

tion; on les opère largement dès le début, mais on observe presque toujours des récidives déplorables. Evidemment il faut les opérer au début, mais même dans ces conditions, il faut s'attendre à des échecs. Ici il n'y a point eu de récidive locale; on trouve sur la lèvre une petite cicatrice blanchâtre, souple; la récidive a eu lieu dans la région du cou. On observe souvent la même marche du côté de l'utérus.

Il est évident que quand le malade a été opéré, il y avait déjà dans les vaisseaux des parcelles de cancer, qui ont été se loger dans le ganglion qui se trouve pris maintenant, ce qui se comprend parfaitement, étant donné que les ganglions sont des sortes de filtres qui retiennent les matières septiques.

M. Verneuil a eu une malade qui, après avoir été opérée d'un cancer de l'utérus, est morte six ans après l'opération.

Ici, le pronostic est extrêmement grave: l'épithélioma s'est diffusé dans toutes les parties voisines. On est tenté tout d'abord de ne pas opérer. D'un autre côté, le malade souffre horriblement, et, au point de vue matériel, il est possible d'enlever toutes les parties malades. C'est en somme une opération grave, difficile, mais qu'on doit faire même en prévoyant un résultat funeste.

On liera d'abord la carotide externe, puis on réséquera la mâchoire, et, avec le morceau de maxillaire qu'on aura enlevé, la tumeur s'en ira.

Il faudra, en outre, se préparer à la trachéotomie, pour que le malade n'étouffe pas si le sang pénétrait dans les voies respiratoires.—*Praticien.*

Traitement antiseptique des abcès par le Dr LUCAS CHAMPIONNIÈRE.—Avant d'ouvrir un abcès, quel qu'il soit, on lave avec soin la région à l'eau phéniquée forte :

Acide phénique cristallisé	50	grammes.
Glycérine	50 à 75	—
Eau.....	1.000	—

On se sert d'un bistouri plongé dans l'eau phéniquée; on vide l'abcès, et on injecte dans sa cavité de la solution forte, en faisant en sorte que le liquide introduit puisse sortir librement. On dispose dans l'orifice un bout de tube de caoutchouc facile à extraire à l'aide d'un fil, et on couvre le tout d'un épais gâteau de charpie imprégné de la solution suivante :

Acide phénique cristallisé.....	25	grammes.
Glycérine	25	—
Eau ..	1.000	—

Le pansement est couvert à son tour d'une feuille de taffetas gommé, convenablement fixée.—Au bout de 24 heures, on retire