

Dans tous les insectes sauteurs, les cuisses postérieures sont ordinairement démesurément renflées. Des sauts prodigieux tels qu'en font plusieurs insectes, demandent aussi des muscles forts et puissants dans les membres qui sont les organes de ce mouvement. Les cuisses, quoique moins souvent que les jambes, sont parfois munies d'appendices plus plus au moins bizarres.

(A continuer).

Liste des Coléoptères pris à Portneuf, Québec.

(Continuée de la page 369, Vol. II).

CHRYSOMELIDES.

ORSODACNA, *Latr.*
 vittata, *Say.*
 ruficollis, *Newm.*
 Childreni, *Kirb.*
 DONACIA, *Fabr.*
 magnifica, *Lec.*
 subtilis, *Kuntze.*
 hirticollis, *Kirby.*
 emarginata, *Kirb.*
 kirbyi, *Lac.*
 confusa, *Lec.*
 SYNETA, *Esch.*
 tripla, *Say.*
 LEMA, *Fabr.*
 trilineata, *Oliv.*
 TRIRHABDA,
 canadensis, *Kirb.*
 ODONTATA, *Chevr.*
 suturalis, *Harr.*
 MICRORHOPALA, *Chevr.*
 vittata, *Fabr.*
 interrupta, *Couper.*
 HISPA, *Newm.*
 rosea, *Web.*

CHELMORPHA, *Chevr.*
 cribraria, *Fabr.*
 COPTOCYCLA, *Chevr.*
 trabeata,
 guttata,
 CASSIDA, *Herbst.*
 palida, *Herb.*
 GALERUCA, *Geoff.*
 tomentosa, *Lin.*
 rufosanguinea, *Say.*
 guttulata, *Lec.*
 DIABROTICA, *Chevr.*
 vittata, *Fabr.*
 12-punctata, *Fabr.*
 PHYLLOBROTICA, *Dej.*
 discoidea, *Fabr.*
 CÆDIONYCHIS, *Latr.*
 quercata, *Fabr.*
 thoracica, *Fabr.*
 HALTICA, *Linn.*
 alternata, *Ill.*
 collaris, *Fabr.*
 bimarginata, *Say.*
 frontalis, *Fabr.*
 violacea, *Mels.*
 nana, *Say.*