

plus coloré et plus gros ici qu'il ne l'est en Angleterre. L'arbre est grand, fort, d'une croissance rapide, et s'étend en une large tête, un peu affaissée par le poids des fruits. Produit de bonne heure, rapporte chaque année, s'épuisant à la production, ce qui abrège son existence. Fruit : gros, quelquefois très gros, et sans dégénérescence, même aux années de sa plus grande production ; parvenu à sa taille normale il prend une forme ronde-conique, s'il arrive à une plus forte taille il devient oblong conique. Couleur : vert, jaunâtre, en partie lavé de rouge foncé et légèrement marbré : Calice, profond et évasé. Chair, jaune, ferme, juteuse, sous acide : Saison : du 10 septembre à décembre. Usage. Cuisine et marché.

McGREGOR'S BAKING.—Plant cultivé pour la première fois, il y a plus de quarante ans, par feu John McGregor, sur sa propriété de *Summer Hill*, sur le chemin de la Côte des Neiges. C'est un arbre d'une grande vigueur et qui déploie une large tête, rapportant de bonne heure mais assez faiblement, chaque année.

FRUIT.—De taille moyenne—uniforme, aplati, épiderme uni et de couleur jaune verdâtre. Chair. Blanche, croquante, dure, juteuse, acide, mais très vendable sur les marchés. Saison, du 25 août au 30 septembre.

SAINT-LAURENT.—Nous devons à M. Guilbault l'histoire assez étrange que nous reproduisons de ce fruit bien connu. Feu Samuel Gerrard, qui demeurait dans la rue Saint-Sulpice, vers l'année 1815, sur une propriété maintenant occupée par l'église paroissiale de Notre Dame avait jeté des pommes pourries sur un tas de fumier. Ce fumier fut transporté comme engrais dans le jardin de feu Henry Shrouder, sur un terrain appartenant aujourd'hui à M. John Molson, au coin des rues Sherbrooke et Saint-Laurent. De cette semence surgirent un grand nombre de pousses au nombre desquelles se trouva la *Saint-Laurent*. Le premier arbre de cette variété existe encore et a donné, l'année dernière deux ou trois minots de récolte. Le tronc mesure environ vingt pouces de diamètre, mais il ne lui reste plus qu'une petite branche. Ce vétéran de nos arbres à fruits, a dû rapporter dès 1828, vu que des bourgeons en furent détachés en 1829 par M. William Lunn, sous le nom de *Hog's Seedling*, M. Hogg étant probablement alors jardinier en cet endroit. Arbre vigoureux et de longue durée, il prend un grand développement, et partant, on ne doit pas le planter à des distances rapprochées. Il produit assez tard, mais tous les ans, une récolte moyenne. Chose étrange ! en certain cas,