

bromures, opium, morphine, cocaïne 1/100, la belladone, le chloral, l'oxalate de cérium, l'arsenic, la tr. d'Iode, la noix vomique.

Certains auteurs vantent la variation dans les aliments, la pepsine, l'alcool, les alcalins, la glace, le régime lacté, le champagne frappé, pulvérisation de chlorure d'éthyle sur le creux épigastrique, le lavage de l'estomac, le gavage, l'électricité.

Sur le col de l'utérus, on a essayé les applications de belladone, de cocaïne, les sangsues, le massage du col, la dilatation du col, le décollement du pôle inférieur de l'oeuf sans rupture des membranes. Ceci n'interrompt pas nécessairement la grossesse, ce qu'il ne vous est jamais permis de faire.

Dans la coqueluche et la laryngite bacillaire, il vous faudra recourir aux antispasmodiques: belladone, bromoforme, antipyrine, badigeonnages de la gorge avec une solution de cocaïne à 1/30, menthol 1/200, résorcine, acide phénique 1/100.

Vomissements d'origine nerveuse centrale.—Ces vomissements trouvent leur cause soit dans une altération de la moelle, soit dans une lésion ou irritation de l'encéphale. Le traitement relève de celui de l'affection générale.

Les vomissements urémiques réclament une saignée, de la dérivation intestinale. Chez les hystériques: ablation de pseudo-tumeurs, isolement, eau colorée, asafoetida, tube de Faucher, électricité.

Vomissements de cause toxique:—Ils peuvent être dus au chloroforme. Au début, ils sont dus à un chloroforme impur; pendant l'anesthésie, à la faute du chloroformisateur qui laisse éveiller son malade ou qui n'a pas poussé l'anesthésie assez loin. Si l'on fait la section de certains organes, nerfs, péritoine, qui les amène par réflexe. Après l'in prétend pouvoir les juguler en faisant une injection de morphine ou en faisant boire un grand verre d'eau froide avant l'opération. S'ils surviennent, on donnera des petits morceaux de glace, du champagne frappé, etc.

Dans les intoxications, les vomissements sont souvent salutaires.

Vomissements périodiques:—Ces vomissements périodiques surviennent soudainement, sans phénomènes anormaux dans les intervalles, surtout chez les jeunes enfants de 2 à 10 ans et sont liés à l'état d'acétonémie. Il faut exclure les viandes rouges, les mets irritants, soigner la constipation il était bien disposé à l'égard de la classe ouvrière et prêt à recevoir gramme toutes les 2 heures.

Contre les vomissements incoercibles des nourrissons, en même temps qu'il règle la qualité et la quantité des tétées, Vanot donne:

Citrate de soude	5 gr.
Eau distillée	300 gr.
Une cuillerée à café avant chaque tétée.	
Il obtiendrait ainsi d'excellents résultats.	