

1° Tout cas de diphtérie sera traité d'emblée par une injection intramusculaire de 20 à 60 centimètres cubes de sérum, selon l'âge, la gravité, la date à laquelle ce traitement intervient.

2° Cete injection sera associée à une injection sous-cutanée faite simultanément, et celle-ci sera répétée les jours suivants (avec ou sans nouvelle injection intramusculaire); elle sera, dans les cas graves, *prolongée plusieurs jours*, même après la disparition des membranes, afin de prolonger l'immunité sérique.

3° On proportionnera les doses à la gravité de la maladie et à la date à laquelle intervient le traitement, sans craindre les doses élevées et en atteignant, dans les cas graves et tardivement traités, la dose massive de 100 centimètres cubes répétée deux à trois jours. Dans les cas d'allure bénigne et traités précocement, les doses peuvent être beaucoup plus modérées.

TEL MAIN 1566
ECHANGE

ASGRAIN & HARBONNEAU
Limitée

28-30, Rue St-Paul Est, — — MONTREAL.

PHARMACIENS EN GROS

Fabricants et Importateurs Instruments de Chirurgie

Instruments et Accessoires pour Dentistes.

Hôpitaux — Dispensaires — Laboratoires.

AMERICAN MACHINIST

322, CRAIG OUEST, MONTREAL.

Galvanoplastie — Instruments de Chirurgie.