

# L'UNION MEDICALE DU CANADA

Revue mensuelle de médecine et de chirurgie, fondée en 1872.

## DIRECTION SCIENTIFIQUE :

MM. A. BERNIER, E. BOULET, E. P. CHAGNON, E. DE COTRET, J. E. DUBÉ,	MM. L. E. FORTIER, A. A. FOUCHER, L. de L'HARWOOD, H. D'ERVIEUX, E. P. LACHAPPELLE,	MM. A. Le SAGE, A. MARIEN, O. F. MERCIER, T. PARIZEAU, C. N. VALIN.
---	---	---

## COLLABORATEURS DE L'ANNEE 1906 :

MM. Benoit, Bougeois, D'Amours, Deleis, Desjardins, Gauthier, Gregor,	MM. Heinck, Joyal, Laramée, Lussier, Laurendeau, Marsan, Pelletier,	MM. Rhéaume, Rouveau, Roy, Sirois, St-Pierre.
---	---	---

⚠ Tout ce qui concerne la rédaction doit être adressé à M. le Dr A. LeSAGE, Secrétaire,  
36, Avenue Laval, Montréal.

Vol. XXXVI

1er DECEMBRE 1907

No 12

## MEMOIRES

### LA PRETUBERCULOSE (1)

Par MM. les docteurs S. BERNHEIM et L. DIEUPART, de Paris.

**SIGNES PARTICULIERS DE LA PRÉTUBERCULOSE.** — Nous allons maintenant passer en revue les signes particuliers de pré-tuberculose proprement dite. Nous le répétons: il ne s'agit pas de diagnostic précoce, ni de symptômes insignifiants, alors qu'en somme, la tuberculose est déjà confirmée.

Ce que nous voulons entendre, ce sont des symptômes qui précèdent la tuberculose, et qui, combattus à temps, peuvent empêcher l'atteinte de la maladie.

I. — *Signe laryngé de M. Fauvel.* — Nous trouvons désigné comme symptôme pré-tuberculeux, une inflammation de la muqueuse pharyngée, rouge et couverte de mucus, puis sèche. Les amygdales et le fond de la gorge sont rouges également. M.

(1) Voir première partie en novembre.