

CHANCRE SIMPLE. — (Chancre mou.) Protéger la plaie contre tout contact irritant et tout traumatisme.

Trois fois par jour lavages avec un tampon d'ouate hydrophile imprégné de la solution suivante.

R	Bichlorure Hg.....	0,50
	Acide tartrique.....	1 gramme
	Solution de sulfate d'indigo à 1/5	V gouttes
	Eau distillée.....	500 grammes

Eponger doucement et sounpoudrer d'iodoforme.

R	Iodoforme pulvérisé.....	5 grammes
---	--------------------------	-----------

Si l'odeur de l'iodoforme ne peut être tolérée, se servir de salol ou d'aristol

R	Salicylate de phényle (salol).....	5 grammes
---	------------------------------------	-----------

ou bien

R	Aristol.....	5 —
---	--------------	-----

cont e le phagédénisme, cautériser au thermocautère les bords et les anfractuosités de la plaie, puis panser avec l'une des poudres indiquées ci-dessus.

CONSTIPATION. — 1° CHEZ L'ADULTE :

Rechercher la cause : cause mécanique : cause alimentaire, défaut de sécrétion des liquides intestinaux, défaut de contractibilité de la couche musculaire de l'intestin, affection de la moelle, etc.

L'alimentation devra se composer principalement de légumes verts, de fruits et de viandes blanches. Potage aux légumes, à l'oseille. Lait et cidre comme boisson.

Insister pour que le malade se présente à la garde-robe tous les matins à la même heure. Conseiller les lavements tièdes, soit à l'eau bouillie pure, soit à l'eau bouillie additionnée de miel, de glycérine ou d'huiles d'olives.

(Miel, glycérine neutre, ou huile d'olives : 2 cuillerées à bouche par lavement).

Recommander l'exercice après les repas, le massage, les bains alcalins. Si ce régime ne suffit pas on aura recours aux laxatifs employés avec modération. On évitera de prescrire l'aloès et les autres drastiques.

Faire prendre deux fois par semaine un verre à bordeaux du mélange laxatif suivant :

R	Sulfate de soude.....	50 grammes
	Phosphate de soude.....	45 —
	Chlorure de sodium.....	5 —
	Eau distillée Q. S. pour 1000 c. cubes ou 1 litre.	

De temps en temps faire prendre le matin au lever une cuillerée à dessert de la poudre suivante :

R	Soufre sublimé lavé.....	10 grammes
	Magésie calcinée.....	10 —
	Rhubarbe pulvérisée.....	10 —
	M. s. a.	

Essayer les pilules suivantes :

R	Podophyllin.....	0,50 centigr.
	Extrait de belladonne.....	0,10 —
	Savon médicinal.....	0,50 —
	M. et diviser en 10 pilules.	

Une de temps en temps le soir au coucher.

On pourra également prescrire les capsules suivantes :

R	Capsules d'huile de ricin (contenant chacune 4 gr. d'huile de ricin), No. 10.	
---	---	--

Une de temps en temps le soir au moment du coucher.

2° CHEZ LES ENFANTS : Il importe également de veiller à ce qu'ils aillent à la garde-robe à des heures régulières.