

receptaculis globosis pedunculatis, caule decumbente, ramis erectis. W.

F. foliis oblongis acutis glabris subtus reticulatis, caule decumbente, ramis erectis, fructibus pedunculatis.

*Thunb. diff. de ficu. n. 11. **

Itabu. Kaempf. amoen. 803.

Aufrechte Feige. W.

Habitat in Japonia. h.

* 33. *FICUS populnea. W.*

F. foliis oblongis breve acuminatis integerrimis glabris. W.

Ficus populifolia. Desf. catal. hort. parif. 209.

Pappelartige Feige. W.

Habitat in America meridionali. h. (v. f. f. fl.)

Folis *bipollicaria et majora oblonga integerrima utrinque glabra longissime petiolata basi parum angustiora et obtusa, apice breve acuminata, acumine obtuso ad unum latus flexo, qua nota folium facile distinguitur. W.*

* 34. *FICUS velutina.*

F. foliis oblongis acutiusculis integerrimis basi obtusis supra glabris subtus pubescenti-mollibus. W.

Ficus velutina. Humboldt et Bonpland.

Sammetartige Feige. W.

Habitat in America meridionali. h. (v. f. f. fl.)

Ramulicraffiti pennae cygneae obsolete angulati pubescentes. Folia petiolata quadri - f. quinquepollicaria et majora oblonga utrinque angustata, basi obtusa subcordata, apice brevissime acuminata obtusa, quandoque apice obtusa absque acumine, margine integerrima supra glabra, subtus dense et mollissime ferrugineo-pubescentia. Petiolus pollicaris pubescens. Costa media subtus ut superficies folii inferior pubescens, sed supra basin macula nigra glabra glandulosa notata. Receptacula non vidi. W.

* 35. *FICUS turbinata. W.*

F. foliis cordato-ovatis obliquis integerrimis subtus scabris, receptaculis turbinatis ecalyculatis. W.

Ficus scabra. Forst. prod. n. 403.

Kreiselförmige Feige. W.

Habitat in Tanna, Namoka. h.