

REVUE DES JOURNAUX

DES FRACTURES DE LA DIAPHYSE DU FÉMUR CHEZ L'ENFANT ET EN PARTICULIER DE LEUR TRAITEMENT

Les fractures du fémur sont parmi les plus fréquentes de l'enfance. Toutes les statistiques concordent sur ce point. Récemment encore le professeur Kirmisson disait qu'il en recevait en moyenne 25 à 30 par an dans son service. En quatorze mois à la consultation de Bretonneau sur 275 fractures chez des enfants entre un et quinze ans que nous avons eues à traiter, nous relevons 43 fractures du fémur dont 41 portant sur le corps de l'os. Nous les trouvons beaucoup plus fréquentes que les fractures des os de l'avant-bras (93), et sensiblement égales à celles des os de la jambe (45), de la clavicule (37) et du coude (36). Mais elles tiennent et de beaucoup la tête comme fréquence dans les fractures des nouveaux-nés et des tout petits.

Tout d'abord on peut les observer dans le cours de la vie intra-utérine (70 p. 100 des fractures intra-utérines sont des fractures du fémur). M. Kaisin Loslever en a récemment rapporté un bel exemple diagnostique par la radiographie. Dans

Syphilis
Artério-sclérose, etc.
(Ioduro-Enzymes)
Todure sans Todisme

Todurase

de COUTURIEUX.

57, Ave. d'Antin, Paris,
en capsules dosées à 50 ctg. d'Io.
dure et 10 ctg. de Levurine.
