jour. 3º Formes cérébrale et méningée simulant à s'y méprendre la méningite cérébro-spinale, (rigidité du cou, Kernig, diminution des réflexes, stupeur, délire, troubles de la sensibilité, paralysie faciale et oculaire, névrite optique, ataxie aiguë etc). Dans ce cas la ponction lombaire seule vient en aide au diagnostic en montrant un liquide clair ou très légèrement louche avec présence de lymphocytes. Assez souvent on trouverait de grandes cellules mononucléaires qui ont pu être regardées dans une certaine mesure comme caractéristiques de la poliomyélite. 4º Forme bulbo cérébelleuse plus rare (Medical Record Koplike, Journal de Médecine de Bordeaux, sept. 1916.

Sur ces notions étiologiques plus ou moins scientifiquement bien assises on a basé les mesures prophylactiques suivantes (Flexner): l'isolement des malades pendant 6 semaines, l'isolement des suspects pendant deux semaines, l'exclusion de l'école pendant six semaines des autres enfants de la même famille; la désinfection en cours de maladie des enfants atteints et des personnes en contact avec les malades; l'hospitalisation des malades n'est pas absolument nécessaire lorsque l'isolement à domicile peut être fait convenablement; on peut se contenter d'un hôpital général au lieu d'un hôpital de contagieux dans le cas où l'isolement du malade est impossible et la surveillance des individus avant été en contact avec le malade est impraticable vu que les cas de contagion à l'hôpital sont très rares, paraît-il, même au temps d'épidémie. Il faut chercher à éviter la contagion par les baisers, la toux et l'éternument, surtout entre jeunes enfants. Comme les mouches ainsi que les animaux domestiques peuvent prendre le virus lors du contact avec des enfants malades et le transporter sur la nourriture (pain, fruits, légumes, biscuits, etc), ou sur les ustensiles de cuisine (mouches), ou directement par le poil ou les pattes (animaux domestiques), il serait à souhaiter que dans les magasins d'alimentation les marchandises soient protégées du contact

a de de le comme la de de