importantes figures jours tragiques de Jagow, est décédé ns. Von Jagow était aires Etrangères au iration de la Grande premier membre du mand à apprendre natum de l'Autriche

prestières de 1933-34 00% selon le rappo ture par le Ministr s, I'hon. M. H. Meris dépasserait 2,600,-

tionnons que le prix t passé de \$12.00 du 00 au cours de l'an portait un entrepre-

Desmarteau, domi-, Montréal, âgée de chez elle ses petitsutres personnes, et ection avait été louée nfants. Soudain le flammes se commuies et aux robes et la t avez trois de e voisine de 10 an eux.—Treize blessés ers venus combattre eur de la machine de onduit à la Sûreté

Ottawa et Washingtraité de réciprocité s discussions publi-18 mars. On menarchandises pouvant Etats-Unis, en vertu a'il sera conclu: mapétrole cru et gazoniques, fer et acier les, fruits frais, coton essions diverses. Le pourrrait exporter; ois et pulpe de bois, écieux, produits chire, fourrures, amian-

ts laitiers. e qu'il y ait oppo a part d'Américains e le poisson, le bétail, erme et le bois.

E L'ACHAT CHEZ 'elle vient d'installer a suite 1001, Immeust, rue Notre-Dame. pourra à l'avenir atv.ces: secrétariat géersorier, office de rennerciaux, bureau du mique, service de la nisation des sections rchands dont le serieu à des critiques et e perdre une impe en appelant PL écrivant à l'adresse

cas des personnes qui Aontréal. igue vise à faciliter la thodique des Canas le domaine éconovue de faire œuvre e met tous ses serà la disposition de ls soient des consome diriger leurs achats ou qu'ils soient des nanciers ou des marionnels ou des agents

connaître leurs maî-

es aux nôtres.

ELEVAGE

## Verrues ou dartres?

M. J.-A. B., de Joly, dans le comté recommande de fréquentes applications nisse qui a le tour de l'œil garni de verrues. Quel remède employer, sans danger pour l'œil"

-Dans le bulletin No 107, du Miniscommunes du bétail" les deux bobos nt décrits au long et nous y trouvons renseignements suivants pour ce qui est des verrues chez les bovins.

#### VERRUES

Les verrues ou papillomes sont des tumeurs, de volume variable, situées très près l'une de l'autre et recouvertes d'une couche épidermique grise, bleuâtre, fendillée.

Au sujet de la nature intime de ces néoplasmes, on en est encore réduit aux suppositions. Bien que les recherches les plus munitieuses n'aient fait découvrir dans leur trame aucun germe, on leur attribue une origine infectieuse. En se basant sur les travaux d'un grand nombre de chercheurs, il semble que les verrues sont des productions de nature virulente, transmissibles d'un animal alade à un jeune animal encore in-

La papillomatose cutance chez les jeunes bovins est fréquente; la plupart du temps, surtout quand le cas est ancine, il existe, mais assez rarement dans Québec, non seulement une série de grappes plus ou moins grosses, pédiculées ou aplaties, sur la ligne inférieure du tronc, allant du bréchet au pis; mais sur d'autres régions, particulièrement au garrot et sur les épaules, quelques tumeurs se sont développées. Le nombre de celles-ci est variable, et. à cause de leur faible volume sont dissimulées sous les poils.

Chez la vache, ce sont les trayons qui sont surtout envahis par ces tumeurs.

L'observation a démontré que ces papillomes ont une marche capricieuse. Parfois, ils disparaissent sans intervention. D'autres fois, ils croissent jusqu'à former des grappes d'un grand poids. Le traîtement est général ou local. n a conseillé l'administration de magnésie calcinée, de bicarbonate de soude, de sous-nitrate de bismuth, de liqueur de Fowler doses, durant 2 semaines, d'acide salicylique, de salicylate de soude, etc. On a enregistré des succès et aussi des échecs.

Localement, employer les attouchéments d'acide acétique glacial, d'acide nitrique, de solutions d'acide tannique. ou bien, appliquer le sulfure d'arsenic après avoir humecté les tumeurs,

Contre les verrues des trayons, surtout contre celles qui sont plates, on . Il vaut mieux brûler ces déchets.

Nous serons bientôt au temps des

aux. Aussi commence-t-on, sur le

arché de Montréal, à parler de ce

sujet. Au cours d'une conversation

avec un de nos principaux acheteurs de

veaux de lait j'ai glané les quelques notes

suivantes que je me permets de trans-

crire ici à l'intention des cultivateurs

Il ne manquera sans doute pas d'in-

térêt de noter ce que lès acheteurs en-

On peut faire un veau de lait avec

un veau de n'importe quelle race pour

ment: le laisser têter est ce qu'il y a r.

peu qu'il réponde aux conditions sur

1 - Avoir été nourri au lait entier seule-

intéressés à cet élevage.

tendent par veau de lait.

de mieux.

vantes:

Ce que doit être un bon veau de lait

irres.

teur en question:

de Lotbinière, nous écrit: "J'ai une gé- d'huile de ricin (castor). Dernièrement. on a préconisé l'injection d'urée sous forme d'une solution à 50% à la dose de 1/2 à 1 cc., sous ou dans les verrues. ce qui amêne leur chute au bout de queltère de l'Agriculture: "Les maladies ques jours. L'injection devrait parfois être répétée.

Le traitement chirurgical, l'ablation aux ciseaux, représente pour beaucoup le traitement de choix. L'excision est suivie de cautérisation. Assez rarement, chez les bovins, l'ablation totale est suivie de récidive. Fait assez curieux, il arrive fréquemment qu'au cours de l'ablation, un certain nombre de verrues passent inaperçues et ne subissent aucun traitement. Malgré cette omission, à la suite de l'opération, la guérison complète est obtenue; même les tumeurs non traitées disparaissent.

Notre correspondant, remarquera que les verrues se localisent généralement sur la ligne inférieure du tronc, allant du bréchet au pis; mais sur d'autres régions, particulièrement au garrot et sur les épaules, quelques tumeurs se sont quel quefois développées. Chez la vache ce sont les trayons qui sont surtout envahis par ces tumeurs.

Peut-être y a-t-il confusion dans le cas qui nous occupe et comme il pourrait plutôt être questions de dartres, qui ont pour foyer, le contour des yeux, et la face des animaux et, à un moindre degré, le cou et les autres parties du corps.

Il convient donc de repéter ici le traitement qui est conseillé pour les dartres, car nous l'avons publié tout récemment. On doit isoler les bêtes atteintes, laver

désinfecter et blanchir les stalles, où elles étaient en ayant soin de se couyrir. les mains de gants.

Le traitement local consiste à saturer chaque plaque d'huile de ricin ou d'huile douce, journellement, jusqu'à ce que les croûtes tombent. Ensuite on gratte légèrement les régions atteintes et on badigeonne les plaques dénuées avec de la teinture d'iode ou avec un onguent Quelques vétérinaires font un onguent soufré en ajoutant à de l'huile de ricin, une quantité suffisante de soufre pour en faire une pâte.

Si plusieurs animaux sont atteints on peut les traiter avec du sulfate de cuivre: quatre onces par chopine d'eau chaude La solution cuprique est appliquée deux fois par semaine. Les plaques autour des yeux sont baignées plusieurs fois par jour avec une solution d'hypochlorite de soude.

On prévient l'expansion de la teigne en évitant la dispersion des poils ou des croûtes provenant des animaux atteints.

Peser de 130 à 180 livres. Il est pre

Etre agé de cinq à six semaines.

férable que son poids soit de 150 à

180 livres. On peut les rendre à 200

Chair et graisse, une fois abattu.

doivent être blanches. Et l'embon-

point du sujet doit être assez avancé

Autant que possible faire teter le

Il est à conseiller d'attacher le veau

immédiatement après chaque repas.

afin de l'empêcher de trop courir et

de se fatiguer inutilement. Ne rien negliger sous le rapport de

la propreté et de l'hygiène

Et pour arriver à ces conditions, voici

quelques conseils que me donnait l'ache-

### La situation des aliments pour les bestiaux au Canada

La situation des aliments à bestiaux au Canada sera influencée par plusieurs facteurs en 1935, dit le rapport de 1935 sur la situation agricole, publié en collaboration par le Ministère fédéral de l'Agriculture et'le Ministère fédéral du Commerce, et qui doit paraître bientôt. Les réserves alimentaires seront beaucoup moins considérables que d'habitude à cause des faibles récoltes de 1934, des besoins domestiques dans les régions affectées par la sécheresse et de la vive demande de la part des Etats-Unis. Dans une grande partie de l'Est du Canada les prés et les pâturages nouvellement ensemencés en 1933 et également en 1934 se ressentiront des mauvaises conditions de température. Les approvisionnements insuffisants de graine de graminées, de trèfies et de luzerne. et les prix élevés de cette graine causeront sans doute une dimunition dans l'étendue ensemencée de ces plantes en 1935. Dans les parties des Provinces des Prairies qui ont été affectées par la secheresse, il s'est mis moins de terre en jachère d'été que d'habitude, et la réserve d'eau dans le sous-sol est insuffisante. Ce sont là des conditions peu savorables aux semailles de graminées et de légumineuses. Ajoutons à ces facteurs désavorables la possibilité que les sauterelles et les vers gris ne détruisent une partie de la récolte de 1935 dans les Provinces des Prairies, tandis que les vers blancs causeront également des dégats, mais moins graves, dans une partie de la Province de Québec.

On espère cependant que les saute relles qui ont prélevé un si lourd tribut sur les plantes fourragères l'année dernière dans les Provinces des Prairies. causeront moins de dégâts en 1935 qu'en 1934, parce que l'invasion a diminué dans les trois provinces, que les chaumes contiennent moins d'œufs et que les cultivateurs qui emploient des moyens répressifs le font avec plus d'habileté. On compte que le ver gris pâle de l'Ouest fera encore son apparition sur de gran-

Tenir le veau à l'abri du soleil. Ceci est particulièrement important si l'on veut conserver la chair et la graisse du veau aussi blanches que possible.

Dans le cas d'une sorté latière qui nourrit son veau, il est à conseiller de la traire un peu avant de laisser téter le veau et non pas de la traire une fois que le veau a tété. Le lait est plus riche en fin de traite; le veau profitera mieux et plus vite si l'on suit cette pratique.

L'âge le plus recommandable pour vendre un veau de lait est six semaines. Plus tôt le sujet ne pese pas suffisamment et plus tard la qualité et la texture de ses chairs, ainsi que leur couleur, subic des changements qui en diminuent la valeur.

Le lait entier donné à un veau qui ne tête pas ne semble pas donner les meilleurs résultats. Ce système de devrait être suivi que lorsque l'on les raisons sérieuses de le faire

Lorsque la chose est possible, il est i recommander de donner des œuss aux yeaux à raison d'un ou deux par jour. Des expériences tentées en maints endroits ont donné de très bons résultats. C'est un moyen de vendre ses œufs à bons prix, particulièrement le printemps alors qu'on en obtient des prix parfois très bas.

# ELLE JOUE DE L'ORGUE A 75 ANS

## Kruschen la protège contre le rhumatisme

Dans une lettre où elle nous explique le secret de sa merveilleuse activité, cette vieille dame déclare:

"Mes mains étaient percluses au point que j'avais dû abandonner le piano et l'orgue et que je ne pouvais pratiquement plus tricoter. Je prends maintenant des Sels Kruschen depuis près de deux ans et je suis enchantée des résubtats obtenus. En août dernier j'ai, touché l'orgue à deux offices religieux et j'espère encore pouvoir faire la même chose en août prochain. Mes doigts ont pratiquement retrouvé toute leur souplesse, bien que je sois âgée de 75 ans, J'ai recommandé les Sels Kruschen à un grand nombre de personnes."—A.A.C., Les six sels mineraux qui composent Kruschen font, effet directement sur le sang, neutralisant l'acide urique, la cause reconnue de rhumatisme. Ils favorisent aussi le bon fonctionnement des organes éliminateurs, empêchant ainsi la constipation et enrayant la formation de l'acide urique et autres posons qui minent la santé.

sons qui minent la santé

des étendues de la Saskatchewan et de l'Alberta. Si les conditions d'humidité et si la température ne sont pas meilleures que d'habitude dans la première partiedela saison on peut s'attendre à de fortes pertes, dans des districts de grande étendue, mais assez éloignés les uns des autres. Dans tous les endroits où l'on sait que les sauterelles et les vers gris abondent, on devrait suivre des procédés d'ameublissement et d'ensomencement conformes aux moyens répressifs recommandés.

### Notes et commentaires

A population de St-Camille de Wolfe vient de reélire M. J.-H, Crépeau pour la trente-neuvième tois consécutive, maire decette muntcipalité essentiellement rurale.

Dans ma paroisse, nous avions celebré, avec assez d'éclat, la réelection d'un maire pour un dixième terme consécutif. Que dire d'un trente-neuvième? Devons-nous comprendre que la population de cette paisible paroisse agricole n'aime pas le changement, ou que son premier magistrat, homme intègre s'il en est un, sait, en dépit des années, s'adapter aux besoins de l'heure pour ce qui a trait à l'administration des affaires municipales.

Cette belle qualité que nous avons personnellement remarquée du président de la Société d'Industrie laitière de Québec, qui, bien que vieillissant d'une année parannée, sait rester jeune quand il est question d'amélioration des systèmes, lorsqu'il s'agit des intérêts agricoles, soit a la direction de la Société d'Industrie laitière, ou au directorat de l'Exposition de Sherbrocke dont il est l'un des membres très actif depuis grand nombre d'années, la majorité des nourrir les veaux à la chaudière no contribuables de Saint-Camille l'a ap-devrait être suivi que lorsque l'on préciée (galement et vient de lui en ren-

> Nous félicitons les électeurs municipaux de St-Camille d'apprécier ainsi la valeur d'un citoyen intègre, charitable et dévoué aux intérêts paroissiaux et l'élu dont la popularité tient à toutes ces belles qualités qu'il possède à un très

Encouragez nos Annonceurs