



**IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)**



**Photographic
Sciences
Corporation**

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

1.8
2.0
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
4.0

**CIHM/ICMH
Microfiche
Series.**

**CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.**



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

01
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

© 1985

The copy filmed here has been reproduced thanks to the generosity of:



Seminary of Quebec
Library

The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in keeping with the filming contract specifications.

Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impression, or the back cover when appropriate. All other original copies are filmed beginning on the first page with a printed or illustrated impression, and ending on the last page with a printed or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche shall contain the symbol \rightarrow (meaning "CONTINUED"), or the symbol ∇ (meaning "END"), whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method:



L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque


Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole \rightarrow signifie "A SUIVRE", le symbole ∇ signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

rrata
to
pelure,
n à



S
L'

SUPPLÉMENT

À

L'HISTOIRE NATURELLE.

Tome Second.

186

REPORT

ANNUAL

1866

E

GE

Scr

Par

d

F

S

DE

86
En Bibl: C: 9: Serchenau

HISTOIRE NATURELLE,

GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE,

Servant de suite à la Théorie de la Terre,
& d'introduction à l'histoire
des Minéraux.

Par M. le Comte DE BÉROUZE, Inten-
dant du Jardin du Roi, de l'Académie
Françoise, & de celle des Sciences, &c.

SUPPLÉMENT, Tome Second.

Séminaire de Québec



A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCLXXIV.

MADE IN

AMERICA

MADE IN

AMERICA

MADE IN

AMERICA

MADE IN

AMERICA

MADE IN

AMERICA

MADE IN

!
I
T
Q
C
S

TABLE

De ce qui est contenu dans
ce Volume.

TROISIÈME MÉMOIRE. *Observations sur la nature de la platine.....* Page 1

QUATRIÈME MÉMOIRE. *Expériences sur la ténacité & sur la décomposition du Fer.....* 57

CINQUIÈME MÉMOIRE. *Expériences sur les effets de la chaleur obscure.....* 98

SIXIÈME MÉMOIRE. *Expériences sur la Lumière, & sur la chaleur qu'elle peut produire..* 141

ARTICLE I.^{er} *Invention des Miroirs pour brûler à de grandes distances.....* ibid.

T A B L E

ARTICLE II. *Réflexions sur le jugement de Descartes , au sujet des miroirs d'Archimède, &c.....* 181

ARTICLE III. *Invention d'autres Miroirs pour brûler à de moindres distances.* 262

EXPLICATION des Figures que représentent le fourneau, &c..... 293

SEPTIÈME MÉMOIRE. *Observations sur les couleurs accidentelles, & sur les ombres colorées....* 309

T A B L E des Matières.. page j
& suiv.



HISTOIRE

ful
l'é
ma
le

ur le
au
rchi-
181
ntion
brûler
. 262
Figu-
four-
. 293
ations
es, &
. 309
page j
suiv.



HISTOIRE NATURELLE.

INTRODUCTION

À L'HISTOIRE DES MINÉRAUX.

PARTIE EXPÉRIMENTALE.

TROISIÈME MÉMOIRE.

OBSERVATIONS *sur la nature* *de la PLATINE.*

ON VIENT de voir que de toutes les substances minérales que j'ai mises à l'épreuve, ce ne sont pas les plus denses, mais les moins fusibles auxquelles il faut le plus de temps pour recevoir & perdre

Supplément. Tome II.

A

STOIRE

2 *Introduction à l'Histoire*

la chaleur ; le fer & l'émeril , qui sont les matières métalliques les plus difficiles à fondre , sont en même temps celles qui s'échauffent & se refroidissent le plus lentement. Il n'y a dans la Nature que la platine qui pourroit être encore moins accessible à la chaleur , & qui la conserveroit plus long-temps que le fer. Ce minéral dont on ne parle que depuis peu , paroît être encore plus difficile à fondre ; le feu des meilleurs fourneaux n'est pas assez violent pour produire cet effet , ni même pour en aglutiner les petits grains qui sont tous anguleux , émoussés , durs , & assez semblables pour la forme , à de la grosse limaille de fer , mais d'une couleur un peu jaunâtre : & quoiqu'on puisse les faire couler sans addition de fondans , & les réduire en masse au foyer d'un bon miroir brûlant , la platine semble exiger plus de chaleur que la mine & la limaille de fer que nous faisons aisément fondre à nos fourneaux de forge. D'ailleurs la densité de la platine étant beaucoup plus grande que celle du fer , les deux qualités de densité & de non-fusibilité se réunissent ici pour rendre cette matière la moins

(a)
assur
mass
livre
de la
(b)
de l'
du J

accessible de toutes au progrès de la chaleur. Je présume donc que la platine seroit à la tête de ma Table & avant le fer si je l'avois mise en expérience, mais il ne m'a pas été possible de m'en procurer un globe d'un pouce de diamètre ; on ne la trouve qu'en grains (a), & celle qui est en masse n'est pas pure, parce qu'on y a mêlé, pour la fondre, d'autres matières qui en ont altéré la nature. Un de mes amis (b), homme de beaucoup d'esprit, qui a la bonté de partager souvent mes vues, m'a mis à portée d'examiner cette substance métallique encore rare, & qu'on ne connoît pas assez. Les Chymistes qui ont travaillé sur la platine, l'ont regardée comme un métal nouveau, parfait, propre, particulier & différent de tous les autres métaux ; ils ont assuré que sa pesanteur

(a) Un homme digne de foi, m'a néanmoins assuré qu'on trouve quelquefois de la platine en masse, & qu'il en avoit vu un morceau de vingt livres pesant qui n'avoit point été fondu, mais tiré de la mine même.

(b) M. le comte de la Billardrie d'Angiviller, de l'Académie des Sciences, Intendant en survivance du Jardin & du Cabinet du Roi.

4 Introduction à l'Histoire

spécifique étoit à très-peu-près égale à celle de l'or, que néanmoins ce huitième métal différoit d'ailleurs essentiellement de l'or, n'en ayant ni la ductilité ni la fusibilité. J'avoue que je suis dans une opinion différente & même toute opposée. Une matière, qui n'a ni ductilité ni fusibilité, ne doit pas être mise au nombre des métaux, dont les propriétés essentielles & communes sont d'être fusibles & ductiles. Et la platine, d'après l'examen que j'en ai pu faire, ne me paroît pas être un nouveau métal différent de tous les autres, mais un mélange, un alliage de fer & d'or formé par la Nature, dans lequel la quantité d'or semble dominer sur la quantité de fer; & voici les faits sur lesquels je crois pouvoir fonder cette opinion.

De huit onces trente-cinq grains de platine que m'a fournie M. d'Angiviller, & que j'ai présentée à une forte pierre d'aimant, il ne m'en est resté qu'une once un gros vingt-neuf grains, tout le reste a été enlevé par l'aimant à deux gros près, qui ont été réduits en poudre qui s'est attachée aux feuilles de papier, & qui les a profondément noircies, comme

des Minéraux, Partie Exp. §

Je le dirai tout-à-l'heure ; cela fait donc à très-peu-près six septièmes du total qui ont été attirés par l'aimant ; ce qui est une quantité si considérable, relativement au tout, qu'il est impossible de se refuser à croire que le fer ne soit contenu dans la substance intime de la platine, & qu'il n'y soit même en assez grande quantité. Il y a plus ; c'est que si je ne m'étois pas lassé de ces expériences, qui ont duré plusieurs jours, j'aurois encore tiré par l'aimant une grande partie du restant de mes huit onces de platine : car l'aimant en attiroit encore quelques grains un à un, & quelquefois deux quand on a cessé de le présenter. Il y a donc beaucoup de fer dans la platine ; & il n'y est pas simplement mêlé comme matière étrangère, mais intimement uni, & faisant partie de la substance, ou si l'on veut le nier, il faudra supposer qu'il existe dans la Nature une seconde matière, qui, comme le fer, est attirable par l'aimant ; mais cette supposition gratuite tombera par les autres faits que je vais rapporter.

Toute la platine que j'ai eu occasion d'examiner, m'a paru mêlée de deux

6 Introduction à l'Histoire

matières différentes, l'une noire & très-attrayable par l'aimant, l'autre en plus gros grains d'un blanc livide un peu jaunâtre & beaucoup moins magnétique que la première ; entre ces deux matières, qui sont les deux extrêmes de cette espèce de mélange, se trouvent toutes les nuances intermédiaires, soit pour le magnétisme, soit pour la couleur & la grosseur des grains. Les plus magnétiques, qui sont en même temps les plus noirs & les plus petits, se réduisent aisément en poudre par un frottement assez léger, & laissent sur le papier blanc la même couleur que le plomb frotté. Sept feuilles de papier dont on s'est servi successivement pour exposer la platine à l'action de l'aimant, ont été noircies sur toute l'étendue qu'occupoit la platine, les dernières feuilles moins que les premières à mesure qu'elle se trioit, & que les grains qui restoit étoient moins noirs & moins magnétiques. Les plus gros grains, qui sont les plus colorés & les moins magnétiques, au lieu de se réduire en poussière comme les petits grains noirs, sont au contraire très-durs & résistent à toute trituration ;

néanmoins ils sont susceptibles d'extension dans un mortier d'agate (c), sous les coups réitérés d'un pilon de même matière, & j'en ai aplati & étendu plusieurs grains au double & au triple de l'étendue de leur surface; cette partie de la platine a donc un certain degré de malléabilité & de ductilité, tandis que la partie noire ne paroît être ni malléable ni ductile. Les grains intermédiaires participent des qualités des deux extrêmes, ils sont aigres & durs, ils se cassent ou s'étendent plus difficilement sous les coups du pilon, & donnent un peu de poudre noire, mais moins noire que la première.

Ayant recueilli cette poudre noire & les grains les plus magnétiques que l'aimant avoit attirés les premiers, j'ai reconnu que le tout étoit du vrai fer, mais dans un état différent du fer ordinaire. Celui-ci réduit en poudre & en limaille, se charge de l'humidité & se rouille aisément; à mesure que la rouille le gagne, il devient

(c) *Nota.* Je n'ai pas voulu les étendre sur le tas d'acier, dans la crainte de leur communiquer plus de magnétisme qu'ils n'en ont naturellement.

8 *Introduction à l'Histoire*

moins magnétique & finit absolument par perdre cette qualité magnétique lorsqu'il est entièrement & intimement rouillé: au lieu que cette poudre de fer, ou si l'on veut ce sablon ferrugineux qui se trouve dans la platine, est au contraire inaccessible à la rouille quelque long-temps qu'il soit exposé à l'humidité; il est aussi plus infusible & beaucoup moins dissoluble que le fer ordinaire, mais ce n'en est pas moins du fer, qui ne m'a paru différer du fer connu que par une plus grande pureté. Ce sablon est en effet du fer absolument dépouillé de toutes les parties combustibles, salines & terreuses qui se trouvent dans le fer ordinaire & même dans l'acier; il paroît enduit & recouvert d'un vernis vitreux qui le défend de toute altération. Et ce qu'il y a de très-remarquable, c'est que ce sablon de fer pur n'appartient pas exclusivement à beaucoup près à la mine de platine; j'en ai trouvé, quoique toujours en petite quantité, dans plusieurs endroits où l'on a fouillé les mines de fer qui se consomment à mes forges. Comme je suis dans l'usage de soumettre à plusieurs épreuves toutes

les mines que je fais exploiter, avant de me déterminer à les faire travailler en grand pour l'usage de mes fourneaux, je fus assez surpris de voir que, dans quelques-unes de ces mines, qui toutes sont en grains, & dont aucune n'est attirable par l'aimant, il se trouvoit néanmoins des particules de fer un peu arrondies & luisantes comme de la limaille de fer, & tout-à-fait semblables au sablon ferrugineux de la platine, elles sont tout aussi magnétiques, tout aussi peu fusibles, tout aussi difficilement dissolubles; tel fut le résultat de la comparaison que je fis du sablon de la platine, & de ce sablon trouvé dans deux de mes mines de fer à trois pieds de profondeur, dans des terrains où l'eau pénètre assez facilement: j'avois peine à concevoir d'où pouvoient provenir ces particules de fer, comment elles avoient pu se défendre de la rouille depuis des siècles qu'elles sont exposées à l'humidité de la terre, enfin comment ce fer très-magnétique pouvoit avoir été produit dans des veines de mines qui ne se sont point du tout. J'ai appelé l'expérience à mon secours, & je me suis assez éclairé sur

tous ces points pour être satisfait. Je savois, par un grand nombre d'observations, qu'aucune de nos mines de fer en grains n'est attirable par l'aimant; j'étois bien persuadé, comme je le suis encore, que toutes les mines de fer, qui sont magnétiques, n'ont acquis cette propriété que par l'action du feu; que les mines du nord, qui sont assez magnétiques pour qu'on les cherche avec la boussole, doivent leur origine à l'élément du feu, tandis que toutes nos mines en grains, qui ne sont point du tout magnétiques, n'ont jamais subi l'action du feu, & n'ont été formées que par le moyen ou l'intermède de l'eau. Je pensai donc que ce sablon ferrugineux & magnétique que je trouvois en petite quantité dans mes mines de fer, devoit son origine au feu; & ayant examiné le local, je me confirmai dans cette idée. Le terrain où se trouve ce sablon magnétique est en bois, de temps immémorial, on y a fait très-anciennement, & on y fait tous les jours des fourneaux de charbon; il est aussi plus que probable qu'il y a eu dans ces bois des incendies considérables. Le charbon & le bois brûlé

des Minéraux, Partie Exp. 11

sur-tout en grande quantité, produisent du mâchefer, & ce mâchefer renferme la partie la plus fixe du fer que contiennent les végétaux; c'est ce fer fixe qui forme le sablon dont il est question lorsque le mâchefer se décompose par l'action de l'air, du soleil & des pluies: car alors ces particules de fer pur, qui ne sont point sujettes à la rouille ni à aucune autre espèce d'altération, se laissent entraîner par l'eau & pénètrent dans la terre avec elle à quelques pieds de profondeur. On pourra vérifier ce que j'avance ici, en faisant broyer du mâchefer bien brûlé, on y trouvera toujours une petite quantité de ce fer pur, qui, ayant résisté à l'action du feu, résiste également à celle des dissolvans, & ne donne point de prise à la rouille (d).

(d) J'ai reconnu, dans le cabinet d'Histoire Naturelle, des sablons ferrugineux de même espèce que celui de mes mines, qui m'ont été envoyés de différens endroits, & qui sont également magnétiques. On en trouve à Quimper en Bretagne, en Danemarck, en Sibérie, à Saint-Domingue, & les ayant tous comparés, j'ai vu que le sablon ferrugineux de Quimper étoit celui qui étoit le plus au mien, & qu'il n'en différoit que par



12 Introduction à l'Histoire

M'étant satisfait sur ce point, & après avoir comparé le sablon tiré de mes mines de fer & du mâchefer avec celui de la platine assez pour ne pouvoir douter de leur identité, je ne fus pas long-temps à penser, vu la pesanteur spécifique de la platine, que si ce sablon de fer pur, provenant de la décomposition du mâchefer, au lieu d'être dans une mine de fer, se trouvoit dans le voisinage d'une mine d'or, il auroit, ens'unissant à ce dernier métal, formé un alliage qui seroit absolument de la même nature que la platine. On sait que l'or & le fer ont un grand degré d'affinité; on sait que la plupart des mines de fer contiennent une petite

un peu plus de pesanteur spécifique. Celui de Saint-Domingue est plus léger, celui de Danemarck est moins pur & plus mélangé de terre, & celui de Sibérie est en masse & en morceaux gros comme le pouce, solides, pesans, & que l'aimant soulève à-peu-près comme si c'étoit une masse de fer pur. On peut donc présumer que ces sablons magnétiques provenans du mâchefer, se trouvent aussi communément que le mâchefer même, mais seulement en bien plus petite quantité. Il est rare qu'on en trouve des amas un peu considérables, & c'est par cette raison qu'ils ont échappé, pour la plupart, aux recherches des Minéralogistes.

quantité d'or; on fait donner à l'or la teinture, la couleur & même l'aigre du fer en les faisant fondre ensemble; on emploie cet or couleur de fer sur différens bijoux d'or, pour en varier les couleurs; & cet or mêlé de fer est plus ou moins gris, & plus ou moins aigre, suivant la quantité de fer qui entre dans le mélange. J'en ai vu d'une teinte absolument semblable à la couleur de la platine. Ayant demandé à un Orfèvre quelle étoit la proportion de l'or & du fer dans ce mélange, qui étoit de la couleur de la platine, il me dit que l'or de 24 karats n'étoit plus qu'à 18 karats, & qu'il y entroit un quart de fer. On verra que c'est à-peu-près la proportion qui se trouve dans la platine naturelle, si l'on en juge par la pesanteur spécifique. Cet or mêlé de fer est plus dur, plus aigre & spécifiquement moins pesant que l'or pur; toutes ces convenances, toutes ces qualités communes avec la platine, m'ont persuadé que ce prétendu métal n'est dans le vrai, qu'un alliage d'or & de fer, & non pas une substance particulière, un métal nouveau, parfait & différent de tous les

après
mines
de la
ter de
mps à
de la
r pur,
mâche-
de fer,
ne mine
dernier
it abso-
platine.
n grand
plupart
e petite
—
ni de Saint-
emarck est
& celui de
ros comme
ant soulève
sse de fer
es sablons
se trouvent
ême, mais
Il est rare
érables, &
é, pour la
tes.

14 Introduction à l'Histoire

autres métaux, comme les Chymistes l'ont avancé.

On peut d'ailleurs le rappeler que l'alliage aigrit tous les métaux, & que quand il y a pénétration, c'est-à-dire, augmentation dans la pesanteur spécifique, l'alliage en est d'autant plus aigre que la pénétration est plus grande, & le mélange devenu plus intime, comme on le reconnoît dans l'alliage appelé *métal des cloches*, quoiqu'il soit composé de deux métaux très-ductiles. Or rien n'est plus aigre ni plus pesant que la platine; cela seul auroit dû faire soupçonner que ce n'est qu'un alliage fait par la Nature, un mélange de fer & d'or, qui doit sa pesanteur spécifique en partie à ce dernier métal, & peut-être aussi en grande partie à la pénétration des deux matières dont il est composé.

Néanmoins cette pesanteur spécifique de la platine n'est pas aussi grande que nos Chymistes l'ont publiée. Comme cette matière traitée seule & sans addition de fondans est très-difficile à réduire en masse, qu'on n'en peut obtenir au feu du miroir brûlant que de très-petites masses, & que les expériences hydrostatiques faites sur

des petits volumes, sont si défectueuses qu'on n'en peut rien conclure, il me paroît qu'on s'est trompé sur l'estimation de la pesanteur spécifique de ce minéral. J'ai mis de la poudre d'or dans un petit tuyau de plume que j'ai pesé très-exactement, j'ai mis dans le même tuyau un égal volume de platine, il pesoit près d'un dixième de moins, mais cette poudre d'or étoit beaucoup trop fine en comparaison de la platine. M. Tillet, qui joint à une connoissance approfondie des métaux, le talent rare de faire des expériences avec la plus grande précision, a bien voulu répéter, à ma prière, celle de la pesanteur spécifique de la platine comparée à l'or pur. Pour cela, il s'est servi comme moi d'un tuyau de plume, & il a fait couper à la cisaille de l'or à 24 karats, réduit autant qu'il étoit possible à la grosseur des grains de la platine, & il a trouvé, par huit expériences, que la pesanteur de la platine différoit de celle de l'or pur d'un quinzième à très-peu-près, mais nous avons observé tous deux, que les grains d'or coupés à la cisaille avoient les angles beaucoup plus vifs que la platine; celle-ci

16 Introduction à l'Histoire

vue à la loupe , est à peu-près de la forme des galets roulés par l'eau, tous les angles sont émoussés, elle est même douce au toucher, au lieu que les grains de cet or coupés à la cisaille, avoient des angles vifs & des pointes tranchantes, en sorte qu'ils ne pouvoient pas s'ajuster ni s'entasser les uns sur les autres aussi aisément que ceux de la platine; tandis qu'au contraire la poudre d'or dont je me suis servi, étoit de l'or en paillettes, telles que les Arpailleurs les trouvent dans le sable des rivières. Ces paillettes s'ajustent beaucoup mieux les unes contre les autres; j'ai trouvé environ un dixième de différence entre le poids spécifique de ces paillettes & celui de la platine; néanmoins ces paillettes ne sont pas ordinairement d'or pur, il s'en faut souvent plus de deux ou trois karats, ce qui en doit diminuer en même rapport la pesanteur spécifique; ainsi, tout bien considéré & comparé, nous avons cru qu'on pouvoit maintenir le résultat de mes expériences, & assurer que la platine en grains & telle que la Nature la produit, est au moins d'un onzième ou d'un douzième moins

pesante que l'or. Il y a toute apparence que cette erreur de fait sur la densité de la platine, vient de ce qu'on ne l'aura pas pesée dans son état de nature, mais seulement après l'avoir réduite en masse : & comme cette fusion ne peut se faire que par l'addition d'autres matières & à un feu très-violent, ce n'est plus de la platine pure, mais un composé dans lequel sont entrées des matières fondantes, & duquel le feu a enlevé les parties les plus légères.

Ainsi, la platine au lieu d'être d'une densité égale ou presque égale à celle de l'or pur, comme l'ont avancé les Auteurs qui en ont écrit, n'est qu'une densité moyenne entre celle de l'or & celle du fer, & seulement plus voisine de celle de ce premier métal que de celle du dernier. Supposant donc que le pied cube d'or pèse treize cens vingt-six livres, & celui du fer pur cinq cens quatre-vingts livres, celui de la platine en grains se trouvera peser environ onze cens quatre-vingt-quatorze livres, ce qui supposeroit plus des trois quarts d'or sur un quart de fer dans cet alliage, s'il n'y a pas de pénétration;

mais, comme on en tire six septièmes à l'aimant, on pourroit croire que le fer y est en quantité de plus d'un quart, d'autant plus qu'en s'obstinant à cette expérience, je suis persuadé qu'on viendroit à bout d'enlever avec un fort aimant, toute la platine jusqu'au dernier grain. Néanmoins on n'en doit pas conclure que le fer y soit contenu en si grande quantité; car, lorsqu'on le mêle par la fonte avec l'or, la masse qui résulte de cette alliage est attirable par l'aimant, quoique le fer n'y soit qu'en petite quantité: j'ai vu entre les mains de M. Baumé, un bouton de cet alliage pesant soixante-six grains, dans lequel il n'étoit entré que six grains, c'est-à-dire un onzième de fer, ce bouton se laissoit enlever aisément par un bon aimant. Dès-lors la platine pourroit bien ne contenir qu'un onzième de fer sur dix onzièmes d'or, & donner néanmoins les mêmes phénomènes, c'est-à-dire, être attirée en entier par l'aimant; & cela s'accorderoit parfaitement avec la pesanteur spécifique qui est d'un douzième moindre que celle de l'or.

Mais ce qui me fait présumer que la platine contient plus d'un onzième de fer

sur dix onzièmes d'or, c'est que l'alliage qui résulte de cette proportion, est encore couleur d'or & beaucoup plus jaune que ne l'est la platine la plus colorée, & qu'il faut un quart de fer sur trois quarts d'or pour que l'alliage ait précisément la couleur naturelle de la platine. Je suis donc très-porté à croire qu'il pourroit bien y avoir cette quantité d'un quart de fer dans la platine. Nous nous sommes assurés, M. Tillet & moi, par plusieurs expériences, que le sablon de ce fer pur que contient la platine, est plus pesant que la limaille de fer ordinaire; ainsi, cette cause ajoutée à l'effet de la pénétration, suffit pour rendre raison de cette grande quantité de fer contenue sous le petit volume indiqué par la pesanteur spécifique de la platine.

Au reste, il est très-possible que je me trompe dans quelques-unes des conséquences que j'ai cru devoir tirer de mes observations sur cette substance métallique; je n'ai pas été à portée d'en faire un examen aussi approfondi que je l'aurois voulu; ce que j'en dis, n'est que ce que j'ai vu, & pourra peut-être servir à faire voir mieux.

P R E M I E R E A D D I T I O N .

COMME j'étois sur le point de livrer ces feuilles à l'impression, le hasard fit que je parlai de mes idées sur la platine, à M. le comte de Milly, qui a beaucoup de connoissances en Physique & en Chymie, il me répondit qu'il pensoit à peu près comme moi sur la nature de ce minéral; je lui donnai le Mémoire ci-dessus pour l'examiner, & deux jours après il eut la bonté de m'envoyer les observations suivantes, que je crois aussi bonnes que les miennes, & qu'il m'a permis de publier ensemble.

« J'ai pesé exactement trente-six grains
 » de platine, je l'ai étendue sur une feuille
 » de papier blanc, pour pouvoir mieux
 » l'observer avec une bonne loupe, j'y
 » ai aperçu ou j'ai cru y apercevoir très-
 » distinctement, trois substances diffé-
 » rentes; la première avoit le brillant
 » métallique, elle étoit la plus abondante;
 » la seconde vitriforme, tirant sur le noir,
 » ressemble assez à une matière métallique
 » ferrugineuse qui auroit subi un degré
 » de feu considérable, telles que des
 » scories de fer, appelées vulgairement

des Minéraux, Partie Exp. 21

mdchefer ; la troisième moins abondante que les deux premières, est du sable de toutes couleurs où cependant le jaune, couleur de topase, domine ; chaque grain de sable considéré à part, offre à la vue des cristaux réguliers de différentes couleurs ; j'en ai remarqué de cristallisés en aiguilles hexagones, se terminant en pyramides comme le cristal-de-roche, & il m'a semblé que ce sable n'étoit qu'un *detritus* de cristaux-de-roche ou de quartz de différentes couleurs.

Je formai le projet de séparer, le plus exactement possible, ces différentes substances par le moyen de l'aimant & de mettre à part la partie la plus attirable à l'aimant, d'avec celle qui l'étoit moins, & enfin de celle qui ne l'étoit pas du tout ; ensuite d'examiner chaque substance en particulier & de les soumettre à différentes épreuves chimiques & mécaniques.

Je mis à part les parties de la platine qui furent attirées avec vivacité à la distance de deux ou trois lignes, c'est-à-dire, sans le contact de l'aimant, & je me servis, pour cette expérience,

22 Introduction à l'Histoire

- » d'un bon aimant factice de M. l'Abbé....;
- » ensuite je touchai avec ce même aimant
- » le métal, & j'en enlevai tout ce qui
- » voulut céder à l'effort magnétique, quo
- » je mis à part; je pesai ce qui étoit resté
- » & qui n'étoit presque plus attirable;
- » cette matière non attirable, & que je
- » nommerai n.^o 4, pesoit vingt-trois grains;
- » n.^o 1.^o qui étoit le plus sensible à l'ai-
- » mant, pesoit quatre grains; n.^o 2, pesoit
- » de même quatre grains; & n.^o 3, cinq
- » grains.
- » N.^o 1.^o examiné à la loupe, n'offroit
- » à la vue qu'un mélange de parties
- » métalliques, d'un blanc sale tirant sur
- » le gris, aplaties & arrondies en forme
- » de galets & de sable noir vitriforme,
- » ressemblant à du mâchefer pilé, dans
- » lequel on apperçoit des parties très-
- » rouillées, enfin telles que les scories de
- » fer en présentent lorsqu'elles ont été
- » exposées à l'humidité.
- » N.^o 2 présentoit à-peu-près la même
- » chose, à l'exception que les parties
- » métalliques dominoient, & qu'il n'y en
- » avoit que très-peu de rouillées.
- » N.^o 3 étoit la même chose, mais

les parties métalliques étoient plus volu-
mineuses, elles ressembloient à du métal
fondu, & qui a été jeté dans l'eau pour
le diviser en grenailles, elles sont aplaties,
elles affectent toutes sortes de figures,
mais arrondies sur les bords à la manière
des galets qui ont été roulés & polis
par les eaux.

N.^o 4 qui n'avoit point été enlevé
par l'aimant, mais dont quelques parties
donnoient encore des marques de sen-
sibilité au magnétisme, lorsqu'on passoit
l'aimant sous le papier où elles étoient
étendues; étoit un mélange de sable,
de parties métalliques & de vrai mâchefer
friable sous les doigts, qui noircissoit à
la manière du mâchefer ordinaire. Le
sable sembloit être composé de petits
crystaux de topase, de cornaline & de
crystal-de-roche; j'en écrasai quelques
crystaux sur un tas d'acier, la poudre
qui en résulta étoit comme du vernis
réduit en poudre; je fis la même chose
au mâchefer, il s'écrasa avec la plus
grande facilité, & il m'offrit une poudre
noire ferrugineuse, qui noircissoit le
papier comme le mâchefer ordinaire.

24 Introduction à l'Histoire

» Les parties métalliques de ce dernier
» (n.º 4), me parurent plus ductiles sous
» le marteau que celles du n.º 1.º, ce
» qui me fit croire qu'elles contenoient
» moins de fer que les premières ; d'où
» il s'ensuit que la platine pourroit fort
» bien n'être qu'un mélange de fer &
» d'or fait par la Nature, ou peut-être
» de la main des hommes, comme je le
» dirai par la suite.

» Je tâcherai d'examiner, par tous les
» moyens qui me seront possibles, la
» nature de la platine, si je peux en
» avoir à ma disposition en suffisante
» quantité ; en attendant, voici les expé-
» riences que j'ai faites.

» Pour m'assurer de la présence du fer
» dans la platine par des moyens chy-
» miques, je pris les deux extrêmes, c'est-
» à-dire, n.º 1.º qui étoit très-attirable à
» l'aimant, & n.º 4 qui ne l'étoit pas, je
» les arrosai avec l'esprit-de-nitre un
» peu fumant ; j'observai avec la loupe ce
» qui en résulteroit, mais je n'y apperçus
» aucun mouvement d'effervescence ; j'y
» ajoutai de l'eau distillée, & il ne se fit
» encore aucun mouvement, mais les
parties

des Minéraux, Partie Exp. 25

parties métalliques se décapèrent, & elles prirent un nouveau brillant semblable à celui de l'argent; j'ai laissé ce mélange tranquille pendant cinq ou six minutes, & ayant encore ajouté de l'eau, j'y laissai tomber quelques gouttes de la liqueur alkaline saturée de la matière colorante du bleu de Prusse, & sur-le-champ le n.º 1.º me donna un très-beau bleu de Prusse.

Le n.º 4 ayant été traité de même, & quoiqu'il se fût refusé à l'action de l'aimant & à celle de l'esprit-de-nitre, me donna de même que le n.º 1.º du très-beau bleu de Prusse.

Il y a deux choses fort singulières à remarquer dans ces expériences; 1.º il passe pour constant parmi les Chymistes, qui ont traité de la platine, que l'eau-forte ou l'esprit-de-nitre n'a aucune action sur elle; cependant, comme on vient de le voir, il s'en dissout assez, quoique sans effervescence, pour donner du bleu de Prusse lorsqu'on y ajoute de la liqueur alkaline phlogistiquée & saturée de la matière

26 Introduction à l'Histoire

» colorante, qui, comme on fait, précipite
» le fer en bleu de Prusse.

» 2.^o La platine, qui n'est pas sensible
» à l'aimant, n'en contient pas moins du
» fer; puisque l'esprit-de-nitre en dissout
» assez, sans occasionner d'effervescence,
» pour former du bleu de Prusse.

» D'où il s'ensuit que cette substance
» que les Chymistes modernes, peut-être
» trop avides du merveilleux & de vouloir
» donner du nouveau, regardent comme
» un huitième métal, pourroit bien n'être,
» comme je l'ai dit, qu'un mélange d'or
» & de fer.

» Il reste sans doute bien des expé-
» riences à faire pour pouvoir déterminer
» comment ce mélange a pu avoir lieu,
» si c'est l'ouvrage de la Nature, &
» comment; ou si c'est le produit de
» quelque volcan, ou simplement le pro-
» duit des travaux que les Espagnols ont
» faits dans le nouveau monde pour retirer
» l'or des mines du Pérou: je ferai mention
» par la suite de mes conjectures là-
» dessus,

» Si l'on frotte de la platine naturelle
» sur un linge blanc, elle le noircit comme

des Minéraux, Partie Exp. 27

pourroit le faire le mâchefer ordinaire, ce qui m'a fait soupçonner que ce sont les parties de fer réduites en mâchefer, qui se trouvent dans la platine qui donnent cette couleur, & qui ne sont dans cet état que pour avoir éprouvé l'action du feu violent. D'ailleurs, ayant examiné une seconde fois de la platine avec ma loupe, j'y aperçus différens globules de mercure coulant, ce qui me fit imaginer que la platine pourroit bien être un produit de la main des hommes, & voici comment.

La platine, à ce qu'on m'a dit, se tire des mines les plus anciennes du Pérou, que les Espagnols ont exploitées après la conquête du nouveau monde : dans ces temps reculés, on ne connoissoit guère que deux manières d'extraire l'or des sables qui le contenoient ; 1.^o par l'amalgame du mercure, 2.^o par le départ à sec : on trituroit le sable aurifère avec du mercure, & lorsqu'on jugeoit qu'il s'étoit chargé de la plus grande partie de l'or, on rejetoit le sable qu'on nommoit *crasse*, comme inutile & de nulle valeur.

28 Introduction à l'Histoire

Le départ à sec se faisoit avec aussi peu d'intelligence; pour y vaquer, on commençoit par minéraliser les métaux aurifères par le moyen du soufre qui n'a point d'action sur l'or, dont la pesanteur spécifique est plus grande que celle des autres métaux; mais, pour faciliter sa précipitation, on ajoute du fer en limaille qui s'empare du soufre surabondant, méthode qu'on suit encore aujourd'hui (e). La force du feu vitrifie une partie du fer, l'autre se combine avec une petite portion d'or & même d'argent qui le mêle avec les scories, d'où on ne peut le retirer que par plusieurs fontes, & sans être bien instruit des intermèdes convenables que les Docimalistes emploient. La Chymie, qui s'est perfectionnée de nos jours, donne à la vérité les moyens de retirer cet or & cet argent en plus grande partie; mais dans le temps où les Espagnols exploitoient les mines du Pérou, ils ignoroient

(e) Voyez les *Éléments docimastiques* de Cramer; *l'Art de traiter les mines*, par Schultzer, Schindeler, &c.

sans doute l'art de traiter les mines avec le plus grand profit; & d'ailleurs ils avoient de si grandes richesses à leur disposition, qu'ils négligeoient vraisemblablement les moyens qui leur auroient coûté de la peine, des soins & du temps; ainsi, il ya apparence qu'ils se contentoient d'une premiere fonte, & jetoient les scories comme inutiles, ainsi que le sable qui avoit passé par le mercure, peut-être même ne faisoient-ils qu'un tas de ces deux mélanges, qu'ils regardoient comme de nulle valeur.

Ces scories contenoient encore de l'or, beaucoup de fer sous différens états, & cela en des proportions différentes qui nous sont inconnues, mais qui sont telles peut-être qu'elles peuvent avoir donné l'existence à la platine. Les globules de mercure que j'ai observés, & les paillettes d'or que j'ai vues distinctement, à l'aide d'une bonne loupe, dans la platine que j'ai eue entre les mains, m'ont fait naître les idées que je viens d'écrire sur l'origine de ce minéral; mais je ne les donne que comme des conjectures hasardées; il faudroit,

30 Introduction à l'Histoire

pour en acquérir quelque certitude ;
savoir au juste où sont situées les mines
de la platine ; si elles ont été exploitées
anciennement, si on la tire d'un terrain
neuf, ou si ce ne sont que des dé-
combres, à quelle profondeur on la
trouve, & enfin si la main des hommes
y est exprimée ou non. Tout cela
pourroit aider à vérifier ou à détruire
les conjectures que j'ai avancées (*f*). »

R E M A R Q U E S.

CES OBSERVATIONS de M. le comte de Milly, confirment les miennes dans presque tous les points. La Nature est une, & se présente toujours la même à ceux qui la savent observer ; ainsi, l'on ne doit pas être surpris que, sans aucune communication, M. de Milly ait vu les mêmes choses que moi, & qu'il en ait tiré la même

(*f*) M. le baron de Sickingen, Ministre de l'Electeur Palatin, a dit à M. de Milly, avoir actuellement entre les mains deux Mémoires qui lui ont été remis par M. Kellner, Chymiste & Métallurgiste, attaché à M. le Prince de Birckenfeld, à Manheim, qui offre à la cour d'Espagne, de rendre à-peu-près autant d'or pesant qu'on lui livrera de platine.

conséquence, que la platine n'est point un nouveau métal, différent de tous les autres métaux, mais un mélange de fer & d'or. Pour concilier encore de plus près ses observations avec les miennes, & pour éclaircir en même temps les doutes qui restent en grand nombre sur l'origine & sur la formation de la platine, j'ai cru devoir ajouter les remarques suivantes.

1.^o M. le comte de Milly distingue dans la platine trois espèces de matières: savoir, deux métalliques, & la troisième non métallique, de substance & de forme quartzeuse ou cristalline; il a observé comme moi, que des deux matières métalliques, l'une est très-attirable par l'aimant, & que l'autre l'est très-peu ou point du tout. J'ai fait mention de ces deux matières comme lui, mais je n'ai pas parlé de la troisième qui n'est pas métallique, parce qu'il n'y en avoit point ou très-peu dans la platine sur laquelle j'ai fait mes observations. Il y a apparence que la platine dont s'est servi M. de Milly, étoit moins pure que la mienne que j'ai observée avec soin, & dans laquelle je n'ai vu que quelques petits globules transparens comme du verre

32 *Introduction à l'Histoire*

blanc fondu, qui étoient unis à des particules de platine ou de sablon ferrugineux, & qui se laissoient enlever ensemble par l'aimant. Ces globules transparens étoient en très-petit nombre, & dans huit onces de platine que j'ai bien regardée & fait regarder à d'autres avec une loupe très-forte, on n'a point aperçu de crystaux réguliers. Il m'a paru au contraire que toutes les particules transparentes étoient globuleuses comme du verre fondu, & toutes attachées à des parties métalliques, comme le laitier s'attache au fer lorsqu'on le fond. Néanmoins comme je ne doutois point du tout de la vérité de l'observation de M. de Milly, qui avoit vu dans sa platine des particules quartzeuses & cristallines, de forme régulière & en grand nombre, j'ai cru ne devoir pas me borner à l'examen de la seule platine dont j'ai parlé ci-devant : j'en ai trouvé au Cabinet du Roi que j'ai examinée avec M. Daubenton, de l'Académie des Sciences, & qui nous a paru à tous deux bien moins pure que la première, & nous y avons en effet remarqué un grand nombre de petits crystaux prismatiques & transparens, les

uns couleur de rubis-balais, d'autres couleur de topase, & d'autres enfin parfaitement blancs; ainsi, M. le comte de Milly ne s'étoit point trompé dans son observation; mais ceci prouve seulement qu'il y a des mines de platine bien plus pures les unes que les autres, & que, dans celles qui le sont le plus, il ne se trouve point de ces corps étrangers. M. Daubenton a aussi remarqué quelques grains aplatis par-dessous & renflés par-dessus, comme seroit une goutte de métal fondu qui se seroit refroidie sur un plan. J'ai vu très-distinctement un de ces grains hémisphériques, & cela pourroit indiquer que la platine est une matière qui a été fondue par le feu; mais il est bien singulier que, dans cette matière fondue par le feu, on trouve des petits cristaux, des topases & des rubis, & je ne sais si l'on ne doit pas soupçonner de la fraude de la part de ceux qui ont fourni cette platine, & qui, pour en augmenter la quantité, auront pu la mêler avec ces sables cristallins, car je le répète, je n'ai point trouvé de ces cristaux dans plus d'une demi-livre de platine que m'a donnée M. le comte d'Angiviller.

34 Introduction à l'Histoire

2.^o J'ai trouvé, comme M. de Milly² des paillettes d'or dans la platine, elles sont aisées à reconnoître par leur couleur, & parce qu'elles ne sont point du tout magnétiques; mais j'avoue que je n'ai pas aperçu les globules de mercure qu'a vus M. de Milly. Je ne veux pas pour cela nier leur existence; seulement il me semble que les pailletes d'or se trouvant avec ces globules de mercure dans la même matière, elles seroient bientôt amalgamées, & ne conserveroient pas la couleur jaune de l'or que j'ai remarquée dans toutes les paillettes d'or que j'ai pu trouver dans une demi-livre de platine (g). D'ailleurs les globules transparens, dont je viens de parler, ressembloit beaucoup à des globules de mercure vif & brillant, en sorte qu'au premier coup d'œil il est aisé de s'y tromper.

3.^o Il y avoit beaucoup moins de parties ternes & rouillées dans ma première platine

(g) J'ai trouvé depuis dans d'autre platine des paillettes d'or qui n'étoient pas jaunes, mais brunes & même noires comme le sablon ferrugineux de la platine, qui probablement leur avoit donné cette couleur noire.

que dans celle de M. de Milly, & ce n'est pas proprement de la rouille qui couvre la surface de ces particules ferrugineuses, mais une substance noire, produite par le feu, & tout-à-fait semblable à celle qui couvre la surface du fer brûlé : mais ma seconde platine, c'est-à-dire, celle que j'ai prise au Cabinet du Roi, avoit encore de commun avec celle de M. le comte de Milly, d'être mêlée de quelques parties ferrugineuses, qui, sous le marteau, se réduisoient en poussière jaune & avoient tous les caractères de la rouille. Ainsi, cette platine du Cabinet du Roi, & celle de M. de Milly, se ressemblant à tous égards, il est vraisemblable qu'elles sont venues du même endroit & par la même voie; je soupçonne même que toutes deux ont été sophistiquées & mêlées de près de moitié, avec des matières étrangères crySTALLINES & ferrugineuses rouillées, qui ne se trouvent pas dans la platine naturelle.

4.° La production du bleu de Prusse par la platine, me paroît prouver évidemment la présence du fer dans la partie même de ce minéral qui est la moins

36 Introduction à l'Histoire

attirable à l'aimant, & confirmer en même temps ce que j'ai avancé du mélange intime du fer dans sa substance. Le décapement de la platine par l'esprit-de-nitre, prouve que, quoiqu'il n'y ait point d'effervescence sensible, cet acide ne laisse pas d'agir sur la platine d'une manière évidente, & que les Auteurs, qui ont assuré le contraire, ont suivi leur routine ordinaire, qui consiste à regarder comme nulle toute action qui ne produit pas l'effervescence. Ces deux expériences de M. de Milly me paroissent très-importantes, elles seroient même décisives si elles réussissoient toujours également.

5.° Il nous manque en effet beaucoup de connoissances qui seroient nécessaires, pour pouvoir pronocer affirmativement sur l'origine de la platine. Nous ne savons rien de l'histoire naturelle de ce minéral, & nous ne pouvons trop exhorter ceux qui sont à portée de l'examiner sur les lieux, de nous faire part de leurs observations. En attendant, nous sommes forcés de nous borner à des conjectures, dont quelques-unes me paroissent seulement plus vraisemblables que les autres. Par

exemple, je ne crois pas que la platine soit l'ouvrage des hommes ; les Mexicains & les Péruviens favoient fondre & travailler l'or, avant l'arrivée des Espagnols, & ils ne connoissoient pas le fer, qu'il auroit néanmoins fallu employer dans le départ à sec en grande quantité. Les Espagnols eux-mêmes n'ont point établi de fourneaux à fondre les mines de fer en cette contrée, dans les premiers temps qu'ils l'ont habitée ; il y a donc toute apparence qu'ils ne sont pas servis de limaille de fer pour le départ de l'or, du moins dans les commencemens de leurs travaux, qui d'ailleurs ne remontent pas à deux siècles & demi, temps beaucoup trop court pour une production aussi abondante que celle de la platine, qu'on ne laisse pas de trouver en assez grande quantité & dans plusieurs endroits.

D'ailleurs lorsqu'on mêle de l'or avec du fer, en les faisant fondre ensemble, on peut toujours, par les voies chymiques, les séparer & retirer l'or en entier ; au lieu que jusqu'à présent les Chymistes n'ont pu faire cette séparation dans la platine, ni déterminer la quantité d'or contenue

38 *Introduction à l'Histoire*

dans ce minéral : cela semble prouver que l'or y est uni d'une manière plus intime que dans l'alliage ordinaire, & que le fer y est aussi, comme je l'ai dit, dans un état différent de celui du fer commun. La platine ne me paroît donc pas être l'ouvrage de l'homme, mais le produit de la Nature, & je suis très-porté à croire qu'elle doit sa première origine au feu des volcans. Le fer brûlé, autant qu'il est possible, intimement uni avec l'or par la sublimation ou par la fusion, peut avoir produit ce minéral, qui, d'abord ayant été formé par l'action du feu le plus violent, aura ensuite éprouvé les impressions de l'eau & les frottemens réitérés qui lui ont donné la forme qu'ils donnent à tous les autres corps, c'est-à-dire, celle des galets & des angles émouffés. Mais il se pourroit aussi que l'eau seule eût produit la platine; car, en supposant l'or & le fer tous deux divisés autant qu'ils peuvent l'être par la voie humide, leurs molécules, en se réunissant, auront pu former les grains qui la composent, & qui depuis les plus pesans jusqu'aux plus légers, contiennent tous de l'or & du

fer. La proposition du Chymiste, qui offre de rendre à-peu-près autant d'or qu'on lui fournira de platine, sembleroit indiquer qu'il n'y a en effet qu'un onzième de fer sur dix onzièmes d'or dans ce minéral ou peut-être encore moins; mais l'à-peu-près de ce Chymiste, est probablement d'un cinquième ou d'un quart, & ce seroit toujours beaucoup si la promesse pouvoit se réaliser à un quart près.

S E C O N D E A D D I T I O N .

M'ÉTANT trouvé à Dijon, cet été 1773, l'Académie des Sciences & Belles-Lettres de cette ville, dont j'ai l'honneur d'être Membre, me parut desirer d'entendre la lecture de mes observations sur la platine; je m'y prêtai d'autant plus volontiers que, sur une matière aussi neuve, on ne peut trop s'informer ni consulter assez, & que j'avois lieu d'espérer de tirer quelques lumières d'une compagnie qui rassemble beaucoup de personnes instruites en tous genres. M. de Morveau, Avocat général au Parlement de Bourgogne, aussi savant Phylicien que grand Jurisconsulte, prit la résolution de travailler

sur la platine ; je lui donnai une portion de celle que j'avois attirée par l'aimant , & une portion de celle qui avoit paru insensible au magnétisme , en le priant d'exposer ce minéral singulier au plus grand feu qu'il lui seroit possible de faire ; & , quelque temps , après il m'a remis les expériences suivantes, qu'il a trouvé bon de joindre ici avec les miennes.

EXPÉRIENCES faites par M. DE MORVEAU, en Septembre 1773.

« M. le comte de Buffon , dans un
 » voyage qu'il a fait à Dijon , cet été
 » 1773 , m'ayant fait remarquer dans un
 » demi-gros de platine , que M. Baumé
 » m'avoit remis en 1768 , des grains en
 » forme de boutons , d'autres plus plats,
 » & quelques-uns noirs & écailleux ; &
 » ayant séparé avec l'aimant ceux qui
 » étoient attirables de ceux qui ne don-
 » noient aucun signe sensible de magné-
 » tisme , j'ai essayé de former le bleu de
 » Prusse avec les uns & les autres. J'ai
 » versé de l'acide nitreux fumant sur les
 » parties non-atirables qui pesoient deux

des Minéraux, Partie Exp. 41

grains & demi; six heures après, j'ai
étendu l'acide par de l'eau distillée, &
j'y ai versé de la liqueur alkaline saturée
de matière colorante, il n'y a pas eu
un atome de bleu, la platine avoit
seulement un coup d'œil plus brillant.
J'ai pareillement versé de l'acide fumant
sur les 33 grains $\frac{1}{2}$ de platine restante,
dont partie étoit attirable, la liqueur
étendue après le même intervalle de
temps, le même alkali Prussien en a
précipité une fécule bleue, qui couvroit
le fond d'un vase assez large. La platine,
après cette opération, étoit bien décapée
comme la première, je l'ai lavée &
séchée, & j'ai vérifié qu'elle n'avoit
perdu qu'un quart de grain ou $\frac{1}{138}$;
l'ayant examinée en cet état, j'y ai
aperçu un grain d'un beau jaune qui
s'est trouvé sur une paillette d'or.

M. de Fourcy avoit nouvellement
publié que la dissolution d'or étoit aussi
précipitée en bleu par l'alkali Prussien,
& avoit consigné ce fait dans une Table
d'affinité; je fus tenté de répéter cette
expérience, je versai en conséquence
de la liqueur alkaline phlogistiquée dans

42 Introduction à l'Histoire

» de la dissolution d'or de départ, mais la
» couleur de cette dissolution ne changea
» pas, ce qui me fait soupçonner que la
» dissolution d'or employée par M. de
» Fourcy, pouvoit bien n'être pas aussi
» pure.

» Et, dans le même temps, M. le comte
» de Buffon m'ayant donné une assez
» grande quantité d'autre platine pour en
» faire quelques essais, j'ai entrepris de
» la séparer de tous les corps étrangers
» par une bonne fonte; voici la manière
» dont j'ai procédé, & les résultats que
» j'ai eus.

PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

» AYANT mis un gros de platine dans
» une petite coupelle, sous la moufle du
» fourneau, donné par M. Macquer
» dans les Mémoires de l'Académie des
» Sciences, année 1758, j'ai soutenu le
» feu pendant deux heures, la moufle
» s'est affaïlée, les supports avoient coulé;
» cependant la platine s'est trouvée seu-
» lement aglutinée, elle tenoit à la coupelle
» & y avoit laissé des taches couleur de
» rouille; la platine étoit alors terne, même

un peu noire, & n'avoit pris qu'un quart de grain d'augmentation de poids, ce quantité bien foible en comparaison de celle que d'autres Chymistes ont observée; ce qui me surprit d'autant plus, que ce gros de platine, ainsi que toute celle que j'ai employée aux autres expériences, avoit été enlevé successivement par l'aimant, & faisoit portion des six septièmes de 8 onces dont M. de Buffon a parlé dans le Mémoire ci-dessus.

DEUXIÈME EXPÉRIENCE.

UN DEMI-GROS de la même platine, exposé au même feu dans une coupelle, s'est aussi aglutiné, elle étoit adhérente à la coupelle, sur laquelle elle avoit laissé des taches de couleur de rouille; l'augmentation de poids s'est trouvée à-peu-près dans la même proportion, & la surface aussi noire.

TROISIÈME EXPÉRIENCE.

J'AI REMIS ce même demi-gros dans une nouvelle coupelle, mais au lieu de mouffle, j'ai renversé sur le support un creuset de plomb noir de Passaw; j'avois

44 *Introduction à l'Histoire*

eu l'attention de n'employer pour support que des têts d'argile pure très-réfractaire, par ce moyen je pouvois augmenter la violence du feu & prolonger sa durée, sans craindre de voir couler les vaisseaux, ni obstruer l'argile par les scories; cet appareil ainsi placé dans le fourneau, j'y ai entretenu, pendant quatre heures, un feu de la dernière violence; lorsque tout a été refroidi, j'ai trouvé le creuset bien conservé, soudé au support; ayant brisé cette soudure vitreuse, j'ai reconnu que rien n'avoit pénétré dans l'intérieur du creuset qui paroissoit seulement plus luisant qu'il n'étoit auparavant. La coupelle avoit conservé sa forme & sa position, elle étoit un peu fendillée, mais pas assez pour se laisser pénétrer, aussi le bouton de platine n'y étoit-il pas adhérent; ce bouton n'étoit encore qu'aglutiné, mais d'une manière bien plus serrée que la première fois, les grains étoient moins saillans, la couleur en étoit plus claire, le brillant plus métallique; & ce qu'il y eut de plus remarquable, c'est qu'il s'étoit élancé de sa surface, pendant

des Minéraux, Partie Exp. 45

l'opération, & probablement dans les premiers instans du refroidissement, trois jets de verre, dont l'un plus élevé, parfaitement sphérique, étoit porté sur un pédicule d'une ligne de hauteur, de la même matière transparente & vitreuse; ce pédicule avoit à peine un sixième de ligne, tandis que le globe avoit une ligne de diamètre, d'une couleur uniforme, avec une légère teinte de rouge, qui ne déroboit rien à sa transparence; des deux autres jets de verre, le plus petit avoit un pédicule comme le plus gros, & le moyen n'avoit point de pédicule, & étoit seulement attaché à la platine par sa surface extérieure.

QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

J'ai essayé de coupeller la platine, & pour cela j'ai mis dans une coupelle un gros des mêmes grains enlevés par l'aimant, avec deux gros de plomb. Après avoir donné un très-grand feu pendant deux heures, j'ai trouvé dans la coupelle un bouton adhérent, couvert d'une croûte jaunâtre & un peu

46 Introduction à l'Histoire

» spongieuse , du poids de 2 gros 12
» grains , ce qui annonçoit que la platine
» avoit retenu 1 gros 12 grains de plomb.
» J'ai remis ce bouton dans une autre
» coupelle au même fourneau , observant
» de le retourner , il n'a perdu que 12
» grains dans un feu de deux heures ,
» la couleur & sa forme avoient très-
» peu changé.

» Je lui ai appliqué ensuite le vent
» du soufflet , après l'avoir placé dans une
» nouvelle coupelle couverte d'un creuset
» de Passaw , dans la partie inférieure d'un
» fourneau de fusion dont j'avois ôté la
» grille ; le bouton a pris alors un coup
» d'œil plus métallique , toujours un peu
» terne , & cette fois il a perdu 18 grains.
» Le même bouton ayant été remis
» dans le fourneau de M. Macquer , tou-
» jours placé dans une coupelle couverte
» d'un creuset de Passaw , je soutins le
» feu pendant trois heures , après lesquelles
» je fus obligé de l'arrêter , parce que les
» briques qui servoient de support , avoient
» entièrement coulé ; le bouton étoit
» devenu de plus en plus métallique , il
» adhéroit pourtant à la coupelle , il avoit

des Minéraux, Partie Exp. 47

perdu cette fois 34 grains. Je le jetai
dans l'acide nitreux fumant pour essayer
de le décaper, il y eut un peu d'effervescence
lorsque j'ajoutai de l'eau distillée, le bouton
y perdit effectivement deux grains, & j'y
remarquai quelques petits trous, comme ceux
que laisse le départ.

Il ne restoit plus que 22 grains de plomb
alliés à la platine, à en juger par l'excédant
de son poids; je commençai à espérer de
vitrifier cette dernière portion de plomb, &
pour cela je mis ce bouton dans une
coupelle neuve, je disposai le tout comme
dans la troisième expérience; je me servis
du même fourneau, en observant de dégager
continuellement la grille, d'entretenir au-
devant dans le courant d'air qu'il attiroit,
une évaporation continue par le moyen
d'une capsule que je remplissois d'eau
de temps en temps, & de laisser un
moment la chape ouverte lorsqu'on venoit
de remplir le fourneau de charbon; ces
précautions augmentèrent tellement l'activité
du feu, qu'il falloit recharger de dix
minutes

48 *Introduction à l'Histoire*

» en dix minutes ; je le soutins au même
» degré pendant quatre heures & je laissai
» refroidir.

» Je reconnus le lendemain que le
» creuset de plomb noir avoit résisté ,
» que les supports n'étoient que fayencés
» par les cendres ; je trouvai dans la
» coupelle un bouton bien rassemblé ,
» nullement adhérent, d'une couleur con-
» tinue & uniforme, approchant plus de
» la couleur de l'étain que de tout autre
» métal, seulement un peu raboteux ; en
» un mot, pesant un gros très-juste, rien
» de plus, rien de moins.

» Tout annonçoit donc que cette platine
» avoit éprouvé une fusion parfaite, qu'elle
» étoit parfaitement pure ; car, pour sup-
» poser qu'elle tenoit encore du plomb ,
» il faudroit supposer aussi que ce minéral
» avoit justement perdu de sa propre
» substance autant qu'il avoit retenu de
» matière étrangère ; & une telle précision
» ne peut être l'effet d'un pur hasard.

» Je devois passer quelques jours avec
» M. le comte de Buffon, dont la société
» a, si je puis le dire, le même charme
» que son style, dont la conversation est
» aussi

des Minéraux, Partie Exp. 49

aussi pleine que ses livres, je me fis un plaisir de lui porter les produits de ces essais, & je remis à les examiner ultérieurement avec lui.

1.^o Nous avons observé que le gros de platine aglutinée de la première expérience, n'étoit pas attiré en bloc par l'aimant, que cependant le barreau magnétique avoit une action marquée sur les grains que l'on en détachoit.

2.^o Le demi-gros de la troisième expérience n'étoit non-seulement pas attirable en masse, mais les grains que l'on en séparoit ne donnoient plus eux-mêmes aucun signe de magnétisme.

3.^o Le bouton de la quatrième expérience étoit aussi absolument insensible à l'approche de l'aimant, ce dont nous nous assurâmes, en mettant le bouton en équilibre dans une balance très-sensible, & lui présentant un très-fort aimant jusqu'au contact, sans que son approche ait le moindrement dérangé l'équilibre.

4.^o La pesanteur spécifique de ce bouton fut déterminée par une bonne balance hydrostatique, & pour plus de

50 Introduction à l'Histoire

» sûreté, comparée à l'or de monnoie &
» au globe d'or très-pur, employé par
» M. de Buffon à ses belles expériences
» sur le progrès de la chaleur; leur densité
» se trouva avoir les rapports suivans, avec
» l'eau dans laquelle ils furent plongés.

» Le globe d'or..... 19 $\frac{1}{2}$.

» L'or de monnoie..... 17 $\frac{1}{2}$.

» Le bouton de platine.... 14 $\frac{1}{2}$.

» 5.^e Ce bouton fut porté sur un tas
» d'acier pour essayer sa ductilité, il soutint
» fort bien quelques coups de marteau,
» sa surface devint plane & même un peu
» polie dans les endroits frappés, mais il
» se fendit bientôt après, & il s'en détacha
» une portion, faisant à peu-près le sixième
» de la totalité; la fracture présenta plu-
» sieurs cavités, dont quelques-unes
» d'environ une ligne de diamètre avoient
» la blancheur & le brillant de l'argent,
» on remarquoit dans d'autres de petites
» pointes élançées, comme les crySTALLISA-
» tions dans les géodes; le sommet de
» l'une de ces pointes vu à la loupe,
» étoit un globule absolument semblable,
» pour la forme, à celui de la troisième

des Minéraux, Partie Exp. 51

expérience & aussi de matière vitreuse & transparente, autant que son extrême petitesse permettoit d'en juger. Au reste, toutes les parties du bouton étoient compactes, bien liées, & le grain plus fin, plus serré que celui du meilleur acier après la plus forte trempe, auquel il ressembloit d'ailleurs par la couleur.

6.° Quelques portions de ce bouton, ainsi réduites en parcelles à coups de marteau sur le tas d'acier, nous leur avons présenté l'aimant, & aucune n'a été attirée; mais les ayant encore pulvérisées dans un mortier d'agate, nous avons remarqué que le barreau magnétique en enlevoit quelques-unes des plus petites toutes les fois qu'on le posoit immédiatement dessus.

Cette nouvelle apparition du magnétisme étoit d'autant plus surprenante, que les grains détachés de la masse aglutinée de la deuxième expérience, nous avoient paru avoir perdu eux-mêmes toute sensibilité à l'approche & au contact de l'aimant; nous reprîmes en conséquence quelques-uns de ces grains, ils furent de même réduits en poussière dans le

§ 2 Introduction à l'Histoire

» mortier d'agate, & nous vîmes bientôt
» les parties les plus petites, s'attacher
» sensiblement au barreau aimanté, il n'est
» pas possible d'attribuer cet effet au poli
» de la surface du barreau ni à aucune
» autre cause étrangère au magnétisme,
» un morceau de fer aussi poli, appliqué
» de la même manière sur les parties de
» cette platine, n'en a jamais pu enlever
» une seule.

» Par le récit exact de ces expériences
» & des observations auxquelles elles ont
» donné lieu, on peut juger de la difficulté
» de déterminer la nature de la platine ;
» il est bien certain que celle-ci contenoit
» quelques parties vitrifiables, & vitrifiables
» même sans addition à un grand feu ; il
» est bien sûr que toute platine contient
» du fer & des parties attirables ; mais si
» l'alkali Prussien ne donnoit jamais du
» bleu qu'avec les grains que l'aimant a
» enlevés, il semble qu'on en pourroit
» conclure, que ceux qui lui résistent
» absolument sont de la platine pure, qui
» n'a par elle-même aucune vertu mag-
» nétique, & que le fer n'en fait pas
» partie essentielle. On devoit espérer

des Minéraux, Partie Exp. 13

qu'une fusion aussi avancée, une coupellation aussi parfaite décideroient au moins cette question ; tout annonçoit qu'en effet ces opérations l'avoient dépouillée de toute vertu magnétique en la séparant de tous corps étrangers, mais la dernière observation prouve, d'une manière invincible, que cette propriété magnétique n'y étoit réellement qu'affoiblie, & peut-être masquée ou ensevelie, puisqu'elle a reparu lorsqu'on l'a broyée.

R E M A R Q U E S.

DE ces expériences de M. de Morveau, & des observations que nous avons ensuite faites ensemble, il résulte :

1.^o Qu'on peut espérer de fondre la platine sans addition dans nos meilleurs fourneaux, en lui appliquant le feu plusieurs fois de suite, parce que les meilleurs creusets ne pourroient résister à l'action d'un feu aussi violent, pendant tout le temps qu'exigeroit l'opération complète.

2.^o Qu'en la fondant avec le plomb, & la coupellant successivement & à plusieurs reprises, on vient à bout de vitrifier

54 *Introduction à l'Histoire*

tout le plomb, & que cette opération pourroit à la fin la purger d'une partie des matières étrangères qu'elle contient.

3.^o Qu'en la fondant sans addition, elle paroît se purger elle-même en partie des matières vitrescibles qu'elle renferme, puisqu'il s'élançe à la surface des petits jets de verre qui forment des masses assez considérables, & qu'on en peut séparer aisément après le refroidissement.

4.^o Qu'en faisant l'expérience du bleu de Prusse avec les grains de platine, qui paroissent les plus insensibles à l'aimant, on n'est pas toujours sûr d'obtenir de ce bleu; comme cela ne manque jamais d'arriver avec les grains qui ont plus ou moins de sensibilité au magnétisme; mais comme M. de Morveau a fait cette expérience sur une très-petite quantité de platine, il se propose de la répéter.

5.^o Il paroît que ni la fusion ni la coupellation ne peuvent détruire dans la platine tout le fer dont elle est intimement pénétrée; les boutons fondus ou coupelés, paroissent à la vérité également insensibles à l'action de l'aimant, mais les ayant brisés dans un mortier d'agate & sur un

des Minéraux, Partie Exp. . 55

tas d'acier, nous y avons retrouvé des parties magnétiques, d'autant plus abondantes que la platine étoit réduite en poudre plus fine : le premier bouton, dont les grains ne s'étoient qu'aglutinés, rendit étant broyé, beaucoup plus de parties magnétiques que le second & le troisième, dont les grains avoient subi une plus forte fusion, mais néanmoins tous deux étant broyés, fournirent des parties magnétiques, en sorte qu'on ne peut pas douter qu'il n'y ait encore du fer dans la platine, après qu'elle a subi les plus violens efforts du feu & l'action dévorante du plomb dans la coupelle; ceci semble achever de démontrer que ce minéral est réellement un mélange intime d'or & de fer, que jusqu'à présent l'art n'a pu séparer.

6.^o Je fis encore, avec M. de Morveau, une autre observation sur cette platine fondue & ensuite broyée, c'est qu'elle reprend, en se brisant, précisément la même forme des galets arrondis & aplatis qu'elle avoit avant d'être fondue; tous les grains de cette platine fondue & brisée, sont semblables à ceux de la platine

56. *Introduction à l'Histoire.*

naturelle , tant pour la forme que pour la variété de grandeur , & ils ne paroissent en différer que parce qu'il n'y a que les plus petits qui se laissent enlever à l'aimant , & en quantité d'autant moindre , que la platine a subi plus de feu. Cela paroît prouver aussi que , quoique le feu ait été assez fort , non-seulement pour brûler & vitrifier, mais même pour chasser au-dehors une partie du fer avec les autres matières vitrescibles qu'elle contient , la fusion néanmoins n'est pas aussi complète que celle des autres métaux parfaits , puisqu'en la brisant les grains reprennent la même figure qu'ils avoient avant la fonte.



qu
fo
&
ju
pa
po
étr
du
de
ma
bou
est
qu
qu
nel
bie
doi
chû
la f

QUATRIÈME MÉMOIRE.

EXPÉRIENCES sur la ténacité & sur la décomposition du Fer.

ON A VU, dans le premier Mémoire, que le fer perd de sa pesanteur à chaque fois qu'on le chauffe à un feu violent, & que des boulets chauffés trois fois jusqu'au blanc, ont perdu la douzième partie de leur poids; on seroit d'abord porté à croire, que cette perte ne doit être attribuée qu'à la diminution du volume du boulet, par les scories qui se détachent de la surface & tombent en petites écailles; mais si l'on fait attention que les petits boulets, dont par conséquent la surface est plus grande, relativement au volume, que celle des gros, perdent moins, & que les gros boulets perdent proportionnellement plus que les petits, on sentira bien que la perte totale de poids, ne doit pas être simplement attribuée à la chute des écailles qui se détachent de la surface, mais encore à une altération

98 *Introduction à l'Histoire*

intérieure de toutes les parties de la masse que le feu violent diminue, & rend d'autant plus légère qu'il est appliqué plus souvent & plus long-temps (a).

Et en effet, si l'on recueille à chaque fois les écailles, qui se détachent de la surface des boulets, on trouvera que sur un boulet de 5 pouces qui, par exemple, aura perdu huit onces par une première chaude, il n'y aura pas une once de ces écailles détachées, & que tout le reste de la perte de poids ne peut être attribué qu'à cette altération intérieure de la substance du fer qui perd de sa densité à chaque fois qu'on le chauffe; en sorte que si l'on répéteroit souvent cette même opération, on réduiroit le fer à n'être plus qu'une manière friable & légère, dont on ne pourroit faire aucun usage; car j'ai

(a) Une expérience familière, & qui semble prouver que le fer perd de sa masse à mesure qu'on le chauffe, même à un feu très-médiocre, c'est que les fers à friser, lorsqu'on les a souvent trempés dans l'eau pour les refroidir, ne conservent pas le même degré de chaleur au bout d'un temps. Il s'en élève aussi des écailles lorsqu'on les a souvent chauffés & trempés; ces écailles sont du véritable fer.

remarqué que les boulets non-seulement avoient perdu de leur poids, c'est-à-dire, de leur densité, mais qu'en même temps ils avoient aussi beaucoup perdu de leur solidité; c'est-à-dire, de cette qualité dont dépend la cohérence des parties; car j'ai vu, en les faisant frapper, qu'on pouvoit les casser d'autant plus aisément qu'ils avoient été chauffés plus souvent & plus long-temps.

C'est sans doute parce que l'on ignoroit jusqu'à quel point va cette altération du fer, ou plutôt parce qu'on ne s'en doutoit point du tout, que l'on imagina, il y a quelques années, dans notre Artillerie, de chauffer les boulets dont il étoit question de diminuer le volume (b). On m'a assuré que le calibre des canons nouvellement fondus, étant plus étroit que celui des anciens canons, il a fallu diminuer les boulets, que, pour y parvenir, on a fait rougir ces boulets à blanc afin de les rarifier ensuite plus aisément en les faisant tourner: on m'a ajouté, que souvent

(b) M. le marquis de Vallière ne s'occupoit point lors des travaux de l'Artillerie.

60 *Introduction à l'Histoire*

on est obligé de les faire chauffer cinq, six & même huit & neuf fois pour les réduire autant qu'il est nécessaire. Or il est évident, par mes expériences, que cette pratique est mauvaise, car un boulet chauffé à blanc neuf fois, doit perdre au moins le quart de son poids, & peut-être les trois quarts de sa solidité. Devenu cassant & friable, il ne peut servir pour faire brèche, puisqu'il se brise contre les murs, &, devenu léger, il a aussi pour les pièces de campagne le grand désavantage de ne pouvoir aller aussi loin que les autres.

En général, si l'on veut conserver au fer sa solidité & son nerf, c'est-à-dire, sa masse & sa force, il ne faut l'exposer au feu ni plus souvent ni plus long-temps qu'il est nécessaire; il suffira, pour la plupart des usages, de le faire rougir sans pousser le feu jusqu'au blanc; ce dernier degré de chaleur ne manque jamais de le détériorer: &, dans les ouvrages où il importe de lui conserver tout son nerf, comme dans les bandes que l'on forge pour les canons de fusil, il faudroit, s'il étoit possible, ne les chauffer qu'une fois

des Minéraux, Partie Exp. 61

pour les battre, plier & souder par une seule opération; car, quand le fer est acquis, sous le marteau, toute la force dont il est susceptible, le feu ne fait plus que la diminuer; c'est aux Artistes à voir jusqu'à quel point ce métal doit être mallé pour acquérir tout son nerf, & cela ne seroit pas impossible à déterminer par des expériences; j'en ai fait quelques-unes que je vais rapporter ici.

I.

UNE BOUCLE de fer de 18 lignes $\frac{2}{3}$ de grosseur, c'est à dire, 348 lignes quarrées pour chaque montant de fer, ce qui fait pour le tout 696 lignes quarrées de fer, a cassé sous le poids de 28 milliers qui tiroit perpendiculairement; cette boucle de fer avoit environ 10 pouces de largeur, sur 13 pouces de hauteur, & elle étoit à très-peu-près de la même grosseur partout. Cette boucle a cassé presque au milieu des branches perpendiculaires, & non pas dans les angles.

Si l'on vouloit conclure du grand au petit sur la force du fer par cette expérience, il se trouveroit que chaque ligne

62 Introduction à l'Histoire

quarrée de fer tirée perpendiculairement, ne pourroit porter qu'environ 40 livres.

II.

Cependant, ayant mis à l'épreuve un fil de fer d'une ligne un peu forte de diamètre, ce morceau de fil de fer a porté, avant de se rompre, 482 livres. Et un pareil morceau de fil de fer, n'a rompu que sous la charge de 495 livres; en sorte qu'il est à présumer qu'une verge quarrée d'une ligne de ce même fer auroit porté encore davantage, puisqu'elle auroit contenu quatre segmens aux quatre coins du quarré inscrit au cercle, de plus que le fil de fer rond, d'une ligne de diamètre.

Or cette disproportion dans la force du fer en gros & du fer en petit, est énorme. Le gros fer que j'avois employé, venoit de la forge d'Aisy sous Rougemont, il étoit sans nerf & à gros grain, & j'ignore de quelle forge étoit mon fil de fer, mais la différence de la qualité du fer, quelque grande qu'on voulût la supposer, ne peut pas faire celle qui se trouve ici dans leur résistance, qui, comme

des Minéraux, Partie Exp. 63

On voit, est douze fois moindre dans le gros fer que dans le petit.

I I I.

J'AI FAIT rompre une autre boucle de fer de 18 lignes $\frac{1}{2}$ de grosseur, du même fer de la forge d'Aisy; elle ne supporta de même que 28450 livres, & rompit encore presque dans le milieu des deux montans.

I V.

J'AVOIS FAIT faire en même temps une boucle du même fer que j'avois fait reforgé pour le partager en deux, en sorte qu'il se trouva réduit à une barre de 9 lignes sur 18; l'ayant mise à l'épreuve, elle supporta, avant de rompre, la charge de 17300 livres, tandis qu'elle n'auroit dû porter tout au plus que 14 milliers, si elle n'eût pas été forgée une seconde fois.

V.

UNE autre boucle de fer de 16 lignes $\frac{1}{4}$ de grosseur, ce qui fait pour chaque montant à peu-près 280 lignes carrées, c'est-à-dire, 260, a porté 24600 livres,

64 Introduction à l'Histoire

au lieu qu'elle n'auroit dû porter que 22400 livres, si je ne l'eusse pas fait forger une seconde fois.

V I.

UN CADRE de fer de la même qualité, c'est-à-dire, sans nerf & à gros grains, & venant de la même forge d'Aisy, que j'avois fait établir pour empêcher l'écartement des murs du haut fourneau de mes forges, & qui avoit 26 pieds d'un côté sur 22 pieds de l'autre, ayant cassé par l'effort de la chaleur du fourneau dans les deux points milieux des deux plus longs côtés, j'ai vu que je pouvois comparer ce cadre aux boucles des expériences précédentes, parce qu'il étoit du même fer, & qu'il a cassé de la même manière : or ce fer avoit 21 lignes de gros, ce qui fait 441 lignes quarrées, & ayant rompu comme les boucles aux deux côtés opposés, cela fait 882 lignes quarrées qui se sont séparées par l'effort de la chaleur. Et comme nous avons trouvé, par les expériences précédentes, que 696 lignes quarrées du même fer ont cassé sous le poids de 28 milliars, on doit en conclure

qu
ron
& c
dev
354
con
dan
de
circ
ven
mes
de
cell
piec
pièc
deux
anne
de fe
30
150
doul
ce n
non
les l
Mais
dant
chale

des Minéraux, Partie Exp. 65

que 882 lignes de ce même fer n'auroient rompu que sous un poids de 35480 livres, & que par conséquent l'effort de la chaleur devoit être estimé comme un poids de 35480 livres. Ayant fait fabriquer pour contenir le mur intérieur de mon fourneau, dans le fondage qui se fit après la rupture de ce cadre, un cercle de 26 pieds $\frac{1}{2}$ de circonférence, avec du fer nerveux provenant de la fonte & de la fabrique de mes forges, cela m'a donné le moyen de comparer la ténacité du bon fer avec celle du fer commun. Ce cercle de 26 pieds $\frac{1}{2}$ de circonférence étoit de deux pièces retenues & jointes ensemble par deux clavettes de fer passées dans des anneaux forgés au bout des deux bandes de fer; la largeur de ces bandes étoit de 30 lignes sur 5 d'épaisseur; cela fait 150 lignes carrées qu'on ne doit pas doubler, parce que si ce cercle eût rompu, ce n'auroit été qu'en un seul endroit, & non pas en deux endroits opposés comme les boucles ou le grand cadre carré. Mais l'expérience me démontra que pendant un fondage de quatre mois, où la chaleur étoit même plus grande que dans

66 Introduction à l'Histoire

le fondage précédent, ces 150 livres de bon fer résistèrent à son effort qui étoit de 35480 livres; d'où l'on doit conclure avec certitude entière, que le bon fer, c'est-à-dire, le fer qui est presque tout nerf, est au moins cinq fois aussi tenace que le fer sans nerf & à gros grains.

Que l'on juge par-là de l'avantage qu'on trouveroit à n'employer que du bon fer nerveux dans les bâtimens & dans la construction des vaisseaux, il en faudroit les trois quarts moins, & l'on auroit encore un quart de solidité de plus.

Par de semblables expériences, & en faisant mailéer une fois, deux fois, trois fois des verges de fer de différentes grosseurs, on pourroit s'assurer du *maximum* de la force du fer, combiner d'une manière certaine la légèreté des armes avec leur solidité, ménager la matière dans les autres ouvrages sans craindre la rupture; en un mot, travailler ce métal sur des principes uniformes & constans. Ces expériences sont le seul moyen de perfectionner l'art de la manipulation du fer; l'État en tireroit de très-grands avantages, car il ne faut pas croire que la qualité du fer dépende

des Minéraux, Partie Exp. 67

de celle de la mine ; que, par exemple, le fer d'Angleterre, ou d'Allemagne, ou de Suède soit meilleur que celui de France ; que le fer de Berri soit plus doux que celui de Bourgogne : la nature des mines n'y fait rien ; c'est la manière de les traiter qui fait tout, & ce que je puis assurer pour l'avoir vu par moi-même, c'est qu'en malléant beaucoup & chauffant peu, on donne au fer plus de force, & qu'on approche de ce *maximum* dont je ne puis que recommander la recherche, & auquel on peut arriver par les expériences que je viens d'indiquer.

Dans les boulets que j'ai soumis plusieurs fois à l'épreuve du plus grand feu, j'ai vu que le fer perd de son poids & de sa force d'autant plus qu'on le chauffe plus souvent & plus long-temps ; la substance se décompose, sa qualité s'altère, & enfin il dégénère en une espèce de mâchefer ou de matière poreuse, légère, qui se réduit en une sorte de chaux par la violence & la longue application du feu : le mâchefer commun est d'une autre espèce, & quoique vulgairement on croie que le mâchefer ne provient & même

68 *Introduction à l'Histoire*

ne peut provenir que du fer, j'ai la preuve du contraire. Le mâchefer est à la vérité une matière produite par le feu; mais, pour le former, il n'est pas nécessaire d'employer du fer ni aucun autre métal; avec du bois & du charbon brûlé & poussé à un feu violent, on obtiendra du mâchefer en assez grande quantité; & si l'on prétend que ce mâchefer ne vient que du fer contenu dans le bois (parce que tous les végétaux en contiennent plus ou moins), je demande pourquoi l'on ne peut pas en tirer du fer même une plus grande quantité qu'on en tire du bois, dont la substance est si différente de celle du fer. Dès que ce fait me fut connu par l'expérience, il me fournit l'intelligence d'un autre fait, qui m'avoit paru inexplicable jusques alors. On trouve dans les terres élevées, & sur-tout dans des forêts, où il n'y a ni rivières ni ruisseaux, & où par conséquent il n'y a jamais eu de forges, non plus qu'aucun indice de volcan ou de feux souterrains; on trouve, dis-je, souvent des gros blocs de mâchefer que deux hommes auroient peine à enlever: j'en ai vus pour la première fois en 1745,

des Minéraux, Partie Exp. 69

à Montigny-l'Encoupe, dans les forêts de M. de Trudaine; j'en ai fait chercher & trouvé depuis dans nos bois de Bourgogne, qui sont encore plus éloignés de l'eau que ceux de Montigny; on en a trouvé en plusieurs endroits: les petits morceaux m'ont paru provenir de quelques fourneaux de charbon qu'on aura laissé brûler, mais les gros ne peuvent venir que d'un incendie dans la forêt lorsqu'elle étoit en pleine venue, & que les arbres y étoient assez grands & assez voisins pour produire un feu très-violent & très-long-temps nourri.

Le mâchefer, qu'on peut regarder comme un résidu de la combustion du bois, contient du fer; & l'on verra dans un autre Mémoire les expériences que j'ai faites, pour reconnoître par ce résidu la quantité de fer qui entre dans la composition des végétaux. Et cette terre morte ou cette chaux dans laquelle le fer se réduit par la trop longue action du feu, ne m'a pas paru contenir plus de fer que le mâchefer du bois, ce qui semble prouver que le fer est comme le bois une matière combustible, que le feu peut également

70 *Introduction à l'Histoire*

dévoré en l'appliquant seulement plus violemment & plus long-temps. Pline dit avec grande raison, *ferrum accensum igni, nisi duretur ictibus, corrumpitur (c)*. On en sera persuadé si l'on observe dans une forge la première loupe que l'on tire de la gueule, cette loupe est un morceau de fer fondu pour la seconde fois, & qui n'a pas encore été forgé, c'est-à-dire, consolidé par le marteau; lorsqu'on le tire de la chaudière où il vient de subir le feu le plus violent, il est rougi à blanc, il jette non-seulement des étincelles ardentes, mais il brûle réellement d'une flamme très-vive qui consommeroît une partie de la substance si on tarδοit trop de temps à porter cette loupe sous le marteau; ce fer seroit, pour ainsi dire, détruit avant que d'être formé, il subiroit l'effet complet de la combustion si le coup du marteau, en rapprochant ses parties trop divisées par le feu, ne commençoit à lui faire prendre le premier degré de sa ténacité. On le tire dans cet état & encore tout rouge de dessous le marteau, & on le

(c) *Hist. Nat. lib. xxxiv, cap. xv.*

des Minéraux, Partie Exp. 71

reporte au foyer de l'affinerie où il se pénètre d'un nouveau feu ; lorsqu'il est blanc on le transporte de même & le plus promptement possible au marteau , sous lequel il se consolide , & s'étend beaucoup plus que la première fois ; enfin on remet encore cette pièce au feu & on la reporte au marteau , sous lequel on l'achève en entier. C'est ainsi qu'on travaille tous les fers communs , on ne leur donne que deux ou tout au plus trois volées de marteau , aussi n'ont-ils pas à beaucoup près la ténacité qu'ils pourroient acquérir si on les travailloit moins précipitamment. La force du marteau non-seulement comprime les parties du fer trop divisées par le feu , mais en les rapprochant elle chasse les matières étrangères & le purifie en le consolidant. Le déchet du fer en gueuse est ordinairement d'un tiers , dont la plus grande partie se brûle , & le reste coule en fusion & forme ce qu'on appelle *les crasses du fer* : ces crasses sont plus pesantes que le mâchefer du bois , & contiennent encore une assez grande quantité de fer , qui est à la vérité très-impur & très-aigre , mais dont on peut

72 Introduction à l'Histoire

néanmoins tirer parti en mêlant ces crasses broyées & en petite quantité avec la mine que l'on jette au fourneau ; j'ai l'expérience qu'en mêlant un sixième de ces crasses avec cinq sixièmes de mine épurée par mes cribles, la fonte ne change pas sensiblement de qualité, mais si l'on en met davantage elle devient plus cassante, sans néanmoins changer de couleur ni de grain. Mais si les mines sont moins épurées, ces crasses gâtent absolument la fonte, parce qu'étant déjà très-aigre & très-cassante par elle-même, elle le devient encore plus par cette addition de mauvaise matière, en sorte que cette pratique, qui peut devenir utile entre les mains d'un habile maître de l'art, produira dans d'autres mains de si mauvais effets, qu'on ne pourra se servir ni des fers ni des fontes qui en proviendront.

Il y a néanmoins des moyens, je ne dis pas de changer, mais de corriger un peu la mauvaise qualité de la fonte, & d'adoucir à la chaudière l'aigreur du fer qui en provient. Le premier de ces moyens est de diminuer la force du vent, soit en changeant l'inclinaison de la tuyère, soit

soit en ralentissant le mouvement des soufflets, car plus on presse le feu plus le fer devient aigre. Le second moyen, & qui est encore plus efficace, c'est de jeter sur la loupe de fer, qui se sépare de la gueuse, une certaine quantité de gravier calcaire ou même de chaux toute faite; cette chaux sert de fondant aux parties vitritiables que le fer aigre contient en trop grande quantité, & le purge de ses impuretés. Mais ce sont de petites ressources auxquelles il ne faut pas se mettre dans le cas d'avoir recours, ce qui n'arriveroit jamais si l'on suivoit les procédés que j'ai donnés pour faire de bonne fonte (*i*).

Lorsqu'on fait travailler les affineurs à leur compte & qu'on les paie au millier, ils font, comme les Fondeurs, le plus de fer qu'ils peuvent dans leur semaine, ils construisent le foyer de leur chaudière de la manière la plus avantageuse pour eux, ils pressent le feu, trouvent que les soufflets ne donnent jamais assez de vent,

(*k*) On trouvera ces procédés dans mes Mémoires sur la fusion des mines de fer.

74 *Introduction à l'Histoire*

ils travaillent moins la loupe & font ordinairement en deux chaudes ce qui en exigeroit au moins trois; on ne sera donc jamais sûr d'avoir du fer d'une bonne & même qualité qu'en payant les ouvriers au mois, & en faisant casser à la fin de chaque semaine quelques barres du fer qu'ils livrent, pour reconnoître s'ils ne se sont pas ou trop pressés ou négligés. Le fer en bandes plates est toujours plus nerveux que le fer en barreaux; s'il se trouve deux tiers de nerf sur un tiers de grain dans les bandes, on ne trouvera dans les barreaux, quoique faits de même étoffe, qu'environ un tiers de nerf sur deux tiers de grain, ce qui prouve bien clairement que la plus ou moins grande force du fer vient de la différente application du marteau; s'il frappe plus constamment, plus fréquemment sur un même plan, comme celui des bandes plates, il en rapproche & en réunit mieux les parties, que s'il frappe presque alternativement sur deux plans différens pour faire les barreaux quarrés: aussi est-il plus difficile de bien souder du barreau que de la bande, & lorsqu'on veut faire du fer de tixerie,

qu
&
po
trav
tires
fond
mier
tout
cette
mais
faut
coup
de di
du m
l'avoir
la verg
barrea
les q
cellifs
de cha
marte
fer do
pour p
& en
soit tro
pas do
assez d

qui doit être en barreaux de treize lignes & d'un fer très-nerveux & assez ductile pour être converti en fil de fer, il faut le travailler plus lentement à l'affinerie, ne le tirer du feu que quand il est presque fondant & le faire luer sous le marteau le mieux qu'il est possible, afin de lui donner tout le nerf dont il est susceptible sous cette forme quarrée, qui est la plus ingrate, mais qui paroît nécessaire ici, parce qu'il faut ensuite tirer de ces barreaux, qu'on coupe environ à quatre pieds, une verge de dix-huit ou vingt pieds par le moyen du martinet, sous lequel on l'allonge après l'avoir échauffée; c'est ce qu'on appelle de la *verge crénelée*, elle est quarrée comme le barreau dont elle provient, & porte sur les quatre faces des enfoncemens successifs, qui sont les empreintes profondes de chaque coup du martinet ou petit marteau sous lequel on la travaille. Ce fer doit être de la plus grande ductilité pour passer jusqu'à la plus petite filière, & en même temps il ne faut pas qu'il soit trop doux, mais assez ferme pour ne pas donner trop de déchet; ce point est assez difficile à saisir, aussi n'y a-t-il en

76 Introduction à l'Histoire

France que deux ou trois forges dont on puisse tirer ces fers pour les fileries.

La bonne fonte est à la vérité la base de tout bon fer, mais il arrive souvent que, par de mauvaises pratiques, on gâte ce bon fer. Une de ces mauvaises pratiques, la plus généralement répandue, & qui détruit le plus le nerf & la ténacité du fer, c'est l'usage où sont les ouvriers de presque toutes les forges, de tremper dans l'eau la première portion de la pièce qu'ils viennent de travailler, afin de pouvoir la manier & la reprendre plus promptement: j'ai vu, avec quelque surprise, la prodigieuse différence qu'occasionne cette trempe, sur-tout en hiver & lorsque l'eau est froide; non-seulement elle rend cassant le meilleur fer, mais même elle en change le grain & en détruit le nerf, au point qu'on n'imagineroit pas que c'est le même fer, si l'on n'en étoit pas convaincu par ses yeux en faisant casser l'autre bout du même barreau, qui, n'ayant point été trempé, conserve son nerf & son grain ordinaire. Cette trempe en été fait beaucoup moins de mal, mais en fait toujours un peu: & si l'on veut avoir du fer toujours

de
lun
tre
po
I
po
ten
vie
les
les
ans,
gran
don
d'ex
ces t
rogn
cassés
rible
qu'el
autre
de p
quoid
duise
Il ne
si mé
parm
faut a

des Minéraux, Partie Exp. 77

de la même bonne qualité, il faut absolument proscrire cet usage, ne jamais tremper le fer chaud dans l'eau, & attendre, pour le manier, qu'il se refroidisse à l'air.

Il faut que la fonte soit bien bonne pour produire du fer aussi nerveux, aussi tenace que celui qu'on peut tirer des vieilles ferrailles refondues, non pas en les jetant au fourneau de fusion, mais en les mettant au feu de l'affinerie; tous les ans, on achete pour mes forges une assez grande quantité de ces vieilles ferrailles, dont, avec un peu de soin, l'on fait d'excellent fer. Mais il y a du choix dans ces ferrailles; celles qui proviennent des rognures de la tôle ou des morceaux cassés du fil de fer, qu'on appelle des *riblons*, sont les meilleurs de toutes, parce qu'elles sont d'un fer plus pur que les autres; on les achete aussi quelque chose de plus, mais en général ces vieux fers, quoique de qualité médiocre, en produisent de très-bon lorsqu'on fait les traiter. Il ne faut jamais les mêler avec la fonte, si même il s'en trouve quelques morceaux parmi les ferrailles, il faut les séparer: il faut aussi mettre une certaine quantité de

78 . Introduction à l'Histoire

crasses dans le foyer, & le feu doit être moins poussé, moins violent que pour le travail du fer en gueuse, sans quoi l'on brûleroit une grande partie de la ferraille qui, quand elle est bien traitée & de bonne qualité, ne donne qu'un cinquième de déchet, & consomme moins de charbon que le fer de la gueuse. Les crasses qui sortent de ces vieux fers, sont en bien moindre quantité, & ne conservent pas à beaucoup près autant de particules de fer que les autres. Avec des riblons qu'on renvoie des fileries que fournissent mes forges, & des rognures de tôle cisailées que je fais fabriquer, j'ai souvent fait du fer qui étoit tout nerf, & dont le déchet n'étoit presque que d'un sixième; tandis que le déchet du fer en gueuse est communément du double, c'est-à-dire, d'un tiers, & souvent de plus du tiers si l'on veut obtenir du fer d'excellente qualité.

M. de Montbeillard, Lieutenant-colonel au régiment royal d'Artillerie, ayant été chargé, pendant plusieurs années, de l'inspection des manufactures d'armes à Charleville, Maubeuge & Saint-Étienne, a bien voulu me communiquer un Mémoire

qu'il a présenté au Ministre, & dans lequel il traite de cette fabrication du fer avec de vieilles ferrailles, il dit, avec grande raison, « que les ferrailles qui ont beaucoup de surface, & celles qui proviennent des vieux fers & clous de chevaux ou des fragmens de petits cylindres ou quarrés tords, ou des anneaux & boucles, toutes ces pièces qui supposent que le fer qu'on a employé pour les fabriquer étoit souple, liant & susceptible d'être plié, étendu ou tordu, doivent être préférées & recherchées pour la fabrication des canons de fusil. » On trouve, dans ce même Mémoire de M. de Montbeillard, d'excellentes réflexions sur les moyens de perfectionner les armes à feu, & d'en assurer la résistance par le choix du bon fer & par la manière de le traiter; l'Auteur rapporte une très-bonne expérience (k),

(k) Qu'on prenne une barre de fer, large de deux à trois pouces, épaisse de deux à trois lignes, qu'on la chauffe au rouge, & qu'avec la panne du marteau on y pratique dans sa longueur une cannelure ou cavité, qu'on la plie sur elle-même pour la doubler & corroyer, l'on remplira ensuite la cannelure des écailles ou pailles en question; on lui

80 Introduction à l'Histoire

qui prouve clairement que les vieilles ferrailles & même les écailles ou exfoliations qui se détachent de la surface du fer, & que bien des gens prennent pour des scories, se soudent ensemble de la manière la plus intime; & que par conséquent le fer, qui en provient, est d'aussi bonne & peut-être de meilleure qualité qu'aucun autre. Mais en même temps il conviendra avec moi, & il observe même dans la suite de son Mémoire, que cet excellent fer ne doit pas être employé seul, par la raison même qu'il

donnera une chaude douce d'abord en rabattant les bords, pour empêcher qu'elles ne s'échappent, & on battra la barre comme on le pratique pour corroyer le fer, avant de la chauffer au blanc; on la chauffera ensuite blanche & fondante, & la pièce soudera à merveille, on la cassera à froid & l'on n'y verra rien qui annonce que la soudure n'ait pas été complète & parfaite, & que toutes les parties du fer ne se soient pas pénétrées réciproquement sans laisser aucun espace vide. J'ai fait cette expérience aisée à répéter, qui doit rassurer sur les pailles, soit qu'elles soient plates ou qu'elles aient la forme d'aiguilles, puisqu'elles ne sont autre chose que du fer, comme la barre avec laquelle on les incorpore, où elles ne forment plus qu'une même masse avec elle.

est trop parfait ; & en effet , un fer qui, sortant de la forge , a toute sa perfection , n'est excellent que pour être employé tel qu'il est , ou pour des ouvrages qui ne demandent que des chaudes douces ; car toute chaude vive , toute chaleur à blanc le dénature ; j'en ai fait des épreuves plus que réitérées sur des morceaux de toute grosseur ; le petit fer se dénature un peu moins que le gros , mais tous deux perdent la plus grande partie de leur nerf dès la première chaude à blanc ; une seconde chaude pareille change & achève de détruire le nerf , elle altère même la qualité du grain qui , de fin qu'il étoit , devient grossier & brillant comme celui du fer le plus commun ; une troisième chaude rend ces grains encore plus gros , & laisse déjà voir entre leurs interstices des parties noires de matière brûlée ; enfin , en continuant de lui donner des chaudes , on arrive au dernier degré de sa décomposition , & on le réduit en une terre morte , qui ne paroît plus contenir de substance métallique , & dont on ne peut faire aucun usage. Car cette terre morte n'a pas , comme la plupart des autres chaux

re
vieilles
exfolia-
face du
ent pour
e de la
ar consé-
st d'aussi
e qualité
e temps
observe
lémoire,
pas être
me qu'il

abattant les
appent , &
tique pour
blanc ; on
& la pièce
id & l'on
e n'ait pas
les parties
roquement
ette expé-
r les pailles,
t la forme
ose que du
incorpore,
me masse

82 *Introduction à l'Histoire*

métalliques, la propriété de se revivifier par l'application des matières combustibles; elle ne contient guère plus de fer que le mâchefer commun tiré du charbon des végétaux; au lieu que les chaux des autres métaux se revivifient presque en entier ou du moins en très-grande partie, & cela achève de démontrer que le fer est une matière presque entièrement combustible.

Ce fer que l'on tire, tant de cette terre ou chaux de fer, que du mâchefer provenant du charbon, m'a paru d'une singulière qualité, il est très-magnétique & très-infusible, j'ai trouvé du petit sable noir aussi magnétique, aussi indissoluble, & presque infusible dans quelques-unes des mines que j'ai fait exploiter; ce sablon ferrugineux & magnétique se trouve mêlé avec les grains de mine qui ne le sont point du tout, & provient certainement d'une cause toute autre: le feu a produit ce sablon magnétique, & l'eau les grains de mine; & lorsque, par hasard, ils se trouvent mêlés, c'est ce que le hasard a fait qu'on a brûlé de grands amas de bois, ou qu'on a fait des fourneaux de charbon sur le terrain qui renferme les

m
n
l'e
pe
de
ne
pr
pr
pr
fi
l'é
que
I
pre
rem
ner
être
les
fois
de
nerf
lence
peut
le de
grain
d'usa
grain

des Minéraux, Partie Exp. 83

mines; & que ce sablon ferrugineux, qui n'est que le détrimment du mâchefer que l'eau ne peut ni rouiller ni dissoudre, a pénétré par la filtration des eaux auprès des lits de mine en grains; qui souvent ne sont qu'à deux ou trois pieds de profondeur. On a vu, dans le Mémoire précédent, que ce sablon ferrugineux, qui provient du mâchefer des végétaux, ou si l'on veut du fer brûlé autant qu'il peut l'être, paroît être le même à tous égards que celui qui se trouve dans la plaine.

Le fer le plus parfait est celui qui n'a presque point de grain, & qui est entièrement d'un nerf de gris cendré; le fer à nerf noir est encore très-bon, & peut-être est-il préférable au premier pour tous les usages où il faut chauffer plus d'une fois ce métal avant de l'employer; le fer de la troisième qualité & qui est moitié nerf & moitié grain, est le fer par excellence pour le commerce, parce qu'on peut le chauffer deux ou trois fois sans le dénaturer; le fer sans nerf, mais à grain fin, sert aussi pour beaucoup d'usages, mais les fers sans nerf & à gros grains, devraient être proscrits & tout le

84 Introduction à l'Histoire


plus grand tort dans la société, parce que malheureusement ils y sont cent fois plus communs que les autres. Il ne faut qu'un coup d'œil à un homme exercé pour connoître la bonne ou la mauvaise qualité du fer, mais les gens qui le font employer, soit dans leurs bâtimens, soit à leurs équipages, ne s'y connoissent ou n'y regardent pas, & paient souvent, comme très-bon, du fer que le fardeau fait rompre ou que la rouille détruit en peu de temps.



Autant les chaudes vives & poussées jusqu'au blanc, détériorent le fer, autant les chaudes douces où l'on ne le rougit que couleur de cerise, semble l'améliorer; c'est par cette raison que les fers destinés à passer à la fenderie ou à la batterie, ne demandent pas à être fabriqués avec autant de soin que ceux qu'on appelle *fers marchands*, qui doivent avoir toute leur qualité. Le fer de tirerie fait une classe à part, il ne peut être trop pur, s'il contenoit des parties hétérogènes il deviendroit très-cassant aux dernières filières; or il n'y a d'autre moyen de le rendre pur que de le faire bien suer en le chauffant

des Minéraux, Partie Exp. 35




la première fois jusqu'au blanc, & le martelant avec autant de force que de précaution, & ensuite en le faisant encore chauffer à blanc afin d'achever de le dépurer sous le martinet en l'allongeant pour en faire de la verge crénelée. Mais les fers destinés à être refendus pour en faire de la verge ordinaire, des fers plats, des languettes pour la tôle, tous ces fers en un mot qu'on doit passer dans les cylindres, n'exigent pas le même degré de perfection, parce qu'ils s'améliorent au four de la fenderie, où l'on n'emploie que du bois, & dans lequel tous ces fers ne prennent une chaleur que du second degré, d'un rouge couleur de feu, qui est suffisant pour les amollir, & leur permet de s'aplatir & de s'étendre sous les cylindres & de se fendre ensuite sous les taillans. Néanmoins si l'on veut avoir de la verge bien douce, comme celle qui est nécessaire pour les clous à maréchal; si l'on veut des fers aplatis qui aient beaucoup de nerf, comme doivent être ceux qu'on emploie pour les roues, & particulièrement les bandages qu'on fait d'une seule pièce, dans lesquels il faut au







**IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)**



**Photographic
Sciences
Corporation**

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

18
20
22
25
E 28
E 32
E 36
E 40
E 45
E 50
E 56
E 63
E 72
E 80
E 90
E 100

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

86 Introduction à l'Histoire

moins un tiers de nerf; les fers qu'on livre à la fenderie doivent être de bonne qualité, c'est-à-dire, avoir au moins un tiers de nerf, car j'ai observé que le feu doux du four & de la forte compression des cylindres rendent à la vérité le grain du fer un peu plus fin, & donnent même du nerf à celui qui n'avoit que du grain très-fin, mais ils ne convertissent jamais en nerf le gros grain des fers communs; en sorte qu'avec du mauvais fer à gros grains on pourra faire de la verge & des fers aplatis dont le grain sera moins gros, mais qui seront toujours trop cassans pour être employés aux usages dont je viens de parler.

Il en est de même de la tôle, on ne peut pas employer de trop bonne étoffe pour la faire, & il est bien fâcheux qu'on fasse tout le contraire; car presque toutes nos tôles en France se font avec du fer commun; elles se rompent en les pliant, & se brûlent ou pourrissent en peu de temps; tandis que de la tôle faite comme celle de Suède ou d'Angleterre, avec du bon fer bien nerveux, se tordra cent fois sans rompre, & durera peut-être vingt

fois plus que les autres. On en fait à mes forges de toute grandeur & de toute épaisseur, on en emploie à Paris pour les casseroles & autres pièces de cuisine qu'on étame & qu'on a raison de préférer aux casseroles de cuivre. On a fait avec cette même tôle grand nombre de poëles, de chaîneaux, de tuyaux, & j'ai depuis quatre ans l'expérience mille fois répétée, qu'elle peut durer comme je viens de le dire, soit au feu, soit à l'air, beaucoup plus que les tôles communes, mais comme elle est un peu plus chère, le débit en est moindre, & l'on n'en demande que pour de certains usages particuliers auxquels les autres tôles ne pourroient être employées. Lorsqu'on est au fait, comme j'y suis, du commerce des fers, on diroit qu'en France on a fait un pacte général, de ne se servir que de ce qu'il y a de plus mauvais en ce genre.

Avec du fer nerveux on pourra toujours faire d'excellente tôle, en faisant passer le fer des languettes sous les cylindres de la fenderie; ceux qui aplatissent ces languettes sous le martinet, après les avoir fait chauffer au charbon, sont dans un

88 *Introduction à l'Histoire*

très-mauvais usage ; le feu de charbon poussé par les soufflets , gâte le fer de ces languettes , celui du four de la fenderie ne fait que le perfectionner : d'ailleurs il en coûte plus de moitié moins pour faire les languettes au cylindre que pour les faire au martinet ; ici l'intérêt s'accorde avec la théorie de l'art : il n'y a donc que l'ignorance qui puisse entretenir cette pratique , qui néanmoins est la plus générale , car il y a peut-être sur toutes les tôles qui se fabriquent en France , plus des trois quarts dont les languettes ont été faites au martinet. Cela ne peut pas être autrement , me dira-t-on , toutes les batteries n'ont pas à côté d'elles une fenderie & des cylindres montés , je l'avoue & c'est ce dont je me plains ; on a tort de permettre ces petits établissemens particuliers qui ne subsistent qu'en achetant dans les grosses forges les fers au meilleur marché , c'est-à-dire tous les plus médiocres , pour les fabriquer ensuite en tôle & en petits fers de la plus mauvaise qualité.

Un autre objet fort important sont les fers de charrue , on ne sauroit croire

stoire

e charbon
fer de ces
a fenderie
l'ailleurs il
pour faire
pour les
s'accorde
y a donc
tenir cette
plus géné-
toutes les
nce, plus
nettes ont
peut pas
toutes les
elles une
je l'avoue
on a tort
mens par-
achetant
a meilleur
les plus
ensuite en
mauvaise
nt sont les
bit croire

des Minéraux, Partie Exp. 89

combien la mauvaise qualité du fer dont on les fabrique fait de tort aux laboureurs ; on leur livre inhumainement des fers qui cassent au moindre effort, & qu'ils sont forcés de renouveler presque aussi souvent que leurs cultures ; on leur fait payer bien cher du mauvais acier dont on arme la pointe de ces fers encore plus mauvais, & le tout est perdu pour eux au bout d'un an, & souvent en moins de temps ; tandis qu'en employant pour ces fers de charrue, comme pour la tôle, le fer le meilleur & le plus nerveux, on pourroit les garantir pour un usage de vingt ans, & même se dispenser d'en acierer la pointe ; car j'ai fait faire plusieurs centaines de ces fers de charrue dont j'en ai fait essayer quelques-uns sans acier, & ils se sont trouvés d'une étoffe assez ferme pour résister au labour. J'ai fait la même expérience sur un grand nombre de pioches ; c'est la mauvaise qualité de nos fers qui a établi chez les taillandiers l'usage général de mettre de l'acier à ces instrumens de campagne, qui n'en auroient pas besoin s'ils étoient de bon fer fabriqué avec des languettes passées sous les cylindres.

90 Introduction à l'Histoire

J'avoue qu'il y a de certains usages pour lesquels on pourroit fabriquer du fer aigre, mais encore ne faut-il pas qu'il soit à trop gros grain ni trop cassant; les clous pour les petites lattes à tuile, les broquettes & autres petits clous plient lorsqu'ils sont faits d'un fer trop doux, mais à l'exception de ce seul emploi, qu'on ne remplira toujours que trop, je ne vois pas qu'on doive se servir de fer aigre. Et si, dans une bonne manufacture, on en veut faire une certaine quantité, rien n'est plus aisé; il ne faut qu'augmenter d'une mesure ou d'une mesure & demie de mine au fourneau, & mettre à part les gueuses qui en proviendront, la fonte en sera moins bonne & plus blanche. On les fera forger à part, en ne donnant que deux chaudes à chaque bande, & l'on aura du fer aigre qui se fendra plus aisément que l'autre, & qui donnera de la verge cassante.

Le meilleur fer, c'est-à-dire, celui qui a le plus de nerf, & par conséquent le plus de ténacité peut éprouver cent & deux cens coups de masse sans se rompre, & comme il faut néanmoins le casser pour tous les usages de la fenderie & de la

ains usages
quer du fer
as qu'il soit
t; les clous
broquettes
squ'ils sont
s à l'excep-
ne remplira
pas qu'on
Et si, dans
a veut faire
st plus aisé;
mesure ou
ne au four-
uses qui en
moins bonne
a forger à
ux chaudes
du fer aigre
ue l'autre,
assante.

, celui qui
séquent le
er cent &
se rompre,
casser pour
& de la

des Minéraux, Partie Exp. 91

batterie, & que cela demanderoit beaucoup de temps, même en s'aidant du ciseau d'acier, il vaut mieux faire couper sous le marteau de la forge, les barres encore chaudes à moitié de leur épaisseur, cela n'empêche pas le marteleur de les achever, & épargne beaucoup de temps au fondeur & au platineur. Tout le fer que j'ai fait casser à froid & à grands coups de masse, s'échauffe d'autant plus qu'il est plus fortement & plus souvent frappé : non-seulement il s'échauffe au point de brûler très-vivement, mais il s'aimante comme s'il eût été frotté sur un très-bon aimant. M'étant assuré de la constance de cet effet par plusieurs observations successives, je voulus voir si, sans percussion, je pourrois de même produire dans le fer la vertu magnétique; je fis prendre pour cela une verge de trois lignes de grosseur de mon fer le plus liant, & que je connoissois pour être très-difficile à rompre, & l'ayant fait plier & replier, par les mains d'un homme fort, sept ou huit fois de suite sans pouvoir la rompre, je trouvai le fer très-chaud au point où on l'avoit plié, & il avoit en même temps toute la vertu

92 *Introduction à l'Histoire*

d'un barreau bien aimanté ; j'aurai occasion dans la suite de revenir à ce phénomène qui tient de très-près à la théorie du magnétisme & de l'électricité , & que je ne rapporte ici que pour démontrer que plus une matière est tenace , c'est-à-dire , plus il faut d'efforts pour la diviser , plus elle est près de produire de la chaleur & tous les autres effets qui peuvent en dépendre , & prouver en même temps que la simple pression produisant le frottement des parties intérieures , équivaut à l'effet de la plus violente percussion.

On soude tous les jours le fer avec lui-même ou sur lui-même , mais il faut la plus grande précaution pour qu'il ne se trouve pas un peu plus foible aux endroits des soudures ; car , pour réunir & souder les deux bouts d'une barre , on les chauffe jusqu'au blanc le plus vif , le fer dans cet état est tout prêt à fondre , il n'y arrive pas sans perdre toute sa ténacité , & par conséquent tout son nerf ; il ne peut donc en reprendre dans toute cette partie qu'on soude , que par la percussion des marteaux dont deux ou trois ouvriers font succéder les coups le plus vite qu'il leur est possible ,

ma
mé
ma
du
bo
de
n'a
mo
le
aff
réu
tan
sou
sou
est
M.
que
bor
exp
que
de
le
fau
der
qu'
ces
au

des Minéraux, Partie Exp. 93

mais cette percussion est très-foible & même lente en comparaison de celle du marteau de la forge ou même de celle du martinet ; ainsi l'endroit soudé, quelque bonne que soit l'étoffe, n'aura que peu de nerf & souvent point du tout si l'on n'a pas bien saisi l'instant où les deux morceaux sont également chauds, & si le mouvement du marteau n'a pas été assez prompt & assez fort pour les bien réunir. Aussi, quand on a des pièces importantes à souder, on fera bien de le faire sous les martinets les plus prompts. La soudure dans les canons des armes à feu, est une des choses les plus importantes ; M. de Montbeillard, dans le Mémoire que j'ai cité ci-dessus, donne de très-bonnes vues sur cet objet, & même des expériences décisives : je crois avec lui, que comme il faut chauffer à blanc nombre de fois la bande ou *maquette* pour souder le canon dans toute sa longueur, il ne faut pas employer du fer qui seroit au dernier degré de sa perfection, parce qu'il ne pourroit que se détériorer par ces fréquentes chaudes vives ; qu'il faut au contraire choisir le fer qui, n'étant

94 *Introduction à l'Histoire*

pas encore aussi épuré qu'il peut l'être, gagnera plutôt de la qualité qu'il n'en perdra par ces nouvelles chaudes, mais cet article seul demanderoit un grand travail fait & dirigé par un homme aussi éclairé que M. de Montbeillard, & l'objet en est d'une si grande importance pour la vie des hommes & pour la gloire de l'État, qu'il mérite la plus grande attention.

Le fer se décompose par l'humidité comme par le feu; il attire l'humide de l'air, s'en pénètre & se rouille, c'est-à-dire, se convertit en une espèce de terre sans liaison, sans cohérence; cette conversion se fait en assez peu de temps dans les fers qui sont de mauvaise qualité ou mal fabriqués: ceux dont l'étoffe est bonne, & dont les surfaces sont bien lisses ou polies, se défendent plus longtemps, mais tous sont sujets à cette espèce de mal, qui de la superficie gagne assez promptement l'intérieur, & détruit avec le temps le corps entier du fer. Dans l'eau il se conserve beaucoup mieux qu'à l'air, & quoiqu'on s'aperçoive de son altération par la couleur noire qu'il y prend,

des Minéraux, Partie Exp. 95

après un long séjour, il n'est point dénaturé, il peut être forgé, au lieu que celui qui a été exposé à l'air pendant quelques siècles, & que les ouvriers appellent du *fer luné*, parce qu'ils s'imaginent que la lune le mange, ne peut ni se forger ni servir à rien; à moins qu'on ne le revivifie comme les rouilles & les safrans de mars, ce qui coûte communément plus que le fer ne vaut. C'est en ceci que consiste la différence des deux décompositions du fer; dans celle qui se fait par le feu, la plus grande partie du fer se brûle & s'exhale en vapeurs comme les autres matières combustibles, il ne reste qu'un mâchefer qui contient, comme celui du bois, une petite quantité de matière très-atirable par l'aimant qui est bien du vrai fer, mais qui m'a paru d'une nature singulière & semblable comme je l'ai dit, au sablon ferrugineux qui se trouve en si grande quantité dans la platine. La décomposition par l'humidité ne diminue pas à beaucoup près autant que la combustion, la masse du fer, mais elle en altère toutes les parties au point de leur faire perdre leur

vertu magnétique, leur cohérence & leur couleur métallique; c'est de cette rouille ou terre de fer que sont en grande partie composées les mines en grain, l'eau après avoir atténué ces particules de rouilles & les avoir réduites en molécules insensibles, les charie & les dépose par filtration dans le sein de la terre, où elles se réunissent en grain par une sorte de crystallisation qui se fait comme toutes les autres, par l'attraction mutuelle des molécules analogues; & comme cette rouille de fer étoit privée de la vertu magnétique, il n'est pas étonnant que les mines en grain qui en proviennent, en soient également dépourvues. Ceci me paroît démontrer d'une manière assez claire, que le magnétisme suppose l'action précédente du feu; que c'est une qualité particulière que le feu donne au fer, & que l'humidité de l'air lui enlève en le décomposant.

Si l'on met dans un vase une grande quantité de limaille de fer pure, qui n'a pas encore pris de rouille, & si on la couvre d'eau, on verra en la laissant sécher, que cette limaille se réunit par ce seul intermède, au point de faire une masse
de

de fer assez solide, pour qu'on ne puisse la casser qu'à coups de masse; ce n'est donc pas précisément l'eau qui décompose le fer & qui produit la rouille, mais plutôt les sels & les vapeurs sulfureuses de l'air, car on sait que le fer se dissout très-aisément par les acides & par le soufre. En présentant une verge de fer bien rouge à une bille de soufre, le fer coule dans l'instant, & en le recevant dans l'eau, on obtient des grenailles qui ne sont plus du fer ni même de la fonte; car j'ai éprouvé qu'on ne pouvoit pas les réunir au feu pour les forger, c'est une matière qu'on ne peut comparer qu'à la pyrite martiale, dans laquelle le fer paroît être également décomposé par le soufre; & je crois que c'est par cette raison que l'on trouve presque par-tout à la surface de la terre & sous les premiers lits de ses couches extérieures, une assez grande quantité de ces pyrites, dont le grain ressemble à celui du mauvais fer, mais qui n'en contiennent qu'une très-petite quantité, mêlée avec beaucoup d'acide vitriolique & plus ou moins de soufre.

CINQUIÈME MÉMOIRE.**EXPÉRIENCES sur les Effets
de la Chaleur obscure.**

POUR reconnoître les effets de la chaleur obscure, c'est-à-dire, de la chaleur privée de lumière, de flamme & du feu libre, autant qu'il est possible, j'ai fait quelques expériences en grand, dont les résultats m'ont paru très-intéressans.

P R E M I È R E E X P É R I E N C E .

ON A COMMENCÉ sur la fin d'août 1772, à mettre des braises ardentes dans le creuset du grand fourneau, qui sert à fondre la mine de fer pour la couleuse en gueuses; ces braises ont achevé de sécher les mortiers qui étoient faits de glaise mêlée par égale portion avec du sable vitrescible. Le fourneau avoit 23 pieds de hauteur. On a jeté par le gueulard (c'est ainsi qu'on appelle l'ouverture supérieure du fourneau) les charbons ardents que l'on

tiroit des petits fourneaux d'expériences, on a mis successivement une assez grande quantité de ces braises pour remplir le bas du fourneau jusqu'à la cuve (c'est ainsi qu'on appelle l'endroit de la plus grande capacité du fourneau), ce qui, dans celui-ci, montoit à 7 pieds 2 pouces de hauteur perpendiculaire depuis le fond du creuset. Par ce moyen on a commencé, de donner au fourneau une chaleur modérée qui ne s'est pas fait sentir dans la partie la plus élevée.

Le 10 septembre, on a vidé toutes ces braises réduites en cendres par l'ouverture du creuset, & lorsqu'il a été bien nettoyé on y a mis quelques charbons ardens & d'autres charbons par dessus, jusqu'à la quantité de 600 livres pesant; ensuite on a laissé prendre le feu, & le lendemain, le 11 septembre, on a achevé de remplir le fourneau avec 4800 livres de charbon; ainsi, il contient en tout 5400 livres de charbon qui y ont été portées en cent trente-cinq corbeilles de 40 livres chacune, tare faite.

On a laissé, pendant ce temps, l'entrée du creuset ouverte, & celle de la tuyère bien bouchée pour empêcher le feu de

100 *Introduction à l'Histoire*

se communiquer aux soufflets. La première impression de la grande chaleur, produite par le long séjour des braises ardentes & par cette première combustion du charbon, s'est marquée par une petite fente qui s'est faite dans la pierre du fond à l'entrée du creuset, & par une autre fente qui s'est faite dans la pierre de la tympe. Le charbon néanmoins, quoique fort allumé dans le bas, ne l'étoit encore qu'à une très-petite hauteur, & le fourneau ne donnoit au gueulard qu'assez peu de fumée, ce même jour, 12 septembre à six heures du soir; car cette ouverture supérieure n'étoit pas bouchée, non plus que l'ouverture du creuset.

A neuf heures du soir du même jour, la flamme a percé jusqu'au - dessus du fourneau, & comme elle est devenue très-vive en peu de temps, on a bouché l'ouverture du creuset à dix heures du soir. La flamme quoique fort ralentie par cette suppression du courant de l'air, s'est soutenue pendant la nuit & le jour suivant; en sorte que le lendemain, 13 septembre, vers les quatre heures du soir, le charbon avoit baissé d'un peu plus de 4 pieds.

des Minéraux, Partie Exp. 101

On a rempli ce vide à cette même heure avec onze orbeilles de charbon, pesant ensemble 440 livres; ainsi, le fourneau a été chargé en tout de 5840 livres de charbon.

Ensuite on a bouché l'ouverture supérieure du fourneau avec un large couvercle de forte tôle, garnie tout autour avec du mortier de glaise & sable mêlé de poudre de charbon, & chargé d'un pied d'épaisseur de cette poudre de charbon mouillée; pendant que l'on bouchoit, on a remarqué que la flamme ne laissoit pas de retentir assez fortement dans l'intérieur du fourneau; mais en moins d'une minute la flamme a cessé de retentir, & l'on n'entendoit plus aucun bruit ni murmure, en sorte qu'on auroit pu penser que l'air n'ayant point d'accès dans la cavité du fourneau, le feu y étoit entièrement étouffé.

On a laissé le fourneau ainsi bouché par-tout, tant au-dessus qu'au-dessous, depuis le 13 septembre jusqu'au 28 du même mois, c'est-à-dire, pendant quinze jours. J'ai remarqué pendant ce temps, que, quoiqu'il n'y eût point de flamme

102. *Introduction à l'Histoire*

dans le fourneau, ni même de feu lumineux, la chaleur ne laissoit pas d'augmenter & de se communiquer autour de la cavité du fourneau.

Le 28 septembre, à dix heures du matin, on a débouché l'ouverture supérieure du fourneau avec précaution, dans la crainte d'être suffoqué par la vapeur du charbon; j'ai remarqué, avant de l'ouvrir, que la chaleur avoit gagné jusqu'à 4 pieds $\frac{1}{2}$ dans l'épaisseur du massif qui forme la tour du fourneau; cette chaleur n'étoit pas fort grande aux environs de la *bure* (c'est ainsi qu'on appelle la partie supérieure du fourneau, qui s'élève au-dessus de son terre-plein). Mais à mesure qu'on approchoit de la cavité, les pierres étoient déjà si fort échauffées, qu'il n'étoit pas possible de les toucher un instant: les mortiers dans les joints des pierres étoient en partie brûlés, & il paroissoit que la chaleur étoit beaucoup plus grande encore dans le bas du fourneau, car les pierres du dessus de la tympe & de la tuyère, étoient excessivement chaudes dans toute leur épaisseur jusqu'à 4 ou 5 pieds.

Au moment qu'on a débouché le

des Minéraux, Partie Exp. 103

gueulard du fourneau, il en est sorti une vapeur suffoquante; dont il a fallu s'éloigner, & qui n'a pas laissé de faire mal à la tête à la plupart des assistans. Lorsque cette vapeur a été dissipée, on a mesuré de combien le charbon enfermé & privé d'air courant pendant quinze jours, avoit diminué, & l'on a trouvé qu'il avoit baissé de 14 pieds 5 pouces de hauteur; en sorte que le fourneau étoit vide dans toute la partie supérieure jusqu'auprès de la cuve.

Ensuite j'ai observé la surface de ce charbon, & j'y ai vu une petite flamme qui venoit de naître; il étoit absolument noir & sans flamme auparavant. En moins d'une heure cette petite flamme bleuâtre est devenue rouge dans le centre, & s'élevoit alors d'environ 2 pieds au-dessus du charbon.

Une heure après avoir débouché le gueulard, j'ai fait déboucher l'entrée du creuset; la première chose qui s'est présentée à cette ouverture, n'a pas été du feu comme on auroit pu le présumer, mais des scories provenans du charbon, & qui ressembloient à du mâchefer léger;

104 Introduction à l'Histoire

ce mâchefer étoit en assez grande quantité, & remplissoit tout l'intérieur du creuset, depuis la tympe à la rustine; & ce qu'il y a de singulier, c'est que, quoiqu'il ne se fût formé que par une grande chaleur, il avoit intercepté cette même chaleur au-dessus du creuset, en sorte que les parties de ce mâchefer, qui étoient au fond, n'étoient, pour ainsi dire, que tièdes; néanmoins elles s'étoient attachées au fond & aux parois du creuset; & elles en avoient réduit en chaux quelques portions jusqu'à plus de trois ou quatre pouces de profondeur.

J'ai fait tirer ce mâchefer & l'ai fait mettre à part pour l'examiner; on a aussi tiré la chaux du creuset & des environs, qui étoit en assez grande quantité. Cette calcination, qui s'est faite par ce feu sans flamme, m'a paru provenir en partie de l'action de ces scories du charbon. J'ai pensé que ce feu sourd & sans flamme étoit trop sec, & je crois que si j'avois mêlé quelque portion de laitier ou de terre vitrescible avec le charbon, cette terre auroit servi d'aliment à la chaleur, & auroit rendu des matières fondantes qui

des Minéraux, Partie Exp. 105

auroient préservé de la calcination la surface de l'ouvrage du fourneau.

Quoi qu'il en soit, il résulte de cette expérience, que la chaleur seule, c'est-à-dire, la chaleur obscure, renfermée, & privée d'air autant qu'il est possible, produit néanmoins avec le temps des effets semblables à ceux du feu le plus actif & le plus lumineux. On fait qu'il doit être violent pour calciner la pierre. Ici c'étoit de toutes les pierres calcaires la moins calcinable, c'est-à-dire, la plus résistante au feu, que j'avois choisie pour faire construire l'ouvrage & la cheminée de mon fourneau; toute cette pierre d'ailleurs avoit été taillée & posée avec soin, les plus petits quartiers avoient un pied d'épaisseur, un pied & demi de largeur, sur trois & quatre pieds de longueur, & dans ce gros volume la pierre est encore bien plus difficile à calciner que quand elle est réduite en moëllons. Cependant cette seule chaleur a non-seulement calciné ces pierres à près d'un demi-pied de profondeur dans la partie la plus étroite & la plus froide du fourneau, mais encore a brûlé en même temps les momiers sans

106 *Introduction à l'Histoire*

de glaise & de sable sans les faire fondre, ce que j'aurois mieux aimé, parce qu'alors les joints de la bâtisse du fourneau se feroient conservés pleins, au lieu que la chaleur, ayant suivi la route de ces joints, a encore calciné les pierres sur toutes les faces des joints. Mais, pour faire mieux entendre les effets de cette chaleur obscure & concentrée, je dois observer :

1.° Que le massif du fourneau étant de 28 pieds d'épaisseur de deux faces, & de 24 pieds d'épaisseur des deux autres faces, & la cavité où étoit contenu le charbon n'ayant que 6 pieds dans la plus grande largeur, les murs pleins qui environnent cette cavité avoient 9 pieds d'épaisseur de maçonnerie à chaux & sable aux parties les moins épaisses; que par conséquent on ne peut pas supposer qu'il ait passé de l'air à travers ces murs de 9 pieds : 2.° Que cette cavité, qui contenoit le charbon, ayant été bouchée en bas à l'endroit de la coulée avec un mortier de glaise mêlé de sable d'un pied d'épaisseur, & à la tuyère qui n'a que quelques pouces d'ouverture, avec ce même mortier dont on se sert pour tous les bouchages;

des Minéraux, Partie Exp. 107

il n'est pas à présumer qu'il ait pu entrer de l'air par ces deux ouvertures : 3.^o Que le gueulard du fourneau ayant de même été fermé avec une plaque de forte tôle lutée, & recouverte avec le même mortier, sur environ six pouces d'épaisseur, & encore environnée & surmontée de poussière de charbon mêlé avec ce mortier, sur six autres pouces de hauteur, tout accès à l'air, par cette dernière ouverture, étoit interdit. On peut donc assurer qu'il n'y avoit point d'air circulant dans toute cette cavité, dont la capacité étoit de 330 pieds cubes, & que l'ayant remplie de 5400 livres de charbon, le feu étouffé dans cette cavité n'a pu se nourrir que de la petite quantité d'air contenue dans les intervalles que laissoient entr'eux les morceaux de charbon ; & comme cette matière jetée l'une sur l'autre laisse de très-grands vides, supposons moitié ou même trois quarts, il n'y a donc eu dans cette cavité que 165, ou tout au plus 248 pieds cubes d'air. Or le feu du fourneau excité par les soufflets, consomme cette quantité d'air en moins d'une demi-minute ; & cependant il sembleroit qu'elle a suffi

pour en retenir pendant quinze jours la chaleur, & l'augmenter à-peu-près au même point que celle du feu libre, puisqu'elle a produit la calcination des pierres à quatre pouces de profondeur dans le bas, & à plus de deux pieds de profondeur dans le milieu & dans toute l'étendue du fourneau, ainsi que nous le dirons tout-à-l'heure. Comme cela me paroïssoit assez inconcevable, j'ai d'abord pensé qu'il falloit ajouter à ces 248 pieds cubes d'air, contenus dans la cavité du fourneau, toute la vapeur de l'humidité des murs que la chaleur concentrée n'a pu manquer d'attirer, & de laquelle il n'est guère possible de faire une juste estimation. Ce sont-là les seuls éléments, soit en air, soit en vapeurs aqueuses que cette très-grande chaleur a consommés pendant quinze jours; car il ne se dégage que peu ou point d'air du charbon dans sa combustion, quoiqu'il s'en dégage plus d'un tiers du poids total du bois de chêne bien séché (a); cet air fixe contenu dans le bois, en est chassé par la première opération du feu qui le convertit en

(a) Hales, *Statique des Végétaux*, page 150.

des Minéraux, Partie Exp. 109

charbon, & s'il en reste, ce n'est qu'en si petite quantité qu'on ne peut pas la regarder comme le supplément de l'air qui manquoit ici à l'entretien du feu. Ainsi, cette chaleur très-grande & qui s'est augmentée au point de calciner profondément les pierres, n'a été entretenue que par 248 pieds cubes d'air & par les vapeurs de l'humidité des murs; & quand nous supposerions le produit successif de cette humidité cent fois plus considérable que le volume d'air contenu dans la cavité du fourneau, cela ne feroit toujours que 24800 pieds cubes de vapeurs propres à entretenir la combustion; quantité que le feu libre & animé par les soufflets consomméroit en moins de 30 minutes, tandis que la chaleur sourde ne la consomme qu'en quinze jours.

Et ce qu'il est nécessaire d'observer encore, c'est que le même feu libre & animé auroit consumé, en 1 ou 2 heures, les 3600 livres de charbon que la chaleur obscure n'a consumé qu'en quinze jours; elle n'a donc eu que la trentième partie de l'aliment du feu libre, puisqu'il y a eu trente fois autant de temps employé à la

pire

urs la char
u même
qu'elle a
à quatre
, & à plus
le milieu
eau, ainsi
. Comme
able, j'ai
ter à ces
s dans la
apeur de
leur con-
er, & de
faire une
s alimens,
euses que
nformés
se dégage
rbon dans
gage plus
de chêne
tenu dans
première
vertit en
é 15a.

110 *Introduction à l'Histoire*

consommation de la matière combustible ; & en même temps il y a eu environ sept cens vingt fois moins d'air ou de vapeurs employées à cette combustion. Néanmoins les effets de cette chaleur obscure ont été les mêmes que ceux du feu libre, car il auroit fallu quinze jours de ce feu violent & animé pour calciner les pierres au même degré qu'elles l'ont été par la chaleur seule ; ce qui nous démontre d'une part l'immense déperdition de la chaleur lorsqu'elle s'exhale avec les vapeurs & la flamme, & d'autre part les grands effets qu'on peut attendre de sa concentration, ou pour mieux dire, de sa coërcion, de sa détention. Car cette chaleur retenue & concentrée ayant produit les mêmes effets que le feu libre & violent, avec trente fois moins de matière combustible & sept cens vingt fois moins d'air, & étant supposée en raison composée de ces deux élémens, on doit en conclure que, dans nos grands fourneaux à fondre les mines de fer, il se perd vingt-un mille fois plus de chaleur qu'il ne s'en applique, soit à la mine, soit aux parois du fourneau ; en sorte qu'on imagineroit que les fourneaux de réverbère où la chaleur est plus

des Minéraux, Partie Exp. 111

concentrée, devoient produire le feu le plus puissant. Cependant j'ai acquis la preuve du contraire, nos mines de fer ne s'étant pas même aglutinées par le feu de réverbère de la glacerie de Rouelles en Bourgogne; tandis qu'elles fondent en moins de 12 heures au feu de nos fourneaux à soufflets: cette différence tient au principe que j'ai donné; le feu, par sa vitesse ou par son volume, produit des effets tous différens sur certaines substances telles que la mine de fer; tandis que, sur d'autres substances telle que la pierre calcaire, il peut en produire de semblables. La fusion est en général une opération prompte, qui doit avoir plus de rapport avec la vitesse du feu que la calcination qui est presque toujours lente, & qui doit dans bien des cas avoir plus de rapport au volume du feu ou à son long séjour, qu'à sa vitesse. On verra, par l'expérience suivante, que cette même chaleur retenue & concentrée, n'a fait aucun effet sur la mine de fer.

DEUXIÈME EXPÉRIENCE.

DANS ce même fourneau de 23 pieds

112 Introduction à l'Histoire

de hauteur, après avoir fondu de la mine de fer pendant environ quatre mois, je fis couler les dernières gueuses en remplissant toujours avec du charbon, mais sans mine, afin d'en tirer toute la matière fondue; & quand je me fus assuré qu'il n'en restoit plus, je fis cesser le vent, boucher exactement l'ouverture de la tuyère & celle de la coulée qu'on maçonna avec de la brique & du mortier de glaise mêlé de sable. Ensuite je fis porter sur le charbon autant de mine qu'il pouvoit en entrer dans le vide qui étoit au-dessus du fourneau; il y en entra cette première fois vingt-sept mesures de 60 livres, c'est-à-dire 1620 livres pour affleurer le niveau du gueulard, après quoi je fis boucher cette ouverture avec la même plaque de forte tôle & du mortier de glaise & sable, & encore de la poudre de charbon en grande quantité; on imagine bien quelle immense chaleur je renfermois ainsi dans le fourneau, tout le charbon en étoit allumé du haut en bas lorsque je fis cesser le vent: toutes les pierres des parois étoient rouges du feu qui les pénéroit depuis quatre mois; toute cette chaleur

ne p
fente
neau
afin
jours
& je
malg
dans
quoid
de r
pou
fis su
vide
enfem
je fis
du gu
de 16
dimin
affaill
de m
ainsi,
charb
avoit
Six jo
pour
penda
baissé

des Minéraux, Partie Exp. 113

ne pouvoit s'exhaler que par deux petites fentes, qui s'étoient faites au mur du fourneau, & que je fis remplir de bon mortier, afin de lui ôter encore ces issues : trois jours après, je fis déboucher le gueulard, & je vis, avec quelque surprise, que, malgré cette chaleur immense renfermée dans le fourneau, le charbon ardent, quoique comprimé par la mine & chargé de 1620 livres, n'avoit baissé que de 16 pouces en trois jours ou 72 heures. Je fis sur-le-champ remplir ces 16 pouces de vide avec 25 mesures de mines, pesantes ensemble 1500 livres. Trois jours après, je fis déboucher cette même ouverture du gueulard, & je trouvai le même vide de 16 pouces, & par conséquent la même diminution, ou si l'on veut, le même affaissement du charbon ; je fis remplir de même avec 1500 livres de mine ; ainsi, il y en avoit déjà 4620 livres sur le charbon qui étoit tout embrasé lorsqu'on avoit commencé de fermer le fourneau. Six jours après, je fis déboucher le gueulard pour la troisième fois, & je trouvai que, pendant ces six jours, le charbon n'avoit baissé que de 20 pouces, que l'on remplit

114 *Introduction à l'Histoire.*

avec 1860 livres de mine ; enfin neuf jours après on déboucha pour la quatrième fois ; & je vis que pendant ces neuf derniers jours, le charbon n'avoit baissé que de 21 pouces, que je fis remplir de 1920 livres de mine ; ainsi, il y en avoit en tout 8400 livres : on referma le gueulard avec les mêmes précautions, & le lendemain, c'est-à-dire vingt-deux jours après avoir bouché pour la première fois, je fis rompre la petite maçonnerie de briques, qui bouchoit l'ouverture de la coulée en laissant toujours fermée celle du gueulard, afin d'éviter le courant d'air qui auroit enflammé le charbon. La première chose que l'on tira par l'ouverture de la coulée, furent des morceaux réduits en chaux dans l'ouvrage du fourneau ; on y trouva aussi quelques petits morceaux de mâchefer, quelques autres d'une fonte mal dirigée, & environ une livre & demie de très-bon fer qui s'étoit formé par coagulation. On tira près d'un tombereau de toutes ces matières, parmi lesquelles il y avoit aussi quelques morceaux de mine brûlée & presque réduite en mauvais laitier ; cette mine brûlée ne provenoit

pas
les
ma
du
du
dan
calc
A
ton
éto
de
pas
en
Le
on
de
je l'
cha
quin
ving
il p
que
cap
cent
16
il fa
été

des Minéraux, Partie Exp. 115

pas de celle que j'avois fait imposer sur les charbons, après avoir fait cesser le vent, mais de celle qu'on y avoit jetée sur la fin du fondage, qui s'étoit attaché aux parois du fourneau, & qui ensuite étoit tombée dans le creuset avec les parties de pierres calcinées auxquelles elle étoit unie.

Après avoir tiré ces matières, on fit tomber le charbon; le premier qui parut étoit à peine rouge; mais, dès qu'il eut de l'air, il devint très-rouge; on ne perdit pas un instant à le tirer, & on l'éteignoit en même temps en jetant de l'eau dessus. Le gueulard étant toujours bien fermé, on tira tout le charbon par l'ouverture de la coulée, & aussi toute la mine dont je l'avois fait charger. La quantité de ce charbon tiré du fourneau, montoit à cent quinze corbeilles; en sorte que, pendant ces vingt-deux jours d'une chaleur si violente, il paroïssoit qu'il ne s'en étoit consumé que dix-sept corbeilles, car toute la capacité du fourneau n'en contient que cent trente-cinq; &, comme il y avoit 16 pouces $\frac{1}{2}$ de vide lorsqu'on le boucha, il faut déduire deux corbeilles qui auroient été nécessaires pour remplir ce vide.

116 *Introduction à l'Histoire*

Étonné de cette excessivement petite consommation du charbon pendant vingt-deux jours de l'action de la plus violente chaleur qu'on eût jamais enfermée, je regardai ces charbons de plus près, & je vis que, quoiqu'ils eussent aussi peu perdu sur leur volume, ils avoient beaucoup perdu sur leur masse, & que, quoique l'eau avec laquelle on les avoit éteints leur eût rendu du poids, ils étoient encore d'environ un tiers plus légers que quand on les avoit jetés au fourneau; cependant les ayant fait transporter aux petites chaufferies des martinets & de la batterie, ils se trouvèrent encore assez bons pour chauffer, même à blanc, les petites barres de fer qu'on fait passer sous ces marteaux.

On avoit tiré la mine en même temps que le charbon, & on l'avoit soigneusement séparée & mise à part; la très-violente chaleur qu'elle avoit essuyée, pendant un si long temps, ne l'avoit ni fondue ni brûlée, ni même aglutinée, le grain en étoit seulement devenu plus propre & plus luisant; le sable vitrescible & les petits cailloux dont elle étoit mêlée ne s'étoient point fondus, & il me parut qu'elle n'avoit

pe
aup
que
un
qua

la p
trée
sans
l'air
le f
de
peu
2.^o
ou
mal
vol
fon
con
exp
se
cha
cha
de
len
&
Da

ent petite
ant vingt-
s violente
rmée, je
rès, & je
oeu perdu
beaucoup
ique l'eau
s leur eût
core d'en-
quand on
endant les
es chauffe-
rie, ils se
r chauffer,
es de fer
eaux.
me temps
soigneuse-
s-violente
endant un
fondue ni
grain en
ore & plus
les petits
e s'étoient
lle n'avoit

des Minéraux, Partie Exp. 117

perdu que l'humidité qu'elle contenoit auparavant, car elle n'avoit guère diminué que d'un cinquième en poids & d'environ un vingtième en volume, & cette dernière quantité s'étoit perdue dans les charbons.

Il résulte de cette expérience : 1.^o Que la plus violente chaleur & la plus concentrée pendant un très-long temps, ne peut, sans le secours & le renouvellement de l'air, fondre la mine de fer, ni même le sable vitrescible, tandis qu'une chaleur de même espèce & beaucoup moindre, peut calciner toutes les matières calcaires : 2.^o Que le charbon pénétré de chaleur ou de feu commence à diminuer de masse long-temps avant de diminuer de volume, & que ce qu'il perd le premier sont les parties les plus combustibles qu'il contient. Car, en comparant cette seconde expérience avec la première, comment se pourroit-il que la même quantité de charbon se consume plus vite avec une chaleur très-médiocre, qu'à une chaleur de la dernière violence, toutes deux également privées d'air, également retenues & concentrées dans le même vaisseau clos ? Dans la première expérience, le charbon

118 *Introduction à l'Histoire*

qui, dans une cavité presque froide, n'avoit éprouvé que la légère impression d'un feu qu'on avoit étouffé au moment que la flamme s'étoit montrée, avoit néanmoins diminué des deux tiers en quinze jours; tandis que le même charbon enflammé autant qu'il pouvoit l'être par le vent des soufflets, & recevant encore la chaleur immense des pierres rouges de feu dont il étoit environné n'a pas diminué d'un sixième pendant vingt-deux jours. Cela seroit inexplicable si l'on ne faisoit pas attention que, dans le premier cas, le charbon avoit toute sa densité, & contenoit toutes ses parties combustibles; au lieu que dans le second cas, où il étoit dans l'état de la plus forte incandescence, toutes ses parties les plus combustibles étoient déjà brûlées. Dans la première expérience la chaleur, d'abord très-médiocre, alloit toujours en augmentant à mesure que la combustion augmentoit & se communiquoit de plus en plus à la masse entière du charbon. Dans la seconde expérience, la chaleur excessive alloit en diminuant à mesure que le charbon achevoit de brûler, & il ne pouvoit plus

do
con
qu
cau
cha
con
brû
que
ne
bust
feu
que
foun
la co
& q
& p
en a
de t
à l'a
n'en
leur
pas,
mais
entre
busti
vite
nir e

des Minéraux, Partie Exp. 119

donner autant de chaleur, parce que la combustion étoit fort avancée au moment qu'on l'avoit enfermée. C'est-là la vraie cause de cette différence d'effets. Le charbon dans la première expérience, contenant toutes ses parties combustibles, brûloit mieux & se consumoit plus vite que celui de la seconde expérience, qui ne contenoit presque plus de matière combustible, & ne pouvoit augmenter son feu ni même l'entretenir au même degré que par l'emprunt de celui des murs du fourneau; c'est par cette seule raison que la combustion alloit toujours en diminuant, & qu'au total elle a été beaucoup moindre & plus lente que l'autre qui alloit toujours en augmentant, & qui s'est faite en moins de temps. Lorsque tout accès est fermé à l'air, & que les matières renfermées n'en contiennent que peu ou point dans leur substance; elles ne se consumeront pas, quelque violente que soit la chaleur; mais s'il reste une certaine quantité d'air entre les interstices de la matière combustible, elle se consumera d'autant plus vite & d'autant plus qu'elle pourra fournir elle-même une plus grande quantité

120 Introduction à l'Histoire

d'air : 3.^o Il résulte encore de ces expériences, que la chaleur la plus violente, dès qu'elle n'est pas nourrie, produit moins d'effet que la plus petite chaleur qui trouve de l'aliment ; la première est, pour ainsi dire, une chaleur morte qui ne se fait sentir que par sa déperdition ; l'autre est un feu vivant qui s'accroît à proportion des alimens qu'il consomme. Pour reconnoître ce que cette chaleur morte, c'est-à-dire cette chaleur dénuée de tout aliment pouvoit produire, j'ai fait l'expérience suivante.


TROISIÈME EXPÉRIENCE.

APRÈS avoir tiré du fourneau, par l'ouverture de la coulée, tout le charbon qui y étoit contenu, & l'avoir entièrement vidé de mine & de toute autre matière, je fis maçonner de nouveau cette ouverture & boucher avec le plus grand soin celle du gueulard en haut, toutes les pierres des parois du fourneau étant encore excessivement chaudes ; l'air ne pouvoit donc entrer dans le fourneau pour le rafraîchir, & la chaleur ne pouvoit en sortir qu'à travers des murs de plus de


expé-
dente,
moins
trouve
r ainsi
t sentir
un feu
on des
noître
-à-dire
aliment
érence

N C E.


u, par
charbon
rement
matière,
ouver-
nd soin
res les
t encore
pouvoir
our le
oit en
e plus
de




Echelle de Six Pieds




E





Echelle de six piats.







Echelle de six piés








Echelle de Six Pieds.





Echelle de six pieds.







Echelle de six pieds

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Fig. 1.





7.



C

Fig. 2.







Fig. 3.





Q

Fig. 6.




Fig. 7.








Fig. 1










Fig.



Fig.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 1.





Fig. 2.





Fig

X



Fig. 2.




Fig. 1.






Fig. 3.





11










Fig: 1.
6. pieds de Foyer.



Fig: 2.
8. pieds de Foyer.



Fig: 3.



Echelle de deux pieds.



Fig. 1.
de de Foyer.





Fig. 2.
de de Foyer.



Fig. 3.



elle de deux pieds.



de 9
avoit c
vide ,
même
donc c
tout l'e
& que
du feu
combust
temps l
le gueu
donnée
large pi
contact
charbon
cette pla
fis mett
ration de
qui ne p
fourneau
le feu vif
toujours
l'ouvertu
plaque de
& capabl
bustibles.
augmenta
Supple

des Minéraux, Partie Exp. 121

de 9 pieds d'épaisseur ; d'ailleurs il n'y avoit dans sa cavité, qui étoit absolument vide, aucune matière combustible, ni même aucune autre matière. Observant donc ce qui arriveroit, je m'aperçus que tout l'effet de la chaleur se portoit en haut, & que, quoique cette chaleur ne fût pas du feu vivant ou nourri par aucune matière combustible, elle fit rougir en peu de temps la forte plaque de tôle qui couvroit le gueulard ; que cette incandescence donnée par la chaleur obscure à cette large pièce de fer se communiqua par le contact à toute la masse de poudre de charbon qui recouvroit les mortiers de cette plaque & enflamma du bois que je fis mettre dessus. Ainsi, la seule évaporation de cette chaleur obscure & morte, qui ne pouvoit sortir que des pierres du fourneau, produisit ici le même effet que le feu vif & nourri. Cette chaleur tendant toujours en haut & se réunissant toute à l'ouverture du gueulard au-dessous de la plaque de fer, la rendit rouge, lumineuse & capable d'enflammer des matières combustibles. D'où l'on doit conclure qu'en augmentant la masse de la chaleur obscure,

122 Introduction à l'Histoire

on peut produire de la lumière de la même manière qu'en augmentant la masse de la lumière on produit de la chaleur; que dès-lors ces deux substances sont réciproquement convertibles de l'une en l'autre, & toutes deux nécessaires à l'élément du feu.

Lorsqu'on enleva cette plaque de fer, qui couvroit l'ouverture supérieure du fourneau, & que la chaleur avoit fait rougir, il en sortit une vapeur légère & qui parut enflammée, mais qui se dissipâ dans un instant; j'observai alors les pierres des parois du fourneau, elles me parurent calcinées en très-grande partie & très-profondément; & en effet, ayant laissé refroidir le fourneau pendant dix jours, elles se sont trouvées calcinées jusqu'à deux pieds, & même deux pieds & demi de profondeur, ce qui ne pouvoit provenir que de la chaleur que j'y avois renfermée pour faire mes expériences; attendu que, dans les autres fondages, le feu animé par les soufflets, n'avoit jamais calciné les mêmes pierres à plus de huit pouces d'épaisseur dans les endroits où il est le plus vif, & seulement à deux ou

de

trois
que t
jusqu'
fait un
généra
& den
deux p
cette ch
ver d'i
bien p
courant

On p
les moy
de la ch
de dimi
bois en
fermé a
ne faud
charbon
moins de
contenu
même d
d'épaisse
fermé.

Dès qu
pour per
on fut ob

des Minéraux, Partie Exp. 123

trois pouces dans tout le reste, au lieu que toutes les pierres, depuis le creuset jusqu'au terre-plein du fourneau, ce qui fait une hauteur de vingt pieds, étoient généralement réduites en chaux d'un pied & demi, de deux pieds, & même de deux pieds & demi d'épaisseur: comme cette chaleur renfermée n'avoit pu trouver d'issue, elle avoit pénétré les pierres bien plus profondément que la chaleur courante.

On pourroit tirer de cette expérience les moyens de cuire la pierre & de faire de la chaux à moindre frais, c'est-à-dire, de diminuer de beaucoup la quantité de bois en se servant d'un fourneau bien fermé au lieu de fourneaux ouverts; il ne faudroit qu'une petite quantité de charbon pour convertir en chaux, dans moins de quinze jours, toutes les pierres contenues dans le fourneau, & les murs même du fourneau à plus d'un pied d'épaisseur, s'il étoit bien exactement fermé.

Dès que le fourneau fut assez refroidi pour permettre aux ouvriers d'y travailler, on fut obligé d'en démolir tout l'intérieur.

124 *Introduction à l'Histoire*

du haut en bas, sur une épaisseur circulaire de quatre pieds, on en tira 54 muids de chaux, sur laquelle je fis les observations suivantes : 1.^o toute cette pierre, dont la calcination s'étoit faite à feu lent & concentré, n'étoit pas devenue aussi légère que la pierre calcinée à la manière ordinaire; celle-ci, comme je l'ai dit, perd à très-peu-près la moitié de son poids, & celle de mon fourneau n'en avoit perdu qu'environ trois huitièmes; 2.^o elle ne faisoit pas l'eau avec la même avidité que la chaux vive ordinaire; lorsqu'on l'y plonge, elle ne donne d'abord aucun signe de chaleur ni d'ébullition, mais peu après elle se gonfle, se divise & s'élève, en sorte qu'on n'a pas besoin de la remuer comme on remue la chaux vive ordinaire pour l'éteindre; 3.^o cette chaux a une saveur beaucoup plus âcre que la chaux commune, elle contient par conséquent beaucoup plus d'alkali fixe; 4.^o elle est infiniment meilleure, plus liante & plus forte que l'autre chaux, & tous les ouvriers n'en emploient qu'environ les deux tiers de l'autre, & assurent que le mortier est encore excellent; 5.^o cette

d
chaux
très-l
ou d
comme
résiste
mois
réduir
comme
son vo
l'écrasa
& péné
qui ne
l'air qu
absorbe
temps
reste,
nément
ces mē
obscuré
mêmes
plus vi
Il son
du four
taille,
fondém
nément
étoient

des Minéraux, Partie Exp. 125

chaux ne s'éteint à l'air qu'après un temps très-long, tandis qu'il ne faut qu'un jour ou deux pour réduire la chaux vive commune en poudre à l'air libre, celle-ci résiste à l'impression de l'air pendant un mois ou cinq semaines; 6.° au lieu de se réduire en farine ou en poussière sèche comme la chaux commune, elle conserve son volume, & lorsqu'on la divise en l'écrasant, toute la masse paroît ductile & pénétrée d'une humidité grasse & liante, qui ne peut provenir que de l'humide de l'air que la pierre a puissamment attiré & absorbé pendant les cinq semaines de temps employées à son extinction: Au reste, la chaux que l'on tire communément des fourneaux de forge a toutes ces mêmes propriétés; ainsi, la chaleur obscure & lente produit encore ici les mêmes effets que le feu le plus vif & le plus violent.

Il sortit de cette démolition de l'intérieur du fourneau, 232 quartiers de pierres de taille, tous calcinés plus ou moins profondément; ces quartiers avoient communément quatre pieds de longueur, la plupart étoient en chaux jusqu'à dix-huit pouces,

126 *Introduction à l'Histoire*

& les autres à deux pieds, & même deux pieds & demi, & cette portion calcinée se séparoit aisément du reste de la pierre qui étoit saine & même plus dure que quand on l'avoit posée pour bâtir le fourneau. Cette observation m'engagea à faire les expériences suivantes.

QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

JE FIS peser dans l'air & dans l'eau trois morceaux de ces pierres qui, comme l'on voit, avoient subi la plus grande chaleur qu'elles pussent éprouver sans se réduire en chaux, & j'en comparai la pesanteur spécifique avec celles de trois autres morceaux à peu-près du même volume, que j'avois fait prendre dans d'autres quartiers de cette même pierre, qui n'avoient point été employés à la construction du fourneau, ni par conséquent chauffés, mais qui avoient été tirés de la même carrière neuf mois auparavant, & qui étoient restés à l'exposition du soleil & de l'air. Je trouvai que la pesanteur spécifique des pierres échauffées à ce grand feu pendant cinq mois avoit augmenté, qu'elle étoit constamment plus grande

de

que ce
d'un
90.° su
troisiè
degré
gagne
lieu q
la calc
de ch
peut
degré
l'air &
fixe d
mière
& que
& s'él
& ent
la pier
comp
& tra
filtre
Ap
sur c
moins
un ter
cela t
de la

des Minéraux, Partie Exp. 127

que celle de la même pierre non échauffée, d'un 81.^e sur le premier morceau, d'un 90.^e sur le second, & d'un 85.^e sur le troisième; donc la pierre chauffée au degré voisin de celui de sa calcination gagne au moins un 86.^e de masse, au lieu qu'elle en perd trois huitièmes par la calcination, qui ne suppose qu'un degré de chaleur de plus. Cette différence ne peut venir que de ce qu'à un certain degré de violente chaleur ou de feu, tout l'air & toute l'eau transformés en matière fixe dans la pierre, reprennent leur première nature, leur élasticité, leur volatilité, & que dès-lors ils se dégagent de la pierre & s'élèvent en vapeurs, que le feu enlève & entraîne avec lui. Nouvelle preuve que la pierre calcaire est en très-grande partie composée d'air fixe & d'eau fixe saisis & transformés en matière solide par le filtre animal.

Après ces expériences, j'en fis d'autres sur cette même pierre échauffée à un moindre degré de chaleur, mais pendant un temps aussi long; je fis détacher pour cela trois morceaux des parois extérieures de la lunette de la tuyère, dans un endroit

128 Introduction à l'Histoire

où la chaleur étoit à peu-près de 95 degrés, parce que le soufre appliqué contre la muraille, s'y ramollissoit & commençoit à fondre, & que ce degré de chaleur est à-très-peu-près celui auquel le soufre entre en fusion. Je trouvai, par trois épreuves semblables aux précédentes, que cette même pierre chauffée à ce degré pendant cinq mois, avoit augmenté en pesanteur spécifique d'un 65.^e, c'est-à-dire, de presque un quart de plus que celle qui avoit éprouvé le degré de chaleur voisin de celui de la calcination, & je conclus de cette différence que l'effet de la calcination commençoit à se préparer dans la pierre qui avoit subi le plus grand feu, au lieu que celle qui n'avoit éprouvé qu'une moindre chaleur, avoit conservé toutes les parties fixes qu'elle y avoit déposées.

Pour me satisfaire pleinement sur ce sujet, & reconnoître si toutes les pierres calcaires augmentent en pesanteur spécifique par une chaleur constamment & long-temps appliquée, je fis six nouvelles épreuves sur deux autres espèces de pierres. Celle dont étoit construit l'intérieur de

des

mon fou
riences
pierre à
l'action
calcaires
petits gr
un cimen
& qui la
pesanteur
celle des
un 20.
morceau
a fallu
du temp
en chaux
être assu
ont été
résistante
je vais l
bonnes
plus bell
a le gra
celui du
plus gro
& pleine
chaux g
la chaux

des Minéraux, Partie Exp. 129

mon fourneau, & qui a servi aux expériences précédentes, s'appelle dans le pays *Pierre à feu*, parce qu'elle résiste plus à l'action du feu que toutes les autres pierres calcaires. Sa substance est composée de petits graviers calcaires liés ensemble par un ciment pierreux qui n'est pas fort dur, & qui laisse quelques interstices vides; sa pesanteur est néanmoins plus grande que celle des autres pierres calcaires d'environ un 20.^e En ayant éprouvé plusieurs morceaux au feu de mes chaufferies, il a fallu pour les calciner plus du double du temps de celui qu'il falloit pour réduire en chaux les autres pierres; on peut donc être assuré que les expériences précédentes ont été faites sur la pierre calcaire la plus résistante au feu. Les pierres auxquelles je vais la comparer, étoient aussi de très-bonnes pierres calcaires dont on fait la plus belle taille pour les bâtimens, l'une a le grain fin & presque aussi serré que celui du marbre; l'autre a le grain un peu plus gros, mais toutes deux sont compactes & pleines, toutes deux font de l'excellente chaux grise, plus liante & plus forte que la chaux commune qui est plus blanche.

130 Introduction à l'Histoire

En pesant dans l'air & dans l'eau trois morceaux chauffés & trois autres non chauffés de cette première pierre dont le grain étoit le plus fin, j'ai trouvé qu'elle avoit gagné un 56.^e en pesanteur spécifique, par l'application constante pendant cinq mois, d'une chaleur d'environ 90 degrés, ce que j'ai reconnu, parce qu'elle étoit voisine de celle dont j'avois fait casser les morceaux dans la voûte extérieure du fourneau, & que le soufre ne fondoit plus contre ses parois; en ayant donc fait enlever trois morceaux encore chauds pour les peser, & comparer avec d'autres morceaux de la même pierre, qui étoient restés exposés à l'air libre, j'ai vu que l'un des morceaux avoit augmenté d'un 60.^e; le second d'un 62.^e; le troisième d'un 56.^e. Ainsi, cette pierre à grain très-fin a augmenté en pesanteur spécifique de près d'un tiers de plus que la pierre à feu chauffée au degré voisin de celui de la calcination, & aussi d'environ un 7.^e de plus que cette même pierre à feu chauffée à 95 degrés, c'est-à-dire, à une chaleur à peu-près égale.

La seconde pierre, dont le grain étoit

d
moin
La vo
maint
besoi
qui a
cinq
que l
casser
de t
chauff
morce
54.^e;
d'un
moye
pesan
Il r
route
long-
devie
ne pe
leur
leur
en de
forme
de po
ou d'
varier

des Minéraux, Partie Exp. 131

moins fin, formoit une assise entière de la voûte extérieure du fourneau, & je fus maître de choisir les morceaux dont j'avois besoin pour l'expérience, dans un quartier qui avoit subi pendant le même temps de cinq mois le même degré 95 de chaleur que la pierre à feu; en ayant donc fait casser trois morceaux, & m'étant muni de trois autres, qui n'avoient pas été chauffés, je trouvai que l'un de ces morceaux chauffés avoit augmenté d'un 54°; le second d'un 63°; & le troisième d'un 66°; ce qui donne pour la mesure moyenne un 61.° d'augmentation en pesanteur spécifique.

Il résulte de ces expériences, 1.° que toute pierre calcaire chauffée pendant long-temps, acquiert de la masse & devient plus pesante; cette augmentation ne peut venir que des particules de chaleur qui la pénètrent & s'y unissent par leur longue résidence, & qui dès-lors en deviennent partie constituante sous une forme fixe: 2.° que cette augmentation de pesanteur spécifique étant d'un 61.° ou d'un 56.° ou d'un 65.° ne se trouve varier ici que par la nature des différentes

132 Introduction à l'Histoire

pierres; que celles dont le grain est le plus fin, sont celles dont la chaleur augmente le plus la masse, & dans lesquelles les pores étant plus petits, elle se fixe plus aisément & en plus grande quantité : 3.^o que la quantité de chaleur, qui se fixe dans la pierre, est encore bien plus grande que ne le désigne ici l'augmentation de la masse; car la chaleur, avant de se fixer dans la pierre, a commencé par en chasser toutes les parties humides qu'elle contenoit; on fait qu'en distillant la pierre calcaire dans une cornue bien fermée, on tire de l'eau pure jusqu'à concurrence d'un seizième de son poids: mais comme une chaleur de 95 degrés, quoiqu'appliquée pendant cinq mois, pourroit néanmoins produire à cet égard de moindres effets que le feu violent qu'on applique au vaisseau dans lequel on distille la pierre, réduisons de moitié & même des trois quarts cette quantité d'eau enlevée à la pierre par la chaleur de 95 degrés, on ne pourra pas disconvenir que la quantité de chaleur, qui s'est fixée dans cette pierre, ne soit d'abord d'un 60.^o indiqué par l'augmentation de la

des L

pesanteur
pour le
contenir
sortir; en
craindre
qui pénè
quée pen
grande q
masse tou
dans la
pendant
l'eau que

CINQ

Tou
pesanteur
gue apph
par cette
dureté q
Voulant
durable,
le temps
mais cell
qu'elles
je fis exp
parties d
avoient f

des Minéraux, Partie Exp. 133

pesanteur spécifique, & encore d'un 64.^e pour le quart de la quantité d'eau qu'elle contenoit, & que cette chaleur aura fait sortir; en sorte qu'on peut assurer, sans craindre de se tromper, que la chaleur qui pénètre dans la pierre lui étant appliquée pendant long-temps, s'y fixe en assez grande quantité pour en augmenter la masse tout au moins d'un trentième, même dans la supposition qu'elle n'ait chassé pendant ce long temps que le quart de l'eau que la pierre contenoit.

CINQUIÈME EXPÉRIENCE.

TOUTES les pierres calcaires dont la pesanteur spécifique augmente par la longue application de la chaleur, acquièrent, par cette espèce de dessèchement, plus de dureté qu'elles n'en avoient auparavant. Voulant reconnoître si cette dureté seroit durable, & si elles ne perdroient pas avec le temps, non-seulement cette qualité, mais celle de l'augmentation de densité qu'elles avoient acquise par la chaleur, je fis exposer aux injures de l'air plusieurs parties de trois espèces de pierres qui avoient servi aux expériences précédentes,

134 *Introduction à l'Histoire*

& qui toutes avoient été plus ou moins chauffées pendant cinq mois. Au bout de quinze jours, pendant lesquels il y avoit eu des pluies, je les fis sonder & frapper au marteau par le même ouvrier qui les avoit trouvées très-dures quinze jours auparavant; il reconnut avec moi que la pierre à feu qui étoit la plus poreuse, & dont le grain étoit le plus gros, n'étoit déjà plus aussi dure & qu'elle se laissoit travailler plus aisément. Mais les deux autres espèces, & sur-tout celle dont le grain étoit le plus fin, avoient conservé la même dureté, néanmoins elles la perdirent en moins de six semaines. Et les ayant fait alors éprouver à la balance hydrostatique, je reconnus qu'elles avoient aussi perdu une assez grande quantité de la matière fixe que la chaleur y avoit déposée. Néanmoins, au bout de plusieurs mois, elles étoient toujours spécifiquement plus pesantes d'un 150.^e ou d'un 160.^e que celles qui n'avoient point été chauffées. La différence devenant alors trop difficile à saisir entre ces morceaux & ceux qui n'avoient pas été chauffés, & qui tous étoient également exposés à l'air, je fus

force
je s
temp
leur
de l
posit
tout
de m
chau
Il
partie
la pi
unies
confe
& pe
préfe
néann
de l'a
que l
la pie
s'y ét
plus a
& en
de p
la ch
les p
dans

des Minéraux, Partie Exp. 135

forcé de borner là cette expérience ; mais je suis persuadé qu'avec beaucoup de temps ces pierres auroient perdu toute leur pesanteur acquise. Il en est de même de la dureté, après quelques mois d'exposition à l'air, les ouvriers les ont traitées tout aussi aisément que les autres pierres de même espèce, qui n'avoient point été chauffées.

Il résulte de cette expérience, que les particules de chaleur, qui se fixent dans la pierre, n'y sont, comme je l'ai dit, unies que par force ; que quoiqu'elles les conserve, après son entier refroidissement, & pendant assez long-temps, si on la préserve de toute humidité, elle les perd néanmoins peu-à-peu par les impressions de l'air & de la pluie, sans doute parce que l'air & l'eau ont plus d'affinité avec la pierre que les parties de la chaleur qui s'y étoient logées. Cette chaleur fixe n'est plus active, elle est pour ainsi dire morte, & entièrement passive ; dès-lors bien loin de pouvoir chasser l'humidité, celle-ci la chasse à son tour & reprend toutes les places qu'elle lui avoit cédées. Mais, dans d'autres matières qui n'ont pas avec

136 Introduction à l'Histoire

l'eau autant d'affinité que la pierre calcaire; cette chaleur une fois fixée n'y demeure-t-elle pas constamment & à toujours? c'est ce que j'ai cherché à constater par l'expérience suivante.

SIXIÈME EXPÉRIENCE.

J'AI PRIS plusieurs morceaux de fonte de fer, que j'ai fait casser dans les gueuses qui avoient servi plusieurs fois à soutenir les parois de la cheminée de mon fourneau, & qui par conséquent avoient été chauffées trois fois pendant quatre ou cinq mois de suite au degré de chaleur qui calcine la pierre; car ces gueuses avoient soutenu les pierres ou les briques de l'intérieur du fourneau, & n'étoient défendues de l'action immédiate du feu que par une pierre épaisse de trois ou quatre pouces qui formoit le dernier rang des étalages du fourneau; ces dernières pierres, ainsi que toutes les autres dont les étalages étoient construits, s'étoient réduites en chaux à chaque fondage, & la calcination avoit toujours pénétré de près de huit pouces dans celles qui étoient exposées à la plus violente

acti
n'éto
par
le n
proc
& l'
fois
suite
que
de l
réité
mêm
l'acti
sépar
de ma
fonte
pend
coup
n'en
même
acquis
indice
diffère
pesant
temps
morce
hydro

des Minéraux, Partie Exp. 137

action du feu ; ainsi , les gueuses , qui n'étoient recouvertes que de quatre pouces par ces pierres , avoient certainement subi le même degré de feu que celui qui produit la parfaite calcination de la pierre , & l'avoient , comme je l'ai dit , subi trois fois pendant quatre ou cinq mois de suite. Les morceaux de cette fonte de fer , que je fis casser , ne se séparèrent du reste de la gueuse qu'à coups de masse très-répétés , au lieu que des gueuses de cette même fonte , mais qui n'avoient pas subi l'action du feu , étoient très-cassantes & se séparoient en morceaux aux premiers coups de masse ; je reconnus dès - lors que cette fonte chauffée à un aussi grand feu & pendant si long-temps , avoit acquis beaucoup plus de dureté & de ténacité qu'elle n'en avoit auparavant , beaucoup plus même à proportion que n'en avoient acquis les pierres calcaires. Par ce premier indice , je jugeai que je trouverois une différence encore plus grande dans la pesanteur spécifique de cette fonte si long-temps échauffée. Et en effet , le premier morceau que j'éprouvai à la balance hydrostatique , pesoit dans l'air 4 livres

138. Introduction à l'Histoire

4 onces 3 gros, ou 547 gros; le même morceau pesoit dans l'eau 3 livres 11 onces 2 gros $\frac{1}{2}$, c'est-à-dire, 474 gros $\frac{1}{2}$, la différence est de 72 gros $\frac{1}{2}$; l'eau dont je me servois pour mes expériences pesoit exactement 70 livres le pied cube, & le volume d'eau déplacé par celui du morceau de cette fonte, pesoit 72 gros $\frac{1}{2}$: ainsi 72 gros $\frac{1}{2}$, poids du volume de l'eau déplacée par le morceau de fonte, sont à 70 livres, poids du pied cube de l'eau, comme 547 gros, poids du morceau de fonte, sont à 528 livres 2 onces 1 gros 47 grains, poids du pied cube de cette fonte: & ce poids excède beaucoup celui de cette même fonte lorsqu'elle n'a pas été chauffée, c'est une fonte blanche qui communément est très-cassante, & dont le poids n'est que de 495 ou 500 livres tout au plus; ainsi, la pesanteur spécifique se trouve augmentée de 28 sur 500 par cette très-longue application de la chaleur, ce qui fait environ un dix-huitième de la masse; je me suis assuré de cette grande différence par cinq épreuves successives pour lesquelles j'ai eu attention de prendre toujours

de

des mo
au moi
morcea
à peu
qu'ici l
grande
& ne
l'opéra
cepend
manier
que les
lorsque
compar
l'un qu
qu'elle
certain
plus ou
moins
de mati
gènes d
les par
soumet
un réfu
préciser
des mo
& d'un
rente,

des Minéraux, Partie Exp. 139

des morceaux pesans chacun quatre livres au moins, & comparés un à un avec des morceaux de même figure & d'un volume à peu - près égal : car quoiqu'il paroisse qu'ici la différence du volume, quelque grande qu'elle soit, ne devrait rien faire, & ne peut influer sur le résultat de l'opération de la balance hydrostatique ; cependant ceux qui sont exercés à la manier se seront aperçus, comme moi, que les résultats sont toujours plus justes lorsque les volumes des matières qu'on compare ne sont pas bien plus grands l'un que l'autre. L'eau, quelque fluide qu'elle nous paroisse, a néanmoins un certain petit degré de ténacité qui influe plus ou moins sur des volumes plus ou moins grands. D'ailleurs il y a très-peu de matières qui soient parfaitement homogènes ou égales en pesanteur dans toutes les parties extérieures du volume qu'on soumet à l'épreuve ; ainsi, pour obtenir un résultat sur lequel on puisse compter précisément, il faut toujours comparer des morceaux d'un volume approchant, & d'une figure qui ne soit pas bien différente ; car si, d'une part, on pesoit un

140 *Introduction à l'Histoire*

globe de fer de deux livres, & d'autre part, une feuille de tôle du même poids, on trouveroit à la balance hydrostatique leur pesanteur spécifique différente, quoiqu'elle fût réellement la même.

Je crois que quiconque réfléchira sur les expériences précédentes & sur leurs résultats, ne pourra disconvenir que la chaleur très-long-temps appliquée aux différens corps qu'elle pénètre, ne dépose dans leur intérieur une très-grande quantité de particules qui deviennent parties constituantes de leur masse, & qui s'y unissent & y adhèrent d'autant plus que les matières se trouvent avoir avec elles plus d'affinité & d'autres rapports de nature. Aussi me trouvant muni de ces expériences, je n'ai pas craint d'avancer, dans mon *Traité des Éléments*, que les molécules de la chaleur se fixoient dans tous les corps, comme s'y fixent celles de la lumière & celles de l'air, dès qu'il est accompagné de chaleur ou de feu.



de

SIX

EXP

& /

A

INVE

L'HISTOIRE
d'Archimède
pour la
disent
la flott
lorsqu'
Syracuse
pas dou
ad'abo
de fable
né pou
Archim
ton de

SIXIÈME MÉMOIRE.

*EXPÉRIENCES sur la Lumière,
& sur la Chaleur qu'elle peut
produire.*

ARTICLE PREMIER.

*INVENTION de Miroirs pour brûler
à de grandes distances.*

L'HISTOIRE des miroirs ardents d'Archimède, est fameuse; il les inventa pour la défense de sa patrie, & il lança, disent les Anciens, le feu du Soleil sur la flotte ennemie qu'il réduisit en cendres lorsqu'elle approcha des remparts de Syracuse; mais cette histoire dont on n'a pas douté pendant quinze ou seize siècles, a d'abord été contredite, & ensuite traitée de fable dans ces derniers temps. Descartes né pour juger, & même pour surpasser Archimède, a prononcé contre lui d'un ton de maître; il a nié la possibilité de

142 Introduction à l'Histoire

l'invention, & son opinion a prévalu sur les témoignages & sur la croyance de toute l'antiquité : les Physiciens modernes, soit par respect pour leur Philosophe, soit par complaisance pour leurs contemporains, ont été de même avis. On n'accorde guère aux Anciens que ce qu'on ne peut leur ôter; déterminés peut-être par ces motifs, dont l'amour-propre ne se sert que trop souvent sans qu'on s'en aperçoive, n'avons-nous pas naturellement trop de penchant à refuser ce que nous devons à ceux qui nous ont précédés? & si notre siècle refuse plus qu'un autre, ne seroit-ce pas qu'étant plus éclairé il croit avoir plus de droit à la gloire, plus de prétentions à la supériorité?

Quoi qu'il en soit, cette invention étoit dans le cas de plusieurs autres découvertes de l'antiquité qui se sont évanouies, parce qu'on a préféré la facilité de les nier à la difficulté de les retrouver; & les miroirs ardents d'Archimède étoient si décriés, qu'il ne paroïssoit pas possible d'en rétablir la réputation; car, pour appeler du jugement de Descartes, il falloit quelque chose de plus fort que des raisons, & il ne

de
restit
vérité
d'entr
c'est-à-
les mê
long-te
que le
de la v
cution,
espéran
J'ai
des mi
distance
300 pie
les mir
jamais
au plus,
gens, la
& je ser
dans la
de méta
titude po
que pou
pieds, la
pieds de
espérer d
ler les v

des Minéraux, Partie Exp. 143

restoit qu'un moyen sûr & décisif, à la vérité, mais difficile & hardi, c'étoit d'entreprendre de trouver les miroirs, c'est-à-dire, d'en faire qui pussent produire les mêmes effets; j'en avois conçu depuis long-temps l'idée, & j'avouerai volontiers que le plus difficile de la chose étoit de la voir possible, puisque, dans l'exécution, j'ai réussi au-delà même de mes espérances.

J'ai donc cherché le moyen de faire des miroirs pour brûler à de grandes distances, comme de 100, de 200 & 300 pieds; je favois en général qu'avec les miroirs par réflexion, l'on n'avoit jamais brûlé qu'à 15 ou 20 pieds tout au plus, & qu'avec ceux qui sont réfringens, la distance étoit encore plus courte, & je sentoisi bien qu'il étoit impossible dans la pratique de travailler un miroir de métal ou de verre avec assez d'exactitude pour brûler à ces grandes distances; que pour brûler, par exemple, à 200 pieds, la sphère ayant dans ce cas 800 pieds de diamètre, on ne pouvoit rien espérer de la méthode ordinaire de travailler les verres, & je me persuadai bientôt

que quand même on pourroit en trouver une nouvelle, pour donner à de grandes pièces de verre ou de métal, une courbure aussi légère, il n'en résulteroit encore qu'un avantage très-peu considérable, comme je le dirai dans la suite.

Mais, pour aller par ordre, je cherchai d'abord combien la lumière du Soleil perdoit par la réflexion à différentes distances, & quelles sont les matières qui la réfléchissent le plus fortement. Je trouvai premièrement que les glaces étamées, lorsqu'elles sont polies avec un peu de soin, réfléchissent plus puissamment la lumière que les métaux les mieux polis, & même mieux que le métal composé dont on se sert pour faire des miroirs de télescopes; & que quoiqu'il y ait dans les glaces deux réflexions, l'une à la surface & l'autre à l'intérieur, elles ne laissent pas de donner une lumière plus vive & plus nette que le métal, qui produit une lumière colorée.

En second lieu, en recevant la lumière du Soleil dans un endroit obscur, & en la comparant avec cette même lumière du Soleil réfléchi par une glace, je
trouvai

des

trouvai
de quat
qu'envi
je juge
lumière
aussi réfl
lumières
de la lum
Troisième
distances
pieds, c
de grand
perdoit p
pauteur d
Ensuite
choses su
pour m'a
quantité d
cause à c
suivante.

Je me
miroir av
chambre
entière, &
aucun ob
chambre
environ,
Supple

des Minéraux, Partie Exp. 145


trouvai qu'à de petites distances, comme de quatre ou cinq pieds, elle ne perdoit qu'environ moitié par la réflexion, ce que je jugeai en faisant tomber sur la première lumière réfléchie, une seconde lumière aussi réfléchie : car la vivacité de ces deux lumières réfléchies me parut égale à celle de la lumière directe.



Troisièmement : ayant reçu à de grandes distances, comme à 100, 200, 300 pieds, cette même lumière réfléchie par de grandes glaces, je reconnus qu'elle ne perdoit presque rien de sa force, par l'épaisseur de l'air qu'elle avoit à traverser.

Ensuite je voulus essayer les mêmes choses sur la lumière des bougies ; & pour m'assurer plus exactement de la quantité d'affoiblissement que la réflexion cause à cette lumière, je fis l'expérience suivante.




Je me mis vis-à-vis une glace de miroir avec un livre à la main, dans une chambre où l'obscurité de la nuit étoit entière, & où je ne pouvois distinguer aucun objet : je fis allumer, dans une chambre voisine, à 40 pieds de distance environ, une seule bougie, & je la fis







**IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)**



**Photographic
Sciences
Corporation**

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

18
19
20
22
25

10
11
12

146 *Introduction à l'Histoire*

approcher peu-à-peu, jusqu'à ce que je pusse distinguer les caractères & lire le livre que j'avois à la main; la distance se trouva de 24 pieds du livre à la bougie; ensuite ayant retourné le livre du côté du miroir, je cherchai à lire par cette même lumière réfléchie, & je fis intercepter par un paravent la partie de la lumière directe qui ne tomboit pas sur le miroir, afin de n'avoir sur mon livre que la lumière réfléchie. Il fallut approcher la bougie, ce qu'on fit peu à peu, jusqu'à ce que je pusse lire les mêmes caractères éclairés par la lumière réfléchie; & alors la distance du livre à la bougie, y compris celle du livre au miroir, qui n'étoit que d'un demi-pied, se trouva être en tout de quinze pieds: je répétai cela plusieurs fois, & j'eus toujours les mêmes résultats, à très-peu-près; d'où je conclus que la force ou la quantité de la lumière directe est à celle de la lumière réfléchie, comme 576 à 225; ainsi, l'effet de la lumière de cinq bougies reçues par une glace plane est à peu-près égal à celui de la lumière directe de deux bougies.

La lumière des bougies perd donc plus

par l
& ce
rayon
comme
quema
Soleil
Cette
j'avois
sur qu
qu'env
glace c
Ces p
besoin
ce que
Soleil,
distance
vais dir
fait ord
du Sole
souveni
à nos
minutes
qui par
venant
face réf
du bord
sur le r

des Minéraux, Partie Exp. 147

par la réflexion que la lumière du Soleil; & cette différence vient de ce que les rayons de lumière, qui partent de la bougie comme d'un centre, tombent plus obliquement sur le miroir que les rayons du Soleil qui viennent presque parallèlement. Cette expérience confirma donc ce que j'avois trouvé d'abord, & je tins pour sûr que la lumière du Soleil ne perd qu'environ moitié par sa réflexion sur une glace de miroir.

Ces premières connoissances dont j'avois besoin étant acquises, je cherchai ensuite ce que deviennent en effet les images du Soleil, lorsqu'on les reçoit à de grandes distances. Pour bien entendre ce que je vais dire, il ne faut pas, comme on le fait ordinairement, considérer les rayons du Soleil comme parallèles; & il faut se souvenir que le corps du Soleil occupe à nos yeux une étendue d'environ 32 minutes; que par conséquent les rayons qui partent du bord supérieur du disque, venant à tomber sur un point d'une surface réfléchissante, les rayons qui partent du bord inférieur, venant à tomber aussi sur le même point de cette surface, ils

148 *Introduction à l'Histoire*

forment entr'eux un angle de 32 minutes dans l'incidence & ensuite dans la réflexion, & que par conséquent l'image doit augmenter de grandeur à mesure qu'elle s'éloigne : il faut de plus faire attention à la figure de ces images ; par exemple, une glace plane quarrée d'un demi-pied, exposée aux rayons du Soleil, formera une image quarrée de six pouces, lorsqu'on recevra cette image à une petite distance de la glace, comme de quelques pieds ; en s'éloignant peu-à-peu on voit l'image augmenter, ensuite se déformer, enfin s'arrondir & demeurer ronde toujours en s'agrandissant, à mesure qu'elle s'éloigne du miroir : cette image est composée d'autant de disques du Soleil qu'il y a de points physiques dans la surface réflé. tante ; le point du milieu forme une image du disque, les points voisins en forment de semblables & de même grandeur qui excèdent un peu le disque du milieu ; il en est de même de tous les autres points, & l'image est composée d'une infinité de disques, qui se surmontent régulièrement, & anticipant circulairement les uns sur les autres,

d
formé
milieu
Si
tous
alors
qu'un
glace,
& à p
la glac
est qua
l'image
reçoit
la glace
disques
celle de
plus la f
la glace
culaire ;
où l'ima
a qu'à ch
nous par
que form
c'est-à-di
cette dist
sa figure
car les d
mètre un

des Minéraux, Partie Exp. 149

forment l'image réfléchie dont le point du milieu de la glace est le centre.

Si l'on reçoit l'image composée de tous ces disques à une petite distance, alors l'étendue qu'ils occupent n'étant qu'un peu plus grande que celle de la glace, cette image est de la même figure & à peu-près de la même étendue que la glace : si la glace est carrée, l'image est carrée ; si la glace est triangulaire, l'image est triangulaire ; mais lorsqu'on reçoit l'image à une grande distance de la glace, où l'étendue qu'occupent les disques est beaucoup plus grande que celle de la glace, l'image ne conserve plus la figure carrée ou triangulaire de la glace, elle devient nécessairement circulaire ; & pour trouver le point de distance où l'image perd sa figure carrée, il n'y a qu'à chercher à quelle distance la glace nous paroît sous un angle égal à celui que forme le corps du Soleil à nos yeux, c'est-à-dire sous un angle de 32 minutes, cette distance sera celle où l'image perdra sa figure carrée, & deviendra ronde, car les disques ayant toujours pour diamètre une ligne égale à la corde de l'arc

150 Introduction à l'Histoire

de cercle, qui mesure un angle de 31 minutes, on trouvera par cette règle qu'une glace quarrée de six pouces, perd sa figure quarrée à la distance d'environ 60 pieds, & qu'une glace d'un pied en quarré ne la perd qu'à 120 pieds environ, & ainsi des autres.

En réfléchissant un peu sur cette théorie, on ne sera plus étonné de voir qu'à de très-grandes distances, une grande & une petite glace donnent à peu près une image de la même grandeur, & qui ne diffère que par l'intensité de la lumière: on ne sera plus surpris qu'une glace ronde, ou quarrée, ou longue, ou triangulaire, ou de telle autre figure que l'on voudra (a), donne toujours des images rondes; & on verra clairement que les images ne s'agrandissent & ne s'affoiblissent pas par la dispersion de la lumière, ou par la perte qu'elle fait en traversant l'air, comme l'ont cru quelques Physiciens;

(a) C'est par cette même raison que les petites

images du Soleil qui passent entre les feuilles des arbres élevés & touffus, qui tombent sur le sable d'une allée, sont toutes ovales ou rondes.

des

& que
l'augme
toujours
quelqu'

De m
simple
les cour
soient,
avantage
le diamè
ne peut
corde de
minutes
concave
seroit ég
le doub
même fu
ce miro
cette cor
qu'un m
Lorsq
viens d'

(b) Si
trouvera
d'avantage
de 17 à 1

des Minéraux, Partie Exp. 151

& que cela n'arrive au contraire que par l'augmentation des disques qui occupent toujours un espace de 32 minutes à quelque éloignement qu'on les porte.

De même on sera convaincu par la simple exposition de cette théorie, que les courbes de quelque espèce qu'elles soient, ne peuvent être employées avec avantage pour brûler de loin, parce que le diamètre du foyer de toutes les courbes, ne peut jamais être plus petit que la corde de l'arc qui mesure un angle de 32 minutes, & que par conséquent le miroir concave le plus parfait dont le diamètre seroit égal à cette corde, ne seroit jamais le double de l'effet de ce miroir plan de même surface (b): & si le diamètre de ce miroir courbe étoit plus petit que cette corde, il ne seroit guères plus d'effet qu'un miroir plan de même surface.

Lorsque j'eus bien compris ce que je viens d'exposer, je me persuadai bientôt

(b) Si l'on se donne la peine de le supputer, on trouvera que le miroir courbe le plus parfait, n'a d'avantage sur un miroir plan que dans la raison de 17 à 10, du moins à très-peu-près.

152 *Introduction à l'Histoire*

à n'en pouvoir douter, qu'Archimède n'avoit pu brûler de loin qu'avec des miroirs plans; car, indépendamment de l'impossibilité où l'on étoit alors, & où l'on seroit encore aujourd'hui d'exécuter des miroirs concaves d'un aussi long foyer, je sentis bien que les réflexions que je viens de faire, ne pouvoient pas avoir échappé à ce grand Mathématicien. D'ailleurs je pensai que, selon toutes les apparences, les Anciens ne savoient pas faire de grandes masses de verre, qu'ils ignoroient l'art de le couler pour en faire de grandes glaces, qu'ils n'avoient tout au plus que celui de le souffler & d'en faire des bouteilles & des vases, & je me persuadai aisément que c'étoit avec des miroirs plans de métal poli, & par la réflexion des rayons du Soleil qu'Archimède avoit brûlé au loin: mais comme j'avois reconnu que les miroirs de glace réfléchissent plus puissamment la lumière que les miroirs du métal le plus poli, je pensai à faire construire une machine pour faire coïncider au même point les images réfléchies par un grand nombre de ces glaces planes, bien convaincu que

des

ce moy
possible
Cepe
& qui
fondés,
Suppose
veux br
claireme
ne peut
diamètre
fera l'éte
à mon
produir
foyer?
la chose
cution;
foyer au
meilleur
ayons,
l'Acadér
mètre d
étoit ce
diamètre
quatre l
brûler
eût été
de miro

des Minéraux, Partie Exp. 153

ce moyen étoit le seul par lequel il fût possible de réussir.

Cependant j'avois encore des doutes, & qui me paroissoient même très-bien fondés, car voici comment je raisonnois. Supposons que la distance à laquelle je veux brûler soit de 240 pieds, je vois clairement que le foyer de mon miroir ne peut avoir moins de deux pieds de diamètre à cette distance; dès-lors quelle sera l'étendue que je serai obligé de donner à mon assemblage de miroirs plans pour produire du feu dans un aussi grand foyer? elle pouvoit être si grande que la chose eût été impraticable dans l'exécution; car, en comparant le diamètre du foyer au diamètre du miroir, dans les meilleurs miroirs par réflexion que nous ayons, par exemple, avec le miroir de l'Académie, j'avois observé que le diamètre de ce miroir qui est de trois pieds, étoit cent huit fois plus grand que le diamètre de son foyer, qui n'a qu'environ quatre lignes, & j'en conclus que, pour brûler aussi vivement à 240 pieds, il eût été nécessaire que mon assemblage de miroirs eût eu 216 pieds de diamètre,

154 *Introduction à l'Histoire*

puisque le foyer auroit deux pieds ; or un miroir de 216 pieds de diamètre étoit assurément une chose impossible.

A la vérité, ce miroir de trois pieds de diamètre brûle assez vivement pour fondre l'or, & je voulus voir combien j'avois à gagner en réduisant son action à n'enflammer que du bois : pour cela, j'appliquai sur le miroir des zones circulaires de papier pour en diminuer le diamètre, & je trouvai qu'il n'avoit plus assez de force pour enflammer du bois sec lorsque son diamètre fut réduit à quatre pouces huit ou neuf lignes : prenant donc cinq pouces ou soixante lignes pour l'étendue du diamètre nécessaire pour brûler avec un foyer de quatre lignes, je ne pouvois me dispenser de conclure que pour brûler également à 240 pieds, où le foyer auroit nécessairement deux pieds de diamètre, il me faudroit un miroir de trente-pieds de diamètre ; ce qui me paroït encore une chose impossible, ou du moins impraticable.

A des raisons si positives, & que d'autres auroient regardées comme des démonstrations de l'impossibilité du miroir, je

n'avo
mais
plus
suadé
c'est
bien
de lu
qu'à é
foyer
les pe
En
ment,
des f
propo
Un m
celle
la mêt
même
doit c
lumièr
&, da
toujou
on avo
ce sec
celle d
De
mathém

des Minéraux, Partie Exp. 155

n'avois rien à opposer qu'un soupçon ; mais un soupçon ancien , & sur lequel plus j'avois réfléchi , plus je m'étois persuadé qu'il n'étoit pas sans fondement ; c'est que les effets de la chaleur pouvoient bien n'être pas proportionnels à la quantité de lumière ; ou , ce qui revient au même , qu'à égale intensité de lumière , les grands foyers devoient brûler plus vivement que les petits.

En estimant la chaleur mathématiquement , il n'est pas douteux que la force des foyers de même longueur ne soit proportionnelle à la surface des miroirs. Un miroir dont la surface est double de celle d'un autre , doit avoir un foyer de la même grandeur , si la courbure est la même ; & ce foyer de même grandeur doit contenir le double de la quantité de lumière que contient le premier foyer ; & , dans la supposition que les effets sont toujours proportionnels à leurs causes , on avoit toujours cru que la chaleur de ce second foyer devoit être double de celle du premier.

De même & par la même estimation mathématique , on a toujours cru qu'à

156 Introduction à l'Histoire

égale intensité de lumière, un petit foyer devoit brûler autant qu'un grand, & que l'effet de la chaleur devoit être proportionnel à cette intensité de lumière : *en sorte, disoit Descartes, qu'on peut faire des verres ou des miroirs extrêmement petits qui brûleront avec autant de violence que les plus grands.* Je pensai d'abord, comme je l'ai dit ci-dessus, que cette conclusion tirée de la théorie mathématique, pourroit bien se trouver fautive dans la pratique, parce que la chaleur étant une qualité physique, de l'action & de la propagation de laquelle nous ne connoissons pas bien les loix, il me sembloit qu'il y avoit quelque espèce de témérité à en estimer ainsi les effets par un raisonnement de simple spéculation.

J'eus donc recours encore une fois à l'expérience : je pris des miroirs de métal de différens foyers & de différens degrés de poliment; &, en comparant l'action des différens foyers sur les mêmes matières fusibles ou combustibles, je trouvai qu'à égale intensité de lumière, les grands foyers font constamment beaucoup plus d'effet que les petits, & produisent souvent

de
l'inflan
les pe
medio
les mi
mieux
grand
que c
pouces
de larg
foyer
minute
portion
de dian
 $\frac{2}{3}$ de li
puisque
une mi
foyer q
devoit
même t
due de
Ayant
comme
de fond
pouvoir
à cette
La n
à donn

des Minéraux, Partie Exp. 157

l'inflammation ou la fusion, tandis que les petits ne produisent qu'une chaleur médiocre ; je trouvai la même chose avec les miroirs par réfraction. Pour le faire mieux sentir, prenons, par exemple, un grand miroir ardent par réfraction, tel que celui du sieur Segard, qui a 32 pouces de diamètre, & un foyer de 8 lignes de largeur, à 6 pieds de distance, auquel foyer le cuivre se fond en moins d'une minute, & faisons dans les mêmes proportions un petit verre ardent de 32 lignes de diamètre, dont le foyer sera de $\frac{8}{12}$ ou $\frac{2}{3}$ de ligne, & la distance à 6 pouces ; puisque le grand miroir fond le cuivre en une minute dans l'étendue entière de son foyer qui est de 8 lignes, le petit verre devrait, selon la théorie, fondre dans le même temps la même matière dans l'étendue de son foyer qui est de $\frac{2}{3}$ de ligne : Ayant fait l'expérience, j'ai trouvé, comme je m'y attendois bien, que, loin de fondre le cuivre, ce petit verre ardent pouvoit à peine donner un peu de chaleur à cette matière.

La raison de cette différence est aisée à donner, si l'on fait attention que la

chaleur se communique de proche en proche, & se disperse, pour ainsi dire, lors même qu'elle est appliquée continuellement sur le même point; par exemple, si l'on fait tomber le foyer d'un verre ardent sur le centre d'un écu, & que ce foyer n'ait qu'une ligne de diamètre, la chaleur qu'il produit sur le centre de l'écu se disperse & s'étend dans le volume entier de l'écu, & il devient chaud jusqu'à la circonférence; dès-lors toute la chaleur, quoiqu'employée d'abord contre le centre de l'écu, ne s'y arrête pas, & ne peut pas produire un aussi grand effet que si elle y demeurait toute entière. Mais si au lieu d'un foyer d'une ligne qui tombe sur le milieu de l'écu, on fait tomber sur l'écu tout entier un foyer d'égale intensité, toutes les parties de l'écu étant également échauffées dans ce dernier cas; non-seulement il n'y a pas de perte de chaleur, comme dans le premier, mais même il y a du gain & de l'augmentation de chaleur, car le point du milieu profitant de la chaleur des autres points qui l'entourent, l'écu sera fondu dans ce dernier cas, tandis que, dans le

premier
échauffé
Ap
réflex
semen
à faire
car j
autant
grand
suada
largeu
pieds
lumie
aussi
comm
dant
flamm
conféc
mathé
pieds
à un
plus;
possib
Je
mon
brûles
glaces

des Minéraux, Partie Exp. 159.

premier, il ne sera que légèrement échauffé.

Après avoir fait ces expériences & ces réflexions, je sentis augmenter prodigieusement l'espérance que j'avois de réussir à faire des miroirs qui brûleraient au loin; car je commençai à ne plus craindre autant que je l'avois craint d'abord, la grande étendue des foyers, je me persuadai au contraire, qu'un foyer d'une largeur considérable, comme de deux pieds, & dans lequel l'intensité de la lumière ne seroit pas à beaucoup près aussi grande que dans un petit foyer, comme de quatre lignes, pourroit cependant produire avec plus de force l'inflammation & l'embrasement, & que par conséquent ce miroir qui, par la théorie mathématique, devoit avoir au moins 30 pieds de diamètre, se réduiroit sans doute à un miroir de 8 ou 10 pieds tout au plus; ce qui est non-seulement une chose possible, mais même très-praticable.

Je pensai donc sérieusement à exécuter mon projet; d'abord j'avois dessein de brûler à 200 ou 300 pieds avec des glaces circulaires ou hexagones d'un pied

quarré de surface , & je voulois faire quatre châssis de fer pour les porter , avec trois vis à chacune pour les mouvoir en tout sens , & un ressort pour les assujettir ; mais la dépense trop considérable qu'exigeoit cet ajustement , me fit abandonner cette idée , & je me rebattis à des glaces communes de 6 pouces sur 8 pouces , & un ajustement en bois , qui , à la vérité , est moins solide & moins précis , mais dont la dépense convenoit mieux à une tentative. M. Passemant , dont l'habileté dans les mécaniques est connue même de l'Académie , se chargea de ce détail ; & je n'en ferai pas la description parce qu'un coup d'œil sur le miroir en fera mieux entendre la construction qu'un long discours (c).

Il suffira de dire qu'il a d'abord été composé de cent soixante-huit glaces étamées de 6 pouces sur 8 pouces chacune , éloignées les unes des autres d'environ quatre lignes : que chacune de ces glaces se peut mouvoir en tout sens ,

(c) Voyez, ci-après, les planches VII, VIII & IX, avec l'explication des figures 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7.

a
 &
 les
 entr
 libert
 laisser
 où il f
 cette
 sur le
 image
 sieurs
 jusqu'
 intern
 leur
 miroir
 de po
 tances
 qu'on
 ces pr
 Seul
 vemen
 aisé à
 un gra
 elles n
 égalem
 telles à
 obligé
 pour a

des Minéraux, Partie Exp. 161

& indépendamment de toutes, & que les quatre lignes d'intervalle, qui sont entr'elles, servent non-seulement à la liberté de ce mouvement, mais aussi à laisser voir à celui qui opère, l'endroit où il faut conduire ses images. Au moyen de cette construction, l'on peut faire tomber sur le même point les cent soixante-huit images, par conséquent brûler à plusieurs distances, comme à 20, 30, & jusqu'à 150 pieds, & à toutes les distances intermédiaires : & en augmentant la grandeur du miroir, ou en faisant d'autres miroirs semblables au premier, on est sûr de porter le feu à de plus grandes distances encore, ou d'en augmenter autant qu'on voudra, la force ou l'activité à ces premières distances.

Seulement il faut observer que le mouvement dont j'ai parlé, n'est point trop aisé à exécuter, & que d'ailleurs il y a un grand choix à faire dans les glaces : elles ne sont pas toutes à beaucoup près également bonnes, quoiqu'elles paroissent telles à la première inspection ; j'ai été obligé d'en prendre plus de cinq cens pour avoir les cent soixante-huit dont je

faire
ter,
voir
r les
fidé-
ne fit
partis
es sur
ois,
moins
enoit
nant,
es est
argea
a des-
sur le
conf-

d été
glaces
cha-
autres
ne de
sens,

& IX,
6 & 7.

me suis servi; la manière de les essayer est de recevoir à une grande distance, par exemple, à 150 pieds l'image réfléchie du Soleil comme un plan vertical; il faut choisir celles qui donnent une image ronde & bien terminée, & rebuter toutes les autres qui sont en beaucoup plus grand nombre, & dont les épaisseurs étant inégales en différens endroits, ou la surface un peu concave ou convexe, au lieu d'être plane, donnent des images mal terminées, doubles, triples, oblongues, chevelues, &c. suivant les différentes défectuosités qui se trouvent dans les glaces.

Par la première expérience que j'ai faite, le 23 mars 1747, à midi, j'ai mis le feu à 66 pieds de distance à une planche de hêtre goudronnée, avec quarante glaces seulement, c'est-à-dire, avec le quart du miroir environ; mais il faut observer que n'étant pas encore monté sur son pied, il étoit posé très-désavantageusement, faisant avec le Soleil un angle de près de 20 degrés de déclinaison, & un autre de plus de 10 degrés d'inclinaison.

Le
planch
pieds
huit g
plus d
que, p
il faut
opposé
matière
qu'en f
sur le
par le
milieu

Le
miroir
on a p
sur une
à 138
glaces,
que la
prendre
de l'en
tibles,
car si
voient
l'éclat
Le

des Minéraux, Partie Exp. 163

Le même jour, j'ai mis le feu à une planche goudronnée & foufrée à 126 pieds de distance avec quatre-vingt-dix-huit glaces, le miroir étant posé encore plus désavantageusement. On sent bien que, pour brûler avec le plus d'avantage, il faut que le miroir soit directement opposé au Soleil, aussi-bien que les matières qu'on veut enflammer; en sorte qu'en supposant un plan perpendiculaire sur le plan du miroir, il faut qu'il passe par le Soleil, & en même temps par le milieu des matières combustibles.

Le 3 avril, à quatre heures du soir, le miroir étant monté & posé sur son pied, on a produit une légère inflammation sur une planche couverte de laine hachée à 138 pieds de distance avec cent douze glaces, quoique le Soleil fût foible, & que la lumière en fût fort pâle. Il faut prendre garde à soi lorsqu'on approche de l'endroit où sont les matières combustibles, & il ne faut pas regarder le miroir, car si malheureusement les yeux se trouvoient au foyer, on seroit aveuglé par l'éclat de la lumière.

Le 4 avril, à onze heures du matin,

164 *Introduction à l'Histoire*

le Soleil étant fort pâle & couvert de vapeurs & de nuages légers, on n'a pas laissé de produire, avec cent cinquante-quatre glaces, à 150 pieds de distance, une chaleur si considérable, qu'elle a fait en moins de deux minutes, fumer une planche goudronnée, qui se seroit certainement enflammée, si le Soleil n'avoit pas disparu tout-à-coup.

Le lendemain, 5 avril, à trois heures après midi, par un Soleil encore plus foible que le jour précédent, on a enflammé à 250 pieds de distance, des copeaux de sapin soufrés & mêlés de charbon, en moins d'une minute & demie, avec cent-cinquante-quatre glaces. Lorsque le Soleil est vif, il ne faut que quelques secondes pour produire l'inflammation.

Le 10 avril, après midi, par un Soleil assez net, on a mis le feu à une planche de sapin goudronnée, à 150 pieds, avec cent vingt-huit glaces seulement, l'inflammation a été très-subite, & elle s'est faite dans toute l'étendue du foyer qui avoit environ 16 pouces de diamètre à cette distance.

Le
on a
hêtre
en q
l'infla
ment
bois
étoit
l'eau
cent d
étoit
Le
pieds
que d
petite
une g
de hê
partie
fondu
enviro
glaces
mince
je suis
les m
ploya
comm
de six

des Minéraux, Partie Exp. 165

Le même jour, à deux heures & demie, on a porté le feu sur une planche de hêtre, goudronnée en partie & couverte en quelques endroits de laine hachée; l'inflammation s'est faite très-promptement, elle a commencé par les parties du bois qui étoient découvertes; & le feu étoit si violent, qu'il a fallu tremper dans l'eau la planche pour l'éteindre; il y avoit cent quarante-huit glaces, & la distance étoit de 150 pieds.

Le 11 avril, le foyer n'étant qu'à 20 pieds de distance du miroir, il n'a fallu que douze glaces pour enflammer des petites matières combustibles: avec vingt-une glaces on a mis le feu à une planche de hêtre qui avoit déjà été brûlée en partie; avec quarante-cinq glaces on a fondu un gros flacon d'étain qui pesoit environ six livres; & avec cent dix-sept glaces on a fondu des morceaux d'argent mince, & rougi une plaque de tôle: & je suis persuadé qu'à 50 pieds on fondra les métaux aussi-bien qu'à 20, en employant toute les glaces du miroir; & comme le foyer à cette distance, est large de six à sept pouces, on pourra faire des

épreuves en grand sur les métaux. (d), ce qu'il n'étoit pas possible de faire avec les miroirs ordinaires, dont le foyer est, ou très-foible, ou cent fois plus petit que celui de mon miroir. J'ai remarqué

(d) Par des expériences subséquentes, j'ai reconnu que la distance la plus avantageuse pour faire commodément avec ces miroirs des épreuves sur les métaux, étoit à 40 ou 45 pieds. Les assiettes d'argent que j'ai fondues à cette distance avec deux cens vingt-quatre glaces, étoient bien nettes, en sorte qu'il n'étoit pas possible d'attribuer la fumée très-abondante qui en sortoit à la graisse, ou à d'autres matières dont l'argent se seroit imbibé, & comme se le persuadoient les gens témoins de l'expérience. Je la répétois néanmoins sur des plaques d'argent toutes neuves & j'eus le même effet. Le métal fumoit très-abondamment, quelquefois pendant plus de 8 ou 10 minutes avant de se fondre. J'avois dessein de recueillir cette fumée d'argent par le moyen d'un chapiteau & d'un ajustement semblable à celui dont on se sert dans les distillations, & j'ai toujours eu regret que mes autres occupations m'en aient empêché; car cette manière de tirer l'eau du métal, est peut-être la seule que l'on puisse employer. Et si l'on prétend que cette fumée, qui m'a paru humide, ne contient pas de l'eau, il seroit toujours très-utile de savoir ce que c'est, car il se peut aussi que ce ne soit que du métal volatilisé. D'ailleurs je suis persuadé qu'en faisant les mêmes épreuves sur l'or, on le verra fumer comme l'argent, peut-être moins, peut-être plus.

d
que
fumer
fumée
ombre
l'obser
possib
lorsqu
beaucc
Les
ci-des
les pre
miroir
d'autre
premie
200 &
miroir
fois qu
pouvoi
miroirs
être pl
les mé
30. &
suite d
ou pe
limites
pour l
fusion.

des Minéraux, Partie Exp. 167

que les métaux & sur-tout l'argent, fument beaucoup avant de se fondre, la fumée en étoit si sensible qu'elle faisoit ombre sur le terrain; & c'est-là où je l'observai attentivement; car il n'est pas possible de regarder un instant le foyer, lorsqu'il tombe sur du métal: l'éclat en est beaucoup plus vif que celui du Soleil.

Les expériences que j'ai rapportées ci-dessus, & qui ont été faites dans les premiers temps de l'invention de ces miroirs, ont été suivies d'un grand nombre d'autres expériences qui confirment les premières. J'ai enflammé du bois jusqu'à 200 & même 210 pieds avec ce même miroir, par le Soleil d'été, toutes les fois que le Ciel étoit pur, & je crois pouvoir assurer qu'avec quatre semblables miroirs on brûleroit à 400 pieds & peut-être plus loin. J'ai de même fondu tous les métaux & minéraux métalliques à 25, 30 & 40 pieds. On trouvera dans la suite de cet article les usages auxquels on peut appliquer ces miroirs, & les limites qu'on doit assiéger à leur puissance pour la calcination, la combustion, la fusion, &c.

168 *Introduction à l'Histoire*

Il faut environ une demi-heure pour monter le miroir, & pour faire coïncider toutes les images au même point; mais, lorsqu'il est une fois ajusté, on peut s'en servir à toute heure, en tirant seulement un rideau, il mettra le feu aux matières combustibles très-prompement, & on ne doit pas le déranger à moins qu'on ne veuille changer la distance; par exemple, lorsqu'il est arrangé pour brûler à 100 pieds, il faut une demi-heure pour l'ajuster à la distance de 150 pieds, & ainsi des autres.

Ce miroir brûle en haut, en bas & horizontalement, suivant la différente inclinaison qu'on lui donne; les expériences que je viens de rapporter, ont été faites publiquement au Jardin du Roi, sur un terrain horizontal, contre des planches posées verticalement: je crois qu'il n'est pas nécessaire d'avertir qu'il auroit brûlé avec plus de force en haut, & moins de force en bas; & de même, qu'il est plus avantageux d'incliner le plan des matières combustibles parallèlement au plan du miroir: ce qui fait qu'il a cet avantage de brûler en haut, en bas & horizontalement,
sur

des

sur les
ne brûl
foyer e
de cour
il est lar
ce qui n
de la ci
qu'on br
La rai
des glac
pouces c
de 6 ou 8
plus con
sur un te
que de
qu'avec c
les imag
qu'avec d
été racc
distances
Cette
choses ut
être pour
rend les
presque
c'est qu'il
qu'on est
Supplé

des Minéraux, Partie Exp. 169

sur les miroirs ordinaires de réflexion qui ne brûlent qu'en haut, c'est que son foyer est fort éloigné, & qu'il a si peu de courbure qu'elle est insensible à l'œil; il est large de 7 pieds, & haut de 8 pieds, ce qui ne fait qu'environ la 150.^e partie de la circonférence de la sphère, lorsqu'on brûle à 150 pieds.

La raison qui m'a déterminé à préférer des glaces de 6 pouces de largeur sur 8 pouces de hauteur, à des glaces quarrées de 6 ou 8 pouces, c'est qu'il est beaucoup plus commode de faire les expériences sur un terrain horizontal & de niveau, que de les faire de bas en haut, & qu'avec cette figure plus haute que large, les images étoient plus rondes, au lieu qu'avec des glaces quarrées, elles auroient été raccourcies, sur-tout pour les petites distances, dans cette situation horizontale.

Cette découverte nous fournit plusieurs choses utiles pour la Physique, & peut-être pour les Arts. On fait que ce qui rend les miroirs ordinaires de réflexion presque inutiles pour les expériences, c'est qu'ils brûlent toujours en haut, & qu'on est fort embarrassé de trouver des

moyens pour suspendre ou soutenir à leur foyer les matières qu'on veut fondre ou calciner : au moyen de mon miroir, on fera brûler en bas les miroirs concaves, & avec un avantage si considérable, qu'on aura une chaleur de tel degré qu'on voudra; par exemple, en opposant à mon miroir, un miroir concave d'un pied carré de surface, la chaleur que ce dernier miroir produira à son foyer, en employant cent cinquante - quatre glaces seulement, sera plus de douze fois plus grande que celle qu'il produit ordinairement, & l'effet sera le même que s'il existoit douze Soleils au lieu d'un, ou plutôt que si le Soleil avoit douze fois plus de chaleur.

Secondement, on aura, par le moyen de mon miroir, la vraie échelle de l'augmentation de la chaleur, & on fera un thermomètre réel, dont les divisions n'auront plus rien d'arbitraire, depuis la température de l'air jusqu'à tel degré de chaleur qu'on voudra, en faisant tomber une à une successivement, les images du Soleil les unes sur les autres, & en graduant les intervalles, soit au moyen

d
d
no
au
&
les
eff
me

con
Sol
diff
est
& f
fero
préc
celle
rapp
invar

(e)
trois g
tation
comm
mais
qui n'
de haf
T. R. A

des Minéraux, Partie Exp. 171

d'une liqueur expansive, soit au moyen d'une machine de dilatation; & de-là nous saurons en effet ce que c'est qu'une augmentation double, triple, quadruple, &c. de chaleur (*e*), & nous connoîtrons les matières dont l'expansion, ou les autres effets seront les plus convenables pour mesurer les augmentations de chaleur.

Troisièmement, nous saurons au juste combien de fois il faut la chaleur du Soleil pour brûler, fondre ou calciner différentes matières, ce qu'on ne savoit estimer jusqu'ici que d'une manière vague & fort éloignée de la vérité; & nous serons en état de faire des comparaisons précises de l'activité de nos feux avec celle du Soleil, & d'avoir sur cela des rapports exacts, & des mesures fixes & invariables.

(*e*) Feu M. de Mairan a fait une épreuve avec trois glaces seulement, & a trouvé que les augmentations du double & du triple de chaleur étoient comme les divisions du thermomètre de Réaumur; mais on ne doit rien conclure de cette expérience qui n'a donné lieu à ce résultat que par une espèce de hasard. *Voyez sur ce sujet ce que j'ai dit dans mon*
TRAITÉ DES ÉLÉMENTS.

172 *Introduction à l'Histoire*

Enfin on fera convaincu lorsqu'on aura examiné la théorie que j'ai donnée, & qu'on aura vu l'effet de mon miroir, que le moyen que j'ai employé étoit le seul par lequel il fût possible de réussir à brûler au loin : car, indépendamment de la difficulté physique de faire de grands miroirs concaves sphériques, paraboliques, ou d'une autre courbure, quelconque assez régulière pour brûler à 150 pieds, on se démontrera aisément à soi-même, qu'ils ne produiroient qu'à peu - près autant d'effet que le mien, parce que le foyer en seroit presque aussi large ; que de plus, ces miroirs courbes, quand même il seroit possible de les exécuter, auroient le désavantage très-grand de ne brûler qu'à une seule distance, au lieu que le mien brûle à toutes les distances ; & par conséquent on abandonnera le projet de faire, par le moyen des courbes, des miroirs pour brûler au loin, ce qui a occupé inutilement un grand nombre de Mathématiciens & d'Artistes qui se trompoient toujours, parce qu'ils considéroient les rayons du Soleil comme parallèles, au lieu qu'il faut les considérer ici tels qu'ils sont,

d
c'est-à
toute
minut
quelq
miroi
plus p
cet an
même
pour h
exemp
dans to
600 pie
une ma
il est ci
d'avant
de petit
Au m
quoiqu
plus gra
tement
& que
dont le
dant il
jamais
car pou
demi-lie
mille fo

des Minéraux, Partie Exp. 173

c'est-à-dire, comme faisant des angles de toute grandeur, depuis zéro jusqu'à 32 minutes, ce qui fait qu'il est impossible, quelque courbure qu'on donne à un miroir, de rendre le diamètre du foyer plus petit que la corde de l'arc qui mesure cet angle de 32 minutes. Ainsi, quand même on pourroit faire un miroir concave pour brûler à une grande distance, par exemple, à 150 pieds, en le travaillant dans tous ses points sur une sphère de 600 pieds de diamètre, & en employant une masse énorme de verre ou de métal, il est clair qu'on aura à peu-peu autant d'avantage à n'employer au contraire que de petits miroirs plans.

Au reste, comme tout a des limites, quoique mon miroir soit susceptible d'une plus grande perfection, tant pour l'ajustement que pour plusieurs autres choses, & que je compte bien en faire un autre dont les effets seront supérieurs, cependant il ne faut pas espérer qu'on puisse jamais brûler à de très-grandes distances; car pour brûler, par exemple, à une demi-lieue, il faudroit un miroir deux mille fois plus grand que le mien; &

174 Introduction à l'Histoire

tout ce qu'on pourra jamais faire, est de brûler à 8 ou 900 pieds tout au plus. Le foyer dont le mouvement correspond toujours à celui du Soleil, marche d'autant plus vite qu'il est plus éloigné du miroir, & à 900 pieds de distance, il feroit un chemin d'environ 6 pieds par minute.

Il n'est pas nécessaire d'avertir qu'on peut faire, avec des petits morceaux plats de glace ou de métal, des miroirs dont les foyers seront variables, & qui brûleront à de petites distances avec une grande vivacité ; &, en les montant à peu-près comme l'on monte les parasols, il ne faudroit qu'un seul mouvement pour en ajuster le foyer.

Maintenant que j'ai rendu compte de ma découverte & du succès de mes expériences, je dois rendre à Archimède & aux Anciens, la gloire qui leur est due. Il est certain qu'Archimède a pu faire avec des miroirs de métal ce que je fais avec des miroirs de verre ; il est sûr qu'il avoit plus de lumières qu'il n'en faut pour imaginer la théorie qui m'a guidé & la mécanique que j'ai fait exécuter, & que par conséquent on ne peut lui refuser le

titr
qu
ren
mé
P
ces
ce c
avo
de
l'Ac
des
don
conn
de
Diffe
dans
tous
arden
le plu
qui vi
le pr
mroi
flotte
ayant
à l'aid
par l'e
brasa l

des Minéraux, Partie Exp. 175

titre de premier inventeur de ces miroirs ; que l'occasion où il fut les employer ; rendit sans doute plus célèbres que le mérite de la chose même.

Pendant le temps que je travaillois à ces miroirs, j'ignorois le détail de tout ce qu'en ont dit les Anciens ; mais, après avoir réüssi à les faire, je fus bien aise de m'en instruire. Feu M. Melet, de l'Académie des Belles-Lettres, & l'un des Gardes de la Bibliothèque du Roi, dont la grande érudition & les talens étoient connus de tous les Savans, eut la bonté de me communiquer une excellente Dissertation qu'il avoit faite sur ce sujet, dans laquelle il rapporte les témoignages de tous les Auteurs qui ont parlé des miroirs ardents d'Archimède ; ceux qui en parlent le plus clairement sont, Zonaras & Tzerzès, qui vivoient tous deux dans le XII.^e siècle ; le premier dit, qu'*Archimède* avec ses miroirs ardents, mit en cendres toute la flotte des Romains : *ce Géomètre*, dit-il, *ayant reçu les rayons du Soleil sur un miroir, à l'aide de ces rayons rassemblés & réfléchis par l'épaisseur & le poli du miroir, il embrasa l'air, & alluma une grande flamme*

176 Introduction à l'Histoire

qu'il lança toute entière sur les vaisseaux qui mouilloient dans la sphère de son activité, & qui furent tous réduits en cendres. Le même Zonaras rapporte aussi, qu'au siège de Constantinople, sous l'empire d'Anastase, l'an 514 de Jésus-Christ, Proclus brûla avec des miroirs d'airain, la flotte de Vitalien qui assiégeoit Constantinople; & il ajoute que ces miroirs étoient une découverte ancienne, & que l'historien Dion en donne l'honneur à Archimède qui la fit, & s'en servit contre les Romains, lorsque Marcellus fit le siège de Syracuse.

Tzetzés, non-seulement rapporte & assure le fait des miroirs, mais même il en explique en quelque façon la construction. Lorsque les vaisseaux Romains, dit-il, furent à la portée du trait, Archimède fit faire une espèce de miroir hexagone, & d'autres plus petits de vingt-quatre angles chacun, qu'il plaça dans une distance proportionnée & qu'on pouvoit mouvoir à l'aide de leurs charnières & de certaines lames de métal; il plaça le miroir hexagone de façon qu'il étoit coupé par le milieu par le méridien d'hiver & d'été, en sorte que les rayons

du S
brise
ence.
fusse
passa
distan
la po
de r
de la
miroi
le m
miroi
veme
enfin
disant
duque
petits
qui v
doit
d'aille
bleme
pour
n'est
que c
quatre
de se
donne

des Minéraux, Partie Exp. 177

du Soleil reçus sur ce miroir venant à se briser, allumèrent un grand feu qui réduisit en cendres les vaisseaux Romains, quoiqu'ils fussent éloignés de la portée d'un trait. Ce passage me paroît assez clair; il fixe la distance à laquelle Archimède a brûlé, la portée du trait ne peut guère être que de 150 ou 200 pieds; il donne l'idée de la construction, & fait voir que le miroir d'Archimède pouvoit être comme le mien, composé de plusieurs petits miroirs qui se mouvoient par des mouvemens de charnières & de ressorts, & enfin il indique la position du miroir, en disant que le miroir hexagone autour duquel étoient sans doute les miroirs plus petits, étoit coupé par le méridien, ce qui veut dire apparemment que le miroir doit être opposé directement au Soleil; d'ailleurs le miroir hexagone étoit probablement celui dont l'image servoit de mire pour ajuster les autres, & cette figure n'est pas tout-à-fait indifférente, non plus que celle de vingt-quatre angles ou vingt-quatre côtés des petits miroirs. Il est aisé de sentir qu'il y a en effet de l'avantage à donner à ces miroirs une figure polygone

178 Introduction à l'Histoire

d'un grand nombre de côtés égaux, afin que la quantité de lumière soit moins inégalement répartie dans l'image réfléchie, & elle sera répartie le moins inégalement qu'il est possible lorsque les miroirs seront circulaires : j'ai bien vu qu'il y avoit de la perte à employer des miroirs quadrangulaires, longs de 6 pouces sur 8 pouces; mais j'ai préféré cette forme parce qu'elle est, comme je l'ai dit, plus avantageuse pour brûler horizontalement.

J'ai aussi trouvé, dans la même dissertation de M. Melot, que le P. Kircher avoit écrit qu'Archimède avoit pu brûler à une grande distance avec des miroirs plans, & que l'expérience lui avoit appris, qu'en réunissant de cette façon les images du Soleil, on produisoit une chaleur considérable au point de réunion.

Enfin dans les Mémoires de l'Académie, année 1726, M. du Fay, dont j'honorerai toujours la mémoire & les talens, paroît avoir touché à cette découverte, il dit: qu'ayant reçu l'image du Soleil sur un miroir plan d'un pied en quarré, & l'ayant portée jusqu'à 600 pieds sur un miroir concave de 17 pouces de diamètre, elle avoit

enco
bust
la fin
Aut
P. Ki
d'un
de pe
sonne
roien
forme
roien
peut-
moins
flexio
& sur
décou
traite
haut ;
nature
que p
pouce
Soleil
beauc
par ce
réfléc
je sup
cinqu

des Minéraux, Partie Exp. 179

encore la force de brûler des matières combustibles au foyer de ce dernier miroir. Et à la fin de son Mémoire, il dit: que quelques Auteurs, il veut sans doute parler du P. Kircher, ont proposé de former un miroir d'un très-long foyer par un grand nombre de petits miroirs plans, que plusieurs personnes tiendroient à la main, & dirigeroient de façon que les images du Soleil formées par chacun de ces miroirs, concouroient en un même point, & que ce seroit peut-être la façon de réussir la plus sûre & la moins difficile à exécuter. Un peu de réflexion sur l'expérience du miroir concave & sur ce projet, auroit porté M. du Fay à la découverte du miroir d'Archimède, qu'il traite cependant de fable un peu plus haut; car il me paroît qu'il étoit tout naturel de conclure de son expérience, que puisqu'un miroir concave de 17 pouces de diamètre sur lequel l'image du Soleil ne tomboit pas toute entière, à beaucoup près, peut cependant brûler par cette seule partie de l'image du Soleil réfléchie à 600 pieds, dans un foyer que je suppose large de 3 lignes; onze cens cinquante-six miroirs plans semblables

au premier miroir réfléchissant, doivent à plus forte raison brûler directement à cette distance de 600 pieds, & que par conséquent deux cens quatre-vingt-neuf miroirs plans auroient été plus que suffisans pour brûler à 300 pieds, en réunissant les deux cens quatre-vingt-neuf images: mais en fait de découverte le dernier pas, quoique souvent le plus facile, est cependant celui qu'on fait le plus rarement.

Mon Mémoire, tel qu'on vient de le lire, a été imprimé dans le volume de l'Académie des Sciences, année 1747, sous le titre: *Invention des miroirs pour brûler à une grande distance*. Feu M. Bouguer, & quelques autres Membres de cette savante Compagnie, m'ayant fait plusieurs objections, tirées principalement de la doctrine de Descartes, dans son *Traité de Dioptrique*, je crus devoir y répondre par le Mémoire suivant, qui fut lû à l'Académie la même année, mais que je ne fis pas imprimer par ménagement pour mes adversaires en opinion. Cependant comme il contient plusieurs choses utiles, & qu'il pourra servir de préservatif contre les erreurs contenues dans quelques livres

d'O
Dio
il ser
préc
dre i

R É M
D
ch
th
de

L A
vrage
le pri
dans
comm
mais
vent
les jo
oblig
faits ;
aux
on d
tance

des Minéraux, Partie Exp. 181

d'Optique, sur-tout dans celui de la Dioptrique de Descartes, que d'autres il sert d'explication & de suite au Mémoire précédent, j'ai jugé à propos de les joindre ici & de les publier ensemble.

ARTICLE SECOND.

RÉFLEXIONS sur le jugement de Descartes, au sujet des miroirs d'Archimède, avec le développement de la théorie de ces miroirs & l'explication de leurs principaux usages.

LA DIOPTRIQUE de Descartes, cet ouvrage qu'il a donné comme le premier & le principal essai de sa méthode de raisonner dans les Sciences, doit être regardée comme un chef-d'œuvre pour son temps; mais les plus belles spéculations sont souvent démenties par l'expérience, & tous les jours les sublimes Mathématiques sont obligées de se plier sous de nouveaux faits; car, dans l'application qu'on en fait aux plus petites parties de la Physique, on doit se défier de toutes les circonstances, & ne pas se confier assez aux

182 *Introduction à l'Histoire*

choses qu'on croit savoir pour prononcer affirmativement sur celles qui sont inconnues. Ce défaut n'est cependant que trop ordinaire, & j'ai cru que je ferois quelque chose d'utile pour ceux qui veulent s'occuper d'Optique, que de leur exposer ce qui manquoit à Descartes, pour pouvoir donner une théorie de cette science qui fût susceptible d'être réduite en pratique.

Son *Traité de Dioptrique* est divisé en dix Discours; dans le premier, notre Philosophe parle de la lumière; & comme il ignoroit son mouvement progressif, qui n'a été découvert que quelque temps après par Roëmer, il faut modifier tout ce qu'il dit à cet égard, & on ne doit adopter aucune des explications qu'il donne au sujet de la nature & de la propagation de la lumière, non plus que les comparaisons & les hypothèses qu'il emploie pour tâcher d'expliquer les causes & les effets de la vision. On sait actuellement que la lumière est environ 7 minutes $\frac{1}{2}$ à venir du Soleil jusqu'à nous, que cette émission du corps lumineux se renouvelle à chaque instant, & que ce n'est pas par la pression continue & par l'action, ou

d
plutôt
rière
toutes
emple
pecte
être c

Il e
Desca
seuler
la cap
tous l
qui tr
ceux
milieu
en eff
la lun
quenc
a tiré

Et
essent
erreu
cet ar
sophe
se cha
ment
& le
l'on c

des Minéraux, Partie Exp. 183

plutôt l'ébranlement instantané d'une matière subtile que ses effets s'opèrent; ainsi, toutes les parties de ce *Traité*, où l'Auteur emploie cette théorie, sont plus que suspectes, & les conséquences ne peuvent être qu'erronées.

Il en est de même de l'explication que Descartes donne de la réfraction; non-seulement sa théorie est hypothétique pour la cause, mais la pratique est contraire dans tous les effets. Les mouvemens d'une balle qui traverse l'eau, sont très-différens de ceux de la lumière qui traverse le même milieu, & s'il eût comparé ce qui arrive en effet à une balle, avec ce qui arrive à la lumière, il en auroit tiré des conséquences tout-à-fait opposées à celles qu'il a tirées.

Et, pour ne pas omettre une chose très-essentielle, & qui pourroit induire en erreur, il faut bien se garder, en lisant cet article, de croire avec notre Philosophe, que le mouvement rectiligne peut se changer naturellement en un mouvement circulaire; cette assertion est fautive, & le contraire est démontré depuis que l'on connoît les loix du mouvement.

184 Introduction à l'Histoire

Comme le second Discours roule en grande partie sur cette théorie hypothétique de la réfraction, je me dispenserai de parler en détail des erreurs qui en sont les conséquences, un Lecteur averti ne peut manquer de les remarquer.

Dans les troisième, quatrième & cinquième Discours, il est question de la vision, & l'explication que Descartes donne au sujet des images qui se forment au fond de l'œil, est assez juste; mais ce qu'il dit sur les couleurs ne peut pas se soutenir ni même s'entendre: car comment concevoir qu'une certaine proportion entre le mouvement rectiligne & un prétendu mouvement circulaire, puisse produire des couleurs? Cette partie a été, comme l'on fait, traitée à fond & d'une manière démonstrative par Newton, & l'expérience a fait voir l'insuffisance de tous les systèmes précédens.

Je ne dirai rien du sixième Discours, où il tâche d'expliquer comment se font nos sensations: quelque ingénieuses que soient ses hypothèses, il est aisé de sentir qu'elles sont gratuites; & comme il n'y a presque rien de mathématique dans

de
cette
arrête
Dan
cours,
géomé
avoir l
peuve
&, ap
rayons
rentes
ellipti
meille
rayons
neuviè
truire
le dixi
tailler
Cet
qui est
matiqu
beauc
denres
la théo
des ve
& l'on
font le
de la G

des Minéraux, Partie Exp. 185

cette partie, il est inutile de nous y arrêter.

Dans le septième & le huitième Discours, Descartes donne une belle théorie géométrique sur les formes que doivent avoir les verres pour produire les effets qui peuvent servir à la perfection de la vision; &, après avoir examiné ce qui arrive aux rayons qui traversent ces verres de différentes formes, il conclut que les verres elliptiques & hyperboliques, sont les meilleurs de tous pour rassembler les rayons; & il finit par donner, dans le neuvième Discours, la manière de construire les lunettes de longue vue, & dans le dixième & dernier Discours, celle de tailler les verres.

Cette partie de l'ouvrage de Descartes, qui est proprement la seule partie mathématique de son Traité, est plus fondée & beaucoup mieux raisonnée que les précédentes; cependant on n'a point appliqué la théorie à la pratique, on n'a pas taillé des verres elliptiques ou hyperboliques, & l'on a oublié ces fameuses ovales qui sont le principal objet du second Livre de la Géométrie; la différente réfrangibilité

des rayons, qui étoit inconnue à Descartes, n'a pas été découverte que cette théorie géométrique a été abandonnée: il est en effet démontré qu'il n'y a pas autant à gagner par le choix de ces formes qu'il y a à perdre par la différente réfrangibilité des rayons, puisque, selon leur différent degré de réfrangibilité, ils se rassemblent plus ou moins près; mais, comme l'on est parvenu à faire des lunettes achromatiques, dans lesquelles on compense la différente réfrangibilité des rayons par des verres de différente densité, il seroit très-utile aujourd'hui de tailler des verres hyperboliques ou elliptiques, si l'on veut donner aux lunettes achromatiques toute la perfection dont elles sont susceptibles.

Après ce que je viens d'exposer, il me semble que l'on ne devroit pas être surpris que Descartes eût mal prononcé au sujet des miroirs d'Archimède, puisqu'il ignoroit un si grand nombre de choses qu'on a découvertes depuis: mais, comme c'est ici le point particulier que je veux examiner, il faut rapporter ce qu'il en a dit, afin qu'on soit plus en état d'en juger.

« Vous pouvez aussi remarquer par

de
occasi
massés
brûlés
sembl
faut p
rayons
mais a
des au
pas se
ceux c
lence e
se doi
corps
celle c
sans q
ce cor
figure
ou un
que ce
quelqu
qu'une
Jusc
brûlan
ment
miroir
fait vo
cette t

des Minéraux, Partie Exp. 187

occasion, que les rayons du Soleil ramassés par le verre elliptique, doivent brûler avec plus de force qu'étant rassemblés par l'hyperbolique, car il ne faut pas seulement prendre garde aux rayons qui viennent du centre du Soleil, mais aussi à tous les autres qui, venant des autres points de la superficie, n'ont pas sensiblement moins de force que ceux du centre; en sorte que la violence de la chaleur qu'ils peuvent causer, se doit mesurer par la grandeur du corps qui les assemble, comparée avec celle de l'espace où il les assemble. . . . sans que la grandeur du diamètre de ce corps y puisse rien ajouter, ni sa figure particulière, qu'environ un quart ou un tiers tout au plus; il est certain que cette ligne brûlante à l'infini, que quelques-uns ont imaginée, n'est qu'une rêverie. »

Jusqu'ici il n'est question que de verres brûlans par réfraction, mais ce raisonnement doit s'appliquer de même aux miroirs par réflexion, & avant que de faire voir que l'Auteur n'a pas tiré de cette théorie les conséquences qu'il devoit

188 Introduction à l'Histoire

en tirer, il est bon de lui répondre d'abord par l'expérience. Cette ligne brûlante à l'infini, qu'il regarde comme une rêverie, pourroit s'exécuter par des miroirs de réflexion semblables au mien, non pas à une distance infinie, parce que l'homme ne peut rien faire d'infini, mais à une distance indéfinie assez considérable. Car supposons que mon miroir au lieu d'être composé de deux cens vingt-quatre petites glaces, fût composé de deux mille, ce qui est possible; il n'en faut que vingt pour brûler à 20 pieds, & le foyer étant comme une colonne de lumière, ces vingt glaces brûlent en même temps à 17 & à 23 pieds; avec vingt-cinq autres glaces, je ferai un foyer qui brûlera depuis 23 jusqu'à 30; avec vingt-neuf glaces, un foyer qui brûlera depuis 30 jusqu'à 40; avec trente-quatre glaces, un foyer qui brûlera depuis 40 jusqu'à 52; avec quarante glaces, depuis 52 jusqu'à 64; avec cinquante glaces, depuis 64 jusqu'à 76; avec soixante glaces, depuis 76 jusqu'à 88; avec soixante-dix glaces, depuis 88 jusqu'à 100 pieds : voilà donc déjà une ligne brûlante, depuis 17 jusqu'à 100

d
pieds
cens
nuer
de qu
100 p
douze
pieds
jusqu
depuis
quant
200 p
prolo
depuis
en qu
puisse
fera h
que h
six po
deux
la lig
& ave
par e
longe
indéfi
est in
infini
Philo

des Minéraux, Partie Exp. 189

pieds, où je n'aurai employé que trois cens vingt-huit glaces; &, pour la continuer, il n'y a qu'à faire d'abord un foyer de quatre-vingts glaces, il brûlera depuis 100 pieds jusqu'à 116; & quatre-vingt-douze glaces, depuis 116 jusqu'à 134 pieds; & cent huit glaces, depuis 134 jusqu'à 150; & cent vingt-quatre glaces, depuis 150 jusqu'à 170; & cent cinquante-quatre glaces, depuis 170 jusqu'à 200 pieds; ainsi, voilà ma ligne brûlante prolongée de 100 pieds, en sorte que depuis dix-sept pieds jusqu'à 200 pieds, en quelqu'endroit de cette distance qu'on puisse mettre un corps combustible, il sera brûlé; & pour cela il ne faut en tout que huit cens quatre-vingt-six glaces de six pouces, & en employant le reste des deux mille glaces, je prolongerai de même la ligne brûlante jusqu'à 3 & 400 pieds; & avec un plus grand nombre de glaces, par exemple, avec quatre mille je la prolongerai beaucoup plus loin, à une distance indéfinie. Or tout ce qui, dans la pratique, est indéfini, peut être regardé comme infini dans la théorie; donc notre célèbre Philosophe a eu tort de dire que cette

190 Introduction à l'Histoire

ligne brûlante à l'infini n'étoit qu'une rêverie.

Maintenant venons à la théorie ; rien n'est plus vrai que ce que dit ici Descartes au sujet de la réunion des rayons du Soleil, qui ne se fait pas dans un point, mais dans un espace ou foyer dont le diamètre augmente à proportion de la distance. Mais ce grand Philosophe n'a pas senti l'étendue de ce principe qu'il ne donne que comme une remarque ; car, s'il y eût fait attention, il n'auroit pas considéré, dans tout le reste de son ouvrage, les rayons du Soleil comme parallèles, il n'auroit pas établi comme le fondement de la théorie de sa construction des lunettes, la réunion des rayons dans un point, & il se seroit bien gardé de dire affirmativement, (*page 131*) *Nous pourrions par cette invention voir des objets aussi particuliers & aussi petits dans les astres, que ceux que nous voyons communément sur la terre.* Cette assertion ne pouvoit être vraie qu'en supposant le parallélisme des rayons & leur réunion en un seul point, & par conséquent elle est opposée à sa propre théorie, ou plutôt il n'a pas employé

la th
s'il r
il e
de f
quar
les v
n'aur
a sup
plus
qu'il
ces o
où, c
malgr
angle
Co
été bi
détail
deux
les di
deux
& do
rente
lunette
avec
il faut
chaqu
qui ne

des Minéraux, Partie Exp. 191.

la théorie comme il le falloit; & en effet, s'il n'eût pas perdu de vue cette remarque, il eût supprimé les deux derniers Livres de sa Dioptrique; car il auroit vu que quand même les Ouvriers eussent putailer les verres comme il l'exigeoit, ces verres n'auroient pas produit les effets qu'il leur a supposés, de nous faire distinguer les plus petits objets dans les astres; à moins qu'il n'eût en même temps supposé dans ces objets une intensité de lumière infinie, où, ce qui revient au même, qu'ils eussent, malgré leur éloignement, pu former un angle sensible à nos yeux.

Comme ce point d'Optique n'a jamais été bien éclairci, j'entrerai dans quelque détail à cet égard: on peut démontrer que deux objets également lumineux & dont les diamètres sont différens, ou bien que deux objets dont les diamètres sont égaux, & dont l'intensité de lumière est différente, doivent être observés avec des lunettes différentes; que, pour observer avec le plus grand avantage possible, il faudroit des lunettes différentes pour chaque Planète; que, par exemple, Vénus qui nous paroît bien plus petite que la

192 Introduction à l'Histoire

Lune, & dont je suppose pour un instant la lumière égale à celle de la Lune, doit être observée avec une lunette d'un plus long foyer que la Lune; & que la perfection des lunettes, pour en tirer le plus grand avantage possible, dépend d'une combinaison qu'il faut faire, non-seulement entre les diamètres & les courbures des verres, comme Descartes l'a fait, mais encore entre ces mêmes diamètres & l'intensité de la lumière de l'objet qu'on observe. Cette intensité de la lumière de chaque objet, est un élément que les Auteurs, qui ont écrit sur l'Optique, n'ont jamais employé, & cependant il fait plus que l'augmentation de l'angle sous lequel un objet doit nous paroître, en vertu de la courbure des verres. Il en est de même d'une chose qui semble être un paradoxe; c'est que les miroirs ardents, soit par réflexion, soit par réfraction, feroient un effet toujours égal à quelque distance qu'on les mît du Soleil. Par exemple, mon miroir brûlant à 150 pieds du bois sur la Terre, brûleroit de même à 150 pieds & avec autant de force du bois dans Saturne, où cependant la chaleur du Soleil est

est en
Terre
tiron
vérité
toutes

Ma
que je
que D
est né
d'Arch
prono
vais fa
en. qu
inventi

Si le
yeux u
étoit
certain
par un
duiroit
& une
positio
rien ic
dont la
autre,
aussi-h
pieds,
Sup

des Minéraux, Partie Exp. 193

est environ cent fois moindre que sur la Terre. Je crois que les bons esprits sentiront bien, sans autre démonstration, la vérité de ces deux propositions, quoique toutes deux nouvelles & singulières.

Mais, pour ne pas m'écarter du sujet que je me suis proposé, & pour démontrer que Descartes n'ayant pas la théorie qui est nécessaire pour construire les miroirs d'Archimède, il n'étoit pas en état de prononcer qu'ils étoient impossibles, je vais faire sentir, autant que je le pourrai, en quoi consistoit la difficulté de cette invention.

Si le Soleil, au lieu d'occuper à nos yeux un espace de 32 minutes de degré, étoit réduit en un point, alors il est certain que ce point de lumière réfléchié par un point d'une surface polie, produiroit à toutes les distances une lumière & une chaleur égales, parce que l'interposition de l'air ne fait rien ou presque rien ici; que par conséquent un miroir dont la surface seroit égale à celle d'un autre, brûleroit à dix lieues à peu-près aussi-bien que le premier brûleroit à 10 pieds, s'il étoit possible de le travailler.

Supplément. Tome II,

I

194 *Introduction à l'Histoire*

sur une sphère de quarante lieues, comme on peut travailler l'autre sur une sphère de 40 pieds; parce que chaque point de la surface du miroir réfléchissant le point lumineux auquel nous avons réduit le disque du Soleil, on auroit, en variant la courbure des miroirs, une égale chaleur ou une égale lumière à toutes les distances sans changer leurs diamètres; ainsi, pour brûler à une grande distance, dans ce cas il faudroit en effet un miroir très-exactement travaillé sur une sphère, ou une hyperboloïde proportionnée à la distance, ou bien un miroir brisé en une infinité de points physiques plans, qu'il faudroit faire coïncider au même point; mais le disque du Soleil occupant un espace de 32 minutes de degré, il est clair que le même miroir sphérique ou hyperbolique ou d'une autre figure quelconque, ne peut jamais, en vertu de cette figure, réduire l'image du Soleil en un espace plus petit que de 32 minutes; que dès-lors l'image augmentera toujours à mesure qu'on s'éloignera; que de plus chaque point de la surface nous donnera une image d'une même largeur, par

exem
or, c
tout l
coïnc
ped,
une n
est la
comm
nomb
de dia
petit n
une im
sera à
pareille
le mire
La th
donc pa
trouvé
dans un
de cha
surface
remarq
été fait
d'avant
que de
qu'on v
& que

des Minéraux, Partie Exp. 195

exemple, d'un demi-pied à 60 pieds : or, comme il est nécessaire pour produire tout l'effet possible que toutes ces images coïncident dans cet espace d'un demi-pied, alors au lieu de briser le miroir en une infinité de parties, il est évident qu'il est à peu près égal & beaucoup plus commode de ne le briser qu'en un petit nombre de parties planes d'un demi-pied de diamètre chacune, parce que chaque petit miroir plan d'un demi-pied donnera une image d'environ un demi-pied, qui sera à peu près aussi lumineuse qu'une pareille surface d'un demi-pied prise dans le miroir sphérique ou hyperbolique.

La théorie de mon miroir ne consiste donc pas, comme on l'a dit ici, à avoir trouvé l'art d'inscrire aisément des plans dans une surface sphérique & le moyen de changer à volonté la courbure de cette surface sphérique; mais elle suppose cette remarque plus délicate & qui n'avoit jamais été faite, c'est qu'il y a presque autant d'avantage à se servir de miroirs plans que de miroirs de toute autre figure, dès qu'on veut brûler à une certaine distance, & que la grandeur du miroir plan est

196 *Introduction à l'Histoire*

déterminée par la grandeur de l'image à cette distance, en sorte qu'à la distance de 60 pieds, où l'image du Soleil a environ un demi-pied de diamètre, on brûlera à peu-près aussi-bien avec des miroirs plans d'un demi-pied qu'avec des miroirs hyperboliques les mieux travaillés, pourvu qu'ils n'aient que la même grandeur. De même avec des miroirs plans d'un pouce & demi, on brûlera à 15 pieds à peu-près avec autant de force qu'avec un miroir exactement travaillé dans toutes ses parties, & pour le dire en un mot, un miroir à facettes plates produira à peu-près autant d'effet qu'un miroir travaillé avec la dernière exactitude dans toutes ses parties, pourvu que la grandeur de chaque facette soit égale à la grandeur de l'image du Soleil; & c'est par cette raison qu'il y a une certaine proportion entre la grandeur des miroirs plans & les distances; & que, pour brûler plus loin, on peut employer, même avec avantage, de plus grandes glaces dans mon miroir que pour brûler plus près.

Car si cela n'étoit pas, on sent bien qu'en réduisant, par exemple, mes glaces

des

de six p
quatre f
premièr
l'étendu
eu quat
les glace
produir
seroit ré
seuleme
polygon
imaginé
pour fa
de certe
les plus
mais le
d'avoir
question
dans un
faire va
encore
devoit
minée
effet; c
rent, &
lieu de
dans to
les ima

des Minéraux, Partie Exp. 197

de six pouces à trois pouces, & employant quatre fois autant de ces glaces que des premières, ce qui revient au même pour l'étendue de la surface du miroir, j'aurois eu quatre fois plus d'effet, & que plus les glaces seroient petites & plus le miroir produiroit d'effet; & c'est à ceci que se seroit réduit l'art de quelqu'un, qui auroit seulement tenté d'inscrire une surface polygone dans une sphère, & qui auroit imaginé l'ajustement dont je me suis servi pour faire changer à volonté la courbure de cette surface; il auroit fait les glaces les plus petites qu'il auroit été possible; mais le fond & la théorie de la chose est d'avoir reconnu qu'il n'étoit pas seulement question d'inscrire une surface polygone dans une sphère avec exactitude, & d'en faire varier la courbure à volonté; mais encore que chaque partie de cette surface devoit avoir une certaine grandeur déterminée pour produire aisément un grand effet; ce qui fait un problème fort différent, & dont la solution m'a fait voir qu'au lieu de travailler ou de briser un miroir dans toutes ses parties pour faire coïncider les images au même endroit, il suffisoit de

le briser ou de le travailler à facettes planes en grandes portions égales à la grandeur de l'image, & qu'il y avoit peu à gagner en le brisant en de trop petites parties, ou, ce qui est la même chose, en le travaillant exactement dans tous ses points. C'est pour cela que j'ai dit dans mon Mémoire que, pour brûler à de grandes distances, il falloit imaginer quelque chose de nouveau & tout-à-fait indépendant de ce qu'on avoit pensé & pratiqué jusqu'ici, & ayant supputé géométriquement la différence, j'ai trouvé qu'un miroir parfait de quelque courbure qu'il puisse être, n'aura jamais plus d'avantage sur le mien que de 17 à 10, & qu'en même temps l'exécution en seroit impossible pour ne brûler même qu'à une petite distance comme de 25 ou 30 pieds. Mais revenons aux assertions de Descartes.

Il dit ensuite: « qu'ayant deux verres » ou miroirs ardents, dont l'un soit beaucoup plus grand que l'autre, de quelque » façon qu'ils puissent être, pourvu que » leurs figures soient routes pareilles, le » plus grand doit bien ramasser les rayons » du Soleil en un plus grand espace &

plus lo
que ce
plus d
espace
ramassé
verres
qui br
que les

Ceci
riences
Mémoi
intense
beaucou
partie su
au senti
la théor
qui suie
Prenons
celui de
de diam
largeur
foyer le
& faiso
petit m
mètre,
de lign
pouces

des Minéraux, Partie Exp. 199

plus loin de soi que le plus petit, mais que ces rayons ne doivent point avoir plus de force en chaque partie de cet espace qu'en celui où le plus petit les ramasse, en sorte qu'on peut faire des verres ou miroirs extrêmement petits, qui brûleront avec autant de violence que les plus grands. »

Ceci est absolument contraire aux expériences que j'ai rapportées dans mon Mémoire, où j'ai fait voir qu'à égale intensité de lumière un grand foyer brûle beaucoup plus qu'un petit, & c'est en partie sur cette remarque, toute opposée au sentiment de Descartes, que j'ai fondé la théorie de mes miroirs ; car voici ce qui suit de l'opinion de ce Philosophe. Prenons un grand miroir ardent, comme celui du sieur Segard, qui a 32 pouces de diamètre, & un foyer de 9 lignes de largeur à 6 pieds de distance, auquel foyer le cuivre se fond en une minute, & faisons dans les mêmes proportions un petit miroir ardent de 32 lignes de diamètre, dont le foyer sera de $\frac{9}{12}$ ou de $\frac{3}{4}$ de ligne de diamètre, & la distance de 6 pouces ; puisque le grand miroir fond le

200 *Introduction à l'Histoire*

cuivre en une minute dans l'étendue de son foyer qui est de 9 lignes, le petit doit, selon Descartes, fondre dans le même temps la même matière dans l'étendue de son foyer qui est de $\frac{3}{4}$ de ligne; or j'en appelle à l'expérience, & on verra que bien loin de fondre le cuivre, à peine ce petit verre brûlant pourra-t-il lui donner un peu de chaleur.

Comme ceci est une remarque physique & qui n'a pas peu servi à augmenter mes espérances lorsque je doutois encore si je pourrois produire du feu à une grande distance, je crois devoir communiquer ce que j'ai pensé à ce sujet.

La première chose à laquelle je fis attention, c'est que la chaleur se communique de proche en proche & se disperse, quand même elle est appliquée continuellement sur le même point; par exemple, si on fait tomber le foyer d'un verre ardent sur le centre d'un écu, & que ce foyer n'ait qu'une ligne de diamètre, la chaleur qu'il produit sur le centre de l'écu se disperse & s'étend dans le volume entier de l'écu, & il devient chaud jusqu'à la circonférence; dès-lors toute la chaleur,

quo
de
pro
dem
d'un
mili
tout
pren
égale
il n'
dans
profi
autan
l'écu
derni
n'aur
je co
faire
duire
petit
soit la
petit
autan
qu'av
un g
qu'un
étant

des Minéraux, Partie Exp. 201

quoiqu'employée d'abord contre le centre de l'écu, ne s'y arrête pas & ne peut pas produire un aussi grand effet que si elle y demeurait toute entière. Mais si au lieu d'un foyer d'une ligne qui tombe sur le milieu de l'écu, je fais tomber sur l'écu tout entier un foyer d'égale force au premier, toutes les parties de l'écu étant également échauffées dans ce dernier cas; il n'y a pas de perte de chaleur comme dans le premier, & le point du milieu profitant de la chaleur des autres points, autant que ces points profitent de la sienne, l'écu sera fondu par la chaleur dans ce dernier cas, tandis que, dans le premier, il n'aura été que légèrement échauffé. De-là je conclus que toutes les fois qu'on peut faire un grand foyer on est sûr de produire de plus grands effets qu'avec un petit foyer, quoique l'intensité de lumière soit la même dans tous deux; & qu'un petit miroir ardent ne peut jamais faire autant d'effet qu'un grand; & même qu'avec une moindre intensité de lumière, un grand miroir doit faire plus d'effet qu'un petit, la figure de ces deux miroirs étant toujours supposée semblable. Ceci,

202. *Introduction à l'Histoire*

qui comme l'on voit , est directement opposé à ce que dit Descartes, s'est trouvé confirmé par les expériences rapportées dans mon Mémoire : mais je ne me suis pas borné à savoir d'une manière générale que les grands foyers agissoient avec plus de force que les petits, j'ai déterminé à très-peu près de combien est cette augmentation de force, & j'ai vu qu'elle étoit très - considérable; car j'ai trouvé que s'il faut dans un miroir cent quarante - quatre fois la surface d'un foyer de six lignes de diamètre pour brûler, il faut au moins le double, c'est-à-dire, deux cens quatre-vingt-huit fois cette surface pour brûler à un foyer de deux lignes; & qu'à un foyer de 6 pouces il ne faut pas trente fois cette même surface du foyer pour brûler, ce qui fait, comme l'on voit, une prodigieuse différence & sur laquelle j'ai compté lorsque j'ai entrepris de faire mon miroir, sans cela il y auroit eu de la témérité à l'entreprendre & il n'auroit pas réussi. Car supposons un instant que je n'eusse pas eu cette connoissance de l'avantage des grands foyers sur les petits; voici comme

de
j'auroi
faut à
huit fo
dans u
de mé
glaces
dans un
pour h
auroit
onze c
pouces
pour un
suffisant
projet;
dérable
qui, d
sentis q
pouces
100 pi
trepris a
mon mi
une théo
sique, se
imagine
Desca
qu'un p
violemm

des Mineraux, Partie Exp. 203

j'aurois été obligé de raisonner. Puisqu'il faut à un miroir deux cens quatre-vingt-huit fois la surface du foyer pour brûler dans un espace de deux lignes, il faudra de même deux cens quatre-vingt-huit glaces ou miroirs de 6 pouces pour brûler dans un espace de 6 pouces; & dès-lors, pour brûler seulement à 100 pieds, il auroit fallu un miroir composé d'environ onze cens cinquante-deux glaces de 6 pouces, ce qui étoit une grandeur énorme pour un petit effet, & cela étoit plus que suffisant pour me faire abandonner mon projet; mais, connoissant l'avantage considérable des grands foyers sur les petits, qui, dans ce cas, est de 288 à 30, je sentis qu'avec cent vingt glaces de 6 pouces je brûlerois très-certainement à 100 pieds, & c'est sur cela que j'entrepris avec confiance la construction de mon miroir qui, comme l'on voit, suppose une théorie tant mathématique que physique, fort différente de ce qu'on pouvoit imaginer au premier coup d'œil.

Descartes ne devoit donc pas affirmer qu'un petit miroir ardent brûloit aussi violemment qu'un grand.

Il dit ensuite, « & un miroir ardent
 » dont le diamètre n'est pas plus grand
 » qu'environ la centième partie de la
 » distance qui est entre lui & le lieu où
 » il doit rassembler les rayons du Soleil ;
 » c'est-à-dire, qui a même proportion
 » avec cette distance qu'a le diamètre du
 » Soleil avec celle qui est entre lui &
 » nous, fût-il poli par un Ange, ne
 » peut faire que les rayons qu'il assemble,
 » échauffent plus en l'endroit où il les
 » assemble que ceux qui viennent direc-
 » tement du Soleil, ce qui se doit aussi
 » entendre des verres brûlans à propor-
 » tion ; d'où vous pouvez voir que ceux
 » qui ne sont qu'à demi-savans en l'Op-
 » tique, se laissent persuader beaucoup
 » de choses qui sont impossibles, & que
 » ces miroirs, dont on a dit qu'Archimède
 » brûloit des navires de fort loin, devoient
 » être extrêmement grands ou plutôt qu'ils
 » sont fabuleux. »

C'est ici où je bornerai mes réflexions :
 si notre illustre Philosophe eût su que
 les grands foyers brûlent plus que les
 petits à égale intensité de lumière, il
 auroit jugé bien différemment, & il

auroit r
 conclusi

Mais,
 sance qu
 n'est po

ardent,
 grand c
 est entre

les rayo
 puisque
 égal au

& par c
 les rayo
 semble r

ce cas à
 plus, en
 & ce qu

s'il eût r
 miroir d
 & qui ne

lement r
 force qu
 du Soleil

de brûle
 miroir d
 lui dont
 auroit tr

des Minéraux, Partie Exp. 205

auroit mis une forte restriction à cette conclusion.

Mais, indépendamment de cette connoissance qui lui manquoit, son raisonnement n'est point du tout exact ; car un miroir ardent, dont le diamètre n'est pas plus grand qu'environ la centième partie qui est entre lui & le lieu où il doit rassembler les rayons, n'est plus un miroir ardent, puisque le diamètre de l'image est environ égal au diamètre du miroir dans ce cas, & par conséquent il ne peut rassembler les rayons, comme le dit Descartes, qui semble n'avoir pas vu qu'on doit réduire ce cas à celui des miroirs plans. Mais de plus, en n'employant que ce qu'il savoit, & ce qu'il avoit prévu, il est visible que s'il eût réfléchi sur l'effet de ce prétendu miroir qu'il suppose poli par un Ange, & qui ne doit pas rassembler, mais seulement réfléchir la lumière avec autant de force qu'elle en a en venant directement du Soleil, il auroit vu qu'il étoit possible de brûler à de grandes distances avec un miroir de médiocre grandeur, s'il eût pu lui donner la figure convenable, car il auroit trouvé que, dans cette hypothèse,

un miroir de cinq pieds auroit brûlé à plus de deux cens pieds, parce qu'il ne faut pas six fois la chaleur du Soleil pour brûler à cette distance ; & de même qu'un miroir de sept pieds auroit brûlé à près de 400 pieds, ce qui ne fait pas des miroirs assez grands pour qu'on puisse les traiter de fabuleux.

Il me reste à observer que Descartes ignoroit combien il falloit de fois la lumière du Soleil pour brûler, qu'il ne dit pas un mot des miroirs plans, qu'il étoit fort éloigné de soupçonner la mécanique par laquelle on pouvoit les disposer pour brûler au loin, & que par conséquent il a prononcé sans avoir assez de connoissance sur cette matière, & même sans avoir fait assez de réflexions sur ce qu'il en savoit.

Au reste, je ne suis pas le premier qui ait fait quelques reproches à Descartes sur ce sujet, quoique j'en aie acquis le droit plus qu'un autre ; car, pour ne pas sortir du sein de cette Compagnie (a), je trouve que M. du Fay en a presque dit

(a) L'Académie Royale des Sciences.

autant qu'il s'agit par
leroit à
si, physique
Cette op
& je dois
qui l'ont
Fay regard
exécuter
Descartes
habilité de
tiers que
aux int
différence
théorie et
de M. du
développ
tire sont
& les den
car si De
cette mat
d'Archim
leuse, ve
de sa pr
ardent,
grand qu
qui est e

des Minéraux, Partie Exp. 207

autant que moi. Voici les paroles : *Il ne s'agit pas, dit-il, si un tel miroir qui brûleroit à 600 pieds est possible ou non, mais si, physiquement parlant, cela peut arriver. Cette opinion a été extrêmement contredite, & je dois mettre Descartes à la tête de ceux qui l'ont combattu. Mais quoique M. du Fay regardât la chose comme impossible à exécuter, il n'a pas laissé de sentir que Descartes avoit eu tort d'en nier la possibilité dans la théorie. J'avouerai volontiers que Descartes a entrevu ce qui arrive aux images réfléchies ou réfractées à différentes distances, & qu'à cet égard sa théorie est peut-être aussi bonne que celle de M. du Fay, que ce dernier n'a pas développée: mais les inductions qu'il en tire sont trop générales & trop vagues, & les dernières conséquences sont fausses; car si Descartes eût bien compris toute cette matière, au lieu de traiter le miroir d'Archimède de chose impossible & fabuleuse, voici ce qu'il auroit dû conclure de sa propre théorie. Puisqu'un miroir ardent, dont le diamètre n'est pas plus grand que la centième partie de la distance qui est entre le lieu où il doit rassembler*

les rayons du Soleil, fût-il poli par un Ange, ne peut faire que les rayons qu'il assemble échauffent plus en l'endroit où il les assemble que ceux qui viennent directement du Soleil; ce miroir ardent doit être considéré comme un miroir plan parfaitement poli, & par conséquent pour brûler à une grande distance; il faut autant de ces miroirs plans qu'il faut de fois la lumière directe du Soleil pour brûler; en sorte que les miroirs dont on dit qu'Archimède s'est servi pour brûler des vaisseaux de loin devoient être composés de miroirs plans, dont il falloit au moins un nombre égal au nombre de fois qu'il faut la lumière directe du Soleil pour brûler; cette conclusion, qui eût été la vraie selon ses principes, est, comme l'on voit, fort différente de celle qu'il a donnée.

On est maintenant en état de juger si je n'ai pas traité le célèbre Descartes avec tous les égards que mérite son grand nom, lorsque j'ai dit dans mon Mémoire: *Descartes né pour juger & même pour surpasser Archimède, a prononcé contre lui d'un ton de maître: il a nié la possibilité de l'invention, & son opinion a prévalu sur*

des

les témoignages
l'antiquité

Ce que je
justifier
& peut-
Archimède
lorsque
pour le j
j'ai senti
peu de
expressio

J'aurai
dire sur
est déjà
mes effo
nerai po
viens d'e
penser d
sujet de
satisfaire
objectio

Jé ne
tivement
pareils
même q
& je ne
chimède

des Minéraux, Partie Exp. 209

les témoignages & la croyance de toute l'antiquité.

Ce que je viens d'exposer suffit pour justifier ces termes que l'on m'a reprochés, & peut-être même sont-ils trop forts, car Archimède étoit un très-grand génie, & lorsque j'ai dit que Descartes étoit né pour le juger, & même pour le surpasser, j'ai senti qu'il pouvoit bien y avoir un peu de compliment national dans mon expression.

J'aurois encore beaucoup de choses à dire sur cette matière, mais comme ceci est déjà bien long, quoique j'aie fait tous mes efforts pour être court, je me bornerai pour le fond du sujet à ce que je viens d'exposer, mais je ne puis me dispenser de parler encore un moment au sujet de l'historique de la chose, afin de satisfaire, par ce seul Mémoire, à toutes les objections & difficultés qu'on m'a faites.

Je ne prétends pas prononcer affirmativement qu'Archimède se soit servi de pareils miroirs au siège de Syracuse, ni même que ce soit lui qui les ait inventés, & je ne les ai appelés *les miroirs d'Archimède*, que parce qu'ils étoient connus

210 Introduction à l'Histoire

sous ce nom depuis plusieurs siècles ; les Auteurs contemporains & ceux des temps qui suivent celui d'Archimède , & qui sont parvenus jusqu'à nous, ne font pas mention de ces miroirs. Tite-Live, à qui le merveilleux fait tant de plaisir à raconter, n'en parle pas ; Polybe , à l'exacritude de qui les grandes inventions n'auroient pas échappé, puisqu'il entre dans le détail des plus petites, & qu'il décrit très-soigneusement les plus légères circonstances du siège de Syracuse , garde un silence profond au sujet de ces miroirs. Plutarque, ce judicieux & grave Auteur, qui a rassemblé un si grand nombre de faits particuliers de la vie d'Archimède, parle aussi peu des miroirs que les deux précédens. En voilà plus qu'il n'en faut pour se croire fondé à douter de la vérité de cette histoire ; cependant ce ne sont ici que des témoignages négatifs , & quoiqu'ils ne soient pas indifférens, ils ne peuvent jamais donner une probabilité équivalente à celle d'un seul témoignage positif.

Galien, qui vivoit dans le second siècle, est le premier qui en ait parlé ; &, après avoir raconté l'histoire d'un homme qui

des i

enflamma
résineux,
il dit, qu
mède br
mais, con
de brûler
peut sign
auroit lan
machine,
miroir,
clair pour
d'affirma
& même
qu'il ne r
qui brûla
d'une ma
brûlé qu
en le jeta
il n'y aur
cette face
quent qu
méritât d
qu'avoit
n'en eût

On a
de deux
siècle, q

des Minéraux , Partie Exp. 211

enflamma de loin un monceau de bois résineux, mêlé avec de la fiente de pigeon, il dit, que c'est de cette façon qu'Archimède brûla les vaisseaux des Romains; mais, comme il ne décrit pas ce moyen de brûler de loin, & que son expression peut signifier aussi-bien un feu qu'on auroit lancé à la main, ou par quelque machine, qu'une lumière réfléchie par un miroir, son témoignage n'est pas assez clair pour qu'on puisse en rien conclure d'affirmatif: cependant on doit présumer, & même avec une grande probabilité, qu'il ne rapporte l'histoire de cet homme qui brûla au loin, que parce qu'il le fit d'une manière singulière, & que, s'il n'eût brûlé qu'en lançant le feu à la main, ou en le jetant par le moyen d'une machine, il n'y auroit eu rien d'extraordinaire dans cette façon d'enflammer; rien par conséquent qui fût digne de remarque, & qui méritât d'être rapporté & comparé à ce qu'avoit fait Archimède, & dès-lors Galien n'en eût pas fait mention.

On a aussi des témoignages semblables de deux ou trois autres Auteurs du III.^e siècle, qui disent seulement qu'Archimède

212 Introduction à l'Histoire

brûla de loin les vaisseaux des Romains; sans expliquer les moyens dont il se servit; mais les témoignages des Auteurs du XII.^e siècle ne sont point équivoques, & surtout ceux de Zonaras & de Tzetzés que j'ai cités, c'est-à-dire, ils nous font voir clairement que cette invention étoit connue des Anciens, car la description qu'en fait ce dernier Auteur, suppose nécessairement ou qu'il eût trouvé lui-même le moyen de construire ces miroirs, ou qu'il l'eût appris & cité d'après quelque Auteur qui en avoit fait une très-exacte description, & que l'inventeur, quel qu'il fût, entendoit à fond la théorie de ces miroirs, ce qui résulte de ce que dit Tzetzés de la figure de 24 angles ou 24 côtés qu'avoient les petits miroirs, ce qui est en effet la figure la plus avantageuse: ainsi, on ne peut pas douter que ces miroirs n'aient été inventés & exécutés autrefois, & le témoignage de Zonaras, au sujet de Proclus, n'est pas suspect, *Proclus s'en servit, dit-il, au siège de Constantinople, l'an 514, & il brûla la flotte de Vitalien.* Et même ce que Zonaras ajoute me paroît une espèce de preuve, qu'Archimède étoit le premier

des I

inventeur
précisément
ancienne
bue l'hon
s'en serv
de Syrac
est parlé
pas parve
grande a
du temps
ne les eû
Ainsi, to
d'autre é
présomp
inventé
servi con
que j'ai d
avoit fait
très-exac
sentimen
avoit en
tance mé
à la port
du trait
m en ont
la conno
mont al

des Minéraux, Partie Exp. 213

inventeur de ces miroirs, car il dit précisément que cette découverte étoit ancienne, & que l'historien Dion en attribue l'honneur à Archimède qui la fit & s'en servit contre les Romains au siège de Syracuse; les Livres de Dion, où il est parlé du siège de Syracuse, ne sont pas parvenus jusqu'à nous, mais il y a grande apparence qu'ils existoient encore du temps de Zonaras, & que sans cela il ne les eût pas cités comme il l'a fait. Ainsi, toutes les probabilités de part & d'autre étant évaluées, il reste une forte présomption qu'Archimède avoit en effet inventé ces miroirs, & qu'il s'en étoit servi contre les Romains. Feu M. Meiot, que j'ai cité dans mon Mémoire, & qui avoit fait des recherches particulières & très-exactes sur ce sujet, étoit de ce sentiment, & il pensoit qu'Archimède avoit en effet brûlé les vaisseaux à une distance médiocre, & comme le dit Tzetzes, à la portée du trait; j'ai évalué la portée du trait à 150 pieds, d'après ce que m'en ont dit des Savans très-versés dans la connoissance des usages anciens, ils m'ont assuré que toutes les fois qu'il est

214 Introduction à l'Histoire

question, dans les Auteurs, de la portée du trait, on doit entendre la distance à laquelle un homme lançoit à la main un trait ou un javelot, & si cela est, je crois avoir donné à cette distance toute l'étendue qu'elle peut comporter.

J'ajouterai qu'il n'est question dans aucun Auteur ancien d'une plus grande distance, comme de trois stades, & j'ai déjà dit que l'Auteur qu'on m'avoit cité, Diodore de Sicile, n'en parle pas, non plus que du siège de Syracuse, & que ce qui nous reste de cet Auteur, finit à la guerre d'Iplus & d'Antigonus, environ soixante ans avant le siège de Syracuse; ainsi, on ne peut pas excuser Descartés, en supposant qu'il a cru que la distance à laquelle on a prétendu qu'Archimède avoit brûlé, étoit très-grande, comme, par exemple, de trois stades, puisque cela n'est dit dans aucun Auteur ancien, & qu'au contraire il est dit, dans Tzetzés, que cette distance n'étoit que de la portée du trait; mais je suis convaincu que c'est cette même distance que Descartés a regardée comme fort grande, & qu'il étoit persuadé qu'il n'étoit pas

de
possib
à 150
raison
fabule

Au
constru
comme
on per
dées,
comme
car je
faire un
attentio
du dou
tion ser
hexagon
de les q
que j'ai
des figu
sans lair
approch
circulai
ces glac
Lunetie
qu'elles
polime
cercle,

des Minéraux, Partie Exp. 215

possible de faire des miroirs pour brûler à 150 pieds, qu'enfin c'est pour cette raison qu'il a traité ceux d'Archimède de fabuleux.

Au reste, les effets du miroir, que j'ai construit, ne doivent être regardés que comme des essais sur lesquels à la vérité on peut statuer toutes proportions gardées, mais qu'on ne doit pas considérer comme les plus grands effets possibles, car je suis convaincu que si on vouloit faire un miroir semblable, avec toutes les attentions nécessaires, il produiroit plus du double de l'effet; la première attention seroit de prendre des glaces de figure hexagone ou même de 24 côtés, au lieu de les prendre barlongues, comme celles que j'ai employées, & cela afin d'avoir des figures qui pussent s'ajuster ensemble sans laisser de grands intervalles, & qui approchassent en même temps de la figure circulaire; la seconde, seroit de faire polir ces glaces jusqu'au dernier degré par un Lunetier, au lieu de les employer telles qu'elles sortent de la manufacture, où le poliment se faisant par une portion de cercle, les glaces sont toujours un peu

216 Introduction à l'Histoire

concaves & irrégulières ; la troisième attention seroit de choisir, parmi un grand nombre de glaces, celles qui donneroient à une grande distance une image plus vive & mieux terminée, ce qui est extrêmement important, & au point qu'il y a dans mon miroir des glaces qui font seules trois fois plus d'effet que d'autres à une grande distance, quoiqu'à une petite distance, comme de 20 ou 25 pieds, l'effet en paroisse absolument le même. Quatrièmement, il faudroit des glaces d'un demi-pied tout au plus de surface pour brûler à 150 ou 200 pieds, & d'un pied de surface pour brûler à 300 ou 400 pieds. Cinquièmement, il faudroit les faire étamer avec plus de soin qu'on ne le fait ordinairement ; j'ai remarqué qu'en général les glaces fraîchement étamées, réfléchissent plus de lumière que celles qui le sont anciennement ; l'étamage en se séchant se gerse, se divise & laisse de petits intervalles qu'on aperçoit en y regardant de près avec une loupe, & ces petits intervalles donnant passage à la lumière, la glace en réfléchit d'autant moins. On pourroit trouver le moyen de faire

des

faire un
qu'on y
l'or & c
peut-être
de cet ét
fit un dé
qu'il y a
rayons ja
plus forte
plus viol
être assur
verre len
jaunes qu
prisme, &
une égale
couleur, r
laire, & f
Sixième
fer & de
pour assuj
qui porte
à un mod
sieur Che
l'humidite
les vis en
venient, &
fois forme

Supplé

des Minéraux, Partie Exp. 217

faire un meilleur étamage, & je crois qu'on y parviendroit en employant de l'or & du vis-argent, la lumière seroit peut-être un peu jaunée par la réflexion de cet étamage; mais bien loin que cela fit un désavantage, j'imagine au contraire qu'il y auroit à gagner, parce que les rayons jaunes sont ceux qui ébranlent le plus fortement la rétine & qui brûlent le plus violemment, comme je crois m'en être assuré, en réunissant, au moyen d'un verre lenticulaire, une quantité de rayons jaunes qui m'étoient fournis par un grand prisme, & en comparant leur action avec une égale quantité de rayons de toute autre couleur, réunis par le même verre lenticulaire, & fournis par le même prisme.

Sixièmement, il faudroit un chassis de fer & des vis de cuivre, & un ressort pour assujettir chacune des petites planches qui portent les glaces, tout cela conforme à un modèle que j'ai fait exécuter par le sieur Chopitel, afin que la sécheresse & l'humidité qui agissent sur le chassis & les vis en bois ne causassent pas d'inconvénient, & que le foyer, lorsqu'il est une fois formé, ne fût pas sujet à s'élargir,

Supplément. Tome II.

K

& à se déranger lorsqu'on fait rouler le miroir sur son pivot, ou qu'on le fait tourner autour de son axe pour suivre le Soleil : il faudroit aussi y ajouter une alidade avec deux pinnules au milieu de la partie inférieure du chassis, afin de s'assurer de la position du miroir par rapport au Soleil, & une autre alidade semblable, mais dans un plan vertical au plan de la première pour suivre le Soleil à ses différentes hauteurs.

Au moyen de toutes ces attentions, je crois pouvoir assurer, par l'expérience que j'ai acquise en me servant de mon miroir, qu'on pourroit en réduire la grandeur à moitié, & qu'au lieu d'un miroir de sept pieds avec lequel j'ai brûlé du bois à 150 pieds, on produiroit le même effet avec un miroir de cinq pieds $\frac{1}{2}$, ce qui n'est, comme l'on voit, qu'une très-médiocre grandeur pour un très-grand effet; & de même, je crois pouvoir assurer qu'il ne faudroit alors qu'un miroir de quatre pieds $\frac{1}{2}$ pour brûler à 100 pieds, & qu'un miroir de trois pieds $\frac{1}{2}$ brûleroit à 60 pieds, ce qui est une distance bien considérable en comparaison du diamètre du miroir.

Avec
plans hex
roient pl
les glaces
point suje
du Soleil
mage, c
très-utiles
plement
du miroir

1.° Pou
salées, où
du bois &
l'art des
côutent be
de plusieurs
Il ne faudr
salées, qu
plans d'un
qu'ils réflé
dirigée au
15 ou 16
assez grand
produire
évaporatio
lante n'est
Soleil d'éte

des Minéraux, Partie Exp. 219

Avec un assemblage de petits miroirs plans hexagones & d'acier poli, qui auroient plus de solidité, plus de durée que les glaces étamées, & qui ne seroient point sujets aux altérations que la lumière du Soleil fait subir à la longue à l'étamage, on pourroit produire des effets très-utiles, & qui dédommageroient amplement des dépenses de la construction du miroir.

1.^o Pour toutes les évaporations des eaux salées, où l'on est obligé de consommer du bois & du charbon, ou d'employer l'art des bâtimens de graduation qui coûtent beaucoup plus que la construction de plusieurs miroirs tels que je les propose. Il ne faudroit, pour l'évaporation des eaux salées, qu'un assemblage de douze miroirs plans d'un pied quarré chacun; la chaleur qu'ils réfléchiroient à leur foyer, quoique dirigée au-dessous de leur niveau, & à 15 ou 16 pieds de distance, sera encore assez grande pour faire bouillir l'eau, & produire par conséquent une prompte évaporation, car la chaleur de l'eau bouillante n'est que triple de la chaleur du Soleil d'été; & , comme la réflexion d'une

220 *Introduction à l'Histoire*

surface plane bien polie ne diminue la chaleur que de moitié, il ne faudroit que six miroirs pour produire au foyer une chaleur égale à celle de l'eau bouillante, mais j'en double le nombre afin que la chaleur se communique plus vite, & aussi à cause de la perte occasionnée par l'obliquité, sous laquelle le faisceau de la lumière tombe sur la surface de l'eau qu'on veut faire évaporer, & encore parce que l'eau salée s'échauffe plus lentement que l'eau douce. Ce miroir, dont l'assemblage ne formeroit qu'un carré de quatre pieds de largeur sur trois de hauteur, seroit aisé à manier & à transporter; & si l'on vouloit en doubler ou tripler les effets dans le même temps, il vaudroit mieux faire plusieurs miroirs semblables, c'est-à-dire, doubler ou tripler le nombre de ces mêmes miroirs de quatre pieds sur trois que d'en augmenter l'étendue; car l'eau ne peut recevoir qu'un certain degré de chaleur déterminée, & l'on ne gagneroit presque rien à augmenter ce degré & par conséquent la grandeur du miroir; au lieu qu'en faisant deux foyers par deux miroirs égaux, on

de
double
tripler
tomber
sur la t
évapora
la perte
veut y
par une
en rece
sur une
sur le m
en bas a
il perdr
premièr
par la se
petits m
obtenir u
bouillan
Pour
plus de
seur de
Une ma
ne s'évap
près, qu
pouces d
en super
près de

des Minéraux, Partie Exp. 221

doublera l'effet de l'évaporation, & on le triplera par trois miroirs dont les foyers tomberont séparément les uns des autres sur la surface de l'eau qu'on veut faire évaporer. Au reste, l'on ne peut éviter la perte causée par l'obliquité, & si l'on veut y remédier, ce ne peut être que par une autre perte encore plus grande, en recevant d'abord les rayons du Soleil sur une grande glace qui les réfléchiroit sur le miroir brisé, car alors il brûleroit en bas au lieu de brûler en haut, mais il perdrait moitié de la chaleur par la première réflexion, & moitié du reste par la seconde; en sorte qu'au lieu de six petits miroirs, il en faudroit douze pour obtenir une chaleur égale à celle de l'eau bouillante.

Pour que l'évaporation se fasse avec plus de succès, il faudroit diminuer l'épaisseur de l'eau tant qu'il sera possible. Une masse d'eau d'un pied d'épaisseur ne s'évaporerait pas aussi vite, à beaucoup près, que la même masse réduite à six pouces d'épaisseur & augmentée du double en superficie. D'ailleurs le fond étant plus près de la surface, il s'échauffe plus

promptement, & cette chaleur, que reçoit le fond du vaisseau, contribue encore à la célérité de l'évaporation.

2.^o On pourra se servir avec avantage de ces miroirs pour calciner les plâtres & même les pierres calcaires, mais il les faudroit plus grands, & placer les matières en haut afin de ne rien perdre par l'obliquité de la lumière. On a vu, par les expériences détaillées dans le second de ces Mémoires, que le gyps s'échauffe plus d'une fois plus vite que la pierre calcaire tendre, & près de deux fois plus vite que le marbre ou la pierre calcaire dure; leur calcination respective doit être en même raison. J'ai trouvé, par une expérience répétée trois fois, qu'il faut un peu plus de chaleur pour calciner le gyps blanc qu'on appelle *albatre*, que pour fondre le plomb. Or la chaleur nécessaire pour fondre le plomb, est, suivant les expériences de Newton, huit fois plus grande que la chaleur du Soleil d'été, il faudroit donc au moins seize petits miroirs pour calciner le gyps, & à cause des pertes occasionnées, tant par l'obliquité de la lumière que par l'irrégularité

du foye
de quinze
vingt &
d'un pie
le gyps
il faudro
de ces pe
nation su
& soixan
pied en
calcaires
pieds de
ne laisse
embarras
monter
viendroie
produit d
dérable p
la dépen
il faudro
par calcin
vingt-qua
faire deu
d'en faire
pièces; c
de ces
pièces, c

des Minéraux, Partie Exp. 223

du foyer, qu'on n'éloignera pas au-delà de quinze pieds, je présume qu'il faudroit vingt & peut-être vingt-quatre miroirs d'un pied quarré chacun, pour calciner le gyps en peu de temps: par conséquent il faudroit un assemblage de quarante-huit de ces petits miroirs pour opérer la calcination sur la pierre calcaire la plus tendre, & soixante-douze des mêmes miroirs d'un pied en quarré pour calciner les pierres calcaires dures. Or un miroir de douze pieds de largeur sur six pieds de hauteur, ne laisse pas d'être une grosse machine embarrassante & difficile à mouvoir, à monter & à maintenir. Cependant on viendrait à bout de ces difficultés, si le produit de la calcination étoit assez considérable pour équivaloir & même surpasser la dépense de la consommation du bois: il faudroit, pour s'en assurer, commencer par calciner le plâtre avec un miroir de vingt-quatre pièces, & si cela réussissoit, faire deux autres miroirs pareils, au lieu d'en faire un grand de soixante-douze pièces; car, en faisant coïncider les foyers de ces trois miroirs de vingt-quatre pièces, on produira une chaleur égale, &

224 Introduction à l'Histoire

qui seroit assez forte pour calciner le marbre ou la pierre dure.

Mais une chose très-essentielle reste douteuse, c'est de savoir combien il faudroit de temps pour calciner, par exemple, un pied cube de matière, sur-tout si ce pied cube n'étoit frappé de chaleur que par une face? je vois qu'il se passeroit du temps, avant que la chaleur n'eût pénétré toute son épaisseur; je vois que, pendant tout ce temps, il s'en perdrait une assez grande partie qui sortiroit de ce bloc de matière après y être entrée; je crains donc beaucoup que la pierre n'étant pas saisie par la chaleur de tous les côtés à la fois, la calcination ne fût très-lente, & le produit en chaux très-petit. L'expérience seule peut ici décider; mais il faudroit au moins la tenter sur les matières gypseuses dont la calcination doit être une fois plus prompte que celle des pierres calcaires (f).

(g) Il vient de paroître un petit Ouvrage rempli de grandes vues, de M. l'Abbé Scipion Bexon, qui a pour titre: *Système de la fertilisation*. Il propose mes miroirs comme un moyen facile pour réduire en chaux toutes les matières; mais il leur attribue

des M

En conce
dans un fou
ture que
lumière, on
la chaleur
avec les pie
de brasque
de toutes l
moins chère
mens suffir
de beaucoup
qui produi
prompte c
frais, comm
expérience
3.° Ces
servir en
voiles de
bois goud
distance;
contre ses
& les aut
cet effet,

plus de pu
ce n'est qu'e
les grands ef

des Minéraux, Partie Exp. 225

En concentrant cette chaleur du Soleil dans un four, qui n'auroit d'autre ouverture que celle qui laisseroit entrer la lumière, on empêcheroit en grande partie la chaleur de s'évaporer, & en mêlant avec les pierres calcaires une petite quantité de braique ou poudre de charbon qui de toutes les matières combustibles est la moins chère; cette légère quantité d'alimens suffiroit pour nourrir & augmenter de beaucoup la quantité de chaleur, ce qui produiroit une plus ample & plus prompte calcination, & à très-peu de frais, comme on l'a vu par la seconde expérience du quatrième Mémoire.

3.^o Ces miroirs d'Archimède peuvent servir en effet à mettre le feu dans des voiles de vaisseaux, & même dans le bois goudronné à plus de 150 pieds de distance; on pourroit s'en servir aussi contre ses ennemis en brûlant les blés & les autres productions de la terre; cet effet, qui seroit assez prompt, seroit

plus de puissance qu'ils n'en ont réellement, & ce n'est qu'en les multipliant qu'on pourroit obtenir les grands effets qu'il s'en promet.

très-dommageable, mais ne nous occupons pas des moyens de faire du mal, & ne pensons qu'à ceux qui peuvent procurer quelque bien à l'humanité.

4.^o Ces miroirs fournissent le seul & unique moyen qu'il y ait de mesurer exactement la chaleur, il est évident que deux miroirs dont les images lumineuses se réunissent, produisent une chaleur double dans tous les points de la surface qu'elles occupent; que trois, quatre, cinq, &c. miroirs donneront de même une chaleur triple, quadruple, quintuple, &c. & que par conséquent on peut par ce moyen faire un thermomètre dont les divisions ne seront point arbitraires, & ses échelles différentes, comme le sont celles de tous les thermomètres dont on s'est servi jusqu'à ce jour. La seule chose arbitraire qui entreroit dans la construction de ce thermomètre, seroit la supposition du nombre total des parties du mercure en partant du degré du froid absolu; mais en le prenant à 10000 au-dessous de la congélation de l'eau, au lieu de 1000, comme dans nos thermomètres ordinaires, on approcheroit beaucoup de

la réalité, sur-tout de l'hiver les plu thermomètre; lui donneroit un de la température à celui de la g s'éleveroit le me la première imag qué 1. Le point chaleur de deux i sera marqué 2. C feront monter, de suite jusqu'à qu'on pourroit ét On auroit à ce de chaleur trente celle du premier grande que celle plus grande que fois plus grande &c. cette augm au-dessus de cell grande pour fo toute apparence volatilise à une feroit, par sa vap On ne pourra

des Minéraux, Partie Exp. 227

la réalité, sur-tout en choisissant les jours de l'hiver les plus froids pour graduer le thermomètre ; chaque image du Soleil lui donneroit un degré de chaleur au-dessus de la température que nous supposerons à celui de la glace. Le point auquel s'éleveroit le mercure par la chaleur de la première image du Soleil, seroit marqué 1. Le point où il s'éleveroit par la chaleur de deux images égales & réunies, sera marqué 2. Celui où trois images le feront monter, sera marqué 3, & ainsi de suite jusqu'à la plus grande hauteur qu'on pourroit étendre jusqu'au degré 36. On auroit à ce degré une augmentation de chaleur trente-six fois plus grande que celle du premier degré ; dix-huit fois plus grande que celle du second ; douze fois plus grande que celle du troisième ; neuf fois plus grande que celle du quatrième, &c. cette augmentation 36 de chaleur au-dessus de celle de la glace seroit assez grande pour fondre le plomb, & il y a toute apparence que le mercure qui se volatilise à une bien moindre chaleur, seroit, par sa vapeur, casser le thermomètre. On ne pourra donc étendre la division

que jusqu'à 12, & peut-être même à 9 degrés si l'on se sert du mercure pour ces thermomètres; & l'on n'aura par ce moyen que les degrés d'une augmentation de chaleur jusqu'à 9. C'est une des raisons qui avoit déterminé Newton à se servir d'huile de lin au lieu de mercure, & en effet on pourra, en se servant de cette liqueur, étendre la division non-seulement à 12 degrés, mais jusqu'au point de cette huile bouillante. Je ne propose pas de remplir ces thermomètres avec de l'esprit-de-vin coloré; il est universellement reconnu que cette liqueur se décompose au bout d'un assez petit temps (g), & que d'ailleurs elle ne peut servir aux expériences d'une chaleur un peu forte.

Lorsqu'on aura marqué sur l'échelle de ces thermomètres remplis d'huile ou de mercure, les premières divisions 1, 2, 3, 4, &c. qui indiqueront le double,

(g) Plusieurs Voyageurs m'ont écrit que les Thermomètres à l'esprit-de-vin de Réaumur, leur étoient devenus tout-à-fait inutiles, parce que cette liqueur se décolore & se charge d'une espèce de boue en assez peu de temps.

le triple
tations
les part
par exe
&c. ou
 $1 \frac{3}{4}$, $2 \frac{3}{4}$
par un r
la moiti
de la su
car alo
contien
trois qu
l'image
divisions
exactes c

Si l'on
momètre
qu'il mar
de la ch
mètres,
& diffé
non-seu
nuisibles
des véri
leur moy
que j'en
mation d

des Minéraux, Partie Exp. 229

le triple, le quadruple, &c. des augmentations de la chaleur, il faudra chercher les parties aliquotes de chaque division: par exemple, les points de $1 \frac{1}{4}$, $2 \frac{1}{4}$, $3 \frac{1}{4}$, &c. ou de $1 \frac{1}{2}$, $2 \frac{1}{2}$, $3 \frac{1}{2}$, &c. & de $1 \frac{3}{4}$, $2 \frac{3}{4}$, $3 \frac{3}{4}$, &c. ce que l'on obtiendra par un moyen facile, qui sera de couvrir la moitié, ou le quart, ou les trois quarts de la superficie d'un des petits miroirs, car alors l'image qu'il réfléchira, ne contiendra que le quart, la moitié ou les trois quarts de la chaleur que contient l'image entière; & par conséquent les divisions des parties aliquotes seront aussi exactes que celles des nombres entiers.

Si l'on réussit une fois à faire ce thermomètre réel, & que j'appelle ainsi, parce qu'il marquerait réellement la proportion de la chaleur, tous les autres thermomètres, dont les échelles sont arbitraires & différentes entr'elles, deviendroient non-seulement superflus, mais même nuisibles, dans bien des cas, à la précision des vérités physiques qu'on cherche par leur moyen. On peut se rappeler l'exemple que j'en ai donné, en parlant de l'estimation de la chaleur qui émane du globe

230 *Introduction à l'Histoire*

de la Terre, comparée à la chaleur qui nous vient du Soleil.

5.° Au moyen de ces miroirs brisés, on pourra aisément recueillir dans leur entière pureté, les parties volatiles de l'or & de l'argent, & des autres métaux & minéraux; car en exposant au large foyer de ces miroirs une grande plaque de métal, comme une assiette ou un plat d'argent, on en verra sortir une fumée très-abondante pendant un temps considérable, jusqu'au moment où le métal tombe en fusion, & en ne donnant qu'une chaleur un peu moindre que celle qu'exige la fusion, on fera évaporer le métal au point d'en diminuer le poids assez considérablement. Je me suis assuré de ce premier fait, qui peut fournir des lumières sur la composition intime des métaux: j'aurois bien désiré recueillir cette vapeur abondante que le feu pur du Soleil fait sortir du métal; mais je n'avois pas les instrumens nécessaires, & je ne puis que recommander aux Chymistes & aux Physiciens, de suivre cette expérience importante; dont les résultats seroient d'autant moins équivoques que la vapeur métallique

d
est ici
opéra
avec
lique
vapeur
tibles
D'a
seul q
métaux
car je
vu s'é
métaux
miroir
liqueur
que la
lisant.
vapeur
mêler
des all
qu'on
mixtion
qui ne
cause
spécific
rances
l'égalité
les pa

des Minéraux, Partie Exp. 231

est ici très-pure; au lieu que, dans toute opération semblable qu'on voudroit faire avec le feu commun, la vapeur métallique seroit nécessairement mêlée d'autres vapeurs provenant des matières combustibles qui servent d'aliment à ce feu.

D'ailleurs ce moyen est peut-être le seul que nous ayons pour volatiliser les métaux fixes, tels que l'or & l'argent; car je présume que cette vapeur, que j'ai vu s'élever en si grande quantité de ces métaux échauffés au large foyer de mon miroir, n'est pas de l'eau ni quelque autre liqueur, mais des parties mêmes du métal que la chaleur en détache en les volatilisant. On pourroit en recevant ainsi les vapeurs pures des différens métaux les mêler ensemble, & faire par ce moyen des alliages plus intimes & plus purs qu'on ne l'a fait par la fusion & par la mixtion de ces mêmes métaux fondus, qui ne se marient jamais parfaitement à cause de l'inégalité de leur pesanteur spécifique, & de plusieurs autres circonstances qui s'opposent à l'intimité & à l'égalité parfaite du mélange. Comme les parties constituantes de ces vapeurs

métalliques sont dans un état de division bien plus grande que dans l'état de fusion, elles se joindroient & se réuniroient de bien plus près & plus facilement. Enfin on arriveroit peut-être par ce moyen à la connoissance d'un fait général, & que plusieurs bonnes raisons me font soupçonner depuis long-temps, c'est qu'il y auroit pénétration dans tous les alliages faits de cette manière, & que leur pesanteur spécifique seroit toujours plus grande que la somme des pesanteurs spécifiques des matières dont ils seroient composés; car la pénétration n'est qu'un degré plus grand d'intimité, & l'intimité, toutes choses égales d'ailleurs, sera d'autant plus grande que les matières seront dans un état de division plus parfaite.

En réfléchissant sur l'appareil des vaisseaux qu'il faudroit employer pour recevoir & recueillir ces vapeurs métalliques, il m'est venu une idée qui me paroît trop utile pour ne la pas publier; elle est aussi trop aisée à réaliser, pour que les bons Chymistes ne la faussent pas. Je l'ai même communiqué à quelques-uns d'entr'eux qui m'en ont paru très-satisfaits.

Cette ic
ce clima
beaucou
riences
ne faut
du mer
volatilif
dans un
auquel
froid an
c'est-à-d
l'action
& des
187 deg
le merc
peut-êtr
être mêm
Je reco
tante à
foi à l'a
Je po
cipaux
autres
devoir
les plu
réduire
devoir

des Minéraux, Partie Exp. 233

Cette idée est de geler le mercure dans ce climat-ci & avec un degré de froid beaucoup moindre que celui des expériences de Pétersbourg ou de Sibérie : il ne faut pour cela que recevoir la vapeur du mercure, qui est le mercure même volatilisé par une très-médiocre chaleur dans une cucurbite, ou dans un vase auquel on donnera un certain degré de froid artificiel ; ce mercure en vapeur, c'est-à-dire, extrêmement divisé, offrira à l'action de ce froid des surfaces si grandes & des masses si petites, qu'au lieu de 187 degrés de froid qu'il faut pour geler le mercure en masse, il n'en faudroit peut-être que 18 ou 20 degrés, peut-être même moins pour le geler en vapeurs. Je recommande cette expérience importante à tous ceux qui travaillent de bonne foi à l'avancement des Sciences.

Je pourrois ajouter à ces usages principaux du miroir d'Archimède, plusieurs autres usages particuliers ; mais j'ai cru devoir me borner à ceux qui m'ont paru les plus utiles & les moins difficiles à réduire en pratique. Néanmoins je crois devoir joindre ici quelques expériences

234 Introduction à l'Histoire

que j'ai faites sur la transmission de la lumière à travers les corps transparens, & donner en même temps quelques idées nouvelles sur les moyens d'apercevoir de loin les objets à l'œil simple, ou par le moyen d'un miroir semblable à celui dont les Anciens ont parlé, par l'effet duquel on apercevoit du port d'Alexandrie les vaisseaux d'aussi loin que la courbure de la Terre pouvoit le permettre.

Tous les Physiciens savent aujourd'hui qu'il y a trois causes qui empêchent la lumière de se réunir dans un point lorsque ses rayons ont traversé le verre objectif d'une lunette ordinaire. La première, est la courbure sphérique de ce verre qui répand une partie des rayons dans un espace terminé par une courbe. La seconde, est l'angle sous lequel nous paroît à l'œil simple l'objet que nous observons; car la largeur du foyer de l'objectif a toujours à très-peu-près pour diamètre une ligne égale à la corde de l'arc qui mesure cet angle. La troisième, est la différente réfrangibilité de la lumière; car les rayons les plus réfrangibles ne se rassemblent pas dans le même lieu où

des M

se rassemblent
gibles.

On peut
cause, en
l'a propo
hyperboli
remédie
moyen d'
de l'objec
près éga
& dont l
sphère
trouvé de
à la tro
qu'on ap
composé
dispersen
de manie
corrigée
que la ré
constitue
lunette d
ce princi
ciennes
Au r
première
inutile j

des Minéraux, Partie Exp. 235

se rassemblent les rayons les moins réfrangibles.

On peut remédier à l'effet de la première cause, en substituant, comme Descartes l'a proposé, des verres elliptiques ou hyperboliques aux verres sphériques. On remédie à l'effet de la seconde par le moyen d'un second verre placé au foyer de l'objectif, dont le diamètre est à peu près égal à la largeur de ce foyer, & dont la surface est travaillée sur une sphère d'un rayon fort court. On a trouvé de nos jours le moyen de remédier à la troisième, en faisant des lunettes qu'on appelle *achromatiques*, & qui sont composées de deux sortes de verres qui dispersent différemment les rayons colorés, de manière que la dispersion de l'un est corrigée par la dispersion de l'autre, sans que la réfraction générale moyenne, qui constitue la lunette, soit anéantie. Une lunette de 3 pieds $\frac{1}{2}$ de longueur faite sur ce principe, équivaut pour l'effet aux anciennes lunettes de 25 pieds de longueur.

Au reste, le remède à l'effet de la première cause, est demeuré tout-à-fait inutile jusqu'à ce jour, parce que l'effet

236 Introduction à l'Histoire

de la dernière étant beaucoup plus considérable, influe si fort sur l'effet total qu'on ne pouvoit rien gagner à substituer des verres hyperboliques ou elliptiques à des verres sphériques, & que cette substitution ne pouvoit devenir avantageuse que dans le cas où l'on pourroit trouver le moyen de corriger l'effet de la différente réfrangibilité des rayons de la lumière; il semble donc qu'aujourd'hui l'on feroit bien de combiner les deux moyens, & de substituer dans les lunettes achromatiques des verres elliptiques aux sphériques.

Pour rendre ceci plus sensible, supposons que l'objet qu'on observe soit un point lumineux sans étendue, telle qu'est une étoile fixe par rapport à nous; il est certain qu'avec un objectif, par exemple, de 30 pieds de foyer, toutes les images de ce point lumineux, s'étendront en forme de courbe au foyer de ce verre s'il est travaillé sur une sphère, & qu'au contraire elles se réuniront en un point si ce verre est hyperbolique; mais si l'objet qu'on observe a une certaine étendue, comme la Lune qui occupe environ un demi-degré d'espace à nos yeux, alors

des I

l'image
d'environ
foyer de
ration ca
une cour
quelconq
tous les
Lune, &
entier. Il
beaucoup
elliptiqu
longues
moyen
mauvais
réfrangib

Il suit
que si l'o
pieds po
entier,
moins 3
l'image
foyer, &
astre av
l'oculaire
de diam
qui mes
la Lune

des Minéraux, Partie Exp. 237

l'image de cet objet occupera un espace d'environ trois pouces de diamètre au foyer de l'objectif de 30 pieds, & l'aberration causée par la sphéricité produisant une confusion dans un point lumineux quelconque, elle la produit de même sur tous les points lumineux du disque de la Lune, & par conséquent la défigure en entier. Il y auroit donc, dans tous les cas, beaucoup d'avantage à se servir de verres elliptiques ou hyperboliques pour de longues lunettes, puisqu'on a trouvé le moyen de corriger en grande partie le mauvais effet produit par la différente réfrangibilité des rayons.

Il suit de ce que nous venons de dire, que si l'on veut faire une lunette de 30 pieds pour observer la lune & la voir en entier, le verre oculaire doit avoir au moins 3 pouces de diamètre pour recueillir l'image entière que produit l'objectif à son foyer, & que si on vouloit observer cet astre avec une lunette de 60 pieds, l'oculaire doit avoir au moins six pouces de diamètre, parce que la corde de l'arc qui mesure l'angle sous lequel nous paroît la Lune, est dans ce cas de trois pouces

& de six pouces à peu-près; aussi les Astronomes ne font jamais usage de lunettes qui renferment le disque entier de la Lune, parce qu'elles grossiroient trop peu: mais si on veut observer Vénus avec une lunette de 60 pieds, comme l'angle sous lequel elle nous paroît n'est que d'environ 60 secondes, le verre oculaire pourra n'avoir que 4 lignes de diamètre, & si on se sert d'un objectif de 120 pieds, un oculaire de 8 lignes de diamètre suffiroit pour réunir l'image entière que l'objectif forme à son foyer.

De-là on voit que quand même les rayons de lumière seroient également réfrangibles, on ne pourroit pas faire d'aussi fortes lunettes pour voir la Lune en entier que pour voir les autres planètes, & que plus une planète est petite à nos yeux, & plus nous pouvons augmenter la longueur de la lunette avec laquelle on peut la voir en entier. Dès-lors on conçoit bien que, dans cette même supposition des rayons également réfrangibles, il doit y avoir une certaine longueur déterminée plus avantageuse qu'aucune autre pour telle ou telle planète, & que

des

cette l
non-seu
planète
de la q
éclairée.

Dans
de la lu
gibles, t
cette vue
pas fort
quelqu'a
l'objet o
ver, & q
puisse av
bleront
plus la lu
d'interva
rouges &
conséque
l'objet o

On n
lunettes
comme
cet effet d
composé

(h) C


cette longueur de la lunette dépend non-seulement de l'angle sous lequel la planète paroît à notre œil, mais encore de la quantité de lumière dont elle est éclairée.



Dans les lunettes ordinaires, les rayons de la lumière étant différemment réfrangibles, tout ce qu'on pourroit faire dans cette vue pour les perfectionner ne seroit pas fort avantageux, parce que, sous quelque angle que parvienne à notre œil l'objet ou l'astre que nous voulons observer, & quelque intensité de lumière qu'il puisse avoir, les rayons ne se rassembleront jamais dans le même endroit; plus la lunette sera longue, plus il y aura d'intervalle (*h*) entre le foyer des rayons rouges & celui des rayons violets, & par conséquent plus sera confuse l'image de l'objet observé.

On ne peut donc perfectionner les lunettes par réfraction qu'en cherchant, comme on l'a fait, les moyens de corriger cet effet de la différente réfrangibilité, soit en composant la lunette de verres de différente





(*h*) Cet intervalle est d'un pied sur 27 de foyer.







**IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)**



**Photographic
Sciences
Corporation**

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

2.8
3.2
3.6
4.0
4.5
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10.0
11.2
12.5
14.0
16.0
18.0
20.0
22.5
25.0

2.8
3.2
3.6
4.0
4.5
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10.0
11.2
12.5
14.0
16.0
18.0
20.0
22.5
25.0

densité, soit par d'autres moyens particuliers, & qui seroient différens selon les différens objets & les différentes circonstances : supposons, par exemple, une courte lunette composée de deux verres, l'un convexe & l'autre concave des deux côtés, il est certain que cette lunette peut se réduire à une autre, dont les deux verres soient plans d'un côté, & travaillés de l'autre côté sur des sphères dont le rayon seroit une fois plus court que celui des sphères sur lesquelles auroient été travaillés les verres de la première lunette. Maintenant, pour éviter une grande partie de l'effet de la différente réfrangibilité des rayons, on peut faire cette seconde lunette d'une seule pièce de verre massif, comme je l'ai fait exécuter avec deux morceaux de verre blanc, l'un de deux pouces & demi de longueur, & l'autre d'un pouce & demi; mais alors la perte de la transparence est un plus grand inconvénient que celui de la différente réfrangibilité qu'on corrige par ce moyen; car ces deux petites lunettes massives de verre, sont plus obscures qu'une petite lunette ordinaire du même verre & des mêmes dimensions, elles

des

elles de
mais ell
on les f
verre m
cette ép
de force
à notre c
de 10 ou
qui ait a
passer la
dans cert
donc de
entre l'ob
en partie
gibilité (

(i) M.
Astronome
voulu me
m'ont paru
je ne suis
remplies d
la différente
rayons color
qu'il y auro
& d'autres
le moins
densité de
leur puissance
Supplé

des Minéraux, Partie Exp. 241

elles donnent à la vérité moins d'iris, mais elles n'en sont pas meilleures ; & si on les faisoit plus longues, toujours en verre massif, la lumière, après avoir traversé cette épaisseur de verre, n'auroit plus assez de force pour peindre l'image de l'objet à notre œil. Ainsi, pour faire des lunettes de 10 ou 20 pieds, je ne vois que l'eau qui ait assez de transparence pour laisser passer la lumière sans l'éteindre en entier dans cette grande épaisseur : en employant donc de l'eau pour remplir l'intervalle entre l'objectif & l'oculaire, on diminuera en partie l'effet de la différente réfrangibilité (i), parce que celle de l'eau

(i) M. de la Lande, l'un de nos plus savans Astronomes, après avoir lu cet article, a bien voulu me communiquer quelques remarques qui m'ont paru très-justes & dont j'ai profité. Seulement je ne suis pas d'accord avec lui sur ces lunettes remplies d'eau ; il croit qu'on diminueroit très-peu la différente réfrangibilité, parce que l'eau disperse les rayons colorés d'une manière différente du verre, & qu'il y auroit des couleurs qui proviendroient de l'eau & d'autres du verre. Mais en se servant du verre le moins dense, & en augmentant par les sels la densité de l'eau, on rapprocheroit de très-près leur puissance réfractive.

Supplément, Tome II. L

242 Introduction à l'Histoire

approche plus de celle du verre que celle de l'air, & si on pouvoit, en chargeant l'eau de différens sels, lui donner le même degré de puissance réfringente qu'au verre, il n'est pas douteux qu'on ne corrigeât davantage, par ce moyen, l'effet de la différente réfrangibilité des rayons. Il s'agiroit donc d'employer une liqueur transparente qui auroit à-peu-près la même puissance réfrangible que le verre ; car alors il sera sûr que les deux verres avec cette liqueur entre-deux, corrigeront en partie l'effet de la différente réfrangibilité des rayons, de la même façon qu'elle est corrigée dans la petite lunette massive dont je viens de parler.

Suivant les expériences de M. Bouguer, une ligne d'épaisseur de verre détruit $\frac{2}{7}$ de la lumière, & par conséquent la diminution s'en feroit dans la proportion suivante ;

Épaisl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes ;
 Dimin. $\frac{2}{7}$, $\frac{10}{49}$, $\frac{50}{343}$, $\frac{250}{2401}$, $\frac{1250}{16807}$, $\frac{6250}{117649}$, en
 sorte que, par la somme de ces six termes,
 on trouveroit que la lumière, qui passe à
 travers six lignes de verre, auroit déjà

de
 perdu
 de la l
 M. Bou
 peu tr
 ligne c
 de la l
 faites
 blanc,
 nuoit l
 riences
 que tou
 Dans
 murs é
 faire de
 allumer
 la cham
 de la bo
 éclairée.
 distance
 pression
 Holland
 & j'ai tro
 ce caract
 distance
 devant
 distance,
 d'une g

des Minéraux, Partie Exp. 243

perdu $\frac{102924}{117649}$, c'est-à-dire, environ le $\frac{10}{11}$ de la quantité. Mais il faut considérer que M. Bouguer s'est servi de verres bien peu transparens, puisqu'il a vu qu'une ligne d'épaisseur de ces verres détruisoit $\frac{2}{7}$ de la lumière. Par les expériences que j'ai faites sur différentes espèces de verre blanc, il m'a paru que la lumière diminueoit beaucoup moins. Voici ces expériences, qui sont assez faciles à faire, & que tout le monde est en état de répéter.

Dans une chambre obscure dont les murs étoient noircis, qui me servoit à faire des expériences d'Optique, j'ai fait allumer une bougie de cinq à la livre; la chambre étoit fort vaste & la lumière de la bougie étoit la seule dont elle fût éclairée. J'ai d'abord cherché à quelle distance je pouvois lire un caractère d'impression, tel que celui de la gazette de Hollande, à la lumière de cette bougie, & j'ai trouvé que je lisois assez facilement ce caractère à 24 pieds 4 pouces de distance de la bougie. Ensuite, ayant placé devant la bougie, à deux pouces de distance, un morceau de verre provenant d'une glace de Saint-Gobin, réduite à

244 Introduction à l'Histoire

une ligne d'épaisseur, j'ai trouvé que je lisois encore tout aussi facilement à 22 pieds 9 pouces, & en substituant à cette glace d'une ligne d'épaisseur un autre morceau de 2 lignes d'épaisseur & du même verre, j'ai lu aussi facilement à 21 pieds de distance de la bougie. Deux de ces mêmes glaces de 2 lignes d'épaisseur jointes l'une contre l'autre & mises devant la bougie, en ont diminué la lumière au point que je n'ai pu lire avec la même facilité qu'à 17 pieds $\frac{1}{2}$ de distance de la bougie. Et enfin avec trois glaces de 2 lignes d'épaisseur chacune, je n'ai lu qu'à la distance de quinze pieds. Or la lumière de la bougie diminuant comme le carré de la distance augmente, la diminution auroit été dans la progression suivante, s'il n'y avoit point eu de glaces interposées.

$24 \frac{1}{3}$.	$22 \frac{3}{4}$.	21.	$17 \frac{1}{2}$.	15. ou
$592 \frac{1}{9}$.	$517 \frac{9}{16}$.	441.	$306 \frac{1}{4}$.	225.

Donc les pertes de la lumière, par l'interposition des glaces, sont dans la progression suivante, $84 \frac{79}{144}$. 151. $285 \frac{7}{9}$. $367 \frac{1}{4}$.

D'où l'on doit conclure qu'une ligne

de

d'épai
lumièr
deux
 $\frac{151}{192}$, p
2 ligne

Con

celui c

je n'av

de ses

en me

je choi

égale,

de mêm

de la b

morcea

21 piec

posés &

pouvoi

trois m

comme

détermi

perte d

verre d

— 462

ne s'éloi

l'on doi

des Minéraux, Partie Exp. 245

d'épaisseur de ce verre, ne diminue la lumière que de $\frac{84}{592}$ ou d'environ $\frac{1}{7}$; que deux lignes d'épaisseur la diminuent de $\frac{151}{592}$, pas tout-à-fait de $\frac{1}{4}$; & trois glaces de 2 lignes de $\frac{167}{592}$, c'est-à-dire, moins de $\frac{2}{3}$.

Comme ce résultat est très-différent de celui de M. Bouguer, & que néanmoins je n'avois garde de douter de la vérité de ses expériences, je répétai les miennes en me servant de verre à vitre commun, je choisis des morceaux d'une épaisseur égale, de $\frac{3}{4}$ de ligne chacun. Ayant lu de même à 24 pieds 4 pouces de distance de la bougie, l'interposition d'un de ces morceaux de verre me fit rapprocher à 21 pieds $\frac{1}{2}$; avec deux morceaux interposés & appliqués l'un sur l'autre, je ne pouvois plus lire qu'à 18 pieds $\frac{1}{4}$, & avec trois morceaux à 16 pieds; ce qui, comme l'on voit, se rapproche de la détermination de M. Bouguer; car la perte de la lumière, en traversant ce verre de $\frac{3}{4}$ de ligne, étant ici de $592 \frac{1}{4}$ — $462 \frac{1}{4} = 130$, le résultat $\frac{130}{592 \frac{1}{4}}$ ou $\frac{65}{296}$, ne s'éloigne pas beaucoup de $\frac{1}{4}$, à quoi l'on doit réduire les $\frac{2}{7}$ donnés par M. Bou-

246 Introduction à l'Histoire

guer pour une ligne d'épaisseur, parce que mes verres n'avoient que $\frac{1}{4}$ de ligne, car $3 : 14 :: 65 : 303\frac{1}{3}$ terme qui ne diffère pas beaucoup de 296.

Mais avec du verre communément appelé verre de Bohème, j'ai trouvé, par les mêmes essais, que la lumière ne perdoit qu'un huitième en traversant une épaisseur d'une ligne, & qu'elle diminueoit dans la progression suivante.

Épais.	1,	2,	3,	4,	5,	6, ... n.
Dimin.	$\frac{1}{8}$	$\frac{7}{64}$	$\frac{49}{512}$	$\frac{343}{4096}$	$\frac{2401}{32768}$	$\frac{16807}{262164}$
	$\frac{0}{8}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{2}{512}$	$\frac{3}{4096}$	$\frac{4}{32768}$	$\frac{5}{262164}$
ou.		$\frac{7}{64}$	$\frac{7}{512}$	$\frac{7}{4096}$	$\frac{7}{32768}$	$\frac{7}{262164}$
		$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{5}{8}$

Prenant la somme de ces termes, on aura le total de la diminution de la lumière à travers une épaisseur de verre d'un nombre donné de lignes; par exemple, la somme des six premiers termes est $\frac{144425}{262164}$. Donc la lumière ne diminue que d'un peu plus de moitié en traversant une épaisseur de six lignes de verre de Bohème, & elle en perdrait encore moins, si au lieu de trois morceaux de deux lignes appliqués l'un sur l'autre, elle n'avoit à

des

traverse
d'épaisse

Avec
masse ép

perdoit
d'épaisse

glace de
d'épaisse

pourroit
de ce ve

comme

54 à 2
une fois

de très-
de 5 ou

verre.

Mais
peut en

est-il à
nient ne

qui résu
que je f

les deu
longues

forte q
qu'on n

sur-tou

des Minéraux, Partie Exp. 247

traverser qu'un seul morceau de six lignes d'épaisseur.

Avec le verre que j'ai fait fondre en masse épaisse, j'ai vu que la lumière ne perdoit pas plus à travers 4 pouces $\frac{1}{2}$ d'épaisseur de ce verre, qu'à travers une glace de Saint-Gobin de deux lignes $\frac{1}{2}$ d'épaisseur; il me semble donc qu'on pourroit en conclure que la transparence de ce verre étant à celle de cette glace, comme 4 pouces $\frac{1}{2}$ sont à 2 lignes $\frac{1}{2}$, ou 54 à 2 $\frac{1}{2}$, c'est-à-dire, plus de vingt-une fois plus grande, on pourroit faire de très-bonnes petites lunettes massives de 5 ou 6 pouces de longueur avec ce verre.

Mais pour des lunettes longues, on ne peut employer que de l'eau, & encore est-il à craindre que le même inconvénient ne subsiste, car quelle sera l'opacité qui résultera de cette quantité de liqueur que je suppose remplir l'intervalle entre les deux verres? Plus les lunettes seront longues & plus on perdra de lumière; en sorte qu'il paroît au premier coup d'œil qu'on ne peut pas se servir de ce moyen, sur-tout pour les lunettes un peu longues,

248 Introduction à l'Histoire

car, en suivant ce que dit M. Bouguer dans son Essai d'Optique, sur la gradation de la lumière, 9 pieds 7 pouces d'eau de mer, font diminuer la lumière dans le rapport de 14 à 5; ou, ce qui revient à peu-près au même, supposons que dix pieds d'épaisseur d'eau diminuent la lumière dans le rapport de 3 à 1; alors vingt pieds d'épaisseur d'eau la diminueront dans le rapport de 9 à 1; trente pieds la diminueront dans celui de 27 à 1, &c. Il paroît donc qu'on ne pourroit se servir de ces longues lunettes pleines d'eau que pour observer le Soleil, & que les autres astres n'auroient pas assez de lumière pour qu'il fût possible de les apercevoir à travers une épaisseur de 20 à 30 pieds de liqueur intermédiaire.

Cependant si l'on fait attention qu'en ne donnant qu'un pouce ou un pouce & demi d'ouverture à un objectif de 30 pieds, on ne laisse pas d'apercevoir très-nettement les planètes dans les lunettes ordinaires de cette longueur, on doit penser qu'en donnant un plus grand diamètre à l'objectif, on augmenteroit la quantité de lumière dans la raison du

des

quarré de
si un po
distincte
ordinaire
à-dire
suffiron
tement
d'eau; &
de diam
travers
qu'avec
de diam
épaisseur
qu'un v
une lun
& un v
de 60

Il se
espéran
lunette
tant le
en part
défaut

On r
quelqu
trop gr
ils sero

des Minéraux, Partie Exp. 249

quarré de ce diamètre, & par conséquent si un pouce d'ouverture suffit pour voir distinctement un astre dans une lunette ordinaire, $\sqrt{3}$ pouces d'ouverture, c'est-à-dire 21 lignes environ de diamètre suffiront pour qu'on le voie aussi distinctement à travers une épaisseur de dix pieds d'eau; & qu'avec un verre de 3. pouces de diamètre, on le verroit également à travers une épaisseur de 20 pieds d'eau; qu'avec un verre $\sqrt{27}$ ou 5. pouces $\frac{1}{4}$ de diamètre, on le verroit à travers une épaisseur de 30 pieds, & qu'il ne faudroit qu'un verre de 9. pouces de diamètre pour une lunette remplie de 40. pieds d'eau, & un verre de 27. pouces pour une lunette de 60. pieds.

Il semble donc qu'on pourroit, avec espérance de réussir, faire construire une lunette sur ces principes; car, en augmentant le diamètre de l'objectif, on regagne en partie la lumière que l'on perd par le défaut de transparence de la liqueur.

On ne doit pas craindre que les objectifs, quelque grands qu'ils soient, fassent une trop grande partie de la sphère sur laquelle ils seront travaillés, & que par cette raison

250 Introduction à l'Histoire

les rayons de la lumière ne puissent se réunir exactement ; car, en supposant même ces objectifs sept ou huit fois plus grands que je ne les ai déterminés, ils ne feroient pas encore à beaucoup près une assez grande partie de leur sphère pour ne pas réunir les rayons avec exactitude.

Mais ce qui ne me paroît pas douteux, c'est qu'une lunette construite de cette façon seroit très-utile pour observer le Soleil ; car, en la supposant même longue de cent pieds, la lumière de cet astre ne seroit encore que trop forte, après avoir traversé cette épaisseur d'eau, & on observeroit à loisir & aisément la surface de cet astre immédiatement, sans qu'il fût nécessaire de se servir de verres enfumés ou d'en recevoir l'image sur un carton, avantage qu'aucune autre espèce de lunette ne peut avoir.

Il y auroit seulement quelque petite différence dans la construction de cette lunette solaire, si l'on veut qu'elle nous présente la face entière du Soleil, car en la supposant longue de cent pieds, il faudra dans ce cas que le verre oculaire ait au moins dix pouces de diamètre,

des

parce
demi-
l'object
au moir
& que,
faudra u
on ne
foyer p
pourro
ainsi qu
diamètre
l'image
trouvass

Quand
pose ne
le Soleil
seroit,
pouvoir
des part
d'autres
galités,
si les ta

(k) M
qui suit :
le Soleil
& disparo
point de

des Minéraux, Partie Exp. 251

parce que le Soleil occupant plus d'un demi-degré céleste, l'image formée par l'objectif à son foyer à 100 pieds, aura au moins cette longueur de dix pouces, & que, pour la réunir toute entière, il faudra un oculaire de cette largeur auquel on ne donneroit que vingt pouces de foyer pour le rendre aussi fort qu'il se pourroit. Il faudroit aussi que l'objectif, ainsi que l'oculaire, eût dix pouces de diamètre, afin que l'image de l'astre & l'image de l'ouverture de la lunette se trouvassent d'égale grandeur au foyer.

Quand même cette lunette que je propose ne serviroit qu'à observer exactement le Soleil, ce seroit déjà beaucoup; il seroit, par exemple, fort curieux de pouvoir reconnoître s'il y a dans cet astre des parties plus ou moins lumineuses que d'autres, s'il y a sur sa surface des inégalités, & de quelle espèce elles seroient, si les taches flottent sur sa surface (k).

(k) M. de la Lande m'a fait sur ceci la remarque qui suit: « Il est constant, dit-il, qu'il n'y a sur le Soleil que des taches qui changent de forme & disparoissent entièrement; mais qui ne changent point de place, si ce n'est par la rotation du »

252 Introduction à l'Histoire

ou si elles y sont toutes constamment attachées, &c. La vivacité de sa lumière nous empêche de l'observer à l'œil simple, & la différente réfrangibilité de ses rayons rend son image confuse lorsqu'on la reçoit au foyer d'un objectif sur un carton; aussi la surface du Soleil nous est-elle moins connue que celle des autres planètes. Cette différente réfrangibilité des rayons ne seroit pas à beaucoup près entièrement corrigée dans cette longue lunette remplie d'eau: mais si cette liqueur pouvoit, par l'addition des sels, être rendue aussi dense que le verre, ce seroit alors la même chose que s'il n'y avoit qu'un seul verre à traverser, & il me semble qu'il y auroit plus d'avantage à se servir de ces lunettes remplies d'eau, que de lunettes ordinaires avec des verres enfumés.

Soleil; sa surface est très-unie & homogène. » Ce savant Astronome pouvoit même ajouter que ce n'est que par le moyen de ces taches, toujours supposées fixes, qu'on a déterminé le temps de la révolution du Soleil sur son axe: mais ce point d'Astronomie physique ne me paroît pas encore absolument démontré; car ces taches, qui toutes changent de figure, pourroient bien aussi quelquefois changer de lieu.

de.

Quo
fait, po
bien d
servir p
très-ces
une lun
à leur
à la qu
nous p
lunette
grand,
possibl
la dist
lumière
Vénus.
la lumi
observ
mente
les voi
planète
d'autan
ainsi, &
on la
propo
Saturn
être ob
que V

des Minéraux, Partie Exp. 253

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il faut, pour observer le Soleil, une lunette bien différente de celles dont on doit se servir pour les autres astres, & il est encore très-certain qu'il faut, pour chaque planète, une lunette particulière, & proportionnée à leur intensité de lumière, c'est-à-dire, à la quantité réelle de lumière dont elles nous paroissent éclairées. Dans toutes les lunettes, il faudroit donc l'objectif aussi grand, & l'oculaire aussi fort qu'il est possible, & en même temps proportionner la distance du foyer à l'intensité de la lumière de chaque planète. Par exemple, Vénus & Saturne sont deux planètes dont la lumière est fort différente; lorsqu'on les observe avec la même lunette on augmente également l'angle sous lequel on les voit, dès-lors la lumière totale de la planète paroît s'étendre sur toute sa surface d'autant plus qu'on la grossit davantage; ainsi, à mesure qu'on agrandit son image on la rend sombre, à peu-près dans la proportion du quarré de son diamètre; Saturne ne peut donc sans devenir obscur être observé avec une lunette aussi forte que Vénus. Si l'intensité de lumière de

celle-ci permet de la grossir cent ou deux cens fois avant de devenir sombre, l'autre ne souffrira peut-être pas la moitié ou le tiers de cette augmentation sans devenir tout-à-fait obscure. Il s'agit donc de faire une lunette pour chaque planète proportionnée à leur intensité de lumière, & pour le faire avec plus d'avantage il me semble qu'il n'y faut employer qu'un objectif d'autant plus grand, & d'un foyer d'autant moins long que la planète a moins de lumière. Pourquoi jusqu'à ce jour n'a-t-on pas fait des objectifs de deux & trois pieds de diamètre? l'aberration des rayons causée par la sphéricité des verres en est la seule cause, elle produit une confusion, qui est comme le quarté du diamètre de l'ouverture (1), & c'est par cette raison que les verres sphériques, qui sont très-bons avec une petite ouverture, ne valent plus rien quand on l'augmente; on a plus de lumière, mais moins de distinction & de netteté. Néanmoins les verres sphériques larges sont très-bons pour faire des lunettes de nuit; les Anglois ont construit des

(1) *Smith's Optick. Boock. 2, cap. 111, art. 346.*

lunettes
avec gra
loin les
Mais ma
grande
réfrangib
qu'il faut
elliptiqu
duiroien
la sphéri
roient ê
que les
ce moy
quantité
planètes
sur les p
comme
nous ob
faut au
geusem
de lumi
recevan
se pour
ne sero
verre
tionné
grande

des Minéraux, Partie Exp. 255

lunettes de cette espèce, & ils s'en servent avec grand avantage pour voir de fort loin les vaisseaux dans une nuit obscure. Mais maintenant que l'on fait corriger en grande partie les effets de la différente réfrangibilité des rayons, il me semble qu'il faudroit s'attacher à faire des verres elliptiques ou hyperboliques, qui ne produiroient pas cette aberration causée par la sphéricité, & qui par conséquent pourroient être trois ou quatre fois plus larges que les verres sphériques. Il n'y a que ce moyen d'augmenter à nos yeux la quantité de lumière que nous envoient les planètes, car nous ne pouvons pas porter sur les planètes une lumière additionnelle comme nous le faisons sur les objets que nous observons au microscope, mais il faut au moins employer le plus avantageusement qu'il est possible, la quantité de lumière dont elles sont éclairées, en la recevant sur une surface aussi grande qu'il se pourra. Cette lunette hyperbolique, qui ne seroit composée que d'un seul grand verre objectif, & d'un oculaire proportionné, exigeroit une matière de la plus grande transparence. On réuniroit par ce

256 Introduction à l'Histoire

moyen tous les avantages possibles, c'est-à-dire, ceux des lunettes achromatiques à celui des lunettes elliptiques ou hyperboliques, & l'on mettroit à profit toute la quantité de lumière que chaque planète réfléchit à nos yeux. Je puis me tromper, mais ce que je propose me paroît assez fondé pour en recommander l'exécution aux personnes zélées pour l'avancement des Sciences.

Me laissant aller à ces espèces de rêveries, dont quelques-unes néanmoins se réaliseront un jour, & que je ne publie que dans cette espérance, j'ai songé au miroir du port d'Alexandrie, dont quelques Auteurs anciens ont parlé, & par le moyen duquel on voyoit de très-loin les vaisseaux en pleine mer. Le passage le plus positif, qui me soit tombé sous les yeux, est celui que je vais rapporter : *Alexandria. . . . in Pharo verò erat speculum è ferro sinico. Per quod à longè videbantur naves Græcorum advenientes; sed paulò postquam Islamismus invaluit, scilicet tempore califatùs Walid-fil : Abdi-l-melec, Christiani, fraude adhibitâ illud deleverunt. Abu-l-feda, &c. Descriptio Ægypti.*

des

J'ai
on voy
n'étoit
miroir
certaine
effet, &
peur-ét
la Terr
lès per
çoivent
plus de
diamètr
remarq
nuisoit
qu'on a
neux d
plus de
le jour.
puits tr
plein jo
on pas
rayons

(m) A
fait ment
passage à
cette Hist

des Minéraux, Partie Exp. 257

J'ai pensé 1.^o que ce miroir par lequel on voyoit de loin les vaisseaux arriver, n'étoit pas impossible ; 2.^o que même, sans miroir ni lunette, on pourroit par de certaines dispositions obtenir le même effet, & voir depuis le port les vaisseaux peut-être d'aussi loin que la courbure de la Terre le permet. Nous avons dit que les personnes qui ont bonne vue, aperçoivent les objets éclairés par le Soleil à plus de trois mille quatre cens fois leur diamètre, & en même temps nous avons remarqué que la lumière intermédiaire nuisoit si fort à celle des objets éloignés, qu'on apercevoit la nuit un objet lumineux de dix, vingt & peut-être cent fois plus de distance qu'on ne le voit pendant le jour. Nous savons que du fond d'un puits très-profond l'on voit les étoiles en plein jour (*m*), pourquoi donc ne verroit-on pas de même les vaisseaux éclairés des rayons du Soleil, en se mettant au fond

(*m*) Aristote est je crois le premier qui ait fait mention de cette observation, & j'en ai cité le passage à l'article *du Sens de la Vue*, tome IV de cette *Histoire Naturelle*.

258 *Introduction à l'Histoire*

d'une longue galerie fort obscure, & située sur le bord de la mer, de manière qu'elle ne recevoit aucune lumière que celle de la mer lointaine & des vaisseaux qui pourroient s'y trouver; cette galerie n'est qu'un puits horizontal qui feroit le même effet pour la vue des vaisseaux, que le puits vertical pour la vue des étoiles, & cela me paroît si simple, que je suis étonné qu'on n'y ait pas songé. Il me semble qu'en prenant, pour faire l'observation, les heures du jour où le Soleil seroit derrière la galerie, c'est-à-dire le temps où les vaisseaux seroient bien éclairés, on les verroit du fond de cette galerie obscure, dix fois au moins mieux qu'on ne peut les voir en pleine lumière. Or, comme nous l'avons dit, on distingue aisément un homme ou un cheval à une lieue de distance lorsqu'ils sont éclairés des rayons du Soleil; & en supprimant la lumière intermédiaire qui nous environne & offusque nos yeux, nous les verrions au moins dix fois plus loin, c'est-à-dire, à dix lieues: donc on verroit les vaisseaux qui sont beaucoup plus gros, d'aussi loin que la courbure

des

de la Te
instrume

Mais
grand d
conque,
noirci, f
près le
objectifs
foyer fer
probable
d'acier p
établi au

(n) La
ou 25-lieu
elle croît
pour 5 lie
c'est-à-dire
a plus de
vu de cin
mer; mais
du niveau
le corps en
& en s'é
apercevoir

(o) De
tout les Jap
grand & en
penser qu
acier poli.

des Minéraux, Partie Exp. 259

de la Terre le permettroit (*n*), sans autre instrument que nos yeux.

Mais un miroir concave d'un assez grand diamètre, & d'un foyer quelconque, placé au fond d'un long tuyau noirci, feroit, pendant le jour, à peu près le même effet que nos grands objectifs de même diamètre & de même foyer feroient pendant la nuit, & c'étoit probablement un de ces miroirs concaves d'acier poli (*à ferro sinico*) qu'on avoit établi au port d'Alexandrie (*o*), pour voir

(*n*) La courbure de la Terre pour un degré ou 25 lieues de 2283 toises, est de 2988 pieds; elle croît comme le quarré des distances; ainsi, pour 5 lieues elle est yingt-cinq fois moindre, c'est-à-dire, d'environ 120 pieds. Un vaisseau qui a plus de 120 pieds de mâture, peut donc être vu de cinq lieues étant même au niveau de la mer; mais si l'on s'élevoit de 120 pieds au-dessus du niveau de la mer, on verroit de cinq lieues le corps entier du vaisseau jusqu'à la ligne de l'eau, & en s'élevant encore davantage, on pourroit apercevoir le haut des mâts de plus de dix lieues.

(*o*) De temps immémorial les Chinois & sur tout les Japonois, savent travailler & polir l'acier en grand & en petit volume, & c'est ce qui m'a fait penser qu'on doit interpréter *à ferro sinica* par acier poli.

260 Introduction à l'Histoire

de loin arriver les vaisseaux Grecs. Au reste, si ce miroir d'acier ou de fer poli a réellement existé, comme il y a toute apparence, on ne peut refuser aux Anciens la gloire de la première invention des télescopes, car ce miroir de métal poli ne pouvoit avoir d'effet qu'autant que la lumière réfléchie par sa surface, étoit recueillie par un autre miroir concave placé à son foyer, & c'est en cela que consiste l'essence du télescope & la facilité de sa construction. Néanmoins cela n'ôte rien à la gloire du grand Newton, qui, le premier, a ressuscité cette invention entièrement oubliée. Il paroît même que ce sont ses belles découvertes, sur la différente réfrangibilité des rayons de la lumière, qui l'ont conduit à celle du télescope. Comme les rayons de la lumière sont par leur nature différemment réfrangibles, il étoit fondé à croire qu'il n'y avoit nul moyen de corriger cet effet; ou s'il a entrevu ces moyens, il les a jugés si difficiles, qu'il a mieux aimé tourner ses vues d'un autre côté, & produire par le moyen de la réflexion des rayons, les grands effets qu'il ne pouvoit obtenir par

des.

leur réfr
son télé
bien sup
naires,
inventée
rieures a
ordinaire
jours son
achroma
télescope
de poli
miroirs,
lumière
réfrangi
flexibles
moins in
fectionn
peuvent
compen
comme
la diffé
Après
crois qu
faire un
employe
ment en
nante, a

des Minéraux, Partie Exp. 261

leur réfraction. Il a donc fait construire son télescope, dont l'effet est réellement bien supérieur à celui des lunettes ordinaires, mais les lunettes achromatiques inventées de nos jours, sont aussi supérieures au télescope qu'il l'est aux lunettes ordinaires. Le meilleur télescope est toujours sombre en comparaison de la lunette achromatique, & cette obscurité dans les télescopes ne vient pas seulement du défaut de poli ou de la couleur du métal des miroirs, mais de la nature même de la lumière, dont les rayons différemment réfrangibles, sont aussi différemment réfléchibles, quoiqu'en degrés beaucoup moins inégaux. Il reste donc pour perfectionner les télescopes, autant qu'ils peuvent l'être, à trouver le moyen de compenser cette différente réflexibilité, comme l'on a trouvé celui de compenser la différente réfrangibilité.

Après tout ce qui vient d'être dit, je crois qu'on sentira bien que l'on peut faire une très-bonne lunette de jour, sans employer ni verres ni miroirs, & simplement en supprimant la lumière environnante, au moyen d'un tuyau de 150 qu

262 Introduction à l'Histoire

200 pieds de long, & en se plaçant dans un lieu obscur où aboutiroit l'une des extrémités de ce tuyau; plus la lumière du jour seroit vive, plus seroit grand l'effet de cette lunette si simple & si facile à exécuter. Je suis persuadé qu'on verroit distinctement à quinze & peut-être vingt lieues les bâtimens & les arbres sur le haut des montagnes. La seule différence qu'il y ait entre ce long tuyau & la galerie obscure que j'ai proposée, c'est que le *champ*; c'est-à-dire, l'espace vu seroit bien plus petit, & précisément dans la raison du quarré de l'ouverture du tuyau à celle de la galerie.

ARTICLE TROISIÈME.

INVENTION d'autres Miroirs pour brûler à de moindres distances.

I.

MIROIRS d'une seule pièce à foyer mobile.

J'AI REMARQUÉ que le verre fait ressort, & qu'il peut plier jusqu'à un certain point;

de.

&, com
peu g
courbu
y est à
j'ai im
miroir
deux p
les fair
un cer
après a
un trou
mètre p
pas for
petit éc
En serr
glaces
50 pie
18 pou
ayant r
j'ai cass
deux p
18 pou
de ce r

(p) V

(q) C
matières

des Minéraux, Partie Exp. 263

&, comme pour brûler à des distances un peu grandes, il ne faut qu'une légère courbure, & que toute courbure régulière y est à peu-près également convenable, j'ai imaginé de prendre des glaces de miroir ordinaire d'un pied & demi, de deux pieds & trois pieds de diamètre, de les faire arrondir, & de les soutenir sur un cercle de fer bien égal & bien tourné, après avoir fait dans le centre de la glace un trou de deux ou trois lignes de diamètre pour y passer une vis (*p*), dont les pas sont très-fins, & qui entre dans un petit écrou posé de l'autre côté de la glace. En serrant cette vis, j'ai courbé assez les glaces de trois pieds, pour brûler depuis 50 pieds jusqu'à 30, & les glaces de 18 pouces ont brûlé à 25 pieds; mais ayant répété plusieurs fois ces expériences, j'ai cassé les glaces de trois pieds & de deux pieds, & il ne m'en reste qu'une de 18 pouces que j'ai gardée pour modèle de ce miroir (*q*).

(*p*) Voyez les *planches x, xi & xii*.

(*q*) Ces glaces de 3 pieds ont mis le feu à des matières légères jusqu'à 50 pieds de distance, &

264 Introduction à l'Histoire

Ce qui fait casser ces glaces si aisément; c'est le trou qui est au milieu; elles se courberoient beaucoup plus sans rompre, s'il n'y avoit point de solution de continuité, & qu'on pût les presser également sur toute la surface : cela m'a conduit à imaginer de les faire courber par le poids même de l'atmosphère; & pour cela il ne faut que mettre une glace circulaire sur une espèce de tambour de fer ou de cuivre, & ajouter à ce tambour une pompe pour en tirer de l'air; on fera de cette manière courber la glace plus ou moins, & par conséquent elle brûlera à de plus & moins grandes distances.

Il y auroit encore un autre moyen; ce seroit d'ôter l'étamage dans le centre de la glace, de la largeur de 9 ou 10 lignes, façonner avec une molette cette partie du centre en portion de sphère, comme un verre convexe, d'un pouce de foyer, mettre dans le tambour une petite mèche

alors elles n'avoient plié que d'une ligne $\frac{1}{4}$; pour brûler à 40 pieds, il falloit les faire plier de 2 lignes; pour brûler à 30 pieds, de deux lignes $\frac{1}{4}$, & c'est en voulant les faire brûler à 20 pieds qu'elles se sont cassées.

souffrée;

des

souffrée
teroir
transm
de la g
allumen
tambou
beroit
de l'ath
ou mo
brûlero
miroir
courber
Soleil sa
mais l'u
pour ce
exécute
rable à

Ces
mobile,
exactem
la diffé
Soleil re
grands.
foyers f
beaucou
quoique
dans les

Supp

des Minéraux, Partie Exp. 265

souffrée; il arriveroit que quand on présenteroit ce miroir au Soleil, les rayons transmis à travers cette partie du centre de la glace & réunis au foyer d'un pouce, allumeroient la mèche souffrée dans le tambour; cette mèche en brûlant absorberoit de l'air, & par conséquent le poids de l'atmosphère feroit plier la glace plus ou moins, selon que la mèche souffrée brûleroit plus ou moins de temps. Ce miroir seroit fort singulier, parce qu'il se courberoit de lui-même à l'aspect du Soleil sans qu'il fût nécessaire d'y toucher; mais l'usage n'en seroit pas facile, & c'est pour cette raison que je ne l'ai pas fait exécuter, la seconde manière étant préférable à tous égards.

Ces miroirs d'une seule pièce à foyer mobile, peuvent servir à mesurer plus exactement, que par aucun autre moyen, la différence des effets de la chaleur du Soleil reçue dans des foyers plus ou moins grands. Nous avons vu que les grands foyers sont toujours proportionnellement beaucoup plus d'effet que les petits, quoique l'intensité de chaleur soit égale dans les uns & les autres; on auroit ici,

Supplément. Tome II. M

en contractant successivement les foyers, toujours une égale quantité de lumière ou de chaleur, mais dans des espaces successivement plus petits; & au moyen de cette quantité constante, on pourroit déterminer, par l'expérience, le *minimum* de l'espace du foyer, c'est-à-dire, l'étendue nécessaire, pour qu'avec la même quantité de lumière on eût le plus grand effet, cela nous conduiroit en même temps à une estimation plus précise de la déperdition de la chaleur dans les différentes substances, sous un même volume ou dans une égale étendue.

A cet usage près, il m'a paru que ces miroirs d'une seule pièce à foyer mobile étoient plus curieux qu'utiles; celui qui agit seul & se courbe à l'aspect du Soleil, est assez ingénieusement conçu pour avoir place dans un cabinet de Physique.

I I.

MIROIRS d'une seule pièce pour brûler très-vivement à des distances médiocres & à de petites distances.

J'AI CHERCHÉ les moyens de courber régulièrement de grandes glaces, & , après

avoir
rens
à en
j'ai co
circul
& den
courb
précau
refroid
56 &
les ma
en les
que j'a
la form
même
glaces
& je
46 po
gens q
pas sur
pièces
infinies
fourne
refroid
minces

des Minéraux, Partie Exp. 267

avoit fait construire deux fourneaux différens qui n'ont pas réussi, je suis parvenu à en faire un troisième (1), dans lequel j'ai courbé très-régulièrement des glaces circulaires de trois, quatre & quatre pieds & demi de diamètre, j'en ai même fait courber deux de 56 pouces, mais quelque précaution qu'on ait prise pour laisser refroidir lentement ces grandes glaces de 56 & 54 pouces de diamètre, & pour les manier doucement, elles se sont cassées en les appliquant sur les moules sphériques que j'avois fait construire pour leur donner la forme régulière & le poli nécessaire; la même chose est arrivée à trois autres glaces de 48 & 50 pouces de diamètre, & je n'en ai conservé qu'une seule de 46 pouces & deux de 37 pouces. Les gens qui connoissent les Arts n'en seront pas surpris, ils savent que les grandes pièces de verre, exigent des précautions infinies pour ne pas se fêler au sortir du fourneau où on les laisse recuire & refroidir, ils savent que plus elles sont minces, & plus elles sont sujettes à se

(1) Voyez les planches I, II, III, IV, V & VI.

263 *Introduction à l'Histoire*

fendre, non-seulement par le premier coup de l'air, mais encore par ses impressions ultérieures. J'ai vu plusieurs de mes glaces courbées se fendre toutes seules au bout de trois, quatre, & cinq mois, quoiqu'elles eussent résisté aux premières impressions de l'air, & qu'on les eût placées sur des moules de plâtre bien séché, sur lesquels la surface concave de ces glaces portoit également par-tout; mais ce qui m'en a fait perdre un grand nombre, c'est le travail qu'il falloit faire pour leur donner une forme régulière. Ces glaces que j'ai achetées toutes polies à la manufacture du fauxbourg Saint-Antoine, quoique choisies parmi les plus épaisses, n'avoient que cinq lignes d'épaisseur: en les courbant, le feu leur faisoit perdre en partie leur poli. Leur épaisseur d'ailleurs n'étoit pas bien égale par-tout, & néanmoins il étoit nécessaire, pour l'objet auquel je les destinois, de rendre les deux surfaces concave & convexe parfaitement concentriques, & par conséquent de les travailler avec des molettes convexes dans des moules creux, & des molettes concaves sur des moules convexes. De vingt-quatre

d
glace
avois
pour
je n'
autres
trois
soit a
De c
a 46
autres
vaillé
& pa
il ne s
leur f
plu sie
d'exp
M. de
que m
à mo
deux
neur
c'est-à
faire,
la for
aiséme
au cha
qui e

des Minéraux, Partie Exp. 269

glaces que j'avois courbées, & dont j'en avois livré quinze à feu M. Passemant ; pour les faire travailler par ses ouvriers, je n'en ai conservé que trois ; toutes les autres, dont les moindres avoient au moins trois pieds de diamètre, se sont cassées, soit avant d'être travaillées, soit après. De ces trois glaces que j'ai sauvées, l'une a 46 pouces de diamètre, & les deux autres 37 pouces, elles étoient bien travaillées, leurs surfaces bien concentriques, & par conséquent l'épaisseur bien égale, il ne s'agissoit plus que de les étamer sur leur surface convexe, & je fis pour cela plusieurs essais & un assez grand nombre d'expériences qui ne me réussirent point. M. de Bernières, beaucoup plus habile que moi dans cet art de l'étamage, vint à mon secours, & me rendit en effet deux de mes glaces étamées ; j'eus l'honneur d'en présenter au Roi la plus grande, c'est-à-dire, celle de 46 pouces, & de faire, devant Sa Majesté, les expériences de la force de ce miroir ardent qui fond aisément tous les métaux ; on l'a déposé au château de la Muette, dans un cabinet qui est sous la direction du Père Noël ;

c'est certainement le plus fort miroir ardent qu'il y ait en Europe (*f*). J'ai déposé au Jardin du Roi, dans le Cabinet d'Histoire Naturelle, la glace de 37 pouces de diamètre, dont le foyer est beaucoup plus court que celui du miroir de 46 pouces. Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer la force de ce second miroir que je crois aussi très-bon. Je fis dans le temps quelques expériences au château de la Muette, sur la lumière de la Lune, reçue par le miroir de 46 pouces, & réfléchie sur un thermomètre très-sensible, je crus d'abord m'apercevoir de quelque mouvement, mais cet effet ne se soutint pas, & depuis je n'ai pas eu occasion de répéter l'expérience. Je ne sais même si l'on obtiendrait un degré de chaleur sensible en réunissant les foyers de plusieurs miroirs, & les faisant tomber ensemble sur un thermomètre aplati & noirci; car il se peut que la Lune nous envoie du froid plutôt

(*f*) On m'a dit que l'étamage de ce miroir, qui a été fait il y a plus de vingt ans, s'étoit gâté, il faudroit le remettre entre les mains de M. de Bernières, qui seul a le secret de cet étamage, pour le bien réparer.

que du
ailleur
à tous
avoir
voir
disting
défauts
dans le
plus au
roient à
qui son
culaires
regard
Mais
commu
qui est
qu'on
foyer
pourt
une lon
suivies
les ray
de qu
d'autan
ces mir
pour qu
de la

des Minéraux, Partie Exp. 271

que du chaud, comme nous l'expliquerons ailleurs. Du reste ces miroirs sont supérieurs à tous les miroirs de réflexion dont on a une connoissance : ils servent aussi à voir en grand les petits tableaux, & à en distinguer toutes les beautés & tous les défauts, & si on en fait étamer de pareils dans leur concavité, ce qui seroit bien plus aisé que sur la convexité, ils serviroient à voir les plafonds & autres peintures qui sont trop grandes & trop perpendiculaires sur la tête, pour pouvoir être regardées aisément.

Mais ces miroirs ont l'inconvénient commun à tous les miroirs de ce genre, qui est de brûler en haut, ce qui fait qu'on ne peut travailler de suite à leur foyer, & qu'ils deviennent presque inutiles pour toutes les expériences qui demandent une longue action du feu & des opérations suivies. Néanmoins en recevant d'abord les rayons du Soleil sur une glace plane de quatre pieds & demi de hauteur & d'autant de largeur qui les réfléchit contre ces miroirs concaves, ils sont assez puissans pour que cette perte, qui est de la moitié de la chaleur, ne les empêche pas de

272 Introduction à l'Histoire

brûter très-vivement à leur foyer, qui par ce moyen se trouve en bas comme celui des miroirs de réfraction, & auquel par conséquent on pourroit travailler de suite & avec une égale facilité. Seulement il seroit nécessaire que la glace plane & le miroir concave, fussent tous deux montés parallèlement sur un même support, où ils pourroient recevoir également les mêmes mouvemens de direction & d'inclinaison, soit horizontalement, soit verticalement. L'effet que le miroir de 46 pouces de diamètre feroit en bas, n'étant que de moitié de celui qu'il produit en haut, c'est comme si la surface de ce miroir étoit réduite de moitié, c'est-à-dire, comme s'il n'avoit qu'un peu plus de 32 pouces de diamètre au lieu de 46, & cette dimension de 32 pouces de diamètre pour un foyer de 6 pieds, ne laisse pas de donner une chaleur plus grande que celle des lentilles de Tschirnaïs ou du sieur Segar, dont je me suis autrefois servi, & qui sont les meilleures que l'on connoisse.

Enfin, par la réunion de ces deux miroirs, on auroit aux rayons du Soleil une chaleur

de
imme
en le
dimin
en ba
beauc
chaleu
effets

LE

AU
travail
vité &
un mi
opposit
remplis
contien

Dan
glaces
ai fait
pour le
n'aura
l'eau de

Au
un pet

(t) v

des Minéraux, Partie Exp. 273

immense à leur foyer commun, sur-tout en le recevant en haut, qui ne seroit diminuée que de moitié en le recevant en bas, & qui par conséquent seroit beaucoup plus grande qu'aucune autre chaleur connue, & pourroit produire des effets dont nous n'avons aucune idée.

I I I.

LENTILLES ou Miroirs à l'eau.

AU MOYEN des glaces courbées & travaillées régulièrement dans leur concavité & sur leur convexité, on peut faire un miroir réfringent, en joignant par opposition deux de ces glaces, & en remplissant d'eau tout l'espace qu'elles contiennent.

Dans cette vue, j'ai fait courber deux glaces de 37 pouces de diamètre, & les ai fait user de 8 ou 9 lignes sur les bords pour les bien joindre. Par ce moyen, l'on n'aura pas besoin de mastic pour empêcher l'eau de fuir.

Au zénith du miroir il faut pratiquer un petit goulot (t), par lequel on en

(t) Voyez la planche. XII.

remplira la capacité avec un entonnoir ; & , comme les vapeurs de l'eau échauffée par le Soleil , pourroient faire casser les glaces , on laissera ce goulot ouvert pour laisser échapper les vapeurs ; & afin de tenir le miroir toujours absolument plein d'eau , on ajustera dans ce goulot une petite bouteille pleine d'eau , & cette bouteille finira elle-même en haut par un goulot étroit , afin que , dans les différentes inclinaisons du miroir , l'eau qu'elle contiendra ne puisse pas se répandre en trop grande quantité.

Cette lentille composée de deux glaces de 37 pouces , chacune de deux pieds & demi de foyer , brûleroit à cinq pieds , si elle étoit de verre ; mais l'eau ayant une moindre réfraction que le verre , le foyer sera plus éloigné ; il ne laissera pas néanmoins de brûler vivement : j'ai supputé qu'à la distance de 5 pieds $\frac{1}{2}$, cette lentille à l'eau produiroit au moins deux fois autant de chaleur que la lentille du Palais-royal , qui est de verre solide , & dont le foyer est à douze pieds.

J'avois conservé une assez forte épaisseur aux glaces , afin que le poids de l'eau

qu'elle
altère
de re
faisant
succes
s'en e
qu'elle
faudro
& on
de l'e
verre.
Tel
travail
celle d
expérie
qu'une
37 pou
précéd
Ces
sphériq
brûler
grands
massif,
aiséme
transpa
pas d'e
attentio

des Minéraux, Partie Exp. 275

qu'elles devoient renfermer ne pût en altérer la courbure: on pourroit essayer de rendre l'eau plus réfringente, en y faisant fondre des sels; comme l'eau peut successivement fondre plusieurs sels, & s'en charger en plus grande quantité qu'elle ne se chargeroit d'un seul sel, il faudroit en fondre de plusieurs espèces, & on rendroit par ce moyen la réfraction de l'eau plus approchante de celle du verre.

Tel étoit mon projet; mais, après avoir travaillé & ajusté ces glaces de 37 pouces, celle du dessous s'est cassée dès la première expérience, & comme il ne m'en restoit qu'une, j'en ai fait le miroir concave de 37 pouces dont j'ai parlé dans l'article précédent.

Ces loupes composées de deux glaces sphériquement courbées & remplies d'eau, brûleront en bas, & produiront de plus grands effets que les loupes de verre massif, parce que l'eau laisse passer plus aisément la lumière que le verre le plus transparent; mais l'exécution ne laisse pas d'en être difficile & demande des attentions infinies. L'expérience m'a fait

connoître qu'il falloit des glaces épaisses de neuf ou huit lignes au moins, c'est-à-dire, des glaces faites exprès, car on n'en coule point aux manufactures d'aussi épaisses à beaucoup près, toutes celles qui sont dans le commerce n'ont qu'environ moitié de cette épaisseur; il faut ensuite courber ces glaces dans un fourneau pareil à celui dont j'ai donné la figure, *pl. I & suivantes*; avoir attention de bien sécher le fourneau, de ne pas presser le feu & d'employer au moins trente heures à l'opération. La glace se ramollira & pliera par son poids sans se dissoudre, & s'affaîssera sur le moule concave qui lui donnera sa forme: on la laissera recuire & refroidir par degrés dans ce fourneau qu'on aura soin de boucher au moment qu'on aura vu la glace bien affaîssée par-tout également. Deux jours après, lorsque le fourneau aura perdu toute sa chaleur, on en tirera la glace, qui ne sera que légèrement dépolie, on examinera avec un grand compas courbe, si son épaisseur est à-peu-près égale par-tout, & si cela n'étoit pas, & qu'il y eût dans de certaines parties de la glace

une in
par l'a
sphère
contin
surface
rendre
sorte q
la mên
cette p
faire,
petites
diamèr
moules
lignes
grande
glaces
de mol
concav
beauco
en frô
s'usero
bure e
dire, d
glace,
tant au
concen
grande

des Minéraux, Partie Exp. 277

une inégalité sensible, on commencera par l'atténuer avec une molette de même sphère que la courbure de la glace. On continuera de travailler de même les deux surfaces concave & convexe, qu'il faut rendre parfaitement concentriques, en sorte que la glace ait par-tout exactement la même épaisseur. Et, pour parvenir à cette précision, qui est absolument nécessaire, il faudra faire courber de plus petites glaces de deux ou trois pieds de diamètre, en observant de faire ces petits moules sur un rayon de quatre ou cinq lignes plus long que ceux du foyer de la grande glace; par ce moyen, on aura des glaces courbées dont on se servira au lieu de molettes pour travailler les deux surfaces concave & convexe, ce qui avancera beaucoup le travail; car ces petites glaces en frottant contre la grande l'useront, & s'useront également; & comme leur courbure est plus forte de 4 lignes, c'est-à-dire, de moitié de l'épaisseur de la grande glace, le travail de ces petites glaces, tant au-dedans qu'au-dehors, rendra concentriques les deux surfaces de la grande glace aussi précisément qu'il est

278 Introduction à l'Histoire

possible. C'est-là le point le plus difficile, & j'ai souvent vu que, pour l'obtenir, on étoit obligé d'user la glace de plus d'une ligne & demie sur chaque surface, ce qui la rendoit trop mince, & dès-lors inutile, du moins pour notre objet. Ma glace de 37 pouces que le poids de l'eau joint à la chaleur du Soleil a fait casser, avoit néanmoins, toute travaillée, plus de 3 lignes & demie d'épaisseur, & c'est pour cela que je recommande de les tenir encore plus épaisses.

J'ai observé que ces glaces courbées sont plus cassantes que les glaces ordinaires; la seconde fusion ou demi-fusion que le verre éprouve pour se courber, est peut-être la cause de cet effet, d'autant que, pour prendre la forme sphérique, il est nécessaire qu'il s'étende inégalement dans chacune de ses parties, & que leur adhérence entr'elles change dans des proportions inégales, & même différentes pour chaque point de la courbe, relativement au plan horizontal de la glace qui s'abaisse successivement pour prendre la courbure sphérique.

En général, le verre a du ressort & peut

des l

plier sans
par pied.
l'ai même
& trois li
de haute
plus de
tout en
mais si o
fois, con
sphérique
demi-po
flexion; l
à l'eau, o
par le poi
une plus
ne soit
soutenue
ombre
l'aspect e
de ces le
ni bien re
étendue
souffre la
l'eau, &
une aber
grande q
simple da

des Minéraux, Partie Exp. 279

plier sans se casser, d'environ un pouce par pied, sur-tout quand il est mince; je l'ai même éprouvé sur des glaces de deux & trois lignes d'épaisseur & de cinq pieds de hauteur; on peut les faire plier de plus de 4 pouces sans les rompre, sur-tout en ne les comprimant qu'en un sens; mais si on les courbe en deux sens à-la-fois, comme pour produire une surface sphérique, elles cassent à moins d'un demi-pouce par pied sous cette double flexion; la glace inférieure de ces lentilles à l'eau, obéissant donc à la pression causée par le poids de l'eau, elle cassera ou prendra une plus forte courbure, à moins qu'elle ne soit fort épaisse, ou qu'elle ne soit soutenue par une croix de fer, ce qui fait ombre au foyer & rend désagréable l'aspect de ce miroir. D'ailleurs le foyer de ces lentilles à l'eau n'est jamais franc, ni bien terminé, ni réduit à sa plus petite étendue; les différentes réfractions que souffre la lumière en passant du verre dans l'eau, & de l'eau dans le verre, causent une aberration des rayons beaucoup plus grande qu'elle ne l'est par une réfraction simple dans les loupes de verre massif;

tous ces inconvéniens m'ont fait tourner mes vues sur les moyens de perfectionner les lentilles de verre, & je crois avoir enfin trouvé tout ce qu'on peut faire de mieux en ce genre, comme je l'expliquerai dans les paragraphes suivans.

Avant de quitter les lentilles à l'eau, je crois devoir encore proposer un moyen de construction nouvelle qui seroit sujette à moins d'inconvéniens, & dont l'exécution seroit assez facile. Au lieu de courber, travailler & polir de grandes glaces de quatre ou cinq pieds de diamètre, il ne faudroit que des petits morceaux quarrés de deux pouces, qui ne coûteroient presque rien, & les placer dans un châssis de fer traversé de verges minces de ce même métal & ajustées comme les vitres en plomb; ce châssis & ces verges de fer auxquelles on donneroient la courbure sphérique & quatre pieds de diamètre, contiendroient chacun trois cens quarante-six de ces petits morceaux de 2 pouces, & en laissant quarante-six pour l'équivalent de l'espace que prendroient les verges de fer, il y auroit toujours trois cens disques du Soleil

qui coïnc
suppose
laisseroit
de diamè
des part
cercle de
n'auroit
2 pouces
glaces et
en diam
lumière
doubles
seroit ici
encore au
de facett
quante fo
Cette co
& je n'y
la fuite
les joints
droient
faudroit
tiquant d
dans ces
de masti
impénétr
meq orie

des Minéraux, Partie Exp. 281

qui coïncideroient au même foyer que je suppose à dix pieds : chaque morceau laisseroit passer un disque de 2 pouces de diamètre, auquel ajoutant la lumière des parties du quarré circonscrit à ce cercle de 2 pouces de diamètre, le foyer n'auroit à dix pieds que 2 pouces $\frac{1}{2}$ ou 2 pouces $\frac{3}{4}$ si la monture de ces petites glaces étoit régulièrement exécutée. Or, en diminuant la perte que souffre la lumière en passant à travers l'eau & les doubles verres qui la contiennent, & qui seroit ici à peu-près de moitié, on auroit encore au foyer de ce miroir tout composé de facettes planes une chaleur cent cinquante fois plus grande que celle du Soleil. Cette construction ne seroit pas chère, & je n'y vois d'autre inconvénient que la fuite de l'eau qui pourroit percer par les joints des verges de fer qui soutiendroient les petits trapèzes de verre; il faudroit prévenir cet inconvénient en pratiquant des petites rainures de chaque côté dans ces verges & enduire ces rainures de mastic ordinaire des vitriers, qui est impénétrable à l'eau.

MEMBRE DEUXIEME

I. V.

LENTILLES de Verre solide.

J'AI vu deux de ces lentilles, celle du palais-royal, & celle du sieur Segard, toutes deux ont été tirées d'une masse de verre d'Allemagne, qui est beaucoup plus transparent que le verre de nos glaces de miroirs. Mais personne ne fait en France fondre le verre en larges masses épaisses, & la composition d'un verre transparent comme celui de Bohême, n'est connue que depuis peu d'années.

J'ai donc d'abord cherché les moyens de fondre le verre en masses épaisses, & j'ai fait en même temps différens essais pour avoir une matière bien transparente. M. de Romilly, qui dans ce temps étoit l'un des Directeurs de la manufacture de Saint-Gobin, m'ayant aidé de ses conseils, nous fondîmes deux masses de verre d'environ sept pouces de diamètre sur cinq à six pouces d'épaisseur dans des creusets à un fourneau où l'on cuisoit de la fayence au fauxbourg Saint-Antoine. Après avoir fait user & polir les deux surfaces de ces morceaux de verre pour

des

les rend
en avoi
tement
qui étoit
qui ne l
bons pr
gardé, p
morceau
& dont
posant c
sur un li
très-aîsér
& les écri
je compa
cette ma
Saint-Go
rentes é
matière d
paisseur
& de la
procura
& l'on n
le dimir
commen
travers s
à 2 ligr
transpare

des Minéraux, Partie Exp. 283

les rendre parallèles, je trouvai qu'il n'y en avoit qu'un des deux qui fût parfaitement net. Je livrai le second morceau, qui étoit le moins parfait, à des ouvriers qui ne laisserent pas que d'en tirer d'assez bons prismes de toute grosseur, & j'ai gardé, pendant plusieurs années, le premier morceau, qui avoit 4 pouces $\frac{1}{2}$ d'épaisseur, & dont la transparence étoit telle qu'en posant ce verre de 4 pouces $\frac{1}{2}$ d'épaisseur sur un livre, on pouvoit lire à travers très-aisément les caractères les plus petits & les écritures de l'encre la plus blanche; je comparai le degré de transparence de cette matière avec celle des glaces de Saint-Gobin, prises & réduites à différentes épaisseurs; un morceau de la matière de ces glaces de 2 pouces $\frac{1}{2}$ d'épaisseur sur environ un pied de longueur & de largeur, que M. de Romilly me procura, étoit vert comme du marbre vert, & l'on ne pouvoit lire à travers; il fallut le diminuer de plus d'un pouce, pour commencer à distinguer les caractères à travers son épaisseur, & enfin le réduire à 2 lignes $\frac{1}{2}$ d'épaisseur pour que sa transparence fût égale à celle de mon

284 Introduction à l'Histoire

morceau de 4 pouces $\frac{1}{2}$ d'épaisseur ; car on voyoit aussi clairement les caractères du livre à travers ces 4 pouces $\frac{1}{2}$, qu'à travers la glace qui n'avoit que 2 lignes $\frac{1}{2}$. Voici la composition de ce verre dont la transparence est si grande.

Sable blanc cristallin, *une livre.*

Minium ou chaux de plomb, *une livre.*

Potasse, *une demi-livre.*

Salpêtre, *une demi-once.*

Le tout mêlé & mis au feu suivant l'art.

J'ai donné à M. Cassini de Thury ce morceau de verre, dont on pouvoit espérer de faire d'excellens verres de lunette achromatique, tant à cause de sa très-grande transparence que de sa force réfringente, qui étoit très-considérable, vu la quantité de plomb qui étoit entrée dans sa composition ; mais M. de Thury ayant confié ce beau morceau de verre à des ouvriers ignorans, ils l'ont gâté au feu, où ils l'ont remis mal-à-propos ; je me suis repenti de ne l'avoir pas fait travailler moi-même, car il ne s'agissoit que de le trancher en lames, & la matière en étoit encore plus

des

transpar
glafs d'
force de

Avec
position

26 ou 2
pieds d

fondre

effet j'av

intérieure

cela n'é

grands f

une ma

27 ou 2

fait envi

demande

mes frai

Gobin,

établisse

permett

J'avois

lentille

la lentill

sont à 6

attendu

lentille,

que celle

des Minéraux, Partie Exp. 285

transparente & plus nette que celle *flint-glass* d'Angleterre, & elle avoit plus de force de réfraction.

Avec 600 livres de cette même composition, je voulois faire une lentille de 26 ou 27 pouces de diamètre & de 5 pieds de foyer. J'espérois pouvoir la fondre dans mon fourneau, dont à cet effet j'avois fait changer la disposition intérieure; mais je reconnus bientôt que cela n'étoit possible que dans les plus grands fourneaux de verrerie, il me falloit une masse de 3 pouces d'épaisseur sur 27 ou 28 pouces de diamètre, ce qui fait environ un pied cube de verre; je demandai la liberté de la faire couler à mes frais à la manufacture de Saint-Gobin, mais les Administrateurs de cet établissement ne voulurent pas me le permettre, & la lentille n'a pas été faite. J'avois supputé que la chaleur de cette lentille de 27 pouces seroit à celle de la lentille du Palais-royal, comme 19 sont à 6; ce qui est un très-grand effet attendu la petitesse du diamètre de cette lentille, qui auroit eu 11 pouces de moins que celle du Palais-royal.

286 *Introduction à l'Histoire*

Cette lentille, dont l'épaisseur au point du milieu ne laisse pas d'être considérable, est néanmoins ce qu'on peut faire de mieux pour brûler à 5 pieds : on pourroit même en augmenter le diamètre ; car je suis persuadé qu'on pourroit fondre & couler également des pièces plus larges & plus épaisses dans les fourneaux où l'on fond les grandes glaces, soit à Saint-Gobin, soit à Rouelle en Bourgogne ; j'observe seulement ici qu'on perdrait plus par l'augmentation de l'épaisseur qu'on ne gagneroit par celle de la surface du miroir, & que c'est pour cela que, tout compensé, je m'étois borné à 26 ou 27 pouces.

Newton a fait voir que quand les rayons de lumière tomboient sur le verre, sous un angle de plus de 47 ou 48 degrés, ils sont réfléchis au lieu d'être réfractés ; on ne peut donc pas donner à un miroir réfringent un diamètre plus grand que la corde d'un arc de 47 ou de 48 degrés de la sphère sur laquelle il a été travaillé ; ainsi, dans le cas présent pour brûler à 5 pieds, la sphère ayant environ 32 pieds de circonférence, le

des

miroir

4 pieds

il auroit

lentille

rayons

jamais

Ces

tous les

les plus

moins su

puissans

bien trav

bien pro

foyers Si

loupe du

ces diffé

comme

diamètre

une dista

suite & f

fera tran

grands be

plus gran

parence,

d'autant n

d'autant

d'autant

des Minéraux, Partie Exp. 287

miroir ne peut avoir qu'un peu plus de 4 pieds de diamètre; mais, dans ce cas, il auroit le double d'épaisseur de ma lentille de 26 pouces, & d'ailleurs les rayons trop obliques ne se réunissent jamais bien.

Ces loupes de verre solide sont, de tous les miroirs que je viens de proposer, les plus commodes, les plus solides, les moins sujets à se gâter, & même les plus puissans lorsqu'ils sont bien transparens, bien travaillés, & que leur diamètre est bien proportionné à la distance de leur foyer. Si l'on veut donc se procurer une loupe de cette espèce, il faut combiner ces différens objets, & ne lui donner, comme je l'ai dit, que 27 pouces de diamètre pour brûler à 5 pieds, qui est une distance commode pour travailler de suite & fort à l'aïse au foyer; plus le verre sera transparent & pesant, plus seront grands les effets; la lumière passera en plus grande quantité en raison de la transparence, & fera d'autant moins dispersée, d'autant moins réfléchie, & par conséquent d'autant mieux faite par le verre, & d'autant plus réfractée qu'il sera plus

288. *Introduction à l'Histoire.*

massif, c'est-à-dire, spécifiquement plus pesant : ce sera donc un avantage que de faire entrer dans la composition de ce verre une grande quantité de plomb ; & c'est par cette raison que j'en ai mis moitié, c'est-à-dire, autant de minium que de sable. Mais quelque transparent que soit le verre de ces lentilles, leur épaisseur dans le milieu est non-seulement un très-grand obstacle à la transmission de la lumière, mais encore un empêchement aux moyens qu'on pourroit trouver pour fondre des masses aussi épaisses & aussi grandes qu'il le faudroit, par exemple, pour une loupe de 4 pieds de diamètre, à laquelle on donneroit un foyer de cinq ou six pieds, qui est la distance la plus commode, & à laquelle la lumière plongeant avec moins d'obliquité, aura plus de force qu'à de plus grandes distances, il faudroit fondre une masse de verre de quatre pieds sur six pouces & demi ou sept pouces d'épaisseur, parce qu'on est obligé de la travailler & de l'user même dans la partie la plus épaisse. Or il seroit très-difficile de fondre & couler d'un seul jet ce gros volume, qui seroit, comme
l'on

l'on v
car l
factur
pieds
60 p
5 lign
d'envi
sera de
volum
pied c
pied c
former
de la p
manufa
à cette
craigne
chaleur
de verr
la table
les glac
5 lignes

(u) Or
à ma priè
suis servi
de vingt a
glaces de
paisseur à
Supp

des Minéraux, Partie Exp. 289

l'on voit, de cinq ou six pieds cubes, car les plus amples cuvettes des manufactures de glaces ne contiennent pas deux pieds cubes; les plus grandes glaces de 60 pouces sur 120, en leur supposant 5 lignes d'épaisseur, ne font qu'un volume d'environ un pied cube trois quarts; l'on sera donc forcé de se réduire à ce moindre volume, & à n'employer en effet qu'un pied cube & demi, ou tout au plus un pied cube trois quarts de verre pour en former la loupe, & encore aura-t-on bien de la peine à obtenir des maîtres de ces manufactures, de faire couler du verre à cette grande épaisseur, parce qu'ils craignent, avec quelque raison, que la chaleur trop grande de cette masse épaisse de verre ne fasse fondre ou boursouffler la table de cuivre sur laquelle on coule les glaces, lesquelles n'ayant au plus que 5 lignes d'épaisseur (u), ne communiquent

(u) On a néanmoins coulé à Saint-Gobin, & à ma prière, des glaces de sept lignes, dont je me suis servi pour différentes expériences, il y a plus de vingt ans; j'ai remis dernièrement une de ces glaces de 38 pouces en carré & de 7 lignes d'épaisseur à M. de Bernières, qui a entrepris de faire

Supplément, Tome II. N

290 *Introduction à l'Histoire*

à la table qu'une chaleur très-médiocre en comparaison de celle que lui feroit subir une masse de six pouces d'épaisseur.

V.

LENTILLES à Échelons pour brûler avec la plus grande vivacité possible (x).

JE VIENS de dire que les fortes épaisseurs qu'on est obligé de donner aux lentilles lorsqu'elles ont un grand diamètre & un foyer court, nuisent beaucoup à leur effet; une lentille de 6 pouces d'épaisseur dans le milieu & de la matière des glaces ordinaires ne brûle, pour ainsi dire, que par les bords. Avec du verre plus transparent, l'effet sera plus grand, mais la partie du milieu reste toujours en pure perte, la lumière ne pouvant en pénétrer & traverser la trop grande épaisseur; j'ai

des loupes à l'eau pour l'Académie des Sciences, & j'ai vu chez lui des glaces de 10 lignes d'épaisseur, qui ont été coulées de même à Saint-Gobin: cela doit faire présumer qu'on pourroit, sans aucun risque pour la table, en couler d'encore plus épaisses.

(x) Voyez les planches XIV, XV & XVI.

rap
sur
à tra
verr
est t
les n
& j'a
aisée
des l
pour
mètre
Ce
de ve
me fai
diminu
lentille
diamèt
d'épais
cette le
proche
portion
qu'un p
forme d
demi-po
les parti
en faisa
l'extrém

des Minéraux, Partie Exp. 291

rapporté les expériences que j'ai faites sur la diminution de la lumière qui passe à travers différentes épaisseurs du même verre, & l'on a vu que cette diminution est très-considérable : j'ai donc cherché les moyens de parer à cet inconvénient, & j'ai trouvé une manière simple & assez aisée de diminuer réellement les épaisseurs des lentilles autant qu'il me plaît, sans pour cela diminuer sensiblement leur diamètre & sans allonger leur foyer.

Ce moyen consiste à travailler ma pièce de verre par échelons. Supposons, pour me faire mieux entendre, que je veuille diminuer de deux pouces l'épaisseur d'une lentille de verre qui a 26 pouces de diamètre, 5 pieds de foyer & 3 pouces d'épaisseur au centre, je divise l'arc de cette lentille en trois parties, & je rapproche concentriquement chacune de ces portions d'arc, en sorte qu'il ne reste qu'un pouce d'épaisseur au centre ; & je forme de chaque côté un échelon d'un demi-pouce, pour rapprocher de même les parties correspondantes ; par ce moyen, en faisant un second échelon, j'arrive à l'extrémité du diamètre, & j'ai une lentille

icroe
subir

r avec
(x).

aisseurs
entilles
& un
à leur
paisseur
s glaces
re, que
us trans-
mais la
en pure
pénétrer
eur ; j'ai

s Sciences,
l'épaisseur,
Gobin : cela
aucun risque
paisses.

171.

292 *Introduction à l'Histoire*

à échelons qui est à très-peu-près du même foyer, & qui a le même diamètre, & près de deux fois moins d'épaisseur que la première, ce qui est un très-grand avantage.

Si l'on vient à bout de fondre une pièce de verre de 4 pieds de diamètre sur deux pouces & demi d'épaisseur & de la travailler par échelons sur un foyer de 8 pieds, j'ai supputé qu'en laissant même un pouce & demi d'épaisseur au centre de cette lentille & à la couronne intérieure des échelons, la chaleur de cette lentille sera à celle de la lentille du Palais-royal, comme 28 sont à 63, sans compter l'effet de la différence des épaisseurs qui est très-considérable & que je ne puis estimer d'avance.

Cette dernière espèce de miroir réfringent est tout ce qu'on peut faire de plus parfait en ce genre; & quand même nous le réduirions à 3 pieds de diamètre sur 15 lignes d'épaisseur au centre & 6 pieds de foyer, ce qui en rendra l'exécution moins difficile, on auroit toujours un degré de chaleur quatre fois au moins plus grand que celui des plus fortes

lentille
ce m
utiles
giné
tous
desire
tireroi
cemen
héliom
toutes
comme
fournea

EXPL
qui r
j'ai f
miroir

LA PL
rez-de-ch
qui sauve
Pâtre du
voûte, c
fulvantes
ER le
l'ouvertu
le vent d
LL d
maçonne

des Minéraux, Partie Exp. 293

lentilles que l'on connoisse. J'ose dire que ce miroir à échelons seroit l'un des plus utiles instrumens de Physique, je l'ai imaginé il y a plus de vingt-cinq ans, & tous les Savans auxquels j'en ai parlé desireroient qu'il fût exécuté. On en tireroit de grands avantages pour l'avancement des Sciences; & y adaptant un héliomètre, on pourroit faire à son foyer toutes les opérations de la Chymie aussi commodément qu'on le fait au feu des fourneaux, &c.

*EXPLICATION DES FIGURES
qui représentent le fourneau dans lequel
j'ai fait courber des Glaces pour faire les
miroirs ardents de différentes espèces.*

LA Planche I est le plan du fourneau, au rez-de-chauffée, où l'on voit *HKB* un vuide qui sauve les inconvéniens du terre-plein sous l'âtre du fourneau; ce vuide est couvert d'une voûte, comme on le verra dans les figures suivantes. *ER* les cendriers, disposés en sorte que l'ouverture de l'un est dans la face où se trouve le vent de l'autre.

LL deux contre-forts qui affermissent la maçonnerie du fourneau.

294 *Introduction à l'Histoire*

MM deux autres contre-forts, dont l'usage est le même que celui de ceux ci-dessus, & qui n'en diffèrent que parce qu'ils sont un peu arrondis.

GGG plans de quatre barres de fer qui affermissent le fourneau, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

La *planche 11* est l'élevation d'une des faces parallèles à la ligne *CD* du plan précédent.

HK l'ouverture pratiquée dans l'âtre du fourneau, afin qu'il ne s'y trouve point d'humidité.

CC la bouche ou grande ouverture du fourneau.

A la petite ouverture pratiquée dans la face opposée, laquelle est toute semblable à celle que la même *planche* représente, à cette différence près, que l'ouverture est plus petite.

Mm un des contre-forts arrondis, à côté duquel on voit le vent.

R ouverture par où l'air extérieur passe sous la grille du foyer.

E le cendrier, *N* le foyer, *P* la porte qui le ferme.

LI un contre-fort carré.

GO, GO deux des barres de fer scellées en terre, & qui sont unies à celles qui sont posées à l'autre face par les liens de fer *D*, ainsi que l'on verra dans une des figures suivantes.

OO deux barres de fer qui unissent ensemble

de

les deux
de l'ouv

m DE

& des
l'arrange
qui com
par la fi

La *pl*
fourneau
AB du

LI,

HK ex

fourneau

A la-p

GOD

parlé, qu

Les lie
sont unis

P est la

Les fig
térieur du
est représe

La *plan*

fourneau p

X est

sphérique

EE les

du cendrie

on a suppo

pour mieu

qui compo

des Minéraux, Partie Exp. 295

les deux barres *GO*, *GO* & retiennent la voûte de l'ouverture *CC* qui est bombée.

mDBDI la voûte commune du fourneau & des foyers, dont la figure est ellipsoïde, l'arrangement des briques & autres matériaux qui composent le fourneau se connoît aisément par la figure.

La *planche III* est la vue extérieure du fourneau par une des faces parallèles à la ligne *AB* du plan.

LI, *MM* contre-forts.

HK extrémités de l'ouverture sous l'âtre du fourneau.

A la petite ouverture, *C* la grande.

GOD, *GOD* les barres de fer dont on a parlé, qui sont unies ensemble par le lien *DD*.

Les liens *DD* couchés sur la voûte *DBD* sont unis ensemble par un troisième lieu de fer.

P est la porte de fer qui ferme le foyer.

Les figures précédentes font connoître l'extérieur du fourneau. L'intérieur plus intéressant est représenté dans les planches suivantes.

La *planche IV* est une coupe horizontale du fourneau par le milieu de la grande bouche.

X est l'âtre que l'on a rendu concave sphérique.

EE les deux grilles qui séparent le foyer du cendrier, & sur lesquelles on met le charbon; on a supposé que la voûte étoit transparente, pour mieux faire voir la direction des barreaux qui composent les grilles.

296 Introduction à l'Histoire

A la petite ouverture, *CC* la grande.

DD les marges, *LM*, *LM* les contreforts.

La planche *v* est la coupe verticale du fourneau suivant la ligne *CD* du plan, ou selon le grand axe de l'ellipsoïde dont la voûte a la figure.

Z le vuide sous l'âtre du fourneau.

G X K cavité sphérique pratiquée dans l'âtre du fourneau, & sur laquelle la glace *G K* qui a été arrondie est posée, & dont elle doit prendre exactement la figure, après qu'elle aura été ramollie par le feu.

FF les grilles ou foyers au-dessous desquelles sont les cendriers.

DD les marges qui empêchent les bords de la glace du côté des foyers d'être trop tôt atteints par le feu.

CBC la voûte, *CC* lunettes que l'on ouvre ou ferme à volonté en les couvrant d'un carreau de terre cuite, *LM* contre-forts.

La planche *v* représente la coupe du fourneau par un plan vertical, qui passe par la ligne *AB* du plan.

HKL le vuide sous l'âtre du fourneau.

G X K cavité sphérique pratiquée dans l'âtre du fourneau, & sur laquelle la glace *X* est déjà appliquée.

DD une des marges, *P* la grande ouverture, *Q* la petite, *CCC* lunettes.

CBC la voûte coupée transversalement ou selon le petit axe de l'ellipsoïde. On jugera de

Je
par l
figure
fourn
par A

GRA
ton ap
à l'ail

C
glaces
chaqu
réfléch

Le
par un
MB,

dans l
cette fi
étais

dans l
par le
sert d'e
NQ,

moyen
pesante
de bo
cette p
les deu

des Minéraux, Partie Exp. 297

la grandeur de chaque partie de ce fourneau par les échelles qui sont au bas de chaque figure, qui ont été exactement levées sur le fourneau qui étoit au Jardin royal des plantes, par M. Gouffier.

GRAND MIROIR DE RÉFLEXION,
appelé MIROIR D'ARCHIMÈDE.

Planche V 11, figure 1.

Ce miroir est composé de trois cens soixante glaces montées sur un châssis de fer *CDEF*, chaque glace est mobile pour que les images réfléchies par chacune puissent être renvoyées au même point, & coïncider dans le même espace.

Le châssis, qui a deux tourillons, est porté par une pièce de fer composée de deux montans *MB, LA* assemblés à tenons & mortoises dans la couche *ZO*; ils sont assujettis dans cette situation par la travée *ab*, & par trois étais à chacun *NP, QP, OP*, fixés en *P* dans le corps du montant *MB*, & assemblés par le bas dans une courbe *NOQ* qui leur sert d'empiètement; ces courbes ont des entailles *NQ, QU* qui reçoivent des roulettes, au moyen desquelles cette machine, quoique fort pesante, peut tourner librement sur le plancher de bois *XXY* étant assujettie au centre de cette plate-forme par l'axe *RS* qui passe dans les deux travées *ZO, ab*, chaque montant

N v

298 *Introduction à l'Histoire*

porte aussi à la partie inférieure une roulette, en sorte que toute la machine est portée par dix roulettes; la plate-forme de bois est recouverte de bandes de fer dans la rouette des roulettes; sans cette attention la plate-forme ne seroit pas de longue durée.

La plate-forme est portée par quatre fortes roulettes de bois, dont l'usage est de faciliter le transport de toute la machine d'un lieu à un autre.

Pour pouvoir varier à volonté les inclinaisons du miroir, & pouvoir l'assujettir dans la situation que l'on juge à propos, on a adapté la cremailière *FG* qui est unie avec des cercles, dont le tourillon *B* est le centre; cette cremailière est menée par un pignon en lanterne, dont la tige *bH* traverse le montant & un des étais, & est terminée par une manivelle *HK*, au moyen de laquelle on incline ou on redresse le miroir à discrétion.

Jusqu'à présent nous n'avons expliqué que la construction générale du miroir; reste à expliquer par quel artifice on parvient à faire que les images différentes, réfléchies par les différens miroirs, sont toutes renvoyées au même point, & c'est à quoi sont destinées les figures suivantes.

Planche VIII, figure 2.

XZ une portion des barres qui occupent le derrière du miroir; ces barres sont au nombre de vingt, & disposées horizontalement, en sorte

de

que leu
chacun
& le m
séparem
verticau
& entr'
auxquell
à-vis de
TA, T
GA, q
queue c
l'épaisse
de chaq
de collect
allons p
& 5, est
dont la f

CD le
pratiqué
peut mo

La vi
nence
l'extrémi
même te
l'autre e
forte qu
montant
la parti
appliqué
de cette
ou charn

des Minéraux, Partie Exp. 299

que leur plan est parallèle au plan du miroir ; chacune de ces barres a dix-huit entailles *TT*, & le même nombre d'éminences *VV* qui les séparent : ces barres sont assujetties aux côtés verticaux du châssis du miroir par des vis, & entr'elles par trois ou quatre barres verticales, auxquelles elles sont assujetties par des vis ; vis-à-vis de chaque entaille *TT*, il y a des poupées *TA*, *TD* qui y sont fixées par les écrous *GA*, qui prennent la partie taraudée de la queue de la poupée après qu'elle a traversé l'épaisseur de la barre ; les parties supérieures de chaque poupée, qui sont percées, servent de collets aux tourillons de la croix dont nous allons parler ; cette croix représentée figures 3 & 5, est un morceau de cuivre ou de fer, dont la figure fait connoître la forme.

CD les tourillons qui entrent dans les trous pratiqués à chaque poupée, en sorte qu'elle se peut mouvoir librement dans ces trous.

La vis *ML*, après avoir traversé l'éminence *V*, va s'appuyer en-dessous contre l'extrémité inférieure *B* du croisillon *BA*, en même temps le ressort *K* va s'appliquer contre l'autre extrémité *A* du même croisillon ; en sorte que lorsque l'on fait tourner la vis en montant, le ressort en se rétablissant, fait que la partie *B* du croisillon se trouve toujours appliquée sur la pointe de la vis : il résulte de cette construction un mouvement de ginglime ou charnière, dont l'axe est *BC*, figure 2.

N vj

300 Introduction à l'Histoire

Ce seul mouvement ne suffisant pas, on en a pratiqué un autre, dont l'axe de mouvement croise à angle droit le premier.

Aux deux extrémités *A* & *B* du croisillon *AB*, on a adapté deux petites poutres *BH*, *AK*, figures 5, retenues comme les précédentes par des vis & des écrous.

Les trous *HK* qui sont aux parties supérieures de ces poutres, reçoivent les tourillons *DC*, figure 4, d'une plaque de fer que nous avons appelée *porte-glace*, qui peut se mouvoir librement sur les poutres, & s'incliner à l'axe *CD* du premier mouvement par le moyen de la vis *FG*, pour laquelle on a réservé un bossage *E* dans le croisillon *AB*, afin de lui servir d'écrous dormans; cette vis s'applique par *E* contre la partie *DBC* du porte-glace, & force cette partie à monter lorsqu'on tourne la vis; mais lorsqu'on vient à lâcher cette vis, le ressort *AL*, qui s'applique contre la partie *DAC* du porte-glace, le force à suivre toujours la pointe de la vis: au moyen de ces deux mouvemens de ginglime, on peut donner à la glace qui est reçue par les crochets *ACB* du porte-glace, telle direction que l'on souhaite, & par ce moyen faire coïncider l'image du Soleil réfléchi par une glace, avec celle qui est réfléchi par une autre.

Planche IX.

La figure 6 représente le porte-glace vu par derrière, où l'on voit la vis *FEG* qui

de

s'applique
HK,

l'autre

La

en-dessus

reste est

MIR

rendu

LA fig

son pied

miroir;

vertical,

branches

DE le

A la

miroir,

La fig

partie po

dans les

FG un

même m

sert de

comprim

BHC

la glace

exacteme

couvre la

des Minéraux, Partie Exp. 301

s'applique en *G* hors de l'axe de mouvement *HK*, & le ressort *L* qui s'applique en *E* de l'autre côté de l'axe de mouvement.

La figure 7 représente le porte-glace vu en-dessus, & garni de la glace *ACBD*, le reste est expliqué dans les autres figures.

MIROIR DE RÉFLEXION

rendu concave par la pression d'une vis appliquée au centre.

Planche X.

LA figure 1 représente le miroir monté sur son pied, *BDC* la fourchette qui porte le miroir; cette fourchette est mobile dans l'axe vertical, & est retenue sur le pied à trois branches *FFF* par l'écrou *G*.

DE le régulateur des inclinaisons.

A la tête de la vis placée au centre du miroir, & rendu concave par son moyen.

La figure 2 représente le miroir vu par sa partie postérieure, *BC* les tourillons qui entrent dans les collets de la fourchette.

FG une barre de fer fixée sur l'anneau de même métal, qui entoure la glace: cette barre sert de point d'appui à la vis *DE* qui comprime la glace.

BHCK l'anneau ou cercle de fer sur lequel la glace est appliquée; ce cercle doit être exactement plan & parfaitement circulaire: on couvre la partie sur laquelle la glace s'applique

302 Introduction à l'Histoire

avec de la peau, du cuir ou de l'étoffe, pour que le contact soit plus immédiat, & que la glace ne soit point exposée à rompre.

MIROIR DE RÉFLEXION,

rendu concave par la pression
de l'Athmosphère.

Planche XI.

C B MIROIR consiste en un tambour ou cylindre, dont une des bases est la glace, & l'autre une plaque de fer.

AB, figure 1, la glace parfaitement plane, **C** une lentille taillée dans l'épaisseur même de la glace.

AE ou **BM** la hauteur du cylindre aux extrémités du diamètre horizontal **TL**, duquel sortent deux tourillons, qui entrent dans les yeux de la fourchette, ainsi qu'il est expliqué en parlant du miroir de réfraction.

MO le régulateur des inclinaisons.

N le collet par lequel il passe, & la vis qui sert à l'y fixer.

NRS PQ le pied qui est semblable à celui du miroir de réfraction, à cette différence près, qu'il est de bois, & que les pièces ont un contour moins orné, du reste sa fonction est la même.

Figure 2 est le profil du miroir coupé par un plan qui passe par l'axe du cylindre, & auquel on suppose que l'œil est perpendiculaire.

de.

AB

C la
foyer to

ED
de fer.

AE,
face cyli

em u
dans la c
dont l'éc
plaque d

G la
H une ro
tête de la
ment le

abc la
l'air que
par la flar
lentille **C**

DF le
assemblé

EmK
sur la bas
assujetties
& la me
l'athmosph
la glace; e
une autre

des Minéraux, Partie Exp. 303

AB la glace dont on voit l'épaisseur.

C la lentille qui y est entallée, & dont le foyer tombe sur le point *c*.

ED la base du cylindre, qui est une plaque de fer.

AE, BD la hauteur & la coupe de la surface cylindrique.

cm une mèche soufrée que l'on fait entrer dans la cavité du miroir après avoir ôté la vis *K*, dont l'écrou est un cube solidement attaché à la plaque de fer qui sert de fond au miroir.

C la même vis représentée séparément; *H* une rondelle de cuir que l'on met entre la tête de la vis & son écrou pour fermer entièrement le passage à l'air.

abc la courbure que la glace prend, après que l'air que le cylindre contient a été consommé par la flamme de la bougie *cm*, à laquelle la lentille *C* a mis le feu.

DF le régulateur des inclinaisons qui est assemblé à charnière au point *D*.

Em, K, Km, D, règles de fer posées de champ sur la base du cylindre, & qui y sont fortement assujetties; leur usage est pour fortifier la plaque & la mettre en état de résister au poids de l'atmosphère, qui la comprime aussi-bien que la glace; cette construction est représentée dans une autre figure, *Planche XII*.

IL CONSISTE aussi en un cylindre ou tambour de fer, dont une des bases est une glace parfaitement plane; la base opposée, & qui est celle que la *figure 1* présente, est une plaque de fer qui est fortifiée par les règles de fer posées de champ *EG, FH, EK*. On vuide l'air que le cylindre contient par la pompe *BC*, qui est affermie sur la plaque de fer par les collets *xx*.

A l'extrémité supérieure du piston.

E un cube de cuivre solidement fixé sur la plaque; ce cube est porté en travers pour recevoir le robinet *F*, au moyen duquel on ouvre ou on ferme la communication de l'intérieur du cylindre avec la pompe.

LM, mn la fourchette sur laquelle le miroir est monté, & qui est mobile dans l'arbre *MO*.

MPRQ le pied qui a seulement trois branches, ce qui fait qu'il porte toujours à plomb, même sur un plan inégal.

La *figure 2* représente le miroir coupé, suivant la ligne *GH*, & duquel on suppose que l'on a pompé l'air.

XVZ la glace que la pression de l'atmosphère a rendue concave.

HG la plaque de fer qui sert de fond au cylindre.

LN les tourillons.

de

FE

EG,

tiennent

Les

coupe

ce cube

pendic

pompe

c par

qui con

b por

la pom

a le

culaire

La

robinet

la portie

ouvertu

La fig

lorsque

partie m

les mên

L

FIGU

ped.

AB

convexe

chassis

BC

des Minéraux, Partie Exp. 305

FE le robinet.

EG, FH les règles de champ qui maintiennent la plaque.

Les figures 3 & 4 représentent en grand la coupe du cube dans lequel passe le robinet; ce cube est supposé coupé par un plan perpendiculaire à la plaque, & qui passe par la pompe.

c partie du canal coudé pratiqué dans le cube qui communique à l'intérieur du miroir.

b portion du même canal qui communique à la pompe.

a le robinet qui se trouve coupé perpendiculairement à son axe.

La figure 3 représente la situation du robinet lorsque la communication est ouverte; la portion *m* du canal se présente vis-à-vis les ouvertures *b, c*.

La figure 4 représente la situation du robinet, lorsque la communication est fermée, alors la partie *m* du canal ne se présente plus vis-à-vis les mêmes ouvertures.

LENTILLE A L'EAU.

Planche XIII.

FIGURE I. Le miroir entier monté sur son pied.

ABMC le miroir composé de deux glaces convexes, assujetties l'une contre l'autre par le châssis ou cadre circulaire *ABMC*.

BC extrémités de la fourchette de fer qui

306 Introduction à l'Histoire

porte ce miroir. Les extrémités de cette fourchette sont percées d'un trou cylindrique pour recevoir les tourillons dont le châssis du miroir est garni, & sur lesquels il se meut pour varier les inclinaisons.

BKC la fourchette.

KFiGH le pied qui porte le miroir; il est composé de plusieurs pièces.

KL l'arbre ou poinçon qui s'appuie par sa partie inférieure sur la croix *HI, FG*; il est fixé dans la situation verticale par les quatre étais ou jambes de forces *KG, KH, KF, KI* qui sont de fer, & auxquelles on a donné un contour agréable.

fghi les roulettes.

Figure 2. Coupe ou profil du miroir dans laquelle on suppose que l'œil est placé dans le plan qui sépare les deux glaces.

XZ les deux glaces qui étant réunies forment une lentille.

or le plan qui sépare les deux glaces.

bm coupe du châssis ou anneau qui retient les glaces unies ensemble; cet anneau est composé de deux pièces qui s'assujettissent l'une à l'autre par des vis, & entre lesquelles les glaces sont mastiquées.

a une petite bouteille à deux cols, l'un desquels communique au vuide que les deux glaces laissent entre elles par un canal pratiqué entre les deux glaces, & qui est entaillé moitié dans l'une & moitié dans l'autre.

des

Figure

porte le m

DE tige

un trou ve

du pied,

successivem

points de l

D colle

inclinaison

LENT

AB bor

miroir à éc

CC touri

horizontale

fourchette

une tige au

ici, étant e

peu à l'aid

tourner à d

L'arbre l

qui est fait

que trois d

GGG ja

pour la soli

HHH

ranger faci

l'on juge à

La Plan

des Minéraux, Partie Exp. 307

Figure 3, BDC la fourchette de fer qui porte le miroir.

DE tige de la fourchette qui entre dans un trou vertical pratiqué à l'axe ou arbre *KL* du pied, en sorte que l'on peut présenter successivement la face du miroir à tous les points de l'horizon.

D collet dans lequel passe le régulateur des inclinaisons que l'on y fixe par une vis.

LENTILLE A ÉCHELONS.

Planche XIV.

AB bordure circulaire pour contenir ce miroir à échelons.

CC tourillons qui passent dans les trous percés horizontalement à la partie supérieure de la fourchette *DD*; à la partie inférieure, tient une tige aussi de fer, que l'on ne voit point ici, étant entrée perpendiculairement, mais un peu à l'aise dans l'arbre *E* afin de pouvoir tourner à droite & à gauche.

L'arbre *E* est attaché solidement à son pied, qui est fait en croix, dont on ne peut voir ici que trois de ses côtés indiqués *FFF*.

GGG jambages de force ou étais de fer pour la solidité.

HHH roulettes dessous les pieds pour ranger facilement ce miroir à la direction que l'on juge à propos.

La *Planche xv* représente ce même miroir

308 *Introduction à l'Histoire*

à échelons en perspective, tourné vers le Soleil pour mettre le feu.

AB bordure circulaire qui contient la glace à échelons.

CC tourillons qui passent dans les trous percés à la partie supérieure de la fourchette *DD*.

A la partie inférieure de la fourchette, qui est de fer, tient une tige cylindrique de même métal qui entre juste dans l'arbre; mais non trop serrée pour qu'elle puisse avoir un jeu doux, propre à pouvoir tourner à droite ou à gauche pour la diriger comme on le desire.

E l'arbre dans lequel entre cette tige.

FFFF les quatre pieds en croix sur laquelle est attaché solidement l'arbre.

GGGG les quatre jambes de force, aussi de fer.

H le feu actif tiré du Soleil par la construction de ce miroir.

III roulettes de dessous les pieds du portemiroir.

La *Planche XVII* représente les coupes de trois miroirs à échelons, dont le plus facile à exécuter seroit celui de la *figure 1.^{re}* Leur échelle est de six pouces de pied-de-roi pour pied-de-roi.



des

SEP

OBSE

accia

QUOI

dans ces
des coul
fait de
ce n'est
mais la
travaillé
& quoir
les expé
peu de g
d'examin
semble
crois pa
genre de
donné de
des coul
Il y a
des coul

SEPTIÈME MÉMOIRE.

*OBSERVATIONS sur les couleurs
accidentelles, & sur les ombres
colorées.*

QUOIQ'ON se soit beaucoup occupé dans ces derniers temps de la physique des couleurs, il ne paroît pas qu'on ait fait de grands progrès depuis Newton: ce n'est pas qu'il ait épuisé la matière, mais la plupart des Physiciens ont plus travaillé à le combattre qu'à l'entendre, & quoique ses principes soient clairs, & ses expériences incontestables, il y a si peu de gens qui se soient donné la peine d'examiner à fond les rapports & l'ensemble de ses découvertes, que je ne crois pas devoir parler d'un nouveau genre de couleurs, sans avoir auparavant donné des idées nettes sur la production des couleurs en général.

Il y a plusieurs moyens de produire des couleurs, le premier est la réfraction;

310 *Introduction à l'Histoire*

un trait de lumière qui passe à travers un prisme se rompt & se divise de façon qu'il produit une image colorée, composée d'un nombre infini de couleurs, & les recherches qu'on a faites sur cette image colorée du Soleil, ont appris que la lumière de cet astre est l'assemblage d'une infinité de rayons de lumière différemment colorés; que ces rayons ont autant de différens degrés de réfrangibilité que de couleurs différentes, & que la même couleur a constamment le même degré de réfrangibilité. Tous les corps diaphanes dont les surfaces ne sont pas parallèles, produisent des couleurs par la réfraction; l'ordre de ces couleurs est invariable, & leur nombre quoiqu'infini a été réduit à sept dénominations principales, *violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge*; chacune de ces dénominations répond à un intervalle déterminé dans l'image colorée, qui contient toutes les nuances de la couleur dénommée; de sorte que, dans l'intervalle rouge, on trouve toutes les nuances de rouge, dans l'intervalle jaune toutes les nuances de jaune, &c. & dans les confins de ces intervalles les

de
couleur
jaunes
raisons
des dé
colorée
folaire
couleur
rouge,
positio
une rep
Comm
infinité
qui rép
Soleil;
beaucou
de tous
mêlang
& il n'y
l'image
comme
foibles,
on se se
les coul
du disq
l'anticip
sur les a
des cou

des Minéraux, Partie Exp. 311

couleurs intermédiaires qui ne sont ni jaunes ni rouges, &c. C'est par de bonnes raisons que Newton a fixé à sept le nombre des dénominations des couleurs; l'image colorée du Soleil qu'il appelle *le spectre solaire*, n'offre à la première vue que cinq couleurs, violet, bleu, vert, jaune & rouge, ce n'est encore qu'une décomposition imparfaite de la lumière, & une représentation confuse des couleurs. Comme cette image est composée d'une infinité de cercles différemment colorés qui répondent à autant de disques du Soleil; & que ces cercles anticipent beaucoup les uns sur les autres, le milieu de tous ces cercles est l'endroit où le mélange des couleurs est le plus grand, & il n'y a que les côtés rectilignes de l'image où les couleurs soient pures; mais, comme elles sont en même temps très-foibles, on a peine à les distinguer, & on se sert d'un autre moyen pour épurer les couleurs: c'est en rétrécissant l'image du disque du Soleil, ce qui diminue l'anticipation des cercles colorés les uns sur les autres, & par conséquent le mélange des couleurs; dans ce spectre de lumière

312 *Introduction à l'Histoire*

épurée & homogène, on voit très-bien les sept couleurs ; on en voit même beaucoup plus de sept avec un peu d'art ; car, en recevant successivement sur un fil blanc les différentes parties de ce spectre de lumière épurée, j'ai compté souvent jusqu'à dix-huit ou vingt couleurs dont la différence étoit sensible à mes yeux. Avec de meilleurs organes ou plus d'attention, on pourroit encore en compter davantage ; cela n'empêche pas qu'on ne doive fixer le nombre de leur dénomination à sept, ni plus ni moins ; & cela par une raison bien fondée, c'est qu'en divisant le spectre de lumière épurée en sept intervalles, & suivant la proportion donnée par Newton, chacun de ces intervalles contient des couleurs qui, quoique prises toutes ensemble, sont indécomposables par le prisme & par quelque art que ce soit, ce qui leur a fait donner le nom de *couleurs primitives* : Si au lieu de diviser le spectre en sept, on ne le divise qu'en six, ou cinq, ou quatre, ou trois intervalles, alors les couleurs contenues dans chacun de ces intervalles se décomposent par le prisme, & par conséquent ces
couleurs

de
couleur
pas être
tives.
couleur
minati
un plu
on divi
deux ou
seroient
partage
de coul
à des ch
Il se
que l'étr
intervall
à l'étend
de la mu
dont on
ces deux
de l'autr
glément
tendre,
soumettr
commun
par les
qu'il est
yeux ou
Suppl

des Minéraux, Partie Exp. 313

couleurs ne sont pas pures, & ne doivent pas être regardées comme couleurs primitives. On ne peut donc pas réduire les couleurs primitives à moins de sept dénominations, & on ne doit pas en admettre un plus grand nombre, parce qu'alors on diviseroit inutilement les intervalles en deux ou plusieurs parties, dont les couleurs seroient de la même nature, & ce seroit partager mal-à-propos une même espèce de couleur, & donner des noms différens à des choses semblables.

Il se trouve, par un hasard singulier, que l'étendue proportionnelle de ces sept intervalles de couleurs, répond assez juste à l'étendue proportionnelle des sept tons de la musique, mais ce n'est qu'un hasard dont on ne doit tirer aucune conséquence; ces deux résultats sont indépendans l'un de l'autre, & il faut se livrer bien aveuglément à l'esprit de système pour prétendre, en vertu d'un rapport fortuit, soumettre l'œil & l'oreille à des loix communes, & traiter l'un de ces organes par les règles de l'autre, imaginant qu'il est possible de faire un concert aux yeux ou un paysage aux oreilles.

Supplément. Tome II.

O

314 Introduction à l'Histoire

Ces sept couleurs, produites par la réfraction, sont inaltérables, & contiennent toutes les couleurs & toutes les nuances de couleurs qui sont au monde; les couleurs du prisme, celles des diamens, celles de l'arc-en-ciel, des images des halos, dépendent toutes de la réfraction, & en suivent exactement les loix.

La réfraction n'est cependant pas le seul moyen pour produire des couleurs, la lumière a de plus que sa qualité réfrangible d'autres propriétés qui, quoique dépendantes de la même cause générale, produisent des effets différents; de la même façon que la lumière se rompt & se divise en couleurs en passant d'un milieu dans un autre milieu transparent, elle se rompt aussi en passant auprès des surfaces d'un corps opaque: cette espèce de réfraction, qui se fait dans le même milieu, s'appelle *inflexion*, & les couleurs qu'elle produit sont les mêmes que celles de la réfraction ordinaire; les rayons violets, qui sont les plus réfrangibles, sont aussi les plus flexibles, & la frange colorée par l'inflexion de la lumière ne diffère du spectre coloré produit par la réfraction, que dans la

d
forme
diffé
prop
égal,
comm
soit c
qu'un
Ma
Natur
leurs,

(a) P:
au sujet
lumière.
assez gén
la plus g
chose qu
cette plu
les cas: c
plus aisé
un cas pa
les autres
mêmes lo
à ressort;
de lumie
réflexibili
tionnelle
plus réfle
ressort; q
de la lum
tensité a

forme; & si l'intensité des couleurs est différente, l'ordre en est le même, les propriétés toutes semblables, le nombre égal, la qualité primitive & inaltérable commune à toutes, soit dans la réfraction, soit dans l'inflexion, qui n'est en effet qu'une espèce de réfraction.

Mais le plus puissant moyen que la Nature emploie pour produire des couleurs, c'est la réflexion (a); toutes les

(a) J'avoue que je ne pense pas comme Newton, au sujet de la réflexibilité des différens rayons de la lumière. Sa définition de la réflexibilité n'est pas assez générale pour être satisfaisante, il est sûr que la plus grande facilité à être réfléchi, est la même chose que la plus grande réflexibilité, il faut que cette plus grande facilité soit générale pour tous les cas: or qui sait si le rayon violet se réfléchit le plus aisément dans tous les cas; à cause que dans un cas particulier, il rentre plus dans le verre que les autres rayons; la réflexion de la lumière suit les mêmes loix que le rebondissement de tous les corps à ressort; de-là on doit conclure que les particules de lumière sont élastiques, & par conséquent la réflexibilité de la lumière sera toujours proportionnelle à son ressort, & dès-lors les rayons les plus réfléchibles seront ceux qui auront le plus de ressort; qualité difficile à mesurer dans la matière de la lumière, parce qu'on ne peut mesurer l'intensité d'un ressort que par la vitesse qu'il produit;

316 Introduction à l'Histoire

couleurs matérielles en dépendent, le vermillon n'est rouge que parce qu'il réfléchit abondamment les rayons rouges de la lumière, & qu'il absorbe les autres; l'outremer ne paroît bleu que parce qu'il réfléchit fortement les rayons bleus, & qu'il reçoit dans ses pores tous les autres rayons qui s'y perdent. Il en est de même des autres couleurs des corps opaques &

il faudroit donc pour qu'il fût possible de faire une expérience sur cela, que les satellites de Jupiter fussent illuminés successivement par toutes les couleurs du prisme, pour reconnoître par leurs éclipses s'il y auroit plus ou moins de vitesse dans le mouvement de la lumière violette que dans le mouvement de la lumière rouge; car ce n'est que par la comparaison de la vitesse de ces deux différens rayons qu'on peut savoir si l'un a plus de ressort que l'autre ou plus de réflexibilité. Mais on n'a jamais observé que les satellites, au moment de leur émergence, aient d'abord paru violets, & ensuite éclairés successivement de toutes les couleurs du prisme; donc il est à présumer que les rayons de lumière ont à peu-près tous un ressort égal, & par conséquent autant de réflexibilité. D'ailleurs le cas particulier où le violet paroît être plus réflexible ne vient que de la réfraction, & ne paroît pas tenir à la réflexion, cela est aisé à démontrer. Newton a fait voir, à n'en pouvoir douter, que les rayons différens sont inégalement réfrangibles, que le rouge l'est

de
transp
l'unifc
compo
densité
mêmes
transpa
parent
plaque

le moins
pas étonn
violet se
la surface
premier f
d'y rentr
l'obliquité
être assez
dans le ve
Newton,
suite de la
donc pas a
réfrangible
paroît vrai
pour une
il est évic
miroir &
réflexion
cas bien d
sortir d'un
est contrai
n'ont rien
avis, s'exp

des Mineraux, Partie Exp. 317

transparens ; la transparence dépend de l'uniformité de densité ; lorsque les parties composantes d'un corps sont d'égale densité, de quelque figure que soient ces mêmes parties, le corps sera toujours transparent. Si l'on réduit un corps transparent à une fort petite épaisseur, cette plaque mince produira des couleurs dont

le moins, & le violet le plus de tous ; il n'est donc pas étonnant qu'à une certaine obliquité le rayon violet se trouvant en sortant du prisme plus oblique à la surface que tous les autres rayons, il soit le premier saisi par l'attraction du verre & contraint d'y rentrer, tandis que les autres rayons, dont l'obliquité est moindre, continuent leur route sans être assez attirés, pour être obligés de rentrer dans le verre ; ceci n'est donc pas, comme le prétend Newton, une vraie réflexion, c'est seulement une suite de la réfraction. Il me semble qu'il ne devoit donc pas assurer en général que les rayons les plus réfrangibles étoient les plus réfléchies. Cela ne me paroît vrai qu'en prenant cette suite de la réfraction pour une réflexion, ce qui n'en est pas une ; car il est évident qu'une lumière qui tombe sur un miroir & qui en rejaillit en formant un angle de réflexion égal à celui d'incidence, est dans un cas bien différent de celui où elle se trouve au sortir d'un verre si oblique à la surface qu'elle est contrainte d'y rentrer ; ces deux phénomènes n'ont rien de commun, & ne peuvent, à mon avis, s'expliquer par la même cause.

l'ordre & les principales apparences sont fort différentes des phénomènes du spectre ou de la frange colorée ; aussi ce n'est pas par la réfraction que ces couleurs sont produites, c'est par la réflexion : les plaques minces des corps transparens, les bulles de savon, les plumes des oiseaux, &c. paroissent colorées parce qu'elles réfléchissent certains rayons & laissent passer ou absorbent les autres ; ces couleurs ont leurs loix & dépendent de l'épaisseur de la plaque mince, une certaine épaisseur produit constamment une certaine couleur, toute autre épaisseur ne peut la produire, mais en produit une autre ; & lorsque cette épaisseur est diminuée à l'infini, en sorte qu'au lieu d'une plaque mince & transparente on n'a plus qu'une surface polie sur un corps opaque, ce poli, qu'on peut regarder comme le premier degré de la transparence, produit aussi des couleurs par la réflexion, qui ont encore d'autres loix ; car lorsqu'on laisse tomber un trait de lumière sur un miroir de métal, ce trait de lumière ne se réfléchit pas tout entier sous le même angle, il s'en disperse une partie qui produit des couleurs

de

dont
des pl
assez c

Tot

parler
queme
mais i

accide

notre

Lorsqu

voit de

cet or

on vo

genre

appelle

disting

qu'en

lorsqu

trop fo

Perf

Jurin

genre

tienne

(b) E
page II
tome II,

des Minéraux, Partie Exp. 319

dont les phénomènes, aussi bien que ceux des plaques minces, n'ont pas encore été assez observés.

Toutes les couleurs dont je viens de parler, sont naturelles & dépendent uniquement des propriétés de la lumière ; mais il en est d'autres qui me paroissent accidentelles & qui dépendent autant de notre organe que de l'action de la lumière. Lorsque l'œil est frappé ou pressé, on voit des couleurs dans l'obscurité, lorsque cet organe est mal disposé ou fatigué, on voit encore des couleurs ; c'est ce genre de couleurs que j'ai cru devoir appeler *couleurs accidentelles*, pour les distinguer des couleurs naturelles, & parce qu'en effet elles ne paroissent jamais que lorsque l'organe est forcé ou qu'il a été trop fortement ébranlé.

Personne n'a fait, avant le Docteur Jurin (b), la moindre observation sur ce genre de couleurs, cependant elles tiennent aux couleurs naturelles par

(b) Essai, *Upon distinct and indistinct vision*, page 115, des notes sur l'Optique de Smith, tome II, imprimé à Cambridge en 1738.

plusieurs rapports, & j'ai découvert une suite de phénomènes singuliers sur cette matière, que je vais rapporter le plus succinctement qu'il me sera possible.

Lorsqu'on regarde fixement & long-temps une tache ou une figure rouge sur un fond blanc, comme un petit carré de papier rouge sur un papier blanc, on voit naître autour du petit carré rouge une espèce de couronne d'un vert foible; en cessant de regarder le carré rouge si on porte l'œil sur le papier blanc, on voit très-distinctement un carré d'un vert tendre, tirant un peu sur le bleu; cette apparence subsiste plus ou moins long-temps, selon que l'impression de la couleur rouge a été plus ou moins forte. La grandeur du carré vert imaginaire, est la même que celle du carré réel rouge, & ce vert ne s'évanouit qu'après que l'œil s'est rassuré & s'est porté successivement sur plusieurs autres objets dont les images détruisent l'impression trop forte causée par le rouge.

En regardant fixement & long-temps une tache jaune sur un fond blanc, on voit naître autour de la tache une couronne

d'un ble
la tache
autre en
distincte
figure &
tache ja
moins a
du vert
paru, ap
avoir fa
d'autres
& plus
impressio
celle du
qu'elle p
& subsist
verte pro
prouver
le jaune
qui fatig

Si l'on
une tach
voit naître
couleur l
d'une pe
cessant d
portant l

des Minéraux, Partie Exp. 321

d'un bleu pâle, & en cessant de regarder la tache jaune & portant son œil sur un autre endroit du fond blanc, on voit distinctement une tache bleue de la même figure & de la même grandeur que la tache jaune, & cette apparence dure au moins aussi long-temps que l'apparence du vert produit par le rouge. Il m'a même paru, après avoir fait moi-même, & après avoir fait répéter cette expérience à d'autres dont les yeux étoient meilleurs & plus forts que les miens; que cette impression du jaune étoit plus forte que celle du rouge, & que la couleur bleue qu'elle produit s'effaçoit plus difficilement & subsistoit plus long-temps que la couleur verte produite par le rouge; ce qui semble prouver ce qu'a soupçonné Newton, que le jaune est de toutes les couleurs celle qui fatigue le plus nos yeux.

Si l'on regarde fixement & long-temps une tache verte sur un fond blanc, on voit naître autour de la tache verte une couleur blanchâtre, qui est à peine colorée d'une petite teinte de pourpre; mais en cessant de regarder la tache verte & en portant l'œil sur un autre endroit du fond

322 *Introduction à l'Histoire*

blanc, on voit distinctement une tache d'un pourpre pâle, semblable à la couleur d'une améthyste pâle; cette apparence est plus foible & ne dure pas, à beaucoup près, aussi long-temps que les couleurs bleues & vertes produites par le jaune & par le rouge.

De même en regardant fixement & long-temps une tache bleue sur un fond blanc, on voit naître autour de la tache bleue une couronne blanchâtre un peu teinte de rouge, & en cessant de regarder la tache bleue, & portant l'œil sur le fond blanc, on voit une tache d'un rouge pâle, toujours de la même figure & de la même grandeur que la tache bleue, & cette apparence ne dure pas plus long-temps que l'apparence pourpre produite par la tache verte.

En regardant de même avec attention une tache noire sur un fond blanc, on voit naître autour de la tache noire une couronne d'un blanc vif, & cessant de regarder la tache noire, & portant l'œil sur un autre endroit du fond blanc, on voit la figure de la tache exactement dessinée & d'un blanc beaucoup plus vif

de

que ce
mat, c
blanc c
lorés d
si on re
che sur
blanche
sur un
voit un
celui d

Voilà
dentell
des cou
produit
le bleu
bleu pr
blanc,
couleur
l'organ
les ape
appare
naturel
brillant
différen
porte à

Tou
sur des

des Minéraux, Partie Exp. 323

que celui du fond ; ce blanc n'est pas mat, c'est un blanc brillant semblable au blanc du premier ordre des anneaux colorés décrits par Newton ; & au contraire, si on regarde long-temps une tache blanche sur un fond noir, on voit la tache blanche se décolorer, & en portant l'œil sur un autre endroit du fond noir, on y voit une tache d'un noir plus vif que celui du fond.

Voilà donc une suite de couleurs accidentelles, qui a des rapports avec la suite des couleurs naturelles ; le rouge naturel produit le vert accidentel, le jaune produit le bleu, le vert produit le pourpre, le bleu produit le rouge, le noir produit le blanc, & le blanc produit le noir. Ces couleurs accidentelles n'existent que dans l'organe fatigué, puisqu'un autre œil ne les aperçoit pas ; elles ont même une apparence qui les distingue des couleurs naturelles, c'est qu'elles sont tendres, brillantes, & qu'elles paroissent être à différentes distances, selon qu'on les rapporte à des objets voisins ou éloignés.

Toutes ces expériences ont été faites sur des couleurs mates avec des morceaux

324 *Introduction à l'Histoire*

de papier ou d'étoffes colorées, mais elles réussissent encore mieux lorsqu'on les fait sur des couleurs brillantes, comme avec de l'or brillant & poli, au lieu de papier ou d'étoffe jaune; avec de l'argent brillant, au lieu de papier blanc; avec du lapis, au lieu de papier bleu, &c. l'impression de ces couleurs brillantes est plus vive & dure beaucoup plus long-temps.

Tout le monde sait qu'après avoir regardé le Soleil, on porte quelquefois pendant long-temps l'image colorée de cet astre sur tous les objets, la lumière trop vive du Soleil produit en un instant ce que la lumière ordinaire des corps ne produit qu'au bout d'une minute ou deux d'application fixe de l'œil sur les couleurs; ces images colorées du Soleil que l'œil ébloui & trop fortement ébranlé porte par-tout, sont des couleurs du même genre que celles que nous venons de décrire, & l'explication de leurs apparences dépend de la même théorie.

Je n'entreprendrai pas de donner ici les idées qui me sont venues sur ce sujet; quelqu'assuré que je sois de mes expériences, je ne suis pas assez certain des

de
consé
oser n
de ces
rappor
firmen
qui sen
matière

En
temps
fond
petite
parlé;
fixeme
milieu
côtés se
comme
beauc
ensuite,
à regard
cadre d
dans les
d'un ro
paroît a
dans for
quatre
cette es
aussi fo

des Minéraux, Partie Exp. 325

conséquences qu'on en doit tirer, pour oser rien hasarder encore sur la théorie de ces couleurs, & je me contenterai de rapporter d'autres observations qui confirment les expériences précédentes, & qui serviront sans doute à éclairer cette matière.

En regardant fixement & fort longtemps un carré d'un rouge vif sur un fond blanc, on voit d'abord naître la petite couronne de vert tendre, dont j'ai parlé; ensuite, en continuant à regarder fixement le carré rouge, on voit le milieu du carré se décolorer, & les côtés se charger de couleur, & former comme un cadre d'un rouge plus fort & beaucoup plus foncé que le milieu; ensuite, en s'éloignant un peu & continuant à regarder toujours fixement, on voit le cadre de rouge foncé se partager en deux dans les quatre côtés, & former une croix d'un rouge aussi foncé; le carré rouge paroît alors comme une fenêtre traversée dans son milieu par une grosse croisée & quatre panneaux blancs, car le cadre de cette espèce de fenêtre est d'un rouge aussi fort que la croisée; continuant

toujours à regarder avec opiniâtreté, cette apparence change encore, & tout se réduit à un rectangle d'un rouge si foncé, si fort & si vif, qu'il offusque entièrement les yeux; ce rectangle est de la même hauteur que le carré, mais il n'a pas la sixième partie de sa largeur: ce point est le dernier degré de fatigue que l'œil peut supporter; & lorsqu'enfin on détourne l'œil de cet objet, & qu'on le porte sur un autre endroit du fond blanc, on voit, au lieu du carré rouge réel, l'image du rectangle rouge imaginaire, exactement dessinée & d'une couleur verte brillante; cette impression subsiste fort long-temps, ne se décolore que peu-à-peu; elle reste dans l'œil même après l'avoir fermé. Ce que je viens de dire du carré rouge, arrive aussi lorsqu'on regarde très-long-temps un carré jaune ou noir, ou de toute autre couleur, on voit de même le cadre jaune ou noir, la croix & le rectangle; & l'impression qui reste est un rectangle bleu, si on a regardé du jaune; un rectangle blanc brillant, si on a regardé un carré noir, &c.

J'ai fait faire les expériences que je viens

de rapp
ont vu
& les
amis m'
regardé
un petit
de trois
autre sur
fixoit se
comme
une tach
sur un t
J'ai moi
& j'ai vu
je craign
en regar
continue
colorées
couleurs
mélant a
qu'elles
les appa
verte acc
naturel,
cette cou
couleur a
le jaune

des Minéraux, Partie Exp. 327

de rapporter à plusieurs personnes, elles ont vu, comme moi, les mêmes couleurs & les mêmes apparences. Un de mes amis m'a assuré, à cette occasion, qu'ayant regardé un jour une éclipse de Soleil par un petit trou, il avoit porté, pendant plus de trois semaines, l'image colorée de cet astre sur tous les objets; que quand il fixoit ses yeux sur du jaune brillant, comme sur une hordure dorée, il voyoit une tache pourpre, & sur du bleu comme sur un toit d'ardoises, une tache verte. J'ai moi-même souvent regardé le Soleil, & j'ai vu les mêmes couleurs; mais, comme je craignois de me faire mal aux yeux en regardant cet astre, j'ai mieux aimé continuer mes expériences sur des étoffes colorées, & j'ai trouvé qu'en effet ces couleurs accidentelles changent en se mêlant avec les couleurs naturelles, & qu'elles suivent les mêmes règles pour les apparences; car lorsque la couleur verte accidentelle, produite par le rouge naturel, tombe sur un fond rouge brillant, cette couleur verte devient jaune; si la couleur accidentelle bleue, produite par le jaune vif, tombe sur un fond jaune,

elle devient verte; en sorte que les couleurs qui résultent du mélange de ces couleurs accidentelles avec les couleurs naturelles, suivent les mêmes règles & ont les mêmes apparences que les couleurs naturelles dans leur composition & dans leur mélange avec d'autres couleurs naturelles.

Ces observations pourront être de quelque utilité pour la connoissance des incommodités des yeux, qui viennent probablement d'un grand ébranlement causé par l'impression trop vive de la lumière; une de ces incommodités est de voir toujours devant ses yeux des taches colorées, des cercles blancs ou des points noirs comme des mouches qui voltigent. J'ai oui bien des personnes se plaindre de cette espèce d'incommodité, & j'ai lu, dans quelques Auteurs de Médecine, que la goutte sereine est toujours précédée de ces points noirs. Je ne fais pas si leur sentiment est fondé sur l'expérience, car j'ai éprouvé moi-même cette incommodité, j'ai vu des points noirs pendant plus de trois mois en si grande quantité que j'en étois fort inquiet; j'avois apparemment fatigué mes yeux en faisant

de

& en ré
 précéd
 le Sole
 dans ce
 jamais
 m'incor
 lorsque
 objets
 contrain
 sur-tout
 obligé d
 la chambr
 de verts
 couleurs
 brillans,
 noirs a d
 suis plus
 vaincu q
 la trop
 c'est qu'
 j'ai touj
 je porto
 sur tous
 tion les d
 colorée,
 peu-à-peu
 plus sur

des Minéraux, Partie Exp. 329

& en répétant trop souvent les expériences précédentes, & en regardant quelquefois le Soleil, car les points noirs ont paru dans ce même temps, & je n'en avois jamais vu de ma vie; mais enfin ils m'incommodoient tellement, sur-tout lorsque je regardois au grand jour des objets fortement éclairés, que j'étois contraint de détourner les yeux; le jaune sur-tout m'étoit insupportable, & j'ai été obligé de changer des rideaux jaunes dans la chambre que j'habitois & d'en mettre de verts; j'ai évité de regarder toutes les couleurs trop fortes & tous les objets brillans, peu-à-peu le nombre des points noirs a diminué, & actuellement je n'en suis plus incommodé. Ce qui m'a convaincu que ces points noirs viennent de la trop forte impression de la lumière, c'est qu'après avoir regardé le Soleil, j'ai toujours vu une image colorée que je portois plus ou moins long-temps sur tous les objets, & suivant avec attention les différentes nuances de cette image colorée, j'ai reconnu qu'elle se décoleroit peu-à-peu, & qu'à la fin je ne portois plus sur les objets qu'une tache noire,

d'abord assez grande, qui diminueoit ensuite peu-à-peu, & se réduisoit enfin à un point noir.

Je vais rapporter à cette occasion un fait qui est assez remarquable, c'est que je n'étois jamais plus incommodé de ces points noirs que quand le ciel étoit couvert de nuées blanches, ce jour me fatiguoit beaucoup plus que la lumière d'un ciel ferein, & cela parce qu'en effet la quantité de lumière réfléchie par un ciel couvert de nuées blanches, est beaucoup plus grande que la quantité de lumière réfléchie par l'air pur; & qu'à l'exception des objets éclairés immédiatement par les rayons du Soleil, tous les autres objets qui sont dans l'ombre, sont beaucoup moins éclairés que ceux qui le sont par la lumière réfléchie d'un ciel couvert de nuées blanches.

Avant que de terminer ce Mémoire, je crois devoir encore annoncer un fait qui paroîtra peut-être extraordinaire, mais qui n'en est pas moins certain, & que je suis fort étonné qu'on n'ait pas observé; c'est que les ombres des corps qui, par leur essence, doivent être noires,

des

puisqu'e
lumière
toujours
du Sole
l'année
autant
ombres
comme
quelque
bleues,
plus be
même à
aussi sur
rien, car
vembre
bleues,
peine de
doigts a
sur un m
comme
fache pa
Physicien
ait parlé
qu'en fa
permettr
observat

Au m

des Minéraux, Partie Exp. 3 3 1

puisqu'elles ne sont que la privation de la lumière, que les ombres, dis-je, sont toujours colorées au lever & au coucher du Soleil; j'ai observé, pendant l'été de l'année 1743, plus de trente aurores & autant de soleils couchans, toutes les ombres qui tomboient sur du blanc, comme sur une muraille blanche, étoient quelquefois vertes, mais le plus souvent bleues, & d'un bleu aussi vif que le plus bel azur. J'ai fait voir ce phénomène à plusieurs personnes qui ont été aussi surprises que moi; la saison n'y fait rien, car il n'y a pas huit jours (15 novembre 1743), que j'ai vu des ombres bleues, & quiconque voudra se donner la peine de regarder l'ombre de l'un de ses doigts au lever ou au coucher du Soleil sur un morceau de papier blanc, verra comme moi cette ombre bleue. Je ne sache pas qu'aucun Astronome, qu'aucun Physicien, que personne, en un mot, ait parlé de ce phénomène, & j'ai cru qu'en faveur de la nouveauté on me permettroit de donner le précis de cette observation.

Au mois de juillet 1743, comme j'étois

332 *Introduction à l'Histoire*

occupé de mes couleurs accidentelles, & que je cherchois à voir le Soleil, dont l'œil soutient mieux la lumière à son coucher qu'à toute autre heure du jour, pour reconnoître ensuite les couleurs & les changemens de couleurs causés par cette impression, je remarquai que les ombres des arbres qui tomboient sur une muraille blanche étoient vertes; j'étois dans un lieu élevé & le Soleil se couchoit dans une gorge de montagne, en sorte qu'il me paroïtoit fort abaissé au-dessous de mon horizon; le ciel étoit serein, à l'exception du couchant, qui, quoiqu'exempt de nuages, étoit chargé d'un rideau transparent de vapeurs d'un jaune rougeâtre, le Soleil lui-même fort rouge, & sa grandeur apparente au moins quadruple de ce qu'elle est à midi; je vis donc très-distinctement les ombres des arbres qui étoient à 20 & 30 pieds de la muraille blanche, colorés d'un vert tendre tirant un peu sur le bleu; l'ombre d'un treillage, qui étoit à 3 pieds de la muraille, étoit parfaitement dessinée sur cette muraille, comme si on l'avoit nouvellement peinte en vert de gris: cette


des M



apparence
quoi la cor
du Soleil
qu'avec le
lever du S
ombres fu
au lieu de
m'y attend
plutôt de l
vif; le cie
qu'un petit
au levant
colline, en
au-dessus c
bleues ne
quoi elles
jour, je re
ombres ver
la veille. S
sans pouvo
coucher du
jours couve
je vis le Sol
n'étoient plu
d'azur, je
n'étoient pa
Soleil ayant

des Minéraux, Partie Exp. 333




apparence dura près de 5 minutes, après quoi la couleur s'affoiblit avec la lumière du Soleil, & ne disparut entièrement qu'avec les ombres. Le lendemain, au lever du Soleil, j'allai regarder d'autres ombres sur une muraille blanche, mais au lieu de les trouver vertes, comme je m'y attendois, je les trouvai bleues ou plutôt de la couleur de l'azur le plus vif; le ciel étoit serein, & il n'y avoit qu'un petit rideau de vapeurs jaunâtres au levant, le Soleil se levoit sur une colline, en sorte qu'il me paroïssoit élevé au-dessus de mon horizon, les ombres bleues ne durèrent que 3 minutes, après quoi elles me parurent noires; le même jour, je revis au coucher du Soleil les ombres vertes, comme je les avois vues la veille. Six jours se passèrent ensuite sans pouvoir observer les ombres au coucher du Soleil, parce qu'il étoit toujours couvert de nuages; le septième jour, je vis le Soleil à son coucher, les ombres n'étoient plus vertes, mais d'un beau bleu d'azur, je remarquai que les vapeurs n'étoient pas fort abondantes, & que le Soleil ayant avancé pendant sept jours,







**IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)**



**Photographic
Sciences
Corporation**

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

1.5 128 125
1.5 132
1.5 122
1.5 120
1.5 118

1.5 110
1.5 108
1.5 106
1.5 104
1.5 102

334 Introduction à l'Histoire

se couchoit derrière un rocher qui le faisoit disparaître avant qu'il pût s'abaisser au-dessous de mon horizon. Depuis ce temps, j'ai très-souvent observé les ombres, soit au lever, soit au coucher du Soleil, & je ne les ai vues que bleues, quelquefois d'un bleu fort vif, d'autres fois d'un bleu pâle, d'un bleu foncé, mais constamment bleues.

Ce Mémoire a été imprimé dans ceux de l'Académie Royale des Sciences, année 1743. Voici ce que je crois devoir y ajouter aujourd'hui (année 1773).

Des observations plus fréquentes m'ont fait reconnoître que les ombres ne paroissent jamais vertes au lever ou au coucher du Soleil, que quand l'horizon est chargé de beaucoup de vapeurs rouges; dans tout autre cas les ombres sont toujours bleues, & d'autant plus bleues que le ciel est plus serein. Cette couleur bleue des ombres, n'est autre chose que la couleur même de l'air, & je ne fais pourquoi quelques Physiciens ont défini l'air *un fluide invisible (c), inodore,*

(c) Dictionnaire de Chymie, article de l'Air.

des

insipide
céleste
de l'air
épaisseur
çoive d
que néa
des obje
plus ou
que les
les omb
de loin
Peintres
base à la
tous aur
plus sen
éloigné

On p
cette cor
notre et
grande
moins si
distance
commen
de l'air,
mille to
à l'omb
éloigné

des Minéraux, Partie Exp. 335

insipide, puisqu'il est certain que l'azur céleste n'est autre chose que la couleur de l'air; qu'à la vérité il faut une grande épaisseur d'air pour que notre œil s'aperçoive de la couleur de cet élément, mais que néanmoins lorsqu'on regarde de loin des objets sombres, on les voit toujours plus ou moins bleus. Cette observation, que les Physiciens n'avoient pas faite sur les ombres, & sur les objets sombres vus de loin, n'avoit pas échappé aux habiles Peintres, & elle doit en effet servir de base à la couleur des objets lointains, qui tous auront une nuance bleuâtre d'autant plus sensible qu'ils seront supposés plus éloignés du point de vue.

On pourra me demander comment cette couleur bleue, qui n'est sensible à notre œil que quand il y a une très-grande épaisseur d'air, se marque néanmoins si fortement à quelques pieds de distance au lever & au coucher du Soleil; comment il est possible que cette couleur de l'air, qui est à peine sensible à dix mille toises de distance, puisse donner à l'ombre noire d'un treillage, qui n'est éloigné de la muraille blanche que de

qui le
abaïsser
puis ce
ombres,
Soleil,
, quel-
res fois
, mais
ns ceux
iences,
s devoir
3).
es m'ont
ne pa-
ou au
horizon
vapeurs
ombres
nt plus
n. Cette
st autre
r, & je
ens ont
nodore,
ision
l'Air.

336 Introduction à l'Histoire

trois pieds, une couleur du plus beau bleu : c'est en effet de la solution de cette question que dépend l'explication du phénomène. Il est certain que la petite épaisseur d'air, qui n'est que de trois pieds entre le treillage & la muraille, ne peut pas donner à la couleur noire de l'ombre une nuance aussi forte de bleu ; si cela étoit, on verroit à midi & dans tous les autres temps du jour les ombres bleues comme on les voit au lever & au coucher du Soleil. Ainsi, cette apparence ne dépend pas uniquement, ni même presque point du tout de l'épaisseur de l'air entre l'objet & l'ombre. Mais il faut considérer qu'au lever & au coucher du Soleil, la lumière de cet astre étant affoiblie à la surface de la Terre, autant qu'elle peut l'être par la plus grande obliquité de cet astre, les ombres sont moins denses, c'est-à-dire, moins noires dans la même proportion, & qu'en même temps la Terre n'étant plus éclairée que par cette foible lumière du Soleil, qui ne fait qu'en raser la superficie, la masse de l'air qui est plus élevée, & qui par conséquent reçoit encore la lumière du Soleil bien moins obliquement,

de
obliqu
& nou
plus qu
ne pe
voyant
sa mêm
rayons
ront sur
couleur
d'une p
selon qu
du Sole
de l'atha
sieurs au
l'appui d
que ce q
pour qu
en soien
Je cro
observés
grand Vi
de me le
des 18 a
dont voic
ment au l
que les o
le ciel éta
Supplé

des Minéraux, Partie Exp. 337

obliquement, nous renvoie cette lumière, & nous éclaire alors autant & peut-être plus que le Soleil. Or cet air pur & bleu ne peut nous éclairer qu'en nous renvoyant une grande quantité de rayons de sa même couleur bleue, & lorsque ces rayons bleus que l'air réfléchit, tomberont sur des objets privés de toute autre couleur comme les ombres, ils les teindront d'une plus ou moins forte nuance de bleu, selon qu'il y aura moins de lumière directe du Soleil, & plus de lumière réfléchie de l'atmosphère. Je pourrois ajouter plusieurs autres choses qui viendroient à l'appui de cette explication, mais je pense que ce que je viens de dire, est suffisant pour que les bons esprits l'entendent & en soient satisfaits.

Je crois devoir citer ici quelques faits observés par M. l'Abbé Millot, ancien grand Vicaire de Lyon, qui a eu la bonté de me les communiquer par ses lettres des 18 août 1754 & 10 février 1755, dont voici l'extrait. « Ce n'est pas seulement au lever & au coucher du Soleil, » que les ombres se colorent. A midi, » le ciel étant couvert de nuages, excepté »

Supplément. Tome II.

P

338 *Introduction à l'Histoire*

» en quelques endroits, vis-à-vis d'une
 » de ces ouvertures que laissoient entr'eux
 » les nuages, j'ai fait tomber des ombres
 » d'un fort beau bleu sur du papier
 » blanc, à quelques pas d'une fenêtre.
 » Les nuages s'étant joints, le bleu dis-
 » parut. J'ajouterai en passant, que plus
 » d'une fois j'ai vu l'azur du ciel se
 » peindre, comme dans un miroir, sur
 » une muraille où la lumière tomboit
 » obliquement. Mais voici d'autres obser-
 » vations plus importantes à mon avis;
 » avant que d'en faire le détail, je suis
 » obligé de tracer la topographie de ma
 » chambre : elle est à un troisième étage,
 » la fenêtre près d'un angle au couchant,
 » la porte presque vis-à-vis. Cette porte
 » donne dans une galerie, au bout de
 » laquelle, à deux pas de distance, est
 » une fenêtre située au midi. Les jours
 » des deux fenêtres se réunissent, la porte
 » étant ouverte contre une des murailles,
 » & c'est-là que j'ai vu des ombres
 » colorées presque à toute heure, mais
 » principalement, sur les dix heures du
 » matin. Les rayons du Soleil, que la
 » fenêtre de la galerie reçoit encore

d
 obliqu
 de la
 viens
 pouces
 bois à
 sont al
 vives.
 du mên
 foncé,
 lumière
 ombres
 & d'autr
 nêtre de
 lettre; l'a
 tre. Celi
 espèce de
 forme con
 d'un côté,
 ou jaune,
 Que je fen
 les couleur
 souvent q
 troissent si
 Je dois ajo
 pas à beau
 Ma fenêtr
 mes pren

des Minéraux, Partie Exp. 339

obliquement, ne tombent point par celle
de la chambre, sur la muraille dont je
viens de parler. Je place à quelques
pouces de cette muraille des chaises de
bois à dossier percé. Les ombres en
sont alors de couleurs quelquefois très-
vives. J'en ai vu qui, quoique projetées
du même côté, étoient l'une d'un vert
foncé, l'autre d'un bel azur. Quand la
lumière est tellement ménagée, que les
ombres soient également sensibles de part
& d'autre, celle qui est opposée à la fe-
nêtre de la chambre est ou bleue ou vio-
lette; l'autre tantôt verte, tantôt jaunâ-
tre. Celle-ci est accompagnée d'une
espèce de pénombre bien colorée, qui
forme comme une double bordure bleue
d'un côté, & de l'autre verte ou rouge
ou jaune, selon l'intensité de la lumière.
Que je ferme les volets de ma fenêtre,
les couleurs de cette pénombre n'en ont
souvent que plus d'éclat; elles dispa-
roissent si je ferme la porte à moitié.
Je dois ajouter que le phénomène n'est
pas à beaucoup près si sensible en hiver.
Ma fenêtre est au couchant d'été, je
fais mes premières expériences dans cette

340 *Supplément à l'Histoire, &c.*

» saison, dans un temps où les rayons du
» Soleil tomboient obliquement sur la
» muraille qui fait angle avec celle où
les ombres se coloroient. »

On voit, par ces observations de
M. l'Abbé Millot, qu'il suffit que la
lumière du Soleil tombe très-obliquement
sur une surface, pour que l'azur du ciel,
dont la lumière tombe toujours directe-
ment, s'y peigne & colore les ombres.
Mais les autres apparences dont il fait
mention, ne dépendent que de la
position des lieux & d'autres circonstances
accessaires.

FIN du second Volume.



Des

A B S C
rien c
d'abso
de vra

A C I D
décom
tales, p
doiven
feu qu
toujou

ACIDES
d'eau d
terre da

A C I D E
quantit

A F F I N
l'eau,
tempéra
est à-pe
générale
139. Le

e, &c.

ons du
sur la
elle où

ons de
que la
quement
du ciel,
directe-
ombres.
at il fait
de la
constances

me.

i

T A B L E

Des Matières contenues dans les deux Volumes.

A

A B S O L U. Il n'y a rien d'absolu dans la Nature, rien de parfait, rien d'absolument grand, rien d'absolument petit, rien d'entièrement nul, rien de vraiment infini, *Volume I, page 21.*

A C I D E S (les) viennent en grande partie de la décomposition des substances minérales ou végétales, preuve de cette assertion. *Vol. I, 68.* Ils ne doivent leur liquidité qu'à la quantité d'air & de feu qu'ils contiennent. *Ibid. 157.* Contiennent toujours une certaine quantité d'alkali. *Ibid. 159.*

A C I D E S & A L K A L I S. Il y a plus de terre & moins d'eau dans les alkalis, & plus d'eau & moins de terre dans les acides. *Vol. I, 157.*

A C I D E S n i t r e u x (les) contiennent une grande quantité d'air & de feu fixes. *Vol. I, 68.*

A F F I N I T É S. Le degré d'affinité de l'air avec l'eau, dépend en grande partie de celui de sa température, ce degré dans son état de liquidité est à-peu-près le même que celui de la chaleur générale à la surface de la terre. *Vol. I, 138 & 139.* Les degrés d'affinité dépendent absolument

de la figure des parties intégrantes des corps.
Volume 1, 160 & 161.

AFFINITÉS chimiques (les) n'ont point d'autres principes que celui de l'attraction universelle commune à toute la matière. — Cette grande loi toujours constante, toujours la même, ne paroît varier que par son expression, qui ne peut être la même dès que la figure des corps entre comme élément dans leur distance. *Volume 1, 107 & suiv.*

A I R (l') est le premier aliment du feu, aliment nécessaire, sans lequel le feu ne peut subsister. — Un petit point de feu, tel que celui d'une bougie allumée, absorbe une grande quantité d'air, & la bougie s'éteint au moment que la quantité ou la qualité de cet aliment lui manque. *Vol. 1, 52.* L'air est le plus fluide de toutes les matières connues, à l'exception du feu, qui est la cause de toute fluidité, & qu'on doit regarder comme plus fluide que l'air. — Inductions tirées de la grande fluidité de l'air. *Ibid. 53 & suiv.* L'air est de toutes les matières connues celle que la chaleur met le plus aisément en mouvement expansif. — Il est tout près de la nature du feu. — Pourquoi il augmente si fort l'activité du feu, & pourquoi il est nécessaire à sa subsistance. *Ibid. 55.* Manière dont le feu détruit le ressort de l'air. — Explication de la façon dont l'air élastique devient fixe. — L'air étant raréfié par la chaleur, peut occuper un espace treize fois plus grand que celui de son volume ordinaire. *Ibid. 62.* L'air paroît être de toutes les matières celle qui peut exister le plus, indépendamment du feu. — Il lui faut infiniment moins de chaleur qu'à toute autre

mati
grand
peuv
le rar
110
repre
& la
tance
Ibid.
anima
dont
à l'en
il pass
suiv.
des ve
127.
moye
se sépa
matière
dont l
conter
d'air c
très-ai
aiséme
A I R F
les cor
longue
tances
sous c
nécessa
à l'air
une ch
soit ap
d'air.

matière pour entretenir sa fluidité. — Les plus grands froids & les plus fortes condensations, ne peuvent détruire son ressort, la chaleur seule, en le raréfiant, est capable de cet effet. *Volume I, 110 & 111.* Dans quelles circonstances l'air peut reprendre son élasticité. — Comment il la perd & la recouvre. — Comment il devient une substance fixe, & s'incorpore avec les autres corps. *Ibid. 111.* Manière dont il contribue à la chaleur animale. *Ibid. 117.* Explication de la manière dont l'air que les animaux respirent contribue à l'entretien de la chaleur animale. — Comment il passe dans le sang des animaux. *Ibid. 121 & suiv.* Il fait partie très-sensible de la nourriture des végétaux, & se fixe dans leur intérieur. *Ibid. 127.* L'air contenu dans l'eau est dans un état moyen entre la fixité & l'élasticité. *Ibid. 136.* Il se sépare plus aisément de l'eau que de toute autre matière. *Ibid. 138.* Explication de la manière dont le froid & le chaud dégagent également l'air contenu dans l'eau. *Ibid.* Il y a beaucoup moins d'air dans l'eau que d'eau dans l'air. — Il s'imbibe très-aisément de l'eau, & paroît aussi la rendre aisément. *Ibid. 141 & 142.*

AIR FIXE. Sa différence avec l'air différé dans les corps. *Vol. I, 62 & suiv.* Il faut une assez longue résidence de l'air devenu fixe dans les substances terrestres pour qu'il s'établisse à demeure sous cette nouvelle forme. Mais il n'est pas nécessaire que le feu soit violent pour faire perdre à l'air son élasticité; le plus petit feu & même une chaleur très-médiocre suffit, pourvu qu'elle soit appliquée long-temps sur une petite quantité d'air. *Ibid. 113.* L'air fixe existe en grande

quantité dans toutes les substances animales ou végétales, & dans un grand nombre de matières brutes. *Volume I, 128.*

AL K A L I (P) est produit par le feu; expérience qui le démontre. *Volume I, 158.* Le feu est le principe de la formation de l'alkali minéral, & les autres alkalis doivent également leur formation à la chaleur constante de l'animal & du végétal dont on les tire. *Ibid. 159.*

A N I M A U X. La chaleur dans les différens genres d'animaux n'est pas égale, les oiseaux sont les plus chauds de tous, les quadrupèdes ensuite, l'homme après les quadrupèdes, les cétacées après l'homme, les reptiles beaucoup après, & enfin les poissons, les insectes & les coquillages sont de tous les animaux ceux qui ont le moins de chaleur. *Volume I, 114.* Les animaux qui ont des poumons, & qui par conséquent respirent l'air, ont toujours plus de chaleur que ceux qui en sont privés; & plus la surface des poumons est étendue, plus aussi leur sang devient chaud. — Les oiseaux ont, relativement au volume de leur corps, les poumons considérablement plus étendus que l'homme ou les quadrupèdes, & c'est par cette raison qu'ils ont plus de chaleur; ceux qui les ont moins étendus ont aussi beaucoup moins de chaleur, & elle dépend en général de la force & de l'étendue des poumons. *Ibid. 117 & suiv.* — Les animaux fixent & transforment l'air, l'eau & le feu en plus grande quantité que les végétaux. — Les fonctions des corps organisés sont l'un des plus puissans moyens que la Nature emploie pour la conversion des élémens. *Ibid. 153.*

A N I M A U X à coquilles. Les animaux à coquilles

ou à t
dans l
terre.

A N T I
régule
moine

ARBRE
plus g
en hiv
grand
& 116
& des

BALAN
de por
drosta
14 &

BOULI
pratiq
fois les
volum
térée t

BURE.
du fo
s'éleve

CALCA
en ver
restres
neaux

DES MATIÈRES. v

ou à transudation pierreuse, sont plus nombreux dans la mer que les insectes ne le sont sur la terre. *Volume I, 147.*

ANTIMOINE. Différence de fusibilité entre le régule d'antimoine ou antimoine natif, & l'antimoine qui a déjà été fondu. *Vol. I, 414.*

ARBRES. La chaleur de l'athmosphère en été, est plus grande que la chaleur propre de l'arbre; mais en hiver cette chaleur propre de l'arbre est plus grande que celle de l'athmosphère. *Vol. I, 115 & 116.* Causes de la chaleur intérieure des arbres & des autres végétaux. *Ibid. 116.*

B

BALANCE hydrostatique. On ne peut rien conclure de positif des expériences faites à la balance hydrostatique sur des volumes trop petits. *Vol. II, 14 & 15.*

BOULETS de Canon. C'est une très-mauvaise pratique que de faire chauffer à blanc & plusieurs fois les boulets de canon pour en diminuer le volume; ils deviennent par cette opération réitérée très-légers & cassans. *Vol. II, 60.*

BURE. C'est ainsi qu'on appelle la partie supérieure du fourneau à fondre les mines de fer, qui s'élève au-dessus de son terre-plein. *Vol. II, 102.*

C

CALCAIRE. Les matières calcaires se réduiroient en verre comme toutes les autres matières terrestres par l'augmentation du feu, soit des fourneaux, soit des miroirs ardents. *Vol. I, 89.*

CALCINATION. Par la simple calcination l'on augmente le poids du plomb de près d'un quart, & l'on diminue celui du marbre de près de moitié; il y a donc un quart de matière inconnue que le feu donne au premier, & une moitié d'autre matière également inconnue qu'il enlève au second; & lorsqu'après cette calcination l'on travaille sur ces matières calcinées, il est évident que ce n'est plus sur le plomb ou sur le marbre que l'on travaille, mais sur des matières dénaturées ou composées par l'action du feu. *Vol. I, 78.* La calcination est pour les corps fixes & incombustibles, ce qu'est la combustion pour les matières volatiles & inflammables. — Elle a besoin, comme la combustion, du secours de l'air. — Comparaison de la calcination & de la combustion. *Ibid. 98 & suiv.* Toute calcination est toujours accompagnée d'un peu de combustion, & de même toute combustion est toujours accompagnée d'un peu de calcination. *Ibid. 100.* Explication de la manière dont certaines matières augmentent de pesanteur par l'effet de la calcination. *Ibid. 102.* Calcination produite par la chaleur obscure dans la pierre calcaire jusqu'à 2 pieds & 2 pieds $\frac{1}{2}$ de profondeur. *Vol. II, 122.* La calcination est plus grande par la chaleur obscure & concentrée que par le feu libre & lumineux. — Moyen de faire à peu de frais la calcination du plâtre & des pierres. *Ibid. 224.*

CALCUL. On peut tout représenter avec le calcul, mais on ne réalise rien. *Vol. I, 191.*

CANONS de fusil. La soudure est l'opération la plus importante dans la fabrication des canons de fusil, & celle qui est en même temps la plus difficile.

— Faire
CHALEUR
que
regar
de la
aussi
fait n
chale
Siège
lumiè
géné
il est
chale
chale
matiè
est un
la lun
bien p
Son n
celui
est l'a
celle
Elle d
que la
deux
Soleil
dont l
Ibid.
Terre
nous
de Pa
quatre
hiver

— Précautions qu'il faudroit prendre pour la faire réussir. *Volume II, 92.*

CHALEUR (la) paroît tenir encore de plus près que la lumière à l'essence du feu, & on doit regarder la chaleur comme une chose différente de la lumière & du feu. *Vol. I, 26.* Elle existe aussi très-souvent sans lumière. *Ibid. 26.* On a fait moins de découvertes sur la nature de la chaleur que sur celle de la lumière. *Ibid. 28.* Siége de la chaleur différent de celui de la lumière. *Ibid. 29.* Le globe de la Terre, & en général toutes les matières fluides & solides dont il est composé ou environné, ont toutes une chaleur propre très-grande & plus grande que la chaleur qui nous vient du Soleil. *Ibid.* Toute la matière connue est chaude, & dès-lors la chaleur est une affection bien plus générale que celle de la lumière. *Ibid.* Les molécules de la chaleur sont bien plus grosses que celles de la lumière. *Ibid. 30.* Son mouvement progressif est bien plus lent que celui de la lumière. — Le principe de la chaleur est l'attrition des corps. *Ibid.* Sa production & celle de la lumière; leur différence. *Ibid. 31.* Elle diminue dans sa propagation beaucoup plus que la lumière. *Ibid. 39.* L'on doit reconnoître deux sortes de chaleurs; l'une lumineuse, dont le Soleil est le foyer immense, & l'autre obscure, dont le grand réservoir est le globe terrestre. *Ibid. 44.* La chaleur qui émane du globe de la Terre est bien plus considérable que celle qui nous vient du Soleil. — Elle est dans le climat de Paris vingt-neuf fois plus grande en été, & quatre cents quatre-vingt-dix fois plus grande en hiver que celle qui nous vient de cet astre, &

cette estimation est encore trop foible. *Ibid.* 45 & 46. Effets de la chaleur du globe terrestre sur les matières minérales. *Vol.* I, 50. La chaleur intérieure du globe a été originaiement bien plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui; on doit lui rapporter, comme à la cause première, toutes les sublimations, précipitations, agrégations, séparations, en un mot tous les mouvemens qui se sont faits & se font chaque jour dans l'intérieur du globe. *Volume* I, 50. La chaleur seule & dénuée de toute apparence de lumière & de feu peut produire les mêmes effets que le feu le plus violent. *Ibid.* 51. Elle chasse des corps toutes les parties humides, elle dilate les corps en les séchant & en augmente la dureté; exemple de cette dureté acquise par la chaleur dans les pierres calcaires. — Elle augmente la pesanteur spécifique de plusieurs matières, & se fixe dans leur intérieur lorsqu'elle leur est long-temps appliquée. *Ibid.* 66. Les degrés de chaleur sont différens dans les différens genres d'animaux. *Ibid.* 114. La chaleur propre du globe terrestre entre comme élément dans la combinaison de tous les autres élémens. *Ibid.* 132. Progression de la chaleur, tant pour l'entrée que pour la sortie dans des boulets de fer de différens diamètres, déterminée par des expériences précises. *Ibid.* 204 & *suiv.* La durée de la chaleur dans les globes, n'est rigoureusement proportionnelle à leur diamètre que dans la supposition mathématique que ces globes soient composés d'une matière parfaitement perméable à la chaleur; en sorte que la sortie de la chaleur fût absolument libre, & que les particules ignées ne trouvassent aucun obstacle qui pût les arrêter ni

chan
obsta
absol
solide
de la
Vol.
diffé
un t
propo
plus
Ce n'
que
moins
bien
leur s
grand
vérité
densité
la cha
fluides
minéra
comme
est cel
pour s
Fer.
Émeril
Cuivre
Or.
Argent
Zinc.
Marbre
Marbre
Pierre
Grès.
Verre.

DES MATIÈRES. ix

changer le cours de leur direction. — Mais les obstacles qui résultent de la perméabilité non absolue, imparfaite & inégale de toute matière solide, au lieu de diminuer le temps de la durée de la chaleur, doivent au contraire l'augmenter. *Vol. I, 216 & 217.* La durée de la chaleur dans différentes matières exposées au même feu pendant un temps égal, est toujours dans la même proportion, soit que le degré de chaleur soit plus grand ou plus petit; exemples. *Ibid. 238.* Ce n'est pas proportionnellement à leur densité que les corps reçoivent & perdent plus ou moins vite la chaleur, mais dans un rapport bien différent, & qui est en raison inverse de leur solidité, c'est-à-dire, de leur plus ou moins grande non-fusibilité: démonstration de cette vérité par l'expérience. *Ibid. 239 & suiv.* La densité n'est pas relative à l'échelle du progrès de la chaleur dans les corps solides, ni dans les fluides. *Ibid. 242.* Ordre dans lequel les matières minérales reçoivent & perdent la chaleur à commencer par le fer, qui de toutes les matières est celle à laquelle il faut le plus de temps pour s'échauffer & se refroidir.

<p>Fer.</p> <p>Émeril.</p> <p>Cuivre.</p> <p>Or.</p> <p>Argent.</p> <p>Zinc.</p> <p>Marbre blanc.</p> <p>Marbre commun.</p> <p>Pierre calcaire dure.</p> <p>Grès.</p> <p>Verre.</p>	<p>Plomb.</p> <p>Étain.</p> <p>Pierre calcaire tendre.</p> <p>Glaïse.</p> <p>Bismuth.</p> <p>Porcelaine.</p> <p>Antimoine.</p> <p>Ocre.</p> <p>Craie.</p> <p>Gyps.</p> <p>Bois.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vol. I, 393 & suivantes. Le progrès de la chaleur dans les métaux, demi-métaux & minéraux métalliques, est en même raison, ou du moins en raison très-voisine de celle de leur fusibilité. *Ibid. 416.* Le progrès de la chaleur dans toutes les substances minérales, est toujours à très-peu près en raison de leur plus ou moins grande facilité à se calciner ou à se fondre, mais quand leur calcination ou leur fusion sont également difficiles, & qu'elles exigent un degré de chaleur extrême, alors le progrès de la chaleur se fait suivant l'ordre de leur densité. *Ibid. 421.* Lorsque la chaleur est appliquée long-temps, elle se fixe dans les pierres & autres matières solides, & en augmente la pesanteur spécifique. *Volume II, 128.* Estimation de la quantité de chaleur qui se fixe dans les pierres calcaires. *Ibid. 131 & 132.*

CHALEUR animale (la) est une espèce de feu qui ne diffère du feu commun que du moins au plus. — Raison pourquoi ce feu ou cette chaleur animale sont sans flamme & sans fumée apparente. *Vol. I, 122 & suiv.*

CHALEUR concentrée. La plus violente chaleur, & la plus concentrée pendant un très-long temps, ne peut, sans le secours & le renouvellement de l'air, fondre la mine de fer ni même le sable vitrescible, tandis qu'une chaleur de même espèce & beaucoup moindre peut calciner toutes les matières calcaires. *Vol. II, 117.* La chaleur la plus violente, dès qu'elle n'est pas nourrie, produit moins d'effet que la plus petite chaleur qui trouve de l'aliment. *Ibid. 120.* Chaleur morte & feu vivant, leur différence. *Ibid.*

CHAL
lum

Vol.

qu'e

quan

— C

avec

En a

on p

man

on p

CH A R

d'air

s'en c

de ch

rience

sa ma

n'a p

CHAUF

partie

les gl

refroi

main,

du ter

la tem

CHAUX

foible

de la

phéno

chaux.

a subi

grande

de faire

123. I

CHALEUR obscure, c'est-à-dire, chaleur privée de lumière, de flamme & de feu libre; ses effets. *Volume II, 98 & suiv.* Petite quantité d'alimens qu'elle consume, en comparaison de la très-grande quantité d'alimens que consume le feu libre. — Comparaison des effets de la chaleur obscure avec les effets du feu lumineux. *Ibid. 109 & suiv.* En augmentant la masse de la chaleur obscure, on peut produire de la lumière, de la même manière qu'en augmentant la masse de la lumière on produit de la chaleur. *Ibid. 121 & 122.*

CHARBON. Il ne se dégage que peu ou point d'air du charbon dans sa combustion, quoiqu'il s'en dégage plus d'un tiers du poids total du bois de chêne bien séché. *Volume II, 108.* Expérience sur la diminution de son volume & de sa masse dans un grand fourneau clos, où l'air n'a point d'accès. *Ibid. 115.*

CHAUFFER & refroidir. Il faut environ la sixième partie & demie du temps pour chauffer à blanc les globes de fer, de ce qu'il en faut pour les refroidir au point de pouvoir les tenir dans la main, & environ la quinzième partie & demie du temps qu'il faut pour les refroidir au point de la température actuelle. *Vol. I, 225.*

CHAUX (la) faite avec des coquilles, est plus foible que la chaux faite avec du marbre ou de la pierre dure. — Explication des différens phénomènes que présente la calcination de la chaux. *Volume I, 149 & 150.* La chaux, qui a subi une longue calcination, contient une plus grande partie d'alkali. *Ibid. 158.* Moyen facile de faire de la chaux à moindres frais. *Volume II, 123.* Différence de la chaux faite à un feu lent,

ou simplement avec la chaleur obscure, & de la chaux faite à la manière ordinaire. *Vol. II, 125.*

CHYMIE. Défauts de sa théorie. *Volume I, 77.*
D'où provient l'obscurité de cette science. *Ibid.*
105 & suiv.

COMBUSTIBLES. Les matières combustibles ne se consomment pas dans des vaisseaux bien clos, quoiqu'exposées à l'action du plus grand feu. *Volume I, 53.* On peut mesurer la célérité ou la lenteur avec laquelle le feu consume les matières combustibles, par la quantité plus ou moins grande de l'air qu'on lui fournit. *Ibid. 56.* Matières combustibles qui paroissent n'avoir pas besoin d'air pour se consumer. *Ibid. 58.* Explication de la manière dont se fait la combustion de ces matières. *Ibid.* Différences des matières combustibles, & non combustibles. *Ibid.* Rapport des matières combustibles avec le feu. *Ibid. 60 & suiv.* Différence essentielle entre les matières volatiles & les matières fixes, & entre les substances plus ou moins combustibles. *Ibid. 61.* Toutes les matières combustibles viennent originellement des animaux ou des végétaux; preuve de cette assertion. *Ibid. 64 & suiv.*

COMBUSTION. Explication de la manière dont s'opère la combustion. *Volume I, 56 & suiv.* Ce qu'elle suppose de plus que la volatilisation. *Ibid. 58.* Ses effets comparés à ceux de la calcination. *Ibid. 99.* La combustion & la calcination sont des effets du même ordre. *Ibid.*

COMÈTES. Correction à faire à l'estime que Newton a faite de la chaleur que le Soleil a communiqué à la comète de 1680. *Volume I, 225.*

Cette
leur
cela
temp
Exp
les q
comé
pas u
durab
de ce
de s'é
surfac
instan

CONG
manie
l'infla

COQU
matière
Vol. I

COQU
des co

CORPS.
feroit
incapa
mouv
ou se
plus fi
plus fo

COUC
la sur
exposé
subi to
à celle

DES MATIÈRES. *xiiij*

Cette comète n'a pu recevoir le degré de chaleur assigné par Newton, il auroit fallu pour cela qu'elle eût séjourné pendant un très-long temps dans le point de son périhélie. *Vol. I, 228.* Explication de l'origine de ce que l'on appelle les queues des comètes. *Ibid. 234.* Lorsque les comètes approchent du Soleil, elles ne reçoivent pas une chaleur immense, ni très-long-temps durable; leur séjour est si court dans le voisinage de cet astre, que leur masse n'a pas le temps de s'échauffer, il n'y a guère que la partie de la surface exposée au Soleil qui soit brûlée par cet instant de grande chaleur. *Ibid. 233 & 234.*

CONGÉLATION (la) paroît présenter d'une manière inverse les mêmes phénomènes que l'inflammation. *Vol. I, 145.*

COQUILLAGES (les) ont produit toute la matière calcaire qui existe sur le globe terrestre. *Vol. I, 146 & 147.*

COQUILLES. Accroissement & multiplication des coquilles. *Vol. I, 147.*

CORPS. Un corps dur & absolument inflexible, seroit nécessairement immobile, c'est-à-dire, incapable de recevoir ou de communiquer le mouvement. *Volume I, 2.* Les corps s'échauffent ou se refroidissent d'autant plus vite qu'ils sont plus fluides & d'autant plus lentement qu'ils sont plus solides. *Ibid. 241.*

COUCHES de la terre. Les couches voisines de la surface du globe sont les seules qui, étant exposées à l'action des causes extérieures, ont subi toutes les modifications que ces causes réunies à celle de la chaleur intérieure auront pu produire

par leur action combinée, c'est-à-dire, toutes les formes de substances minérales. *Vol.* I, 51.

COULEURS en général. Moyens de les produire. *Volume* II, 309. Chaque couleur différente a un degré différent de réfrangibilité. — Pourquoi les dénominations de toutes les couleurs doivent être réduites à sept, ni plus ni moins. *Ibid.* 310 & *suiv.* Le rapport entre les sept espaces qui contiennent les couleurs primitives & les sept intervalles des sept tons de la Musique n'est qu'une proportion de hasard dont on ne doit tirer aucune conséquence. *Ibid.* 313. Elles sont produites par la réflexion de la lumière, aussi-bien que par la réfraction. *Ibid.* 315 & *suiv.*

COULEURS, (les) odeurs, saveurs, proviennent toutes de l'élément du feu; preuves de cette assertion. *Vol.* I, 157 & 158.

COULEURS accidentelles. Découverte des couleurs accidentelles. *Volume* II, 319 & *suiv.* Rapports & différence des couleurs naturelles & accidentelles. *Ibid.* 319 & *suiv.* Moyen de les produire, & exposition des phénomènes qu'elles présentent. *Ibid.* Expériences sur les couleurs accidentelles faites sur des couleurs naturelles mates, & sur des couleurs naturelles brillantes. *Ibid.* 323 & 324. Les taches que l'œil porte sur tous les objets, après avoir regardé le Soleil, sont des phénomènes du même genre que ceux des couleurs accidentelles. — Il en est de même des flammes & des points noirs que l'on voit lorsque l'organe de l'œil est trop fatigué. *Ibid.* 324 & *suiv.* Autres expériences sur les couleurs accidentelles. *Ibid.* 325 & *suiv.*

CRYST
phé
&
feu
fois

CUIV
de
plon

CUV
plus
fond
ordie
haut
dire
du f

DÉCH
d'un
veut
chet
de m

DÉCOM
rente
leur

DENS
l'idée
densi
démoc
encor

DÉVE
loppé
végé

CRYSTALLISATION. Explication générale des phénomènes de la cristallisation. *Volume I*, 166 & *suiv.* Elle peut se faire par l'intermède du feu aussi-bien que par celui de l'eau & quelque-fois par le concours des deux. *Ibid.*

CUIVRE (le) s'échauffe & se refroidit en moins de temps que le fer & plus lentement que le plomb. *Vol. I*, 247.

CUYE. C'est ainsi qu'on appelle l'endroit de la plus grande capacité des grands fourneaux où l'on fond les mines de fer; cet endroit se trouve ordinairement à un quart ou à un tiers de la hauteur du fourneau prise depuis le bas, c'est-à-dire à deux tiers ou trois quarts depuis le dessus du fourneau. *Vol. II*, 99.

D

DÉCHET (le) du fer en gueuse est ordinairement d'un tiers, & souvent de plus d'un tiers si l'on veut obtenir du fer d'excellente qualité, & le déchet du fer fait avec des vieilles ferrailles n'est pas de moitié, c'est-à-dire, d'un sixième. *Vol. II*, 78.

DÉCOMPOSITION du fer. Deux manières différentes dont s'opère la décomposition du fer, leur comparaison. *Vol. II*, 94 & 95.

DENSITÉ. Explication & développement de l'idée qu'on doit se former des causes de la densité. *Volume I*, 408. Matière dense: on peut démontrer que la matière la plus dense contient encore plus de vuide que de plein. *Ibid.* 409.

DÉVELOPPEMENT. Explication du développement & de la nutrition des animaux & des végétaux. *Vol. I*, 152 & 153.

DIAMANT. C'est mal-à-propos qu'on a donné le diamant pour la terre pure & élémentaire. *Volume I, 169.*

DILATATION (la) par la chaleur, est générale dans tous les corps. — La dilatation est le premier degré pour arriver à la fusion. *Vol. I, 59.*

DISSOLUTION. Toutes les explications que l'on donne de la dissolution, ne peuvent se soutenir, si l'on n'admet pas deux forces opposées, l'une attractive & l'autre expansive, & par conséquent la présence des élémens de l'air & du feu, qui sont seuls doués de cette seconde force. Explication générale de la manière dont s'opère la dissolution. *Vol. I, 160 & 161.*

DUCTILITÉ (la) des métaux paroît avoir autant de rapport à la densité qu'à la fusibilité, & cette qualité semble être en raison composée des deux autres. *Volume I, 410.* Difficulté de prononcer affirmativement sur le plus ou moins de ductilités des substances minérales. *Ibid. & suiv.*

DURÉE (la) de la chaleur n'est pas en raison plus petite, mais plutôt en raison plus grande que celle des diamètres ou des épaisseurs des corps. *Vol. I, 220.*

E

E A U (l') a, comme toutes les autres matières du globe, un grand degré de chaleur qui lui appartient en propre, & qui est indépendante de celle du Soleil. *Volume I, 49.* Elle est aussi chaude à 100 & 200 brasses de profondeur dans la mer qu'elle l'est à la surface. *Ibid. 49.*

DES MATIÈRES. xvij

Il suffit de faire chauffer de l'eau ou de la faire geler, pour que l'air qu'elle contient reprenne son élasticité & s'élève en bulles sensibles à sa surface. *Volume I*, 137. L'eau, soit gelée, soit bouillie, reprend l'air qu'elle avoit perdu dès qu'elle se liquéfie ou qu'elle se refroidit. *Ibid.* 138. Étant prise en masse est incompressible, & néanmoins très-élastique, dès qu'elle est en petites parties. *Ibid.* 139. Elle peut se changer en air lorsqu'elle est assez raréfiée pour s'élever en vapeur. *Ibid.* 140. Sa transformation en matière solide par le filtre animal. *Ibid.* 146. Elle s'unit de préférence avec l'air & ensuite avec les sels, & c'est par leur moyen qu'elle entre dans la composition des minéraux. *Ibid.* 154. La durée de la chaleur dans l'eau, est plus exactement proportionnelle à son épaisseur que dans les corps solides; raison de cet effet. *Ibid.* 221.

ÉCROUISSEMENT. Considération de l'écrouissement des métaux; le fer s'écroutit comme tous les autres. *Volume I*, 411.

EFFERVESCENCE. Le degré de division de la matière dans les effervescences est fort au-dessus de celui de la division de la matière dans les cristallisations. *Vol. I*, 168.

EFFET général. Pourquoi on ne peut pas en donner la cause; les effets généraux de la Nature doivent être pris pour les vraies causes, *Vol. I*, page 8.

ÉLÉMENTS. Tous les éléments sont convertibles; le feu, l'air, l'eau & la terre peuvent chacun devenir successivement chaque autre; preuve de cette assertion. *Volume I*, 23 & *suiv.* La terre,

l'eau, l'air & le feu, entrent tous quatre dans tous les corps de la Nature, mais en proportion très-différente. *Volume I, 60.* Dans l'ordre de la conversion des élémens, l'eau est pour l'air ce que l'air est pour le feu, & toutes les transformations de la Nature dépendent de celles-ci. — L'eau raréfiée par la chaleur, se transforme en une espèce d'air capable d'alimenter le feu comme l'air ordinaire, & le feu se convertit ultérieurement avec l'air en matière fixe dans les substances terrestres qu'il pénètre par la chaleur ou par la lumière. *Ibid. 143 & 144.* Grandes bases sur lesquelles sont fondés les quatre élémens, la terre, l'eau, l'air & le feu. *Ibid. 168.*

ÉMÉRIL (P) quoiqu'une fois moins dense que le bismuth, conserve sa chaleur une fois plus long-temps. *Vol. I, 412.*

ÉTAIN (P) exige pour se fondre plus du double de chaleur de ce qu'il en faut pour fondre le soufre. *Volume I, 249.* L'étain est de tous les métaux celui qui se dilate le plus promptement, & qui se fond aussi le plus vite. *Ibid. 410.*

ÉTAMAGE (P) fait avec de l'or & du mercure pourroit réfléchir plus puissamment la lumière que l'étamage ordinaire. *Vol. II, 216 & 217.*

ÉVAPORATION. Une masse d'eau d'un pied d'épaisseur ne s'évaporerait pas aussi vite que la même masse réduite à six pouces d'épaisseur, & augmentée du double en superficie. Ainsi, pour accélérer l'évaporation, il faut diminuer, autant qu'il est possible, l'épaisseur du liquide. *Vol. II, 221.*

EX
im
40
la
II

F E
per
Pr
rie
aug
fon
Le
fon
se
ent
att
non
le
c'est
dev
cass
le fe
Ibid.
pres
aussi
preu
dépe
de l
c'est
Ibid.
au fe
trop

EXPÉRIENCES. Précision rigoureuse, presque impossible dans certaines expériences. *Volume I*, 405. Expériences en grand, pour reconnoître la force du fer de différentes qualités. *Vol. II*, 61 & *suiv.*

F

FER. A chaque fois que l'on chauffe le fer, il perd une partie de son poids. *Volume I*, 212. Proportion de cette perte trouvée par les expériences. *Ibid.* & *suivantes*. Cette perte va en augmentant à mesure que les boulets de fer sont plus gros; raisons de cet effet. *Ibid.* 214. Le fer qui de tous les métaux est celui qui se fond le plus difficilement, est aussi celui qui se dilate le plus lentement, *Ibid.* 410. Le fer entièrement & intimement rouillé, n'est plus attirable par l'aimant. *Volume II*, 8. Il perd non-seulement de sa densité à chaque fois qu'on le chauffe, mais il perd aussi de sa solidité, c'est-à-dire, de la cohérence de ses parties, il devient à chaque chaude plus léger & plus cassant. *Volume II*, 58. Comment il faut traiter le fer pour lui conserver sa masse & sa solidité. *Ibid.* 60. Le bon fer, c'est-à-dire, le fer qui est presque tout nerf, est cinq fois aussi tenace & aussi fort que le fer sans nerf & à gros grains; preuve par l'expérience. *Ibid.* 66. Sa qualité ne dépend pas en entier, à beaucoup près, de celle de la mine; la nature des mines n'y fait rien, c'est la manière de les traiter qui fait tout. *Ibid.* 67 Moyens d'arriver au point de donner au fer toute la perfection. *Ibid.* Le fer chauffé trop souvent dégénère en mâchefer. *Ibid.* Il est,

comme le bois, une matière combustible à laquelle il ne faut qu'un plus grand feu pour brûler. *Vol. II, 69 & 70.* Comment on procure au fer de la consistance & de la ténacité. *Ibid. 71.* Plus on presse le feu dans la fabrication du fer à l'affinerie, & plus il devient aigre & mauvais. *Ibid. 73.* Le fer en bandes plates est toujours plus nerveux que le fer en barreaux. *Ibid. 74.* D'où provient le nerf du fer, & la différence de sa force & de sa cohérence; effets de la malleation. *Ibid. 75.* Une des plus mauvaises pratiques dans la fabrication du fer, est de tremper dans l'eau, sur-tout dans l'eau froide, les barres de fer encore rouges au sortir de dessous le marteau; cette trempe perd le nerf & gâte le grain du meilleur fer. *Ibid. 77.* Les écailles ou exfoliations, qui se détachent de la surface du fer, donnent de très-bons fers. *Ibid. 80.* Indices par lesquels on doit juger les différentes qualités du fer. *Volume II, 85.* Les fers sans nerfs & à très-gros grains, devroient être pros crits. *Ibid.* Le feu du charbon de bois, & à plus forte raison celui du charbon de terre donnent de l'aigre au fer, ce que ne fait pas le feu de bois qui pourroit l'améliorer & le rendre moins aigre. *Ibid. 88.* Le fer s'aimante par la percussion, & aussi par la torsion sans percussion lorsqu'on le plie plusieurs fois de suite en différens sens. *Ibid. 91.* Il se soude avec lui-même; précautions nécessaires au succès de cette opération. *Ibid. 92 & 93.* Il se décompose par l'humidité comme par le feu. *Ibid. 94.* Se conserve sans altération dans l'eau beaucoup plus long-temps qu'à l'air. *Ibid.* Énumération des principaux usages auxquels on emploie le fer, & proportion de la qualité

qual
ces
FERS
du fe
on p
que l
à la c
FERS
les fe
Vol. I
FER d
de fal
de trè
FEU. N
le feu.
feu, d
Le feu
regard
de leur
priétés
quefois
chaleur
& son
différen
leur &
& peut
— L'a
matière
La chal
regardé
Ibid. 63
rentes su
dont on
Suppl

qualité qu'on doit lui donner pour chacun de ces usages. *Vol. II, 85 & suiv.*

FERS de charrue, (les) doivent être fabriqués avec du fer de la meilleure qualité, & si cela étoit, on pourroit se passer de les armer d'acier, ainsi que les pioches & autres instrumens nécessaires à la culture des terres. *Vol. II, 88 & suiv.*

FERS de tirerie. Comment doivent être fabriqués les fers de tirerie pour faire le fil-de-fer. *Vol. II, 74 & suiv.*

FER de vieilles ferrailles. Manière de travailler & de fabriquer ce fer. *Vol. II, 77.* C'est un fer de très-bonne qualité. *Ibid.*

FEU. Moyens généraux & particuliers de produire le feu. *Volume 1, 11.* Origine & production du feu, de la chaleur & de la lumière. *Ibid. 14.* Le feu, la chaleur & la lumière peuvent être regardés comme trois choses différentes; examen de leurs propriétés différentes & de leurs propriétés communes. *Ibid. 25 & suiv.* Il existe quelquefois sans lumière, mais n'existe jamais sans chaleur. *Ibid.* A besoin d'alimens pour subsister, & son premier aliment est l'air. *Ibid. 52.* La différence la plus générale entre le feu, la chaleur & la lumière, paroît consister dans la quantité & peut-être dans la qualité de leurs alimens. — L'air est le premier aliment du feu, les matières combustibles ne sont que le second. *Ibid.* La chaleur propre du globe terrestre doit être regardée comme notre vrai feu élémentaire. *Ibid. 63 & 64.* L'action du feu, sur les différentes substances, dépend beaucoup de la manière dont on l'applique; le produit de son action, *Supplément. Tome II.* Q

sur une même substance, paroîtra différent selon la façon dont il est administré. — Le feu doit être considéré en trois états différens, le premier relatif à sa vitesse, le second à son volume, & le troisième à sa masse. *Vol. I, 71.* Trois moyens généraux d'augmenter l'action du feu. — Chacun de ces moyens donne souvent des produits différens. *Ibid. 72 & 73.* On peut augmenter l'action du feu en accélérant sa vitesse, en augmentant son volume, & en augmentant sa masse & sa densité. Les instrumens du premier moyen sont tous les fourneaux où l'on se sert de ventilateurs, de soufflets, de trompes, de tuyaux d'aspiration, &c. les instrumens du second moyen sont tous les fourneaux de réverbères; & ceux du troisième moyen sont les miroirs ardents; chacun de ces moyens employés sur les mêmes matières, donnent souvent des résultats très-différens. *Ibid.* L'administration du feu doit se diviser en trois procédés généraux, le premier relatif à la vitesse, le second au volume, & le troisième à la masse de cet élément. — Les matières qu'on soumet à l'action du feu, doivent être divisées dans trois classes, celles qui perdent au feu de leur poids, celles qui au lieu de perdre du poids en acquièrent, & celles qui ne perdent ni n'acquièrent rien. *Ibid. 75 & suiv.* Le feu est réellement pesant comme toute autre matière. *Ibid. 76 & suiv.* Matières avec lesquelles le feu a le plus d'affinité. *Ibid.* Le feu se trouve comme l'air sous une forme fixe & concrète dans presque tous les corps. *Ibid.* Matières indifférentes à l'action du feu. *Ibid. 82.* C'est par la lumière que le feu se communique, & la chaleur seule ne peut produire le même effet que quand

elle
Vol.
FLA
l'inc
Vol.
mun
toute
point
FLUI
corps
Tous
densité
différent
que le
FLUIDI
Vol. I
n'indiqu
plus ou
adhéren
d'autan
plus ais
degré d
tière di
FONTE d
mauvais
La bonn
fer. *Ibid.*
pendant
de ténac
pesanteu
FORCE
qui prod
de la Na

DES MATIÈRES. xxij

elle devient assez forte pour être lumineuse.
Vol. I, 95.

FLAMME (la) n'est pas la partie du feu où l'intensité de la chaleur est la plus grande.
Vol. I, 91. Sa principale propriété est de communiquer le feu. *Ibid.* Il y a de la flamme dans toute incandescence. *Ibid.* 93. Celle-ci n'obéit point à l'impulsion de l'air. *Ibid.* 94.

FLUIDE. Le mercure seroit le plus fluide des corps si l'air ne l'étoit encore plus. *Vol. I, 53.* Tous les fluides, avec la même chaleur, quelque denses qu'ils soient, s'échauffent & se refroidissent plus promptement qu'aucun solide, quelque léger qu'il soit. *Ibid.* 240.

FLUIDITÉ. Toute fluidité a la chaleur pour cause. *Vol. I, 53.* La plus ou moins grande fluidité n'indique pas que les parties du fluide soient plus ou moins pesantes, mais seulement que leur adhérence est d'autant moindre, leur union d'autant moins intime & leur séparation d'autant plus aisée. *Ibid.* 54. Moyen facile d'estimer le degré de fluidité ou de fusibilité de chaque matière différente. *Ibid.* 243.

FONTE de fer. Moyens de corriger à l'affinerie, la mauvaise qualité de la fonte de fer. *Vol. II, 73.* La bonne fonte de fer est la base de tout bon fer. *Ibid.* 76. Étant chauffée à un très-grand feu pendant long-temps, acquiert plus de dureté & de ténacité. *Ibid.* 137. Elle acquiert aussi plus de pesanteur spécifique. *Ibid.*

FORCE (la) qui produit la pesanteur & celle qui produit la chaleur, sont les deux seules forces de la Nature. *Vol. I, 1 & suiv.* Force attractive

& force expansive; leur différence & la combinaison de leurs effets. *Volume I, 6 & suiv.* Réduction des forces de la Nature & de la puissance de l'expansion à celle de l'attraction. *Ibid. 9.* Force expansive, n'est point une force particulière opposée à la force attractive, mais un effet qui en dérive, & qui se manifeste toutes les fois que les corps se choquent ou se frottent les uns contre les autres. *Ibid.* Force expansive, n'est que la réaction de la force attractive. *Ibid. 11.* La force attractive & la force expansive, sont pour la Nature deux instrumens de même espèce, ou plutôt ce n'est que le même instrument qu'elle manie dans deux sens opposés. *Ibid. 20.*

FOURNEAUX. Le feu des fourneaux de verrerie, n'est qu'un feu foible en comparaison de celui des fourneaux à soufflets. *Vol. I, 90.* Description du fourneau pour courber des glaces, avec l'explication des figures. *Vol. II, 293 & suiv.*

FOYERS. Dans les miroirs ardents, les grands foyers sont toujours beaucoup plus d'effet que les petits à égale intensité de lumière. *Vol. II, 156.* Évaluation & comparaison de leurs effets. *Ibid. 203 & suiv.*

FUSIBILITÉ. Explication des causes de la fusibilité. *Vol. I, 409.*

FUSION (la) est en général une opération prompte, qui a plus de rapport avec la vitesse du feu que la calcination; qui est presque toujours lente. *Vol. II, 111.*

GLACE. Phénomènes remarquables dans la congélation. *Vol. I, 145.*

OLA
ou
lun
pa

GLA
rec
ten

GL O
n'e
dik

GR E
que

G U E
ture
les r

G Y P
moi
caire
les a
de la
mais
revie

I M P É
regar
résista
& suiv

I M P U L
à la fo
effet
preuv

DES MATIÈRES. xxv

GLACES ou MIROIRS (les) de verre bien poli ou bien étamés, réfléchissent plus puissamment la lumière que les miroirs de métal poli. *Volume II, page 144.*

GLACES ou miroirs plans. Manière aisée de reconnoître si la surface de ces miroirs est parfaitement plane. *Vol. II, 162.*

GLOBE terrestre. L'intérieur du globe de la terre, n'est qu'une matière de verre ou coneret ou discret. *Vol. I, 50.*

GRÈS (le) chauffé au plus grand feu, ne perd que très-peu de son poids. *Vol. I, 236.*

GUEULARD. C'est ainsi qu'on appelle l'ouverture du haut des grands fourneaux où l'on fond les mines de fer. *Vol. II, 102.*

GYP S & PLATRES (les) se calcinent à un moindre degré de chaleur que les pierres calcaires. *Vol. I, 420.* Ils ne suivent pas, comme les autres matières calcaires ou vitrescibles, l'ordre de la densité, pour le progrès de la chaleur, mais celui de la facilité à la calcination, ce qui revient à l'ordre de la fusibilité. *Ibid.*

I

IMPÉNÉTRABILITÉ (P) ne doit pas être regardée comme une force, mais comme une résistance essentielle à la matière. *Volume I, 9 & suiv.*

IMPULSION. La force d'impulsion est subordonnée à la force d'attraction, & en dépend comme un effet particulier dépend d'un effet général; preuve de cette assertion. *Vol. I, 2 & suiv.*

INCANDESCENCE. Toutes les matières, lorsqu'elles sont dans un état d'incandescence, c'est-à-dire, lorsqu'elles sont blanches ou rouges de feu, sont alors environnées d'une flamme dense, qui ne s'étend qu'à une très-petite distance, & qui, pour ainsi dire, est attachée à leur surface. *Vol. I, 93 & 94.* Cette couleur blanche ou rouge qui sort de tous les corps en incandescence & vient frapper nos yeux, est l'évaporation de cette flamme dense qui environne le corps en se renouvelant incessamment à sa surface. *Ibid.* Incandescence produite par la chaleur obscure. *Vol. II, 121.*

INFLEXION (P') de la lumière n'est qu'une réfraction, qui s'opère dans le même milieu; elle est produite par l'attraction des corps, auprès desquels passe la lumière. *Vol. I, 314.*

INTENSITÉ de lumière. Cette intensité de la lumière de chaque objet, est un élément que les Auteurs qui ont écrit sur l'Optique, n'ont point employé, & qui néanmoins fait plus que l'augmentation de l'angle sous lequel un objet doit nous paroître, en vertu de la courbure des verres. *Vol. II, 192.*

L

LENTILLES de verre solide. *Volume II, 282.* Grandeur & proportion qu'on doit donner aux lentilles pour qu'elles puissent brûler le plus avantageusement. *Ibid. 287 & suiv.* Inconvéniens qui résultent de l'épaisseur des lentilles ordinaires. La partie du milieu de la lentille ne fait presque aucun effet. *Ibid. 288.*

LENTILLES à échelons, est le miroir par réfraction le plus parfait qu'on puisse faire. Son invention

& C
Vol
de c
ord
crip

LIGNI
pas
Vol.

LIMA
dev
96 &

LUMI
chaf
affer
qual
attri
com
est
pefan
tanc
part
mass
tous
au f
La l
mati
petit
aton
faces
se c
La l
Ibid
les r

DES MATIÈRES. xxvij

& sa description, avec le calcul de ses effets. *Volume II, 290 & suiv.* Comparaison des effets de cette lentille à échelons, avec l'effet des lentilles ordinaires. *Ibid.* 292. Sa construction & sa description. *Ibid.* 307 & 308.

LIGNE brûlante à l'infini ou à l'indéfini, n'est pas une rêverie comme l'a dit *Descartes*. *Vol. II, 188 & suiv.*

LIMAILLE (la) de fer mêlée avec de l'eau, devient une masse solide difficile à casser. *Vol. II, 96 & 97.*

LUMIÈRE. Toute matière peut devenir lumière, chaleur & feu. *Vol. VI, 14.* Preuve de cette assertion. *Ibid. & suiv.* Elle conserve toutes les qualités essentielles, & même la plupart des attributs de la matière commune. *Ibid.* Quoique composée de parties presque infiniment petites, est encore réellement divisible. *Ibid.* 15. Est pesante comme toute autre matière. — Sa substance n'est pas simple. — Elle est composée de parties de différentes pesanteurs. *Ibid.* Elle est massive & agit dans quelques cas, comme agissent tous les autres corps, elle les pousse & déplace au foyer du miroir ardent. *Ibid.* 17 & 18, & *suiv.* La lumière est mixte, & composée comme la matière commune de parties plus grosses & plus petites, & différemment figurées. *Ibid.* 19. Les atomes, qui composent la lumière, ont plusieurs faces & plusieurs angles. *Ibid.* La lumière peut se convertir en toute autre matière. *Ibid.* 23. La lumière paroît exister souvent sans chaleur. *Ibid.* 25. Expériences à faire, pour reconnoître si les rayons rouges ne sont pas plus chauds que les

autres rayons, & en général pour reconnoître la proportion de chaleur des différens rayons qui composent la lumière. *Vol. I, 41. Note.* La lumière s'incorpore, s'amortit & s'éteint dans tous les corps qui ne la réfléchissent pas, ou qui ne la laissent pas passer librement. *Ibid. 42.* Elle paroît n'avoir pas besoin d'alimens, tandis que le feu ne peut subsister qu'en absorbant de l'air. *Ibid. 51 & 52.* C'est par la lumière que le feu se communique. *Ibid. 95.* Expérience qui paroît démontrer que la lumière a plus d'affinité avec les substances combustibles, qu'avec toutes les autres matières. *Ibid. 130, Note.* La lumière ne perd qu'environ moitié de sa chaleur par une glace bien étamée & bien polie. *Volume II, 144.* Elle ne perd presque rien de sa force par l'épaisseur de l'air qu'elle traverse. *Ibid. 145.* Expérience de la perte de la lumière d'une bougie, comparée à la perte de la lumière du Soleil. *Ibid.* Diminution de la lumière en traversant différentes épaisseurs du même verre, & les mêmes épaisseurs de différens verres; expériences à ce sujet. *Ibid. 242 & 243.*

LUNE. Il se peut que la Lune, quoique fort lumineuse, nous envoie plutôt du froid que de la chaleur. *Vol. II, 270 & 271.*

LUNETTES. Pour observer avec le plus grand avantage possible, il faudroit, pour chaque planète, une lunette différente, & proportionnée à leur intensité de lumière. *Vol. II, 191 & suiv.* Les lunettes avec de très-grands objectifs, seroient fort avantageuses pour observer les planètes & autres astres qui n'ont que peu de lumière. *Ibid. 249.* Construction & avantages des lunettes solaires. *Ibid. 250.*

LUN
con
de l
Mo
& 9

LUN
page

LUN
Vol

LUN

LUN

LUN

M A G

four

ferru

Vol.

grand

de ce

dans

M A G I

précé

M A T I E

Vol.

matie

toute

feu,

Natu

M A T I E

dissen

Vol.

DES MATIÈRES. xxix

LUNETTES achromatiques, dans lesquelles on compense la différente réfrangibilité des rayons de la lumière par des verres de différentes densités. Moyens de les perfectionner. *Volume II, 186 & suiv.*

LUNETTES de jour, sans aucun verre. *Vol. II, page 261.*

LUNETTES massives. — Lunettes à l'eau, &c. *Vol. II, 240 & suiv.*

LUNETTES de nuit. *Vol. II, 252 & suiv.*

LUNETTES pour chaque planète. *Ibid.*

LUNETTES pour le Soleil. *Ibid.*

M

MACHEFER. Lorsqu'on broye le mâchefer, il fournit une certaine quantité de fer ou de sable ferrugineux, tout semblable à celui de la platine. *Vol. II, 11.* Le charbon & le bois brûlé en grande quantité produisent du mâchefer; preuve de cette assertion. *Ibid. 68.* Celui qu'on trouve dans les forêts; son origine. *Ibid. 69.*

MAGNÉTISME du fer (le) suppose l'action précédente du feu. *Vol. II, 96.*

MATIÈRE brute & matière vive, leur différence. *Vol. I, 5.* Toutes les parties constitutives de la matière sont à ressort parfait. *Ibid. 10.* Comment toute matière peut devenir lumière, chaleur & feu; explication de cette grande opération de la Nature. *Ibid. 23 & suiv.*

MATIÈRES calcaires (les) suivent dans leur refroidissement l'ordre de la densité, raison de cet effet. *Vol. I, 419.* Elles peuvent se réduire en verre

au foyer d'un bon miroir ardent. — Le terme de leur fusibilité est encore plus éloigné que celui des matières vitrescibles. *Vol. I, 419 & suivantes.*

MATIÈRES vitrescibles (les) forment le noyau des plus hautes montagnes. *Vol. I, 174.*

MERCURE. On pourroit geler & figer le mercure à un bien moindre degré de froid, si on le sublimoit en vapeurs dans un air très-froid. *Volume I, 146; & Volume II, 233.* Dans le mercure, qui est onze mille fois plus dense que l'air, il ne faut, pour refroidir les corps qu'on y plonge, qu'environ neuf fois autant de temps de ce qu'il en faut pour produire le même effet dans l'air. *Vol. I, 124.*

MÉTAUX. Explication simple de leur réduction ou revivification. *Vol. I, 104.* L'ordre des six métaux, suivant leur densité est, étain, fer, cuivre, argent, plomb, or; & l'ordre dans lequel ces métaux reçoivent & perdent la chaleur est, étain, plomb, argent, or, cuivre, fer. — Ce n'est point dans l'ordre de leur densité, mais dans celui de leur fusibilité que les métaux reçoivent & perdent la chaleur. *Ibid. 406 & suiv.*

MÉTAUX, demi-métaux ou substances métalliques; l'ordre de leur densité est, émeril, zinc, antimoine, bismuth; & celui dans lequel ils perdent & reçoivent la chaleur est, antimoine, bismuth, zinc, émeril, ce qui ne suit pas l'ordre de leur densité, mais plutôt celui de leur fusibilité. *Vol. I, 412.*

MINÉRAUX. L'air & le feu entrent dans la composition des minéraux; preuve de cette

aff
au
juh
&
la f

MIN
fait
89
le t
qui
l'air
gran
néti
& j
assez
bou
min

MIR
& fa
a en
de d
feu
Ibid.
miné
quar
sa pu
& su
de c
préca
parfa
effets
miro
on ve

DES MATIÈRES. xxxj

assertion. *Volume I, 154 & suiv.* Point de vue auquel on doit s'élever pour se former une idée juste de la formation des minéraux. *Ibid. 172 & suiv.* Établissement d'une théorie générale sur la formation des minéraux. *Ibid. 174 & suiv.*

MINES de Fer. Expérience sur la mine de fer, faites au plus grand feu de réverbère. *Vol. I, 89 & suiv.* Il y a des mines de fer formées par le feu, les autres par l'eau. *Ibid. 176.* Celles qui sont en grain ne sont point attirables par l'aimant. — Celles qui sont en roches ou en grandes masses solides, sont presque toutes magnétiques; raison de cette différence. *Vol. II, 9 & suiv.* Les mines de fer des pays du nord, sont assez magnétiques pour qu'on les cherche à la boussole. *Ibid. 10.* Composition originaire des mines de fer en grain. *Ibid. 96.*

MIROIR ardent pour brûler au loin. Sa description & sa construction. *Volume II, 160 & suiv.* On a enflammé du bois jusqu'à deux cens pieds de distance, & il seroit très-possible de porter le feu du Soleil encore plus loin avec ce miroir. *Ibid. 167.* On a fondu tous les métaux & minéraux métalliques à vingt-cinq, trente & quarante pieds de distance. *Ibid.* Estimation de la puissance & limites de ses effets. *Ibid. 173 & suiv.* En quoi consiste essentiellement la théorie de ce miroir. *Ibid. 195 & suiv.* Moyens & précautions pour rendre ce miroir encore plus parfait & en augmenter considérablement les effets. *Ibid. 215.* Proportion de la grandeur des miroirs, suivant les différentes distances auxquelles on veut brûler. *Ibid. 216.*

MIROIR du port d'*Alexandrie*, dont les Anciens ont fait mention & par le moyen duquel on voyoit de très-loin les vaisseaux en mer, n'est point du tout impossible. *Vol. II, 256 & suiv.*

MIROIR courbé par la pression de l'atmosphère. Sa construction & sa description. *Volume II, 302 & 303.*

MIROIRS ardens. Le feu produit par de bons miroirs ardens, est le plus violent de tous les feux. *Volume I, 90.* Pourquoi des miroirs plans plus grands ou plus petits, formant, à une certaine distance des images également grandes & qui ne diffèrent que par l'intensité de la lumière. *Vol. II, 150.*

MIROIRS ardens, soit par réflexion, soit par réfraction font un effet toujours égal à quelque distance du Soleil qu'on puisse supposer. Par exemple, un miroir qui peut brûler du bois à cent cinquante pieds de distance sur la globe de la terre, brûleroit de même à cent cinquante pieds, & avec autant de force, du bois sur la planète de Saturne. *Vol. II, 192.*

MIROIRS d'*Archimède* (les) peuvent servir très-utilement pour l'évaporation des eaux salées. *Volume II, 219.* Attentions nécessaires pour procurer cet effet avec le plus grand avantage. *Ibid. 221.* Ils peuvent servir utilement pour calciner les plâtres, les matières gypseuses, &c. *Ibid. 222.* On peut par leur moyen recueillir les parties volatiles de l'or & de l'argent, & des autres métaux & minéraux. *Ibid. 230.* Ce moyen paroît être le seul que nous ayons pour volatiliser les métaux fixes, tels que l'or & l'argent. *Ibid. 231.* Représentation & description de ce miroir. *Ibid. 297. & suiv.*

DES MATIÈRES. xxxiiij

MIROIRS concaves, faits par des glaces courbées. *Vol. II, 268.* Leur usage. *Ibid. 271.* Manière de produire une chaleur immense à leur foyer en les réunissant. *Ibid. 272 & 273.*

MIROIRS courbés (les) de quelque espèce qu'ils soient, ne peuvent être employés avec avantage pour brûler de loin. *Vol. II, 151.* Le miroir le plus parfait n'aura jamais l'avantage que de dix-sept à dix sur un assemblage de miroirs plans, dès qu'il faudra brûler à une distance où le disque du Soleil sera égal à la grandeur du miroir plan. *Ibid. 198.*

MIROIRS courbés par le moyen d'une vis au centre. *Vol. II, 263.* Construction & description de ces miroirs. *Ibid. 301 & 302.*

MIROIRS courbés par le moyen d'une pompe. *Vol. II, 264.* Et miroir très-singulier que le Soleil rend courbe & brûlant au moment qu'il y est exposé. *Ibid. 265.* Leur construction & leur description. *Ibid. 304 & suiv.*

MIROIRS d'une seule pièce, à foyer mobile pour brûler à de médiocres distances; construction & usage de cette espèce de miroirs. *Vol. II, 262 & suiv.* Ils peuvent servir à mesurer plus exactement que par aucun autre moyen la différence des effets de la chaleur du Soleil reçue dans des foyers plus ou moins grands. *Ibid. 265.* Autres miroirs d'une seule pièce pour brûler très-vivement à des distances médiocres & à de petites distances. *Ibid. 266.* Construction d'un fourneau pour courber des glaces. *Ibid. 267.*

MIROIRS à l'eau ou Lentilles. Manière de les construire. *Vol. II, 273.* Précautions nécessaires

pour les faire réussir. *Vol. II, 273.* Difficulté de les traiter. *Ibid. 274.* Inconvénient qui résulte de la différente réfrangibilité du verre & de l'eau. *Ibid. 275.* Étant composés d'un grand nombre de glaces planes, seroient presque autant d'effet que les glaces courbées, & seroient d'une exécution plus facile, & d'une moindre dépense. *Ibid. 280.* Leur construction & description. *Ibid. 305 & 306.*

M O U V E M E N T (le) appartient dans tous les cas encore plus à l'attraction qu'à l'impulsion. *Vol. I, 8.*

N

N A T U R E (la) peut produire, par le moyen de l'eau, tout ce que nos Arts produisent par le moyen du feu. *Volume I, 163.* Elle ne se dépouille jamais de ses propriétés en faveur d'une autre d'une manière absolue, c'est-à-dire, de façon que la première n'influe en rien sur la seconde. *Ibid. 407.*

N E W T O N. Correction à faire d'un passage de Newton, au sujet du progrès de la chaleur. *Vol. I, 216 & suiv.*

N I T R E (le) doit son origine aux matières animales ou végétales. *Volume I, 68.* Contient une prodigieuse quantité d'air & de feu fixés. — Explication de sa combustion. *Ibid. & suiv.*

O

O B J E T S. Moyens d'apercevoir sans lunettes les objets de très-loin. *Vol. II, 257.*

O M
Vo
lev
au
ou
col
à d
& y

O R ,
que
tier
un
pla
plu
pes
les
pas
deu
Un
leq
de f
l'air

P E R
& c
nati
de

P H L O
être
Vo
ma
cor

OMBRÉS. Découverte des ombres colorées. *Volume II, 309 & suiv.* Ombres colorées au lever & au coucher du Soleil. — Les ombres, au lieu d'être noires, sont alors d'un bleu plus ou moins vif, & quelquefois verdâtres. — Ombres colorées à midi & à d'autres heures du jour, à de certaines inclinaisons de la lumière. *Ibid. 331 & suiv.* Explication de ce phénomène. *Ibid. 334.*

OR, (P) qui est deux fois & demie plus dense que le fer, perd néanmoins sa chaleur un demi-tiers plus vite. *Volume I, 407.* Étant fondu avec un quart de fer, prend la couleur grise de la platine. *Volume II, 13.* Cet or mêlé de fer est plus dur, plus aigre & spécifiquement moins pesant que l'or pur. *Ibid.* Les paillettes d'or que les Arpailleurs ramassent dans les sables, ne sont pas de l'or pur, il s'en faut souvent plus de deux ou trois karats sur vingt-quatre. *Ibid. 16.* Un morceau d'or pesant soixante grains, avec lequel on avoit mêlé, par la fonte, six grains de fer, c'est-à-dire, un onzième, étoit attirable à l'aimant. *Ibid. 18.*

P

PERPENDICULARITÉ (la) de la tige des arbres & des plantes, a pour cause principale les émanations constantes de la chaleur propre du globe de la Terre. *Vol. I, 48.*

PHLOGISTIQUE (le) des Chymistes n'est qu'un être de méthode, & non pas de la Nature. *Vol. I, 61.* Ce n'est point un principe simple, mais un composé d'air & de feu fixes dans les corps; preuve de cette assertion. *Ibid. & suiv.*

PHOSPHORE artificiel, sa combustibilité plus grande que celle d'aucune autre matière. — Il s'enflamme de lui-même sans communication d'aucune matière ignée, sans frottement, sans autre addition que celle du contact de l'air. — Le feu est contenu dans le phosphore dans un état moyen entre la fixité & la volatilité. — Il contient en effet cet élément sous une forme obscure & condensée. *Vol. I, 70 & 71.*

PIERRES calcaires (les) perdent au feu près de la moitié de leur poids par la calcination. *Vol. I, 149 & 150.* Elles ne sont en très grande partie que de l'eau & de l'air contenus dans l'eau, transformés par le filtre animal en matière solide. *Ibid. 149.* Les pierres augmentent de pesanteur par la longue application de la chaleur. *Vol. II, 126 & suiv.* La dureté que les pierres calcaires peuvent acquérir, par la longue application de la chaleur, n'est pas durable, elles perdent cette dureté acquise au bout de quelque temps. *Ibid. 134.* Elles perdent de même leur pesanteur acquise. *Ibid. 135.*

PLATINE. Minéral nouveau, sa description. *Volume II, 2.* Elle exige plus de chaleur pour se fondre que la mine ou la limaille de fer. *Ibid.* N'ayant ni fusibilité, ni ductilité, elle ne doit pas être mise au nombre des métaux, dont les propriétés essentielles sont la fusibilité & la ductilité. *Ibid. 4.* La platine est un mélange ou un alliage de fer & d'or formé par la Nature. *Ibid.* Il y a beaucoup de fer dans ce minéral, & ce fer n'y est pas simplement mêlé, mais incorporé de la manière la plus intime. *Ibid. 5.* On peut en enlever six septièmes du total par l'aimant. *Ibid.*

Sa
&
cel
diff
mi
sou
un
cifi
auf
rien
pes
ziè
Exp
plat
plat
com
&
cont
cont
indi
min
cont
mêl
L'or
font
intim
méta
est d
fer o
Mor
peut
dans
le fé
meil
d'un

DES MATIÈRES. xxxvij

Sa composition & son mélange. *Volume II, 5 & suiv.* Le fer qui est uni à la platine & même celui qui n'y est que mélangé, est dans un état différent de celui du fer ordinaire. *Ibid. 7.* Ce minéral est très-aigre, ce qui auroit dû faire soupçonner que ce n'est point un métal, mais un alliage. *Ibid. 13 & suiv.* La pesanteur spécifique de la platine n'est pas à beaucoup près aussi grande que celle de l'or. — Diverses expériences à ce sujet, desquelles il résulte que la pesanteur spécifique de la platine est d'un douzième moindre que celle de l'or. *Ibid. 13 & suiv.* Expériences de M. le comte de Milly sur la platine. *Ibid. 20 & suiv.* Il y a des espèces de platine qui sont mélangées de parties crystallines comme petits rubis, de petites topases, &c. & il y a d'autres espèces de platine qui ne contiennent rien de semblable. *Ibid. 23.* Elle contient des grains hémisphériques qui paroissent indiquer qu'elle est le produit du feu. *Ibid.* La mine de platine, même la plus pure, qui ne contient point de parties crystallines, est souvent mélangée de quelques paillettes d'or. *Ibid. 34.* L'or & le fer dont est composée la platine, y sont unis d'une manière plus étroite & plus intime que dans l'alliage ordinaire de ces deux métaux, & le fer qui est incorporé à la platine, est du fer dans un état différent de l'état du fer ordinaire. *Ibid. 38.* Expériences de M. de Morveau sur ce minéral. *Ibid. 40 & suiv.* On peut espérer de fondre la platine sans addition dans nos meilleurs fourneaux en lui appliquant le feu plusieurs fois de suite, parce que les meilleurs creusets ne pourroient résister à l'action d'un feu aussi violent pendant tout le temps

xxxviij T A B L E

qu'exigeroit l'opération complète. *Vol. II, 53.*
 En la fondant sans addition, elle paroît se purger elle-même des matières vitrescibles qu'elle renferme, car il s'élançe à sa surface des jets de verre assez considérables. *Ibid. 53 & 54.* On peut faire le bleu de Prusse avec la platine, ce qui prouve qu'elle est intimement mêlée de fer, & que le plus grand feu ni la coupellation ne peuvent détruire ce fer dont elle est intimement pénétrée; car, après la fusion, on retrouve en rebroyant le bouton qu'elle contient encore des parties ferrugineuses & magnétiques. *Ibid. 54.* La platine fondue sans addition reprend lorsqu'on la broie, précisément la même forme des galets arrondis & aplatis qu'elle avoit avant la fusion. *Ibid. 55.*

PLOMB (le) s'échauffe plus vite & se refroidit en moins de temps que le fer. *Vol. I, 247.*

POUMONS (les) sont les soufflets de la machine animale, ils entretiennent & augmentent le feu qui nous anime, selon qu'ils sont plus ou moins puissans, & que leur mouvement est plus ou moins prompt. *Vol. I, 121.*

PUISSANCES (les) de la Nature réduites aux deux forces attractive & expansive. *Volume I, 1 & 6.*

PYRITES martiales; leur origine, & pourquoi on les trouve en si grande quantité à la surface de de la Terre. *Vol. II, 97.*

Q

QUALITÉ Physique, c'est-à-dire, qualité réelle dans la Nature, ne peut avoir qu'une mesure,

&
par
cett

R É
diffi
104
com
d'air
force
subst
temp
la p
Ibid.

RÉFL
com
plus
réflex
315

REFR
des c
36. I
des c
pouv
lorsq
Ibid.
Terre
point
s'est
foika
la ter
vingt

DES MATIÈRES. xxxix

& par conséquent ne peut être représentée que par un terme. *Vol. I, 187.* Démonstration de cette vérité. *Ibid. & suiv.*

R.

RÉDUCTION des métaux (la) n'est pas plus difficile à entendre que la précipitation. *Vol. I, 104.* Elle n'est dans le réel qu'une seconde combustion par laquelle on dégage les parties d'air & de feu fixes que la calcination avoit forcé d'entrer dans le métal & de s'unir à la substance fixe, à laquelle on rend en même temps les parties volatiles & combustibles que la première action du feu lui avoit enlevées. *Ibid. 134.*

RÉFLEXION de la lumière. Il n'est pas certain, comme l'a dit Newton, que les rayons les plus réfrangibles soient en même temps les plus réfléchibles. Discussion à ce sujet. *Note, Vol. II, 315 & suiv.*

REFROIDISSEMENT. Le temps du refroidissement des corps, est en raison de leur diamètre. *Vol. I, 36.* Deux points à saisir dans le refroidissement des corps; le premier, lorsqu'on commence à pouvoir les toucher sans se brûler; & le second, lorsqu'ils sont refroidis à la température actuelle. *Ibid. 206.* Le refroidissement du globe de la Terre, depuis l'état d'incandescence jusqu'au point de pouvoir le toucher sans se brûler, ne s'est fait qu'en quarante-deux mille neuf cens soixante-quatre ans, & son refroidissement jusqu'à la température actuelle, ne s'est fait qu'en quatre-vingt-seize mille six cens soixante-dix ans, en

supposant le globe principalement composé de fer & de matières ferrugineuses. *Volume I*, 222 & 223. La principale cause du refroidissement n'est pas le contact du milieu ambiant, mais la force expansive qui anime les parties de la chaleur & du feu. *Ibid.* 224. Comparaison du temps du refroidissement des globes de glaise & de grès avec celui du refroidissement des globes de fer. *Ibid.* 234 & *suiv.* Comparaison du temps du refroidissement du marbre, de la pierre, du plomb & de l'étain avec celui du refroidissement du fer. *Ibid.* 238. Rapports du refroidissement des différentes substances minérales constaté par un grand nombre d'expériences. *Ibid.* 249 & *suivantes.*

RÉPULSION. Changement d'attraction en répulsion, comment il s'opère. *Vol. I*, 10.

RESSORT (le) est le seul moyen par lequel la force d'impulsion & le mouvement puissent se communiquer. *Vol. I*, 2. Le ressort dépend de la force d'attraction; preuves de cette assertion. *Ibid.* & *suiv.*

RUSTINE. C'est ainsi qu'on appelle le côté du creuset qui est exposé à l'ouverture par où l'on coule la fonte dans les fourneaux de forges. *Vol. II*, 104.

S

SABLON ferrugineux (le) qui se trouve dans la platine, est indissoluble, presque infusible & inaccessible à la rouille. *Vol. II*, 8. Ce sablon est néanmoins du vrai fer, du fer pur, du fer dépouillé de toutes les parties combustibles, salines & terreuses qui se trouvent dans le fer

oro
Il
se
du
S A V
l'él
S E L
cor
étr
ent
cc
les
S E N
infl
ou
SENS
plu
que
for
SOLE
la f
inc
Sol
effe
niq
ner
tou
con
de
con
qu
du
au
de

DES MATIÈRES. *xlj*

ordinaire, & même dans l'acier. *Volume II, 8.*
Il n'appartient pas exclusivement à la platine, il se trouve en beaucoup d'endroits, & provient du mâchefer. *Ibid. & suivantes.*

SAVEUR (la) piquante des acides provient de l'élément du feu. *Vol. I, 158.*

SELS. Leur différence avec le soufre, & leur composition. *Volume I, 66 & suiv.* Ils doivent être regardés comme les substances moyennes entre la terre & l'eau. *Ibid. 156.* L'air entre comme principe dans la composition de tous les sels. *Ibid.*

SENS. Nos sens sont meilleurs juges que les instrumens de tout ce qui est absolument égal ou parfaitement semblable. *Vol. I, 207.*

SENSATIONS. Une sensation vive est toujours plus précise qu'une sensation tempérée, attendu que la première nous affecte d'une manière plus forte. *Vol. I, 207.*

SOLEIL. La lumière du Soleil est l'évaporation de la flamme dense qui environne ce vaste corps en incandescence. *Volume I, 94.* Cette lumière du Soleil produit, lorsqu'on la condense, les mêmes effets que la flamme la plus vive; elle communique le feu avec autant de promptitude & d'énergie, elle résiste à l'impulsion de l'air, suit toujours une route directe; on doit la regarder comme une vraie flamme, plus pure & plus dense que toutes les flammes de nos matières combustibles. *Ibid. & suiv.* La plupart des taches que les Astronomes ont observées sur le disque du Soleil, leur ont paru fixes, mais il se pourroit aussi qu'il y eût des taches flottantes à la surface de cet astre. *Vol. II, 351.*

SOLIDITÉ. Différentes acceptions du mot *solidité*.
Vol. I, 241. *Solidité* considérée comme opposée
à la fluidité. *Ibid. 242.*

SOUFRE. Sa composition & sa production.
Volume I, 66 & 67. Le soufre est de la même
nature que les autres matières combustibles, &
 tire de même son origine du détrimen des
animaux & des végétaux. *Ibid. 67.* Il altère,
dissout & même décompose le fer & le dénature,
car si l'on présente une verge de fer bien rouge
à une bille de soufre, le fer qui coule dans
l'instant en grenaille n'est plus du fer, ni même
de la fonte, mais une espèce de pyrite martiale
qui n'est bonne à rien. *Vol. II, 97.* Le soufre
entre en fusion par une chaleur d'environ 50
degrés (division de Réaumur). *Ibid. 128.*

T

TÔLE (la) doit être faite avec le meilleur fer.
— Défauts dans la fabrication ordinaire de la
tôle, & manière de la fabriquer pour la rendre
plus parfaite & plus durable. *Volume II, 86*
& *suiv.*

TERRE. L'élément de la Terre peut se convertir
dans les autres élémens. *Vol I, 168.* Élément
de la Terre, ce sont les matières vitrifables dont la
masse est mille & cent mille fois plus considérable
que celle de toutes les autres substances terrestres,
qu'on doit regarder comme le vrai fonds de cet
élément. *Ibid. 170 & 171.*

TERRE vitrescible (la) est la vraie terre élémentaire
qui sert de base à toutes les autres substances, &
en constitue les parties fixes. *Vol. I, 152.*

THERMOMÈTRE réel, c'est-à-dire, thermomètre

do
tat
qu
Vo
tru

TRA
pol
cor
Vo

TU Y
dir
forg

TYM
fer
côte
dan
ser

VAI
pou
Vai
de l

huit
supp

VÉGÉ
subst

quan
qu'i

élem
pas l

Le fi
quan

prod

DES MATIÈRES. *xliv*

dont les degrés pourroient marquer les augmentations réelles de la chaleur, ne peut être construit que par le moyen des miroirs d'Archimède. *Vol. II, 170. Explication détaillée de la construction de ce thermomètre. Ibid. 226 & suiv.*

TRANSPARENCE. Cause de la transparence; le poliment dans les corps opaques, peut être regardé comme le premier degré de la transparence. *Vol. II, 317 & suiv.*

TUYÈRE. Pièce de cuivre ou de fer qui sert à diriger le vent dans l'intérieur des fourneaux de forges. *Vol. II, 102.*

TYMPE. C'est ainsi qu'on appelle une pièce de fer ou de pierre qu'on pose sur le creuset du côté de l'ouverture par où l'on coule la matière dans les grands fourneaux à fondre la mine de fer. *Vol. II, 100.*

VAISSEAUX. Moyen fort aisé par lequel on pourroit voir à d'eil simple sans lunettes, les Vaisseaux sur la mer d'aussi loin que la courbure de la Terre le permet, c'est-à-dire, à sept ou huit lieues. *Vol. II, 257.* Ce moyen consiste à supprimer l'effet de la lumière intermédiaire. *Ibid.*

VÉGÉTAL (le) convertit réellement en sa substance une grande quantité d'air, & une quantité encore plus grande d'eau; la terre fixe qu'il s'approprie & qui sert de base à ces deux élémens, est en si petite quantité, qu'elle ne fait pas la centième partie de sa masse. *Vol. I, 153.* Le filtre végétal ne peut produire qu'une petite quantité de pierres, tandis que le filtre animal en produit une immense quantité. *Ibid.*

xliv T A B L E, &c.

VÉGÉTAUX (les) ont un degré de chaleur propre ;
expérience qui le prouve. *Vol. I, 114 & suiv.*

VERRE (le) est le terme ultérieur auquel on peut
réduire, par le feu, toutes les substances terrestres.

— Il est la base de ces mêmes substances. *Vol. I, 152.* Il est de la substance la plus ancienne de la
Terre. *Ibid. 171.* Le verre fait ressort, & peut
plier jusqu'à un certain point sans rompre. Une
glace de deux ou trois lignes d'épaisseur peut prier
d'environ un pouce par pied. *Vol. II, 263.*

VERRE d'une très-grande transparence. *Vol. II, 282 & suiv.* Comparaison de la transparence de
ce verre avec la transparence des glaces de Saint-
Gobin. *Ibid. 283.* Composition de ce verre. *Ibid.*
Difficulté de fondre le verre en grande masse
épaisse. *Ibid. 285 & suiv.*

VERGE de fer crénelée. Sa fabrication & son usage.
Vol. II, 75.

VITESSE de la lumière (la) est la plus grande qui
nous soit connue, car la lumière fait 20 mille
lieues en une seconde. *Vol. I, 72 & suiv.*

VITESSE des planètes & des comètes (la) est aussi
très-grande. *Vol. I, 22.*

VERRES ESCALE. Matières vitreuses survent dans
leur refroidissement l'ordre de la densité. *Vol. I,*

page 417.

VITRIFIABLE. Matières vitrifiables ; origine &
gradation du gissement & de la formation des
matières vitrifiables. *Vol. I, 173.*

FIN de la Table des Matières.

TABLEAU des Matières vitrifiables, & de leur formation.

propre;
suiv.

on peut
terrestres.

Vol. I,

ne de la

& peut

pre. Une

peut prier

63.

Vol. II,

rence de

de Saint-

re. Ibid.

de masse

et sans

on usage.

ande qui

20 mille

est aussi

est dans

Vol. I,

origine &

tion des

es.

