





**IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)**



**Photographic
Sciences
Corporation**

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

1.5
1.6
1.8
1.9
2.0
2.2
2.5

**CIHM/ICMH
Microfiche
Series.**

**CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.**



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

© 1985

Technical and Bibliographic Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checked below.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Coloured covers/
Couverture de couleur | <input type="checkbox"/> Coloured pages/
Pages de couleur |
| <input type="checkbox"/> Covers damaged/
Couverture endommagée | <input type="checkbox"/> Pages damaged/
Pages endommagées |
| <input type="checkbox"/> Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée | <input type="checkbox"/> Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées |
| <input type="checkbox"/> Cover title missing/
Le titre de couverture manque | <input checked="" type="checkbox"/> Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées |
| <input type="checkbox"/> Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur | <input type="checkbox"/> Pages detached/
Pages détachées |
| <input type="checkbox"/> Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire) | <input checked="" type="checkbox"/> Showthrough/
Transparence |
| <input type="checkbox"/> Coloured plates and/or illustrations/
Planches et/ou illustrations en couleur | <input type="checkbox"/> Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impression |
| <input type="checkbox"/> Bound with other material/
Relié avec d'autres documents | <input type="checkbox"/> Includes supplementary material/
Comprend du matériel supplémentaire |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tight binding may cause shadows or distortion along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la distorsion le long de la marge intérieure | <input type="checkbox"/> Only edition available/
Seule édition disponible |
| <input type="checkbox"/> Blank leaves added during restoration may appear within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées lors d'une restauration apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont pas été filmées. | <input type="checkbox"/> Pages wholly or partially obscured by errata slips, tissues, etc., have been refilmed to ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure, etc., ont été filmées à nouveau de façon à obtenir la meilleure image possible. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Additional comments:
Commentaires supplémentaires: Pagination multiple. Les pages froissées peuvent causer de la distorsion. | |

This item is filmed at the reduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X	12X	14X	16X	18X	20X	22X	24X	26X	28X	30X	32X
			✓								

The copy filmed here has been reproduced thanks to the generosity of:




Seminary of Quebec
Library

The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in keeping with the filming contract specifications.

Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impression, or the back cover when appropriate. All other original copies are filmed beginning on the first page with a printed or illustrated impression, and ending on the last page with a printed or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche shall contain the symbol \rightarrow (meaning "CONTINUED"), or the symbol ∇ (meaning "END"), whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method:



L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole \rightarrow signifie "A SUIVRE", le symbole ∇ signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

ails
du
odifier
une
image

rrata
o

pelure,
à

32X

Bibliothèque,
Le Séminaire de Québec
3 rue de l'Université,
Québec 4, QUE.

SU

HIS

SUPPLÉMENT

À

HISTOIRE NATURELLE.

Tome douzième.

166

62
H

GÉ

Serv

Par

de

de

S

S

u



DE

ex Bibl. C. J. Deschenaux
HISTOIRE
NATURELLE,

GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE,
Servant de suite à l'histoire des Animaux
quadrapèdes.

Par M. le Comte DE BUFFON, Inten-
dant du Jardin & du Cabinet du Roi,
de l'Académie Française, de celle des
Sciences, &c.

SUPPLÉMENT. Tome douzième.

Seminaire de Québec



P A R I

Suivant la Copie in-4.^o

DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCLXXXII.

HISTOIRE

NATURELLE

CHIMIE ET MÉTÉOROLOGIE

de Jean de La Fontaine, de l'Académie des Sciences
par M. de La Fontaine, de l'Académie des Sciences

Par M. de La Fontaine, de l'Académie des Sciences
de l'Académie des Sciences, de l'Académie des Sciences
de l'Académie des Sciences, de l'Académie des Sciences

SUPPLÉMENT. Tome deuxième.



DE L'IMPRIMERIE ROYALE

M. BOCCARD

D
L
L
D
D
D
L
D
L
D

T A B L E

De ce qui est contenu dans
ce Volume.

<i>LE CHEVROTAIN appelé petite Gazelle.....</i>	Page 1
<i>LE COCHON de terre.....</i>	3
<i>DU RATON-CRABIER....</i>	14
<i>DU COATI.....</i>	18
<i>DU SARIGUE.....</i>	20
<i>LE SARIGUE à longs poils.</i>	23
<i>DE LA MARMOSE.....</i>	25
<i>LE KOURI ou le petit Unau.</i>	29
<i>DE LA TAUPE.....</i>	33

T A B L E.

<i>LA TAUPE ROUGE d'Amérique.</i>	36
<i>LA GRANDE TAUPE d'Afrique.</i>	37
<i>Addition à l'article de la Taupe.</i>	38
<i>LA TAUPE de Canada...</i>	45
<i>LA GRANDE TAUPE du Cap.</i>	48
<i>LA GERBOISE.....</i>	53
<i>Addition à l'article de la Gerboise</i>	59
<i>Seconde addition à l'histoire des Gerboises</i>	69
<i>DU DAMAN d'Israël.....</i>	85
<i>DE LA LOUTRE.....</i>	97
<i>DE LA SARICOVIENNE ou Lou-tre-marine.....</i>	104

Amérique. 36
 Afrique. 37
 la Taupe. 38
 .. 45
 p. 48
 .. 53
 la Ger-
 .. 59
 stoire des
 .. 69
 .. 85
 .. 97
 u Lou-
 .. 104

T A B L E.

*Addition à l'article des Morses
 ou Vaches-marines.* 124

*Addition à l'article des Pho-
 ques* 129

**LES PHOQUES sans oreilles ou
 Phoques proprement
 dits.** 132

*Le grand Phoque à museau ridé.
 Première espèce.* 133

*Le Phoque à ventre blanc. Se-
 conde espèce* 140

*Le Phoque à capuchon. Troi-
 sième espèce.* 162

*Le Phoque à croissant. Qua-
 trième espèce.* 164

*Le Phoque Neit-soak. Cin-
 quième espèce.* 169


*Le Phoque Laktak de Kamis-
 chatka. Sixième espèce. 170*

*Le Phoque Gassigiak. Septième
 espèce* 171

T A B L E.

<i>Le Phoque commun. Huitième</i> espèce.....	172
<i>L'OURS-MARIN.....</i>	182
<i>LE LION-MARIN.....</i>	216
<i>LES LAMANTINS.....</i>	262
<i>LE GRAND LAMANTIN de</i> <i>Kamtschatka.....</i>	258
<i>LE GRAND LAMANTIN des</i> <i>Antilles.....</i>	276
<i>LE PETIT LAMANTIN de</i> <i>l'Amérique.....</i>	281
<i>LE PETIT LAMANTIN du Sé-</i> <i>négal.....</i>	286

FIN DE LA TABLE.



HISTOIRE

Huitième

.... 172

... 182

... 216

... 262

TIN de

... 258

TIN des

.. 276

TIN de

... 281

du Sé-

... 286

E.

TOIRE



LE CHEVROTAIN DE JAVA.

H
M
XX
SU
LE
a
N
la fi
fous
nous
très-
mén
que
S



HISTOIRE NATURELLE.



SUPPLÉMENT A L'HISTOIRE
des Animaux quadrupèdes.

LE CHEVROTAIN, *appelé à Java PETITE GAZELLE.*

NOUS DONNONS ici (*planche XXX*),
la figure d'un chevrotain venu de Java,
sous le nom de *petite gazelle*, & qui
nous paroît être de la même espèce, à
très-peu-près, que celle du chevrotain
mémina de Ceylan; les seules différences
que nous puissions y remarquer, sont,
Supplément. Tome XII. A



qu'il n'a point, comme le mémina, de bandes ou de livrée sur le corps, le poil est seulement ondé ou jaspé de noir, sur un fond couleur de musc - foncé, avec trois bandes blanches distinctement marquées sur la poitrine; le bout du nez est noir, & la tête est moins arrondie & plus fine que celle du mémina, & les sabots des pieds sont plus alongés. Ces différences, assez légères, pourroient n'être qu'individuelles, & ne doivent pas nous empêcher de regarder ce chevrotain de Java, comme une simple variété dans l'espèce du mémina de Ceylan. Au reste, nous n'avons pas eu d'autre indication sur ce petit animal, qui n'est certainement pas du genre des gazelles, mais de celui des chevrotains.



LE COCHON DE TERRE.

NOUS AVONS DIT & répété souvent qu'aucune espèce des animaux de l'Afrique ne s'est trouvée dans l'Amérique méridionale, & que réciproquement aucun des animaux de cette partie de l'Amérique ne s'est trouvé dans l'ancien continent. L'animal, dont il est ici question, a pu induire en erreur des Observateurs peu attentifs, tels que M. Vossmaër; mais on va voir, par sa description & par la comparaison de sa figure avec celle des fourmilliers d'Amérique, qu'il est d'une espèce très-différente, & qu'il n'a guère d'autres rapports avec eux, que d'être de même privé de dents, & d'avoir une langue assez longue pour introduire dans les fourmillières. Nous avons donc adopté le nom de cochon de terre que Kolbe donne à ce mangeur de fourmis, de préférence à celui de fourmillier, qui doit être réservé aux mangeurs de fourmis d'Amérique, puisqu'en effet cet animal d'Afrique en diffère

4 *Supplément à l'Histoire*

essentiellement par l'espèce, & même par le genre. Le nom de cochon de terre est relatif à ses habitudes naturelles & même à sa forme, & c'est celui sous lequel il est communément connu dans les terres du Cap. Voici la description que M. Allamand a faite de cet animal dans le nouveau supplément à mon Ouyrage.

« M. de Buffon semble avoir épuisé tout ce qu'on peut dire sur les animaux mangeurs de fourmis; l'article, qu'il en a dressé (a), doit lui avoir coûté beaucoup de peine, tant à cause des recherches qu'il a dû faire de tout ce qui a été dit de ces animaux, que de la nécessité où il a été de relever les fautes de ceux qui en ont parlé avant lui, & particulièrement de Séba. Celui-ci ne les a pas seulement mal décrits, mais il a encore rangé parmi eux un animal d'un genre très-différent.

(a) Voyez le tome X de cet Ouyrage, page 67.

des Animaux quadrupèdes. 5

M. de Buffon, après avoir dissipé la confusion qui régnoit dans l'histoire de ces animaux, n'admet que trois espèces de mangeurs de fourmis, le tamanoir, le tamandua & celui auquel il a conservé le nom de fourmillier; mais ensuite il a donné la description d'un animal (b) qui semble être une nouvelle espèce de tamandua, plutôt qu'une simple variété; enfin il conclut de tout ce qu'il a dit, que les mangeurs de fourmis ne se trouvent que dans les pays chauds de l'Amérique, & qu'ils n'existent pas dans l'ancien continent. Il est vrai que Desmarchais & Kolbe disent qu'il y en a en Afrique; mais le premier affirme simplement la chose, sans en rien dire de plus, ni sans en apporter aucune preuve; quant à Kolbe, son témoignage est si suspect, que M. de Buffon a été très-autorisé à n'y pas ajouter foi. J'ai pensé comme lui au sujet de Kolbe, & je n'ai point cru qu'il y eût des mangeurs de

(b) Voyez le tome IV.^e des suppléments, page 126; & la planche LII.

6 *Supplément à l'Histoire*

fourmis en Afrique ; mais M. le Capitaine Gordon m'a tiré de l'erreur où j'étois ; il m'a envoyé la dépouille d'un de ces animaux tué au cap de Bonne-espérance, où ils sont connus sous le nom de cochons de terre ; c'est précisément celui que Kolbe leur donne ; ainsi, je lui fais réparation d'avoir révoqué ici en doute sa véracité, & je suis persuadé que M. de Buffon lui rendra la même justice. Il est vrai que M. Pallas a confirmé le témoignage de Kolbe par ses propres observations ; il a donné la description d'un fœtus de mangeurs de fourmis, envoyé du cap de Bonne-espérance au Cabinet de S. A. S. M.^{se} le Prince d'Orange ; mais un fœtus, dénué de son poil, étoit peu propre à donner une juste idée de l'animal dont il tiroit son origine, & il pouvoit avoir été envoyé d'ailleurs au Cap ; cependant le nom de cochon, par lequel on l'avoit désigné, a commencé à me faire revenir de mon préjugé contre Kolbe.

J'ai fait remplir la peau que M. Gordon m'a envoyée, ce qui m'a très-bien réussi ; & c'est d'après cette peau bourrée, que

M. le Capi-
l'erreur où
ouille d'un
de Bonne-
sous le nom
précisément
; ainsi, je
révoqué ici
is persuadé
ra la même
allas a con-
be par ses
onné la def-
angeurs de
Bonne-espé-
S. M.^{se} le
etus, dénué
e à donner
ont il tiroit
t avoir été
pendant le
on l'avoit
ire revenir
e.

M. Gordon
bien réussi;
urrée, que

j'ai fait graver la figure de la *planche*
XI (c). Si l'on doit appeller mangeur
de fourmis un animal qui n'a point de
dents, & qui a une langue fort longue
qu'il enfonce dans les fourmillières, pour
avaler ensuite les fourmis qui s'y atta-
chent, on ne peut pas douter que celui
qui est représenté ici n'en mérite le nom;
cependant il diffère très-fort des trois
espèces décrites par M. de Buffon, &
que je crois, avec lui, être particulières
à l'Amérique.

Il est à-peu-près aussi gros & aussi
grand que le tamanoir, comme on le
verra par les dimensions que j'en don-
nerai. Les poils qui couvrent sa tête, le
dessus de son corps & sa queue, sont
très-courts, & tellement couchés &
appliqués sur sa peau, qu'ils semblent
y être collés; leur couleur est d'un gris-
sale, un peu approchant de celui du
lapin, mais plus obscur; sur les flancs
& sous le ventre, ils sont plus longs
& d'une couleur roussâtre; ceux qui

(c) Voyez, dans ce volume, *planche XXXI.*

8 *Supplément à l'Histoire.*

couvrent les jambes sont aussi beaucoup plus longs ; ils sont tout-à-fait noirs & droits.

Sa tête est presque un cône tronqué, un peu comprimé vers son extrémité ; elle est terminée par un plan ou plutôt par un boutoir, tel que celui d'un cochon, dans lequel sont les trous des narines, & qui avance de près d'un pouce au-delà de la mâchoire inférieure ; celle-ci est très-petite ; la langue est longue, fort mince & plate, mais plus large que dans les autres mangeurs de fourmis, qui l'ont presque cylindrique ; il n'a absolument aucune dent ; ses yeux sont beaucoup plus près des oreilles que du museau, ils sont assez grands, & d'un angle à l'autre, ils ont un pouce de longueur ; ses oreilles, assez semblables à celles des cochons, s'élèvent à la hauteur de six pouces, & se terminent en pointe ; elles sont formées par une membrane presque aussi mince que du parchemin, & couvertes de poils à peine remarquables, tant ils sont courts ; j'ignore si, dans l'animal vivant, elles sont pendantes comme dans les tamandua ;

des Animaux quadrupèdes. 9

M. Pallas dit qu'elles le sont, mais il en juge d'après celles du fœtus, où leur longueur doit leur faire prendre cette position, sans qu'on en doive conclure qu'elles l'aient dans l'animal lorsqu'il est hors du ventre de sa mère; la queue surpasse le tiers de la longueur de tout le corps; elle est fort grosse à son origine, & va en diminuant jusqu'à son extrémité; ses pieds de devant ont quatre doigts, ceux de derrière en ont cinq, tous armés de forts ongles, dont les plus longs sont aux pieds postérieurs, car ils égalent en longueur les doigts mêmes; ils ne sont pas pointus, mais arrondis à leur extrémité, un peu recourbés & propres à creuser la terre; il ne paroît pas qu'il puisse s'en servir pour saisir fortement, ou pour se défendre, comme les autres mangeurs de fourmis; cependant il doit avoir beaucoup de force dans ses jambes, qui sont très-grosses proportionnellement à son corps.

On voit, par cette description, que cet animal est très-différent du tamanoir, par son poil, sa couleur, sa tête & sa queue; il surpasse aussi fort en grandeur

le tamandua , dont il diffère de même par son pelage , par sa couleur & par ses ongles ; je ne dis rien de sa différence avec le fourmillier , avec lequel personne ne le confondra ; il appartient donc à une quatrième espèce inconnue jusqu'à présent ; & tout ce que j'en fais de certain , c'est que cet animal fourre sa langue dans les fourmillières , qu'il avale les fourmis qui s'y attachent , & qu'il se cache en terre dans des trous ; quoiqu'il ait une queue qui ressemble un peu à celle du tamandua , je doute qu'il s'en serve , comme lui , pour se suspendre à des branches d'arbres , elle ne me paroît pas , pour cela , assez flexible , & les ongles ne sont pas faits pour grimper.

Comme je l'ai déjà dit , on lui donne au Cap le nom de cochon de terre ; mais il ressemble au cochon , & cela encore très-imparfaitement , uniquement par sa tête allongée , par le boutoir qui la termine , & par la longueur de ses oreilles : d'ailleurs il en diffère essentiellement par les dents qu'il n'a pas ; par sa queue , & principalement par ses pieds , aussi-bien que par la conformation de tout son corps.

des Animaux quadrupèdes. 11

Au défaut de bonnes autorités sur ce qui regarde ce mangeur de fourmis (car c'est le nom que je crois devoir lui donner, pour le distinguer des trois espèces décrites par M. de Buffon), je mettrai ici en note ce que Kolbe en a dit (*d*); il a été plus exact dans la

(*d*) « La quatrième espèce des cochons se nomme le *cochon de terre*; il ressemble très-fort aux cochons rouges. (*Nota.* Pourquoi aux cochons rouges? il ne leur ressemble pas plus par la couleur qu'aux autres), il a seulement la tête plus longue & le groin plus pointu; il n'a absolument point de dents, & ses soies ne sont pas si fortes; sa langue est longue & affilée; sa queue est longue; il a aussi les jambes longues & fortes; la terre lui sert de demeure; il s'y creuse une grotte, ouvrage qu'il fait avec beaucoup de vivacité & de promptitude, & s'il a seulement la tête & les pieds de devant dans la terre, il s'y cramponne si bien, que l'homme le plus robuste ne sauroit l'en arracher. »

Lorsqu'il a faim, il va chercher une fourmière; dès qu'il a fait cette bonne trouvaille, il regarde tout autour de lui, pour voir si tout est tranquille & s'il n'y a point de danger; il ne mange jamais sans avoir pris cette précaution, alors il se couche, &



12 *Supplément à l'Histoire*

description qu'il en a faite qu'il ne l'est ordinairement.

Voici ses dimensions.

	pieds.	pouces.	lignes.
Longueur du corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue	3.	5.	8
Circonférence du milieu du			

„ çant son groin tout près de la fourmillière, il
 „ tire la langue tant qu'il peut, les fourmis
 „ montent dessus en foule, & dès qu'elle est
 „ bien couverte, il la retire & les gobe tou-
 „ tes; ce jeu se recommence plusieurs fois,
 „ & jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Afin de lui
 „ procurer plus aisément cette nourriture, la
 „ Nature, toute sage, a fait en sorte que la
 „ partie supérieure de cette langue, qui doit
 „ recevoir les fourmis, est toujours couverte &
 „ comme enduite d'une matière visqueuse &
 „ gluante, qui empêche ces foibles animaux de
 „ s'en retourner, lorsqu'une fois leurs jambes y
 „ sont empêtrées; c'est-là leur manière de manger.
 „ Ils ont la chair de fort bon goût & très-saine;
 „ les Européens & les Hottentots vont souvent
 „ à la chasse de ces animaux; rien n'est plus
 „ facile que de les tuer, il ne faut que leur
 „ donner un petit cou de bâton sur la tête. „
Description du cap de Bonne-espérance, par Kolbe,
volume III, page 42.

ire.
l ne l'est
uces. lignes
5. II

millière, il
les fourmis
qu'elle est
gobe tou-
sieurs fois,
Afin de lui
rriture, la
orte que la
, qui doit
couverte &
isqueuse &
animaux de
rs jambes y
de manger.
c très-saine;
ont souvent
n n'est plus
t que leur
la tête. »
par Kolbe,



re del.

Magd. Th. Rousselet Sculp.

LE COCHON DE TERRE.

I
S

I
I

I
I

I
I

Lo
Sa

Lo

Sa

Lo

Le

des Animaux quadrupèdes. 13

	pieds.	pouces.	lignes.
corps.....	2.	8.	//
Longueur de la tête.....	//	11.	//
Sa circonférence entre les yeux & les oreilles.....	1.	1.	//
— près du bout du museau.....	//	7.	//
Longueur des oreilles.....	//	6.	//
Distance entre leurs bases.....	//	2.	//
Longueur des yeux mesurée d'un angle à l'autre.....	//	1.	//
Distance des yeux aux oreilles.....	//	2.	//
— au bout du museau..	//	7.	//
— entre les deux yeux, en ligne droite.....	//	4.	//
Longueur de la queue....	1.	9.	//
Sa circonférence près de l'anus.....	1.	3.	//
— près de l'extrémité..	//	2.	//
Longueur des jambes de devant.....	1.	//	//
Sa circonférence près du corps.....	//	11.	//
— près du poignet....	//	6.	6.
Longueur des jambes de derrière.....	1.	1.	//
Leur circonférence près du corps.....	1.	//	//
— près du talon.....	//	7.	6.

DU RATON - CRABIER. (a)

NOUS DONNONS ici (*planche xxxii*), la figure d'un animal qui nous a été envoyé de Cayenne par M. de la Borde, sous la dénomination impropre de *chien-crabier*, & qui n'a d'autre rapport avec le crabier, que l'habitude de manger également des crabes; mais il tient beaucoup du raton par la grandeur, la forme & les proportions de la tête, du corps & de la queue; & comme nous ignorons le nom qu'il porte dans son pays natal, nous lui donnerons, en attendant que nous en soyons informés, la dénomination de *raton-crabier*, pour le distinguer & du raton & du crabier, dont nous avons donné les figures, *volume VIII, planche XLIII*; & *supplément, volume III, planche LIV*.

(a) Addition à ce qui est dit de cet animal, *supplément, vol. III, p. 215*.

des Animaux quadrupèdes. 15

Cet animal a été envoyé de Cayenne avec le nom & l'indication suivante ; *chien-crabier adulte , femelle prise nourrissant trois petits* ; mais , comme nous venons de le dire , il n'a nul rapport apparent avec le crabier , il n'en a ni la forme du corps ni la queue écaillée ; sa longueur , depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue , est de vingt-trois pouces six lignes , & par conséquent elle est à-peu-près égale à celle du raton , qui est de vingt-deux pouces six lignes ; les autres dimensions sont proportionnellement les mêmes entre ces deux animaux , à l'exception de la queue qui est plus courte & beaucoup plus mince dans cet animal que celle du raton.

La couleur de ce raton-crabier , est d'un fauve mêlé de noir & de gris ; le noir domine sur la tête , le cou & le dos , mais le fauve est sans mélange sur les côtés du cou & du corps ; le bout du nez & les naseaux sont noirs ; les plus grands poils des moustaches ont quatre pouces de longueur , & ceux du dessus de l'angle des yeux , ont deux pouces

pire

R. (a)

planche
qui nous
M. de la
impropre
autre rap-
itude de
mais il
randeur,
e la tête,
comme
rte dans
nerons ,
vons in-
ton-cra-
raton &
onné les
XLIII;
planche

t animal,

deux lignes; une bande d'un brun-noirâtre environne les yeux & s'étend presque jusqu'aux oreilles, elle passe sur le museau, se prolonge & s'unit au noir du sommet de la tête; le dedans des oreilles est garni d'un poil blanchâtre; & une bande de cette même couleur règne au-dessus des yeux, & il y a une tache blanche au milieu du front; les joues, les mâchoires, le dessous du cou, de la poitrine & du ventre, sont d'un blanc-jaunâtre: les jambes & les pieds, sont d'un brun-noirâtre, celles de devant sont couvertes d'un poil court; les doigts sont longs & bien séparés les uns des autres; la queue est environnée de six anneaux noirs, dont les intervalles sont d'un fauve-grisâtre; ce qui établit encore une différence entre cet animal & le vrai raton, dont la queue longue, grosse & touffue, est seulement annelée sur la face supérieure. Ces deux espèces de raton diffèrent encore entr'elles par la couleur du poil, qui, dans le raton, est sur le corps d'un noir mêlé de gris & de fauve-pâle, & sur les jambes de couleur blanchâtre; au lieu que, dans

ire

brun-noir
end pref-
le sur le
au noir
dans des
châtre ;
couleur
l y a une
ont ; les
du cou,
ont d'un
es pieds,
s de de-
l court ;
parés les
vironnée
ntervalles
ui établit
et animal
longue,
et annelée.
x espèces
elles par
le raton,
de gris
mbes de
ue ; dans



e. 7d

(C Bar-1)

LE RATON-CRABIER.

o
c
r
c
p
p
e

des Animaux quadrupèdes. 17

celui-ci, il est d'un fauve mêlé de noir & de gris sur le corps, & d'un brun-noirâtre sur les jambes. Ainsi, quoique ces deux animaux aient plusieurs rapports entre eux, leurs différences nous paroissent suffisantes pour en faire deux espèces distinctes.



D U C O A T I.

QUELQUES PERSONNES qui ont séjourné dans l'Amérique méridionale, m'ont informé que les Coatis produisent ordinairement trois petits; qu'ils se font des tanières en terre comme des renards; que leur chair a un mauvais goût de venaison, mais qu'on peut faire de leurs peaux d'assez belles fourrures. Ils m'ont assuré que ces animaux s'apprivoisent fort aisément, qu'ils deviennent même très-caressans, & qu'ils sont sujets à manger leur queue ainsi que les sapa-jous, guenons & la plupart des autres animaux à longue queue des climats chauds. Lorsqu'ils ont pris cette habitude sanguinaire on ne peut pas les en corriger, ils continuent de ronger leur queue & finissent par mourir, quelques soins & quelque nourriture qu'on puisse leur donner; il semble que cette inquiétude est prodnite par une vive démangeaison; mais peut-être les préserveroit-on du mal qu'ils se font en

ire

des Animaux quadrupèdes. 19

couvrant l'extrémité de la queue avec une plaque mince de métal, comme l'on couvre quelquefois les perroquets sur le ventre, pour les empêcher de se déplumer.

qui ont fé-
dionale ,
roduisent
ls se font
renards ;
goût de
de leurs
Ils m'ont
orivoisent
nt même
sujets à
les sapa-
les autres
s climats
te habi-
as les en
nger leur
quelques
on puisse
cette in-
ne vive
les pré-
font en



D U S A R I G U E .

N O U S D O N N O N S ici (*planche xxxiii*), la figure d'un Sarigue qui nous paroît n'être qu'une variété dans cette espèce, mais dont les différences sont néanmoins assez grandes, pour que nous ayons cru devoir le faire représenter. Ce sarigue se trouve dans le pays des Illinois, & diffère de l'autre par la couleur & par le poil qui est long sur tout le corps : il a la tête moins allongée & entièrement blanche, à l'exception d'une tache brunâtre, qui prend du coin de l'œil & finit en s'affoiblissant du côté du nez, dont l'extrémité est la seule partie de la face qui soit noire ; la queue est écailleuse & sans poil dans toute sa longueur, au lieu que celle du sarigue de la *planche XLV*, *volume X*, est garnie de poil depuis son origine jusqu'à plus des trois quarts de sa longueur ; cependant ces différences ne me paroissent pas suffisantes pour constituer deux espèces ; & d'ailleurs

ire

J E.

planche
rigue qui
été dans
différences
pour que
e repré-
dans le
le l'autre
l qui est
a la tête
blanche,
âtre, qui
en s'affoi-
at l'extré-
face qui
se & fans
u lieu que
XLV, vo-
epuis son
quarts de
différences
ates pour
d'ailleurs



LE SARIGUE DES ILLINOIS :

co
M
ne
pa
qu
pr

Lo
c
i
c
Lo
La
Lo
Lo

fer
au
le
qu
br
&
jul
do
la

des Animaux quadrupèdes. 21

comme le climat des Illinois & celui du Missipipi où se trouve le premier sarigue ne sont pas éloignés ; il y a toute apparence que ce second sarigue n'est qu'une simple variété dans l'espèce du premier.

pieds. pouces. lignes.

Longueur du corps entier, depuis le bout du nez, jusqu'à l'origine de la queue.....	I.	3.	3.
Longueur des oreilles....	II	I.	I.
Largeur des oreilles.....	II	II	9.
Longueur des mouffaches.	II	2.	2.
Longueur de la queue...	II	I.	3.

Les oreilles sont d'une peau lisse ; semblable à du parchemin brun, sans aucun poil en dedans ni en dehors ; le poil, qui couvre le corps jusqu'à la queue, ainsi que les jambes, est d'un brun plus ou moins nuancé de cendré, & mêlé de longs poils blancs qui ont jusqu'à deux pouces trois lignes sur le dos, & deux pouces six lignes près de la queue ; le dessous du corps est d'un

22 *Supplément à l'Histoire*

cendré blanchâtre; il y a cinq doigts à tous les pieds; le pouce ou doigt interne des pieds de derrière, a un ongle plat qui n'excède pas la chair; les autres ongles sont blancs & crochus.



LE SARIGUE A LONGS POILS.

NOUS DONNONS ici (*planche XXXIV*), la figure d'un Sarigue mâle à longs poils, qui est d'un quart plus grand que le précédent, & qui en diffère aussi par la queue, qui est beaucoup plus courte à proportion; la longueur de ce sarigue est de vingt pouces trois lignes du bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, au lieu que l'autre n'a que quinze pouces trois lignes; la tête est semblable dans tous deux, à l'exception du bout du nez qui est noir dans le précédent, & couleur de chair dans celui-ci; les plus grands poils des moustaches ont près de trois pouces de longueur; il y a encore une petite différence, c'est que dans le sarigue Illinois, les deux dents incisives du milieu de la mâchoire supérieure sont les plus petites, tandis que, dans celui-ci, ces deux mêmes dents incisives sont les plus grandes; ils diffèrent encore par les couleurs du poil, qui,

dans ce sarigue, est brun sur les jambes & les pieds, blanchâtre sur les doigts, & rayé sur le corps de plusieurs bandes brunes indécises, une sur le dos jusqu'auprès de la queue, & une de chaque côté du corps qui s'étend de l'aisselle jusqu'aux cuisses; le cou est roussâtre depuis l'oreille aux épaules, & cette couleur s'étend sous le ventre & domine par endroits sur plusieurs parties du corps; la queue est écailleuse & garnie à son origine de poils blancs & de poils bruns; nous ne déciderons pas par cette simple comparaison de l'identité ou de la diversité de ces deux espèces de sarigues, qui toutes deux pourroient bien n'être que des variétés de celle du sarigue commun.



ire
es jambes
s doigts,
eurs ban-
r le dos
une de
étend de
cou est
épaules,
le ventre
plusieurs
écailleuse
ils blancs
déciderons
raison de
ces deux
ites deux
es variétés



DE

LE SARGUE à longs poils.

C
M
ler
le
à l
pri
l'un
me
fuj
qui
aut
Sai
voy
toin
Gre

dit
avo
(m
poi
des
dans
S

DE LA MARMOSE.

ON SAIT qu'en général les Sarigues, Marmoses & Cayopolins portent également leurs petits dans une poche sous le ventre, & que ces petits sont attachés à la mamelle long-temps avant d'avoir pris leur accroissement entier; ce fait, l'un des plus singuliers de la Nature, me faisoit desirer des éclaircissemens au sujet de la génération de ces animaux qui ne naissent pas à terme comme les autres; voici ce que M. Roume de Saint-Laurent m'en a écrit en m'envoyant le Catalogue du Cabinet d'Histoire Naturelle qu'il a fait à l'île de la Grenade.

« Des personnes dignes de croyance, dit M. de Saint-Laurent, m'ont assuré avoir trouvé des femelles de *manicou* (marmose), dont les petits n'étoient point encore formés; on voyoit au bout des mamelons de petites bosses claires, dans lesquelles on trouvoit l'embryon

Supplément. Tome XII. B

26 *Supplément à l'Histoire*

ébauché : tout extraordinaire que ce fait doive paroître, je ne puis le révoquer en doute, & je vais ajouter ici la dissection que je fis d'un de ces animaux en 1767, qui peut donner quelques lumières sur la façon dont la génération s'effectue dans cette espèce.

La mere avoit dans son sac sept petits, au bout d'autant de mamelons, auxquels ils étoient fortement fixés, sans qu'ils y adhérassent; ils avoient environ trois lignes de longueur, & une ligne & demie de grosseur; la tête étoit fort grosse à proportion du corps, dont la partie antérieure étoit plus formée que la postérieure; la queue étoit moins avancée que tout le reste; ces petits n'avoient point de poil, leur peau très-fine paroissoit sanguinolente; les yeux ne se distinguoient que par deux petits filets en cercles; les cornes de la matrice étoient gonflées, fort longues, formant un tour & se portant ensuite vers les ovaires, elles contenoient un mucus blanc, épais & parfumé de globules d'air nombreux; l'extrémité des cornes se terminoit par des filets gros comme

des Animaux quadrupèdes. 27

de forts crins, d'une substance à-peu-près semblable à celle des trompes de Fallope, mais plus blanche & plus solide; on suivoit ces filets jusque dans le corps glanduleux des mamelles, où ils aboutissoient chacun à des mamelons, sans que l'on pût en distinguer la fin, parce qu'elle se confondoit dans la substance des mamelles; ces filets paroissent être creux & remplis du même mucus qui étoit contenu dans les cornes: peut-être les petits embryons, produits dans la matrice, passent-ils dans ces canaux pour se rendre aux mamelons contenus dans le sac. »

Cette observation de M. de Saint-Laurent, mérite assurément beaucoup d'attention; mais elle nous paroît si singulière, qu'il seroit bon de la répéter plus d'une fois & de s'assurer de cette marche très extraordinaire des fœtus & de leur passage immédiat de la matrice aux mamelles, & du temps où se fait ce passage après la conception; il faudroit pour cela élever & nourrir un certain nombre de ces animaux, &

28 *Supplément à l'Histoire*

disséquer les femelles peu de temps après leur avoir donné le mâle à un jour, deux jours, trois jours, quatre jours après l'accouplement, on pourroit saisir le progrès de leur développement, & reconnoître le temps & la manière dont ils passent réellement de la matrice aux mamelles qui sont renfermées dans la poche de la mère. »



N
x
l'e
il
ma
for
dan
çoi
lieu
c'e
esp
il
du
nou
fes
mes
sim

(
page

LE KOURI

OU LE PETIT UNAU. (a)

NOUS DONNONS ici (*planche xxxv*), la figure d'un animal dont l'espèce est voisine de celle de l'Unau; il est à la vérité de moitié plus petit, mais il lui ressemble beaucoup par la forme du corps. Cet animal a été trouvé dans une habitation de la Guyane françoise; il étoit dans la basse-cour au milieu des poules & il mangeoit avec elles; c'est, dit-on, le seul individu de cette espèce que l'on ait vu à Cayenne, d'où il nous a été envoyé pour le Cabinet du Roi, sous le nom de *kouri*; mais nous n'avons eu aucune information sur ses habitudes naturelles, & nous sommes obligés de nous restreindre à une simple description.

Ce petit unau ressemble au grand par

(a) Suite de l'addition du supplément, *vol. III*, page 289.

30. *Supplément à l'Histoire*

un caractère essentiel ; il n'a , comme lui , que deux doigts aux pieds de devant , au lieu que l'ai en a trois , & par conséquent il est d'une espèce différente de celle de l'ai ; il n'a que douze pouces de longueur , depuis l'extrémité du nez jusqu'à l'origine de la queue , tandis que l'unau , dont nous avons donné l'histoire & la description , *vol. XIII* , avoit dix-sept pouces six lignes ; cependant ce petit unau paroïssoit être adulte ; il a , comme le grand , deux doigts aux pieds de devant & cinq à ceux de derrière ; mais il en diffère non-seulement par la taille , mais encore par son poil qui est d'un brun-musc nuancé de grisâtre & de fauve ; & ce poil est bien plus court & plus terne en couleur que dans le grand unau ; sous le ventre , il est d'une couleur de musc-clair , nuancé de cendré , & cette couleur s'éclaircit encore davantage sous le cou jusqu'aux épaules , où il forme comme une bande foible de fauve-pâle ; les plus grands ongles de ce petit unau n'ont que neuf lignes , tandis que ceux du grand ont un pouce sept lignes & demse.

, comme
ds de de-
ois, & par
différente
ize pouces
ité du nez
tandis que
é l'histoire
avoit dix-
endant ce
ulte; il a,
s aux pieds
derrière;
ent par la
oïl qui est
ifâtre & de
us court &
ns le grand
d'une cou-
de cendré,
ore davan-
pales, où
foible de
ongles de
euf lignes,
t un pouce

Nous avons eu le grand unau vivant; mais, comme nous n'avons pu faire la description du petit que d'après une peau bourrée, nous ne sommes pas en état de prononcer sur toutes les différences qui peuvent se trouver entre ces deux animaux; nous présumons néanmoins qu'ils ne forment qu'une seule & même espèce, dans laquelle il se trouve deux races, l'une plus grande & l'autre plus petite.

J'ai dit, d'après M. de la Borde (*supplément, volume III, page 289*), que le paresseux qu'il nomme *mouton*, se jette sur les hommes depuis le haut des arbres; cela a été mal exprimé par M. de la Borde; il est certain qu'il n'attaque pas les hommes, mais comme tous les paresseux en général ne peuvent descendre des arbres, ils sont forcés de se laisser tomber, & tombent quelquefois sur les hommes. M. de la Borde, dans ses nouveaux Mémoires, indique quatre espèces de paresseux; savoir, le *paresseux cabri*, le *paresseux mouton*, le *paresseux dos brûlé* & le nouveau paresseux que nous venons d'appeller *kouri*.

Comme il ne donne point la description exacte de ces quatre espèces, nous ne pouvons les comparer avec celles que nous connoissons; nous présumons seulement que son paresseux cabri & son paresseux mouton sont notre ai & notre unau; il nous a envoyé une peau qui nous paroît être celle de son paresseux dos brûlé, mais qui n'est pas assez bien conservée, pour que nous puissions juger si elle vient d'un animal dont l'espèce soit différente de celle de l'ai, à laquelle cette peau nous paroît ressembler, plus qu'à celle de l'unau.



pire


escription
nous ne
elles que
mons feu-
ri & son
i & notre
peau qui
paresseux
assez bien
issions ju-
dont l'es-
de l'ai, à
it ressem-
u.

XII. *Supl.* Tom. XI. *N. Edit*

Pl. XXXV. pag. 32.



LE KOURI ou LE PETIT UNAU.



n
t
M
t
e
i
t
&
c

ti
r
le

d
co
la
co
tr

—
sup

DE LA TAUPE. (a)

DEPUIS la publication du volume de mon ouvrage où j'ai donné la description de la taupe, il a paru un très-bon Mémoire de M. de la Faille, sur l'histoire naturelle de cet animal, imprimé en 1769, dont je crois devoir donner ici l'extrait, parce que ce mémoire contient plusieurs observations nouvelles & quelques faits qui ne m'étoient pas connus.

Selon M. de la Faille, on peut distinguer en Europe cinq taupes différentes; 1.^o celle de nos jardins, dont le poil est fin & d'un très-beau noir.

2.^o La taupe blanche, qui ne diffère de la taupe noire commune que par la couleur; elle est plus commune en Hollande qu'en France, & se trouve encore plus fréquemment dans les contrées septentrionales.

3.^o La taupe fauve qui, selon lui, ne

(a) Suite de l'addition à l'article de la Taupe, supplément, vol. III, page 193.

34 *Supplément à l'Histoire*

se trouve guère que dans le pays d'Aunis, & qui a le poil d'un roux-clair, tirant sur le ventre biche, sans aucune tache ni mélange; il paroît que c'est une nuance dans l'espèce de la taupe blanche, seulement elle est un peu plus grosse; mais M. de la Faille n'en a vu qu'un seul individu, qui avoit été pris près de la Rochelle dans le même terrain que la taupe blanche.

4.° La taupe jaune-verdâtre ou couleur de citron, qui se trouve dans le territoire d'Alais en Languedoc; elle est d'une belle couleur de citron, & l'on prétend que cette couleur n'est due qu'à la qualité de la terre qu'elle habite; c'est entre le bourg d'*Aulas* & les hameaux qu'on appelle *les Carrières*, dans le diocèse d'Alais, que se trouve cette taupe citron.

5.° La taupe tachetée ou variée qu'on trouve dans plusieurs contrées de l'Europe. Celles de l'Ost-frise ont tout le corps parsemé de taches blanches & noires: en Suisse, en Angleterre & dans le pays d'Aunis, elles ont le poil noir varié de fauve.

des Animaux quadrupèdes. 35

Indépendamment de ces cinq races de taupes, qui se trouvent en Europe ; les Voyageurs parlent d'une taupe, de l'île de Java, dont les quatre pieds sont blancs, ainsi que la moitié des jambes ; en Amérique, celle de Virginie ont le poil noirâtre & luisant, mêlé d'un pourpre foncé. Toutes ces taupes ne paroissent être que de simples variétés de l'espèce de la taupe commune, parce qu'elles n'en diffèrent que par les couleurs ; mais il y en a d'autres qui semblent constituer des espèces différentes, parce qu'elles diffèrent de la taupe commune, non-seulement par les couleurs, mais par la forme du corps & des membres.



LA TAUPE ROUGE D'AMÉRIQUE.

LA PREMIÈRE ESPÈCE est la Taupe d'Amérique, qui a le poil roux mêlé de cendré-clair, & qui n'a pas les pieds conformés comme ceux de la taupe d'Europe, n'ayant que trois doigts aux pieds de devant, & quatre à ceux de derrière qui sont à-peu-près égaux, tandis que ceux des pieds de devant sont très-inégaux; le doigt extérieur étant beaucoup plus long que les deux autres, & armé d'un ongle plus fort & plus crochu; le second doigt est plus petit, & le troisième l'est encore beaucoup plus. J'ai dit à ce sujet, *vol. VIII, page 86*, que cette prétendue taupe étoit un autre animal que notre taupe d'Europe, & je crois devoir persister dans cette opinion, jusqu'à ce qu'elle n'ait été mieux observée & décrite plus en détail.



LA GRANDE TAUPE D'AFRIQUE.

UNE SECONDE ESPÈCE est la Taupe du cap de Bonne-espérance, dont nous avons fait mention dans le *vol. III* de nos supplémens, *page 193*. Ces taupes d'Afrique, suivant M. l'abbé de la Caille, sont plus grosses que celles d'Europe, & sont si nombreuses dans les terres du Cap, qu'elles y forment des trous & des élévations en si grand nombre, qu'on ne peut les parcourir à cheval, sans courir risque de broncher, à chaque pas (b).

(b) Voyage de M. l'Abbé de la Caille, *page 299*.



*ADDITION à l'article de la
TAUPE du cap de Bonne-espé-
rance , tome IV des supplémens ,
dans l'édition de Hollande de mes
Ouvrages , page 81.*

DEPUIS la publication du *volume III* de mes supplémens, j'ai reçu de M. Alamand, une description plus exacte de cette Taupe du Cap, avec une figure faite sur l'animal vivant, & que je crois devoir donner ici (*planche XXXVI*), comme plus exacte que la *planche XXXIII* de mes supplémens: Voici ce que cet habile Naturaliste a publié cette année 1781, sur cet animal, que je n'avois guère pu qu'indiquer d'après M.^{rs} Sonnerat & de la Caille.

« M. de Buffon a donné une figure de cette taupe, faite d'après une peau bourrée, qui lui a été donnée par

des Animaux quadrupèdes. 39

M. Sonnerat, & il ne lui étoit pas possible d'en donner une meilleure, parce qu'un tel animal ne peut pas être transporté vivant en Europe; mais cette figure représente si imparfaitement son original, que je n'ai pas hésité d'en donner une meilleure; Voyez *planches IX & XXXVI*. M. Gordon m'en a envoyé le dessin.

Cette taupe ressemble à la taupe ordinaire par les habitudes & par la forme du corps, mais aussi elle en diffère en des parties si essentielles, que M. de Buffon a eu raison de dire que c'étoit une espèce particulière, qui ne pouvoit pas être regardée comme une simple variété. Sa longueur est de sept pouces; & son poil est d'un brun-minime, qui devient plus foncé & presque noir sur la tête: vers les côtés & sous le ventre, il est d'un blanc-cendré ou bleuâtre.

La tête de cette taupe est presque aussi haute que longue, & elle est terminée par un museau aplati, & non pas alongé comme celui de nos taupes; cependant elle a ceci de commun avec

ces dernières, c'est que son museau ressemble à une espèce de boutoir, de couleur de chair, où l'on voit les ouvertures des narines, comme dans le cochon, mais qui n'avance point au-delà des dents (c); la gueule est environnée d'une bande blanche de la largeur de quatre ou cinq lignes, qui passe au-dessus du museau; il en part quelques longs poils blancs qui forment une espèce de moustache; elle a à chaque mâchoire deux dents incisives fort longues, qui paroissent même quand la gueule est fermée; celles d'en haut sont de la longueur de quatre lignes, & celles d'en bas de plus de six; ses yeux sont extrêmement petits & placés presque à égale distance du museau & des oreilles, ils occupent le centre d'une tache ovale blanche, dont ils sont environnés, ce qui fait qu'on n'a pas de peine à les

(c) Comparez cette description avec celle que M. Daubenton a donnée de la taupe ordinaire, dans le *tome VIII* de cet Ouvrage, *page 34.*

ire

seau ref-
toir, de
t les ou-
dans le
t au-delà
vironnée
geur de
au-dessus
es longs
pèce de
mâchoire
ues, qui
eule est
le la lon-
lles d'en
nt extrê-
e à égale
eilles, ils
he ovale
nnés, ce
ine à les

avec celle
taupe ordi-
Ouvrage,

des Animaux quadrupèdes. 41

trouver, comme dans nos taupes; ses oreilles n'ont point de conque qui paroisse en dehors, tout ce qu'on en voit extérieurement consiste dans l'orifice du canal auditif qui est assez grand, & dont le rebord a un peu de saillie; cet orifice est aussi placé au milieu d'une tache blanche; enfin il y a une troisième tache de la même couleur au-dessus de la tête; & c'est à cause de ces différentes taches, qu'on la nomme au Cap *blesmol* ou *taupe tachetée*; ses pieds ont tous cinq doigts munis de forts ongles; ils sont sans poils en dessus, mais ils en ont d'assez longs en dessous; ceux de devant sont faits comme ceux de derrière, & ils n'ont rien qui ressemble à ceux des taupes d'Europe, qui sont beaucoup plus grands que les pieds postérieurs, & dont la figure approche de celle d'une main, dont la paume seroit tournée en arrière.

Sa queue qui ne surpasse pas sept ou huit lignes, est couverte de longs poils de la même couleur que ceux des côtés.

Ces taupes ressemblent encore aux

42 *Supplément à l'Histoire*

nôtres par leurs habitudes, elles vivent sous terre, elles y creusent des galeries, & elles font beaucoup de mal aux jardins. M. Gordon a vu, fort avant dans l'intérieur du pays, une espèce beaucoup plus petite & de couleur d'acier, aussi lui en donne-t-on le nom ; mais quant au reste elle étoit tout-à-fait semblable à celle que nous venons de décrire. Ce que nous en avons dit est une nouvelle preuve du peu d'attention que Kolbe a donné à ce qu'il a vu ; en parlant de la taupe du Cap, voici comment il s'exprime.

« Il y a des taupes au Cap & même en fort grande quantité, qui ressemblent, à tous égards, à celles que nous avons en Europe, « ainsi, je n'ai rien à dire sur ce sujet » ; il auroit donc pu se passer d'en faire un article, où il n'est question que du piège qu'on leur tend, en lui faisant tirer une corde qui fait partir un coup de fusil qui les tue, & même encore je doute qu'on se donne la peine de faire tant d'appareil pour un aussi petit animal que cette taupe ; le piège paroît plutôt être tendu pour une autre

des Animaux quadrupèdes. 43

taupe, dont il sera question dans l'article suivant, mais dont Kolbe n'aura connu que le nom; cependant il seroit dangereux de prendre ces animaux avec la main, ils sont méchans & mordent bien fort.

M. de Buffon, dans l'article intéressant qu'il a donné de la taupe ordinaire (*d*), a remarqué que pour la dédommager du sens de la vue dont elle est presque privée, la Nature lui a accordé avec magnificence les organes qui servent à la génération. La taupe du Cap auroit besoin du même dédommagement; mais j'ignore si la Nature a été si libérale à son égard.

Dans le Journal d'un Voyage entrepris par l'ordre du Gouvernement du Cap, il est dit dans une note de l'Éditeur, que cette taupe ressemble plus au hamster, qu'à tout autre animal de l'Europe. Je ne comprends pas où l'auteur de cette note trouve la ressemblance.

(*d*) Voyez le volume VIII de cet Ouvrage, page 41.


44 *Supplément à l'Histoire*


Si l'on compare la figure que j'en donne ici avec celle du hamster qui se trouve dans le *tome XIII* de cet Ouvrage, je doute qu'on trouve aucun rapport entr'elles. 33



oire

en donné
se trouve
vrage, je
port en-





LA PETITE TAUPE DU CAP

LA TAUPE DE CANADA.

UNE TROISIÈME ESPÈCE est celle que M. de la Faille a fait graver à la suite de son Mémoire, & de laquelle nous donnons ici la figure (planche XXXVII): M. de la Faille dit qu'elle se trouve au Canada, & qu'elle n'a été indiquée par aucun auteur; & voici la courte description qu'il en donne.

Ce quadrupède n'a de la taupe vulgaire, que quelques parties; dans d'autres, il porte un caractère qui le rapproche beaucoup plus de la classe des rats; il en a la forme & la légèreté; sa queue longue de trois pouces est noueuse & presque nue, ainsi que ses pieds qui ont chacun cinq doigts; ils sont défendus par de petites écailles brunes & blanches, qui n'en couvrent que la partie supérieure; cet animal est plus élevé de terre & moins rampant que la taupe d'Europe; il a le corps effilé & couvert d'un poil noir, grossier, moins



46 *Supplément à l'Histoire*

foyeux & plus long ; il a aussi les mains moins fortes & plus délicates les yeux sont cachés sous le poil ; le museau est relevé d'une moustache qui lui est particulière, & ce museau n'est pas pointu, ni terminé par un cartilage propre à fouiller la terre, mais il est bordé de muscles charnus & très-déliés qui ont l'air d'autant d'épines ; toutes ces pointes sont nuancées d'une belle couleur de rose, & jouent à la volonté de l'animal, de façon qu'elles se rapprochent & se réunissent au point de ne former qu'un corps aigu & très-délicat ; quelquefois aussi ces muscles épineux s'ouvrent & s'épanouissent à la manière du calice des fleurs ; ils enveloppent & renferment le conduit nasal auquel ils servent d'abri ; il seroit difficile de décider à quels autres usages qu'à fouiller la terre, cet animal fait servir une partie aussi extraordinaire

Cette taupe se trouve au Canada où cependant elle n'est pas fort commune ; comme elle est forcée de passer la plus grande partie de sa vie sous la neige, elle s'accoutume probablement à vivre en

mains
... les
nuseau
lui est
pointu,
opre à
rdé de
ui ont
pointes
de rose,
nal, de
se réu-
qu'un
quefois
rent &
lice des
ment le
d'abri;
uels au-
re, cet
aussi ex-
nada où
mmune;
la plus
ge, elle
ivre en



LA TAUPE DU CANADA .

retr
mè
com
lent
peu

M
bin
figu
noit

des Animaux quadrupèdes. 47.

retraite & sort fort peu de sa tanière, même dans le bon temps; elle manœuvre comme nos taupes, mais avec plus de lenteur, aussi ses taupinières sont-elles peu nombreuses & allez petites. »

M. de la Faille conserve dans son cabinet l'individu dont il a fait graver la figure, & on lui doit en effet la connoissance de cet animal singulier,



LA GRANDE TAUPE DU CAP.

NOUS AJOUTERONS à toutes ces nouvelles espèces de Taupes, celles dont M.^{rs} Gordon & Allamand nous ont donné la description & la figure, sous la dénomination de *grande taupe du Cap* ou *taupe des Dunes*, & qui est en effet si grande & si grosse, en comparaison de toutes les autres, qu'on n'a pas besoin de lui donner un autre nom que celui de grande taupe, pour en distinguer & reconnoître aisément l'espèce.

« L'animal, dit M. Allamand, qui est représenté dans la *pl. X (e)*, a été jusqu'à présent, inconnu à tous les Naturalistes, & vraisemblablement il l'auroit été encore long-temps sans les soins toujours actifs de M. le capitaine Gordon, qui ne néglige aucune occasion d'enrichir l'Histoire Naturelle par de nouvelles découvertes; c'est lui qui m'en

(e) Voyez, dans ce volume, *planche XXXVIII.*
a envoy

U CAP.

ces nou-
elles dont
ont donné
s la déno-
u Cap ou
en effet si
raison de
pas besoin
que celui
stinguer &

nd, qui est
) , a été
us les Na-
ent il l'au-
s les soins
taine Gor-
e occasion
le par de
i qui m'en

che XXXVIII.
a envoy

a envoyé le dessin. Je nomme cet ani-
mal, avec les habitans du Cap, *la taupe*
des Dunes, & c'est un peu malgré moi,
je n'aime pas ces noms composés, &
d'ailleurs celui de taupe lui convient
encore moins qu'à la taupe du Cap,
que j'ai décrite ci-devant; j'aurois sou-
haité de pouvoir lui donner le nom par
lequel les Hottentots le désignent;
mais il est lui-même composé & fort
dur à l'oreille, c'est celui de *kauw*
howba, qui signifie *taupe hyppopotame*.
Les Hottentots l'appellent ainsi à cause
de je ne fais quelle ressemblance qu'ils
lui trouvent avec ce gros animal, peut-
être faut-il la chercher dans ses dents
incisives qui sont très-remarquables par
leur longueur; quoi qu'il en soit, s'il
diffère de la taupe à quelques égards,
il a aussi diverses affinités avec elles, &
il n'y a point d'autre animal dont le
nom lui convienne mieux.

Ces taupes habitent dans les Dunes
qui sont aux environs du cap de Bonne-
espérance & près de la mer; on n'en
trouve point dans l'intérieur du pays;
celle dont on voit ici la figure étoit

50 *Supplément à l'Histoire*

un mâle , dont la longueur , depuis le museau jusqu'à la queue , en suivant la courbure du corps , étoit d'un pied ; sa circonférence prise derrière les jambes de devant , étoit de dix pouces , & de neuf devant les jambes de derrière ; la partie supérieure de son corps étoit blancheâtre , avec une légère teinte de jaune , qui se changeoit en couleur grise sur les côtés & sous le ventre.

Sa tête n'étoit pas ronde comme celle de la taupe du Cap , elle étoit allongée & elle se terminoit par un museau plat , de couleur de chair , assez semblable au boutoir d'un cochon ; ses yeux étoient fort petits , & ses oreilles n'étoient marquées que par l'ouverture du canal auditif , placée au milieu d'une tache ronde plus blanche que le reste du corps ; elle avoit à chaque mâchoire deux dents incisives qui se monroient ; quoique la gueule fût fermée ; celles d'en bas étoient fort longues , celles d'en haut étoient beaucoup plus courtes ; au premier coup-d'œil il sembloit qu'il y en eût quatre , elles étoient fort larges , & chacune avoit pardevant un profond

fil
fait
rièr
der
hui
les
en
peu
qu'
qu'
pou
lon
auc
S
gue
éto
mê
stac
éto
cho
doi
blan
C
si c
les
seu

des Animaux quadrupèdes. 51

fillon qui la partageoit en deux & la faisoit paroître double, mais pardi-rière elles étoient tout-à-fait unies; les dents molaires étoient au nombre de huit dans chaque mâchoire, ainsi avec les incisives elle avoit vingt-deux dents en tout; les inférieures avançoient un peu au-delà des supérieures; mais ce qu'elles offroient de plus singulier, c'est qu'elles étoient mobiles, & que l'animal pouvoit les écarter ou les réunir à volonté; faculté qui ne se trouve dans aucun quadrupède qui me soit connu.

Sa queue étoit plate & de la longueur de deux pouces six lignes, elle étoit couverte de longs poils qui, de même que ceux qui formoient les moustaches, & ceux de dessous ses pattes, étoient roides comme des soies de cochon.

Il y avoit à chaque pied cinq doigts, munis d'ongles fort longs & blanchâtres.

On voit par cette description, que si ces animaux surpassent de beaucoup les autres taupes en grandeur & en profondeur, ils leur ressemblent par les yeux

52 *Supplément à l'Histoire*

& par les oreilles; mais il y a plus encore; ils vivent comme elles sous terre; ils y font des trous profonds & de longs boyaux; ils jettent la terre comme nos taupes en l'accumulant en de très-gros monceaux; cela fait qu'il est dangereux d'aller à cheval dans les lieux où ils sont, souvent il arrive que les jambes des chevaux s'enfoncent dans ces trous jusqu'aux genoux.

Il faut que ces taupes multiplient beaucoup, car elles sont très-nombreuses; elles vivent de plantes & d'oignons, & par conséquent elles causent beaucoup de dommage aux jardins qui sont près des Dunes; on mange leur chair & on la dit fort bonne.


Elles ne courent pas vite, & en marchant elles tournent leurs pieds en dedans, comme les perroquets; mais elles sont très-expéditives à creuser la terre; leur corps touche toujours le sol sur lequel elles sont méchantes; elles mordent très-fort & il est dangereux de les irriter.

pire

s encore ;
terre ; ils
de longs
omme nos
très-gros
langereux
ux où ils
es jambes
ces trous


multiplient
mbreuses ;
l'oignons ,
ent beau-
s qui font
leur chair

e , & en
s pieds en
uets ; mais
creuser la
ours le sol
ntes ; elles
ngereux de



LA GRANDE TAUPE DE CAP





LA GERBOISE debout.

N
x.
bo
vo
av
di
de
d'
di
ne
va
lev
va
co

un
ce
les
à-
ba
co
né
cu

DE LA GERBOISE.

NOUS DONNONS ici (*planches XXXIX & XL*), la figure de la Gerboise (*Gerbo*), qui manquoit dans le *volume XIII* de notre ouvrage , où nous avons donné une courte histoire des différentes espèces de gerboises , & une description particulière de celle-ci , tirée d'Edwards & d'Hasselquist. Les petites différences qu'on pourroit y remarquer ne feroient tout au plus qu'une légère variété dans cette espèce , dont les couleurs & la longueur des pattes de devant & des ongles , ne paroissent pas constantes.

Il existe dans le désert de Barca , une gerboise différente de celle-ci , en ce qu'elle a le corps encore plus mince , les oreilles plus longues , arrondies , & à-peu-près également larges du haut en bas ; les ongles des quatre pieds beaucoup plus courts ; & les couleurs en général moins foncées ; la bande sur les cuisses moins marquée ; les talons noirs ;

la pointe du museau beaucoup plus aplatie (a). On voit que ces disconvenances sont encore assez légères, & qu'on peut les regarder comme de simples variétés.

Les gerboises se trouvent dans tous les climats de l'Afrique, depuis la Barbarie jusqu'au cap de Bonne-espérance; on en voit aussi en Arabie & dans plusieurs autres contrées de l'Asie; mais il paroît qu'il y en a de grandeur très-différente, & il est assez étonnant que, dans ces animaux à longues jambes, il s'en trouve de vingt & même de cent fois plus gros que les petites gerboises dont nous avons parlé. « J'ai vu, dit M. le vicomte de Querhoënt, à la ménagerie du Cap, un animal, pris dans le pays, qu'on nomme *lièvre sauteur*; il est de la grandeur du lapin d'Europe; il a la tête à-peu-près comme lui, les oreilles au moins de la même longueur; les pattes de devant très-courtes & très-petites, il s'en sert pour porter à sa

(a) Note communiquée à M. de Buffon, par M. le chevalier de Bruce.

des Animaux quadrupèdes. 55

gueule, & je ne crois pas qu'elles lui servent beaucoup à marcher, il les tient ordinairement remassées dans son long poil qui les recouvre entièrement; les pattes de derrière sont grandes & grosses; les doigts du pied, au nombre de quatre, sont longs & séparés; la queue est de la longueur du corps au moins & couverte de longs poils couchés; le poil du corps est jaunâtre; le bout des oreilles & de la queue sont de la même couleur; les yeux sont noirs, grands & saillans; on le nourrissoit de feuilles de laitue; il aime beaucoup à ronger, on lui mettoit exprès dans sa cage de petits morceaux de bois pour l'amuser (*b*). »

M. Forster nous a communiqué un dessin de cette grande gerboise ou lièvre sauteur du Cap, que nous donnons ici (*planche XLI*). Ce dessin étoit accompagné de la notice suivante. « Cette gerboise, dit-il, a cinq doigts aux pieds

(*b*) Extrait du Journal du Voyage de M. le vicomte de Querhoënt.

56 *Supplément à l'Histoire*

de devant & quatre à ceux de derrière ; les ongles du devant sont noirs , longs , minces & courbés ; ceux des jambes de derrière sont bruns , gros , courts , de figure conique , un peu courbés vers l'extrémité ; l'œil est noir & fort gros ; le nez & les naseaux sont d'un brun-roux ; les oreilles sont grandes , lisses , nues en dedans & couvertes en dehors d'un petit poil court qui est couleur d'ardoise ; la tête ressemble assez à celles des petites gerboises ; il y a des moustaches autour de la gueule & aux angles des yeux ; les jambes ou plutôt les bras de devant sont très-courts & les mains fort petites ; les jambes de derrière , au contraire , sont très-grosses & les pieds excessivement longs ; la queue qui est aussi fort longue & fort chargée de poil , paroît mince à sa naissance & fort grosse à son extrémité , elle est d'un fauve-foncé sur la plus grande partie de sa longueur , & d'un brun-minime vers le bout ; les jambes & les pieds sont d'un fauve-pale mêlé de gris ; la couleur du corps & de la tête , est d'un jaune-pâle presque blanc ; les cuisses &


des Animaux quadrupèdes. 57

le dessous du corps sont plus jaunes ; tout le dessus du corps, ainsi que l'extrémité de la mâchoire, le dessus du nez, les mains, ont une teinte de fauve ; le derrière de la tête est couvert de grands poils mêlés de noirs, de gris & de fauve. » Au reste, nous pensons que cette gerboise du Cap, décrite par M. de Querhoënt & par M. Forster, est la même que celle dont M. Allamand a donné l'histoire & la figure (*pl. xv*) de l'Histoire Naturelle, édition de Hollande.

Il nous paroît aussi que l'animal dont nous avons donné la description (*volume XIII, page 87 & suivantes*), sous le nom de tarsier, est du même genre que les gerboises, & qu'il appartient à l'ancien continent, aucune espèce de gerboise grandes & petites ne se trouvant qu'en Afrique & en Asie, nous ne pouvons guère douter que le tarsier ne soit de l'une ou de l'autre de ces parties du monde.

J'ai vu plusieurs figures de gerboises dessinées d'après des pièces antiques, & sur-tout d'après une ancienne mé-

daille de Cyrène, qui portoit en revers une gerboise, dont la figure ne ressemble point à celle de la gerboise dont le docteur Shaw a donné la description, sous le nom de Daman-israël; car elle en diffère beaucoup par la grandeur, par la forme de la tête, par les yeux & par plusieurs autres caractères; il est aisé de démontrer que le docteur Shaw s'est trompé en rapportant le daman-israël à cette espèce de gerboise. Celle qui est dessinée sur la médaille de Cyrène, est une vraie gerboise, & n'a nul rapport avec le daman. Dans d'autres gravures tirées des marbres antiques d'Oxford, j'ai vu la figure de quelques gerboises, dont les unes avoient les pattes de devant & sur-tout les oreilles beaucoup plus longues que celles dont nous donnons ici les figures; mais au reste ces gerboises gravées sur des marbres antiques, ne sont pas assez bien représentées pour pouvoir les rapporter aux espèces que nous venons d'indiquer.



ire
n revers
semble
dont le
ription,
car elle
andeur,
les yeux
es; il est
ur Shaw
daman-
é. Celle
Cyrene,
nul rap-
tres gra-
es d'Ox-
quelques
les pattes
es beau-
ont nous
au reste
marbres
n repré-
orter aux
iquer.



L'A GERBOISE sautante 9.



PLATE I. THE GREAT PYRAMID OF GIZA.



De Sève del.

LA GRANDE GERBOISE ou Lièvre Sauter

d
e
B
re
a
ef
ce
de
il a
du
ef
Ce
An
qu
(d
toi
de

A D D I T I O N


de l'Éditeur hollandois (M. le Professeur ALLAMAND), à l'article de la GERBOISE OU GERBO.



« D A N S l'historie des Gerboises, M. de Buffon distingue quatre espèces différentes de ces animaux (c); mais il n'en a vu qu'une qui est celle du tarsier, aussi est-ce la seule dont il ait donné la figure; ce qu'il a dit des trois autres est tiré des auteurs qui en ont parlé avant lui; il a emprunté entr'autres, la description du gerbo qui appartient à la seconde espèce de M.^{rs} Edwards & Hasselquist. Cet animal est actuellement vivant à Amsterdam, chez le docteur Klockner, qui nous a permis de le faire dessiner (d), & qui a bien voulu nous commu-

(c) Voyez le tome XIII, page 77 de cette Histoire Naturelle, édit. de Hollande.





(d) Voyez planche VII du tome XV, édition de Hollande.







**IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)**



**Photographic
Sciences
Corporation**

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

1.8 2.0 2.2 2.5
E 2.8
E 3.2
E 3.6
E 4.0
5

10
E 1.8
E 2.0
E 2.2
E 2.5

niquer ce qu'il a offert de plus remarquable ; c'est en faisant usage de ses observations , que nous allons ajouter quelques particularités à celles que M. de Buffon en a rapportées.

La description que celui-ci en a faite (e), est très-exacte ; on retrouve dans le gerbo de M. Klockner tout ce qu'il en a dit , à l'exception de cette grande bande noire transversale en forme de croissant , qui est au bas des reins , près de la queue ; c'est une femelle , & peut-être cette bande ne se voit-elle que sur le mâle ; ce qui me porte à le croire , c'est que j'ai mis dans le Cabinet de l'Académie de Leyde , la peau d'un autre gerbo femelle , où cette bande ne paroît pas non plus.

M. Klockner a reçu cette gerboise de Tunis ; la caisse dans laquelle elle lui a été apportée étoit garnie en dedans de fer-blanc , elle en avoit enlevé avec ses dents quelques pièces , & en avoit rongé

(e) Voyez tome XIII, page 78, édition de Hollande.

des Animaux quadrupèdes. 61

le bois en différens endroits; elle fait la même chose dans la cage où elle est actuellement gardée; elle n'aime pas à être renfermée, cependant elle n'est point farouche, car elle souffre qu'on la tire de son nid & qu'on l'y remette avec la main nue, sans qu'elle morde jamais; au reste, elle ne s'apprivoise que jusqu'à un certain point, comme l'a remarqué M. de Buffon; car elle ne paroît mettre aucune différence entre celui qui lui donne à manger & des étrangers; lorsqu'elle est en repos, elle est assise sur ses genoux & ses jambes de derrière étendues sous le ventre atteignent presque les jambes de devant, en formant une espèce d'arc-de-cercle; sa queue alors est posée le long de son corps; dans cette attitude, elle recueille les grains de blés ou les pois dont elle se nourrit; c'est avec ses pattes de devant qu'elle les porte à sa bouche, & cela si promptement qu'on a peine à en suivre de l'œil les mouvemens; elle porte chaque grain à sa bouche & en rejette l'écorce pour ne manger que l'intérieur.

emar-
es ob-
quel-
M. de
a faite
dans
e qu'il
grande
ne de
s, près
peut-
que sur
croire,
de l'A-
un au-
nde ne
oise de
e lui a
ans de
vec ses
t rongé

dition de

Quand elle se meut, elle ne marche pas en avançant un pied devant l'autre, mais en sautant comme une sauterelle, & en s'appuyant uniquement sur l'extrémité des doigts de ses pieds de derrière; alors elle tient ses pieds de devant si bien appliqués contre sa poitrine, qu'il semble qu'elle n'en a point; la figure qu'en offre la planche (f), la représente dans l'attitude où elle est quand elle se prépare à sauter, & il est difficile de concevoir comment elle peut se soutenir; quelquefois même son corps forme, avec ses jambes, un angle plus aigu encore; mais, pour l'ordinaire, elle se tient dans une situation qui approche plus de la perpendiculaire; si on l'épouvante elle saute à sept ou huit pieds de distance; lorsqu'elle veut grimper sur une hauteur, elle fait usage de ses quatre pieds; mais, lorsqu'il faut descendre dans un creux, elle traîne après soi ses jambes de derrière sans s'en servir, & elle avance en s'ai-

(f) Voyez, dans ce volume, *planche XL*.

des Animaux quadrupèdes. 63

dant uniquement des pieds de devant.

Il semble que la lumière incommode cet animal, aussi dort-il pendant tout le jour, & il faut qu'il soit bien pressé par la faim, pour qu'il lui arrive de manger quand le soleil luit encore; mais, dès qu'il commence à faire obscur, il se réveille, &, durant toute la nuit, il est continuellement en mouvement, & c'est alors seulement qu'il mange; quand le jour paroît, il rassemble en tas le sable qui est dispersé dans sa cage, il met par-dessus le coton qui lui sert de lit & qui est fort dérangé par le mouvement qu'il vient de se donner; &, après avoir raccommoqué son nid, il s'y fourre jusqu'à la nuit suivante.

Pendant le voyage qu'il a fait de Tunis à Amsterdam, & qui a été de quelques mois, on l'a nourri de gruau ou de biscuit sec sans lui donner à boire. Dès qu'il fut arrivé, le premier soin de M. Klockner fut de lui présenter un morceau de pain trempé dans l'eau, ne doutant pas qu'il ne fût fort altéré, mais il ne voulut point y toucher, & il préféra un biscuit dur; cependant

M. Klockner, ne soupçonnant pas qu'il pût se passer d'eau, lui donna des pois verts & des grains de blé qui en étoient imbibés, mais ce fut inutilement, il n'en goûta point; il fallut en revenir à ne lui donner que du manger sec sans eau; & jusqu'à présent, depuis une année & demie, il s'en est bien trouvé.

Quelques auteurs ont rangé cet animal parmi les lapins auxquels il ressemble par la couleur & la finesse de son poil, & par la longueur de ses oreilles; d'autres l'ont pris pour un rat, parce qu'il est à-peu-près de la même grandeur; mais il n'est ni lapin ni rat; l'extrême disproportion qu'il y a entre ses jambes de devant & celles de derrière, & l'excessive longueur de sa queue, le distinguent des uns & des autres. Il forme un genre à part & même très-singulier avec l'alagtaga, dont M. Gmelin nous a donné la description & la figure, mais qui approche si fort de notre gerbo, qu'on ne peut le regarder, avec M. de Buffon, que comme une variété de la même espèce.

Il ne faut pas oublier que le gerbo

des Animaux quadrupèdes. 65

a autour de la bouche une moustache composée de poils assez roides ; parmi lesquels il y en a un de côté d'une longueur extraordinaire , puisqu'il est long de trois pouces.

Je me suis servi de la peau bourrée qui est dans le Cabinet de l'Académie de Leyde , pour prendre les dimensions que voici.

	pieds.	pouces.	lignes.
Longueur du corps entier, mesurée en ligne droite, depuis le bout du museau jusqu'à l'anus.....	''	6	7.
Longueur des oreilles...	''	''	10.
Distance entre l'oreille & l'œil.....	''	''	6.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre.....	''	''	6 $\frac{1}{2}$.
Ouverture de l'œil.....	''	''	5.
Distance entre l'œil & le bout du museau.....	''	1.	''
Circonférence du bout du museau.....	''	2.	6.
Circonférence de la tête entre les oreilles & les yeux.....	''	5.	''
Circonférence du corps			

66 *Supplément à l'Histoire*

	pieds.	pouces.	lignes.
prise derrière les jambes			
de devant.....	"	5.	5.
Circonférence prise de-			
vant les jambes de der-			
rière.....	"	6.	1.
Longueur des jambes de			
devant, depuis l'extré-			
mité des doigts jusqu'à			
la poitrine.....	"	"	10.
Longueur des jambes de			
derrière, depuis l'extré-			
mité des pieds jusqu'à			
l'abdomen.....	"	5.	6.
Longueur de la queue...	"	8.	"

Ces dimensions sont celles du gerbo dont j'ai la dépouille, & elles sont à-peu-près celles du gerbo de M. le docteur Klockner, & de presque tous ceux qui ont été décrits par les Naturalistes; il y en a cependant qui sont beaucoup plus grands. Prosper Alpin, en parlant du daman ou agneau d'Israël, que M. de Buffon range avec raison, au nombre des gerboises (g), avoit déjà dit que

(g) Nota. On verra ci-après les raisons que j'ai de changer de sentiment à cet égard.

des Animaux quadrupèdes. 67

cet animal est plus gros que notre lapin d'Europe, ce qui a paru douteux au docteur Shaw & même à M. de Buffon (h). A présent, nous sommes certains que cet auteur n'a point exagéré; toute l'Europe sait que M.^{rs} Bancks & Solander, animés d'un zèle, je dirois presque héroïque, pour avancer nos connoissances dans l'Astronomie & dans l'Histoire Naturelle, ont entrepris le tour du monde; à leur retour en Angleterre, ils ont fait voir deux gerbos qui surpassent en grosseur nos plus grands lièvres; en courant sur leurs deux pieds de derrière ils mettent en défaut les meilleurs chiens. Ce n'est-là qu'une des moindres curiosités qu'ils ont apportées avec eux; ils en ont fait une ample collection, qui leur fournira de quoi remplir un millier de planches. On prépare, par ordre de l'Amirauté d'Angleterre, une relation de leur Voyage; on y verra des particularités très-inté-

(h) Voyez le tome XIII, page 80 de cet Ouvrage, édition de Hollande.

68 *Supplément à l'Histoire*

ressantes sur un pays des terres australes, que nous ne connoissons jusqu'à présent que de nom ; je veux parler de la nouvelle Zélande, &c. »



I
C
a
a
é
r
m
r
d
q
li
q
an

tie
ve
les
St
da

SECONDE ADDITION

à l'histoire des GERBOISES,

par M. ALLAMAND.

DANS l'histoire que j'ai donnée du Gerbo, j'ai remarqué que Prosper Alpin a eu raison de dire que le daman, qui appartient au genre des gerboises (i), étoit plus gros que notre lapin d'Europe. J'ai avancé cela, fondé sur ce qu'on m'avoit écrit d'Angleterre, que M. Banks revenu de son Voyage autour du monde, avoit apporté un de ces animaux qui surpassoit en grosseur nos plus grands lièvres. A présent, je suis en état de dire quelque chose de plus positif sur cet animal, dont M. Banks a eu la bonté

(i) Nota. Le daman du docteur Shaw, appartient en effet au genre des gerboises ; mais nous verrons, comme nous venons d'en avertir, les raisons qui nous persuadent que le docteur Shaw a mal appliqué à cet animal le nom de daman.

70 *Supplément à l'Histoire*

de me faire voir la dépouille, & dont nous avons la description & la figure dans la relation du Voyage de M. le capitaine Cook (*k*). Il diffère de toutes les espèces de gerboises décrites jusqu'à présent, non-seulement par sa grandeur, qui approche de celle d'une brebis, mais encore par le nombre ou l'arrangement de ses doigts. Parkinson (*l*), qui étoit parti avec M. Banks, en qualité de son dessinateur, & dont on a publié les Mémoires, nous apprend qu'il avoit cinq doigts aux pieds de devant, armés d'ongles crochus, & quatre à ceux de derrière; comme c'étoit un jeune qui n'étoit pas encore parvenu à toute sa grandeur, il ne pesoit que trente-huit livres; sa tête, son cou & ses épaules, étoient fort petites en comparaison des autres parties de son corps; ses jambes

(*k*) Voyez An account of the Voyages performed by Commodore Byron, capitain Wallis, capitain Carteret, and capitain Cook, vol. III, page 577.

(*l*) A journal of a Voyage to the south sea by Sydney Parkinson, page 145.

des Animaux quadrupèdes. 71

de devant avoient huit pouces de longueur, & celles de derrière en avoient vingt-deux; il avançoit en faisant de très-grands sauts & en se tenant debout; il tenoit ses jambes de devant appliquées à sa poitrine, & elles paroissoient ne lui servir qu'à creuser la terre; sa queue étoit épaisse à son origine, & son diamètre alloit en diminuant jusqu'à son extrémité; tout son corps étoit couvert d'un poil gris-de-souris foncé, excepté à la tête & aux oreilles qui avoient quelque ressemblance à celles d'un lièvre.

Par cette description, on voit que cet animal n'est pas le gerbo qui a quatre doigts aux pieds de devant & trois à ceux de derrière, ni le daman ou agneau d'Israël, qui a quatre doigts aux pieds de devant & cinq à ceux de derrière (m), avec lequel par conséquent

(m) *Nota.* Cela est vrai du prétendu daman du docteur Shaw, qui est une gerboise, mais faux à l'égard du véritable daman, qui n'a que trois doigts aux pieds de derrière. Voyez, ci-après, son article.

72 *Supplément à l'Histoire*

je n'aurois pas dû le confondre ; l'alagtaga est l'espèce des gerboises qui en approche le plus par le nombre des doigts, il en a cinq aux pieds de devant & trois à ceux de derrière, avec un éperon qui peut passer pour un pouce ou quatrième doigt, comme le remarque M. de Buffon ; mais la différence de grandeur, la distance des lieux & la diversité du climat où ces deux animaux se trouvent, ne permettent guère de les regarder comme une seule & même espèce. Celui que M. Banks nous a fait connoître, est habitant de la nouvelle Hollande, & l'alagtaga est commun en Tartarie & sur le Wolga.

Nous avons actuellement en Hollande un animal vivant, qui pourroit bien être le même que celui de la nouvelle Hollande : on en jugera par la description suivante, dont je suis redevable à M. le docteur Klockner, à qui j'ai dû aussi celle que j'ai donnée ci-devant du petit gerbo.

Cet animal a été apporté du cap de Bonne-espérance par le sieur Holst, à qui il appartient ; il a été pris sur une montagne

n
à
fo
H
m
sa
liè
co
leu
mê
la
cou
ore
seu
mâc
cach
peti
con
si en
L
que
min
leur
férie
tran
il a
d'un
S

des Animaux quadrupèdes. 73

montagne nommée *Snenwberg*, située à une très-grande distance du Cap & fort avant dans les terres ; les paysans Hollandois lui donnent le nom de *aerdmannetje*, de *springendehaas* ou lièvre sautant ; il est de la grandeur d'un lièvre ou d'un lapin ; son pelage est de couleur fauve par le haut, mais de couleur de cendre sur la peau, & entremêlé de quelques poils plus longs, dont la pointe est noire ; la tête est fort courte, mais large & plate entre les oreilles, & elle se termine par un museau obtus qui a un fort petit nez ; sa mâchoire supérieure est fort ample & cache l'inférieure qui est très-courte & petite ; il n'est point de quadrupède connu qui ait l'ouverture de la gueule si en arrière au-dessous de la tête.

Les oreilles sont d'un tiers plus courtes que celle du lapin ; elles sont fort minces & transparentes au grand jour ; leur partie supérieure est noirâtre, l'inférieure est de couleur de chair & plus transparente que la partie supérieure ; il a de grands yeux à fleur de tête, d'un brun tirant sur le noir ; ses pau-

Supplément. Tome XII. D

pières sont garnies de cils & surmontés de cinq ou six poils très-longs; chaque mâchoire est garnie de deux dents incisives très-fortes, celles de la supérieure ne sont pas si longues que celle de la mâchoire inférieure; la lèvre d'en haut est garnie d'une moustache composée de longs poils.

Les pieds de devant sont petits, courts & situés tout près du cou, ils ont chacun cinq doigts aussi très-courts, placés sur la même ligne, ils sont armés d'ongles crochus de deux tiers plus grands que les doigts mêmes; il y a au-dessous une éminence charnue sur laquelle ces ongles reposent; les deux jambes de derrière sont plus grandes que celles de devant; les pieds ont quatre doigts, dont les deux intérieurs sont plus courts que le troisième, qui est un tiers plus grand que l'extérieur; ils sont tous garnis d'ongles, dont le dos est élevé, & qui sont concaves en dessous.

Le corps est étroit en avant & un peu plus gros en arrière; la queue est aussi longue que le corps, les deux tiers en sont couverts de longs poils

des Animaux quadrupèdes. 75

fauves, & l'arrière tiers de poils noirs.

Comme les autres sortes de gerboises, il ne se sert que de ses pieds de derrière pour marcher, ou, pour parler juste, pour sauter; aussi ces pieds sont-ils très-forts, & si on le prend par la queue, il en frappe avec beaucoup de violence. On n'a pas pu déterminer la longueur de ses plus grands sauts, parce qu'il ne peut pas exercer sa force dans le petit appartement où il est renfermé: dans l'état de liberté, on dit que ces animaux font des sauts de vingt à trente pieds.

Son cri est une espèce de grognement; quand il mange, il s'assied en étendant horizontalement ses grandes jambes & en courbant son dos; il se sert de ses pieds de devant comme de mains pour porter sa nourriture à sa gueule; il s'en sert aussi pour creuser la terre, ce qu'il fait avec tant de promptitude, qu'en peu de minutes il peult'y enfoncer tout-à-fait.

Sa nourriture ordinaire est du pain, des racines, du blé, &c.

Quand il dort, il prend une attitude

singulière, il est assis avec les genoux étendus; il met sa tête à-peu-près entre ses jambes de derrière, & avec ses deux pieds de devant il tient ses oreilles appliquées sur ses yeux, il semble ainsi protéger sa tête par ses mains; c'est pendant le jour qu'il dort, & pendant la nuit il est ordinairement éveillé.

Par cette description on voit que cet animal doit être rangé dans la classe des gerboises, décrites par M. de Buffon, mais qu'il en diffère cependant beaucoup, tant par sa grandeur que par le nombre de ses doigts. Nous en donnons ici la figure (*planche XV*) (*n*), qui, quoiqu'elle ait beaucoup de rapport avec celle que nous avons donnée du gerbo (*planche VII de ce volume*), en diffère cependant assez pour qu'on ne puisse pas les confondre: nous avons fait graver, au bas de la planche, les pieds de cet animal, pour qu'on comprenne mieux ce que nous en avons dit.

S'il est le même animal que celui qui a été décrit dans la relation du

(*n*) Voyez, dans ce volume, *planche XLI*.

des Animaux quadrupèdes. 77

Voyage du capitaine Cook, comme il y a grande apparence, la figure qui s'en trouve dans l'ouvrage Anglois & dans la traduction françoise, n'est pas exacte; la tête en est trop longue; ses jambes de devant ne sont jamais dans la situation où elles sont représentées comme pendantes vers le bas; le nôtre les tient toujours appliquées à sa poitrine, de façon que ses ongles sont placés immédiatement sous la mâchoire inférieure; situation qui s'accorde avec celle que leur donne l'auteur Anglois, mais qui a été mal exprimée par le dessinateur & par le graveur.

Voici les dimensions de notre grand gerbo, qui feront mieux connoître combien il diffère de toutes les autres espèces décrites. »

	pieds.	pouces.	lignes.
Longueur du corps, mesuré en ligne droite, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue	I.	2.	7.
Longueur des oreilles	//	2.	9.
Distance entre les yeux	//	2.	7.
Longueur de l'œil d'un an-			

78 *Supplément à l'Histoire*

	pieds.	pouces.	lignes.
gle à l'autre.....	#	1.	1.
Ouverture de l'œil.....	#	#	9.
Circonférence du corps, prise derrière les jambes de devant.....	#	21.	#
Circonférence prise de- vant les jambes de der- rière.....	1.	#	2.
Hauteur des jambes de de- vant, depuis l'extrémité des ongles jusqu'à la poi- trine.....	#	3.	#
Longueur des jambes de derrière, depuis l'extré- mité des pieds jusqu'à l'abdomen.....	#	8.	9.
Longueur de la queue....	1.	2.	9.

En comparant ces descriptions de M. Allamand, & en résumant les observations que l'on vient de lire, nous trouverons dans ce genre des gerboises quatre espèces bien distinctement connues : 1.^o la *gerboise* ou *gerbo* d'Edwards, d'Hasselquist & de M. Allamand, dont nous avons donné la description, *volume XII*, & dont nous donnons ici la figure (*planche XXXIX & XL*), & à laquelle nous laissons simplement le

no
rap
enc
boi
2.^o
XI
ger
qui
ren
pie
faut
con
de
don
4.^o
Ho
ture
gro
est
que
liè
lam
No
figu
pré
par
tue

dès Animaux quadrupèdes. 79

nom de gerboise ; en persistant à lui rapporter l'alagtaga, & en lui rapportant encore, comme simple variété, la *gerboise de Barca* de M. le chevalier Bruce ; 2.^o notre *tarsier* (*planche IX, tome XIII*), qui est bien du genre de la gerboise & même de sa taille, mais qui néanmoins forme une espèce différente, puisqu'il a cinq doigts à tous les pieds ; 3.^o la grande gerboise ou lièvre sauteur du Cap que nous venons de reconnoître dans les descriptions de M.^{rs} de de Querhoënt, Forster & Allamand, & dont nous donnons ici la figure (*pl. XLI*) ; 4.^o la très-grande gerboise de la nouvelle Hollande, appelée *kangaroo* par les naturels du pays ; elle approche de la grosseur d'une brebis, & par conséquent est d'une espèce beaucoup plus forte que celle de notre grande gerboise ou lièvre sauteur du Cap, quoique M. Allamand semble les rapporter l'un à l'autre. Nous n'avons pas cru devoir copier la figure de cette gerboise, donnée dans le premier Voyage du capitaine Cook, parce qu'elle nous paroît trop défectueuse ; mais nous devons rapporter

80 *Supplément à l'Histoire*

ici ce que ce célèbre Navigateur a dit de ce singulier animal, qui, jusqu'à ce jour, ne s'est trouvé nulle part que dans le continent de la nouvelle Hollande.

« Comme je me promenois le matin à peu de distance du Vaisseau, dit-il (à la baie d'Endéavour, côte de la nouvelle Hollande), je vis un des animaux que les gens de l'équipage m'avoient décrit si souvent ; il étoit d'une légère couleur de souris, & ressembloit beaucoup par la grosseur & la figure à un lévrier, & je l'aurois en effet pris pour un chien sauvage, si au lieu de courir il n'avoit pas sauté comme un lièvre ou un daim M. Banks qui vit imparfaitement cet animal, pensa que son espèce étoit encore inconnue Un des jours suivans, comme nos gens partoient au premier crépuscule du matin pour aller chercher du gibier, ils virent quatre de ces animaux, dont deux furent très-bien chassés par le lévrier de M. Banks, mais ils le laissèrent bientôt derrière en sautant par-dessus l'herbe longue & épaisse qui empêchoit le chien

de
ne
be
de
mu
lieu
un
ave
un
sou
ani
cur
en
ana
sen
gro
éta
cet
fan
tua
con
for

ma
pro

des Animaux quadrupèdes. 81

de courir; on observa que ces animaux ne marchent pas sur leurs quatre jambes, mais qu'ils sautoient sur les deux de derrière (*m*), comme le *gerbua* ou *mus jaculus* Enfin M. Gore mon lieutenant, faisant, peu de jours après, une promenade dans l'intérieur du pays avec son fusil, eut le bonheur de tuer un de ces quadrupèdes qui avoit été si souvent l'objet de nos spéculations. Cet animal n'a pas assez de rapport avec aucun autre déjà connu, pour qu'on puisse en faire la comparaison; sa figure est très-analogue à celle du *gerbo*, à qui il ressemble aussi par ses mouvemens; mais sa grosseur est fort différente, le *gerbo* étant de la taille d'un rat ordinaire, & cet animal parvenu à son entière croissance, de celle d'un mouton; celui que tua mon Lieutenant étoit jeune, & comme il n'avoit pas encore pris tout son accroissement, il ne pesoit que trente-

(*m*) Le traducteur dit les deux de devant; mais c'est évidemment une faute, comme le prouve ce qui suit.

huit livres ; la tête , le cou & les épaules , sont très-petits en proportion des autres parties du corps ; la queue est presque aussi longue que le corps , elle est épaisse à la naissance & elle se termine en pointe à l'extrémité ; les jambes de devant n'ont que huit pouces de long , & celles de derrière en ont vingt-deux ; il marche par sauts & par bonds ; il tient alors la tête droit & ses pas sont fort longs ; il replie ses jambes de devant tout près de la poitrine , & il ne paroît s'en servir que pour creuser la terre ; la peau est couverte d'un poil court , gris ou couleur de souris-foncé ; il faut en excepter la tête & les oreilles , qui ont une légère ressemblance avec celles du lièvre : cet animal est appelé *kanguroo* par les naturels du pays ... Le même M. Gore , dans une autre chasse , tua un second *kanguroo* , qui , avec la peau , les entrailles & la tête , pesoit quatre-vingt-quatre livres , & néanmoins en l'examinant nous reconnûmes qu'il n'avoit pas encore pris toute sa croissance , parce que les dents machelières inférieures n'étoient pas encore formées ...

Ce
qu
vel
pr
dan
-L
st
tion
trè
lan
gra
cap
ste
con
nou
nou
ren
d'u
dit
app
liè
que
seu

d'H
page

des Animaux quadrupèdes. 83

Ces animaux paroissent être l'espèce de quadrupèdes la plus commune à la nouvelle Hollande, & nous en rencontrons presque toutes les fois que nous allons dans les bois (n).

On voit clairement par cette description historique, que le kangaroo ou très-grande gerboise de la nouvelle Hollande n'est pas le même animal que la grande gerboise ou lièvre sauteur du cap de Bonne-espérance; & M.^r Forster, qui ont été à portée d'en faire la comparaison avec le kangaroo de la nouvelle Hollande, ont pensé comme nous, que c'étoit deux espèces différentes dans le genre des gerboises; d'un autre côté, si l'on compare ce que dit le docteur Shaw de l'animal qu'il appelle *daman*, avec la description du lièvre sauteur, on reconnoîtra aisément que ces deux animaux ne font qu'une seule & même espèce, & que ce savant

(n) Premier Voyage de Cook; collection d'Hawkeswort, traduction françoise, tome IV, pages 24, 34, 45, 56 & 62.

84 *Supplément à l'Histoire*

Voyageur s'est trompé sur l'application du nom *daman*, qui appartient à un animal tout différent.

On peut aussi inférer de ce qui vient d'être dit, que l'espèce du lièvre sauteur, appartient non-seulement à l'Afrique, mais encore à la Phénicie, la Syrie & autres régions de l'Asie mineure, dont la communication avec l'Afrique est bien établie par l'Arabie, pour des animaux sur-tout qui vivent dans les sables brûlans du désert. En séparant donc le vrai *daman* des gerboises, nous devons indiquer les caractères qui les distinguent.



C
ng
vr
inc
pr
a
éc
«
bo
do
de
de
pro
fait
cet
II
Mo
pét
tag
tou
il
d'u
plu

DU DAMAN - ISRAËL.

C'EST à M. le chevalier Bruce que nous devons l'exacte connoissance & la vraie description du daman, déjà bien indiquée par Prosper Alpin, & mal-à-propos rapporté par le docteur Shaw à la grande gerboise. Voici ce que m'a écrit à ce sujet cet illustre Voyageur. « Le daman-israël n'est point une gerboise; il est mal indiqué par notre docteur Shaw, qui dit que ses pattes de devant sont courtes en comparaison de celles de derrière, dans la même proportion que celles des gerboises; ce fait n'est point vrai: voici la figure de cet animal que j'ai dessiné moi-même. Il est fort commun aux environs du Mont-Liban & encore plus dans l'Arabie pétérée; il se trouve aussi dans les montagnes de l'Arabie heureuse, & dans toutes les parties hautes de l'Abyssinie; il est de la forme & de la grandeur d'un lapin; les jambes de devant un peu plus courtes que celles de derrière,

mais non pas plus que le lapin ; un caractère très-distinct , c'est qu'il n'a point du tout de queue , & qu'il a trois doigts à chaque patte , à-peu-près comme ceux des singes , sans aucun ongle , & environnés d'une chair molle d'une forme ronde ; par ce caractère & par le manque de queue , il paroît approcher du léris ; les oreilles sont petites & courtes , couvertes de poil en dedans comme en dehors , par où il differe encore du lapin ; tout le dessous du corps est blanc , & le dedans à-peu-près de la couleur de nos lapins sauvages ; il lui sort sur le dos & sur tout le dessus du corps & des cuisses , de longs poils isolés , d'un noir fort luisant. Ces animaux vivent toujours dans les cavernes des rochers & non pas dans la terre , puisqu'ils n'ont point d'ongles. « Je donne ici (*planche XLII*) , la figure de cet animal , d'après le dessin de M. Bruce , & il paroît , par son témoignage , que le docteur Shaw s'est trompé ; & ce qui le confirme encore , c'est que ne voulant pas s'en tenir à ce que Prosper Alpin avoit dit du daman , que sa chair est excellente

des Animaux quadrupèdes. 87

à manger, & qu'il est *plus gros que notre lapin d'Europe*, il a retanché ce dernier fait du passage de Prosper Alpin qu'il cite au reste en entier. Il faut donc rectifier ce que j'en ai dit moi-même, & rendre à Prosper Alpin la justice d'avoir indiqué le premier le daman-israël, & de lui avoir donné ses véritables caractères.

Au reste, il ne paroît pas douteux que ce daman ou agneau d'Israël ne soit le *saphan* de l'Écriture Sainte. M. le chevalier Bruce dit qu'il l'a vu, non-seulement dans les différentes parties de l'Asie, mais jusqu'en Abyssinie; mais il existe dans les terres du cap de Bonne-espérance une autre espèce de daman que M. Sonnerat nous a rapporté, & dont nous donnons ici la figure (*planche XLIII*). Ce daman du Cap diffère du daman Israël par plus de rondeur dans la taille, & aussi parce qu'il n'a pas autant de poils saillans ni aussi longs que ceux du daman Israël; il a de plus un grand ongle courbe & creusé en gouttière au doigt intérieur du pied de derrière, ce qui ne se trouve pas dans les

pieds du daman Israël. Ces caractères nous paroissent suffisans pour faire une espèce distincte de ce daman du Cap, & le séparer, comme nous le faisons ici, de celle du daman de Syrie, avec lequel néanmoins il a la plus grande ressemblance par la grandeur & la conformation, par le nombre des doigts & par le manque de queue.

Au reste, nous devons ajouter ici qu'à l'inspection seule de ce daman du Cap, nous l'avons reconnu pour le même animal que celui dont nous avons donné la figure (*tome III du supplément, planche XXIX*), sous le nom de *marmotte du Cap*, en avertissant en même temps que je n'adoptois cette dénomination que provisionnellement, & en attendant que je fusse mieux informé de la nature & du vrai nom de cet animal; & comme la figure que j'en ai donnée & que je viens de citer, a été faite sur un assez mauvais dessin, on doit consulter de préférence celle que je donne ici (*pl. XLIII*); ainsi, il faut rapporter à ce daman du Cap, ce que nous avons dit de cette prétendue marmotte,

& encore tout ce que nous donne M. Al-
lamand, d'après M. Klockner, sur ce
même animal, sous la dénomination de
Klipdaas ou *blaireau de roches* (a), en
observant que, par la seule conforma-
tion de ses pieds, il ne doit pas être
mis dans le genre des blaireaux, & que
c'est mal-à-propos qu'on lui en a ap-
pliqué le nom. Voici ce qu'en dit ce
savant Naturaliste dans ses additions à
mon Ouvrage.

« M.^{rs} Pallas & Volmaër, croient que
cet animal se creuse des trous en terre
comme notre marmotte ou notre blai-
reau, & cela, disent-ils, parce que ses
pieds sont propres à cette opération ;
mais à en juger par ces mêmes pieds,
on seroit porté à croire qu'il ne s'en
sert jamais pour un pareil usage, car
ils ne paroissent point propres à creu-
ser ; ils sont couverts en dessous d'une
peau fort douce, & les doigts sont ar-

(a) Volume IV. des supplémens, édition de
Hollande, *planche LXXV.*

més d'ongles courts & plats , qui ne s'étendent point au-delà de la peau ; cela n'indique guère un animal qui gratte la terre pour s'y former une retraite. M. Pallas dit , à la vérité , que les ongles sont très-courts ou plutôt qu'il n'en a point , pour qu'en creusant ils ne s'usent pas contre les rochers , au milieu desquels ces animaux habitent ; cette raison est ingénieusement trouvée , mais ne seroit-on pas autorisé aussi à dire , & peut-être avec plus de fondement , que la Nature ne leur a donné des ongles si courts , que parce qu'ils n'ont pas besoin de s'en servir pour creuser ? au moins est-il sûr que celui qui est à Amsterdam , ne les emploie pas à cela , jamais on ne le voit gratter ou creuser la terre

M. Vosmaër dit que ces animaux sont lents dans leurs mouvemens ; cela est vrai , sans doute , de celui qu'il a vu , mais M. Pallas nous apprend qu'il étoit mort pour avoir trop mangé ; ainsi , ne pourroit-on pas supposer que la graisse dont il étoit surchargé le rendoit lourd & pesant ? Au moins ceux que M. Klockner a observés ne sont point tels ; au

des Animaux quadrupèdes. 91

contraire, ils sont très-pressés dans leurs mouvemens ; ils sautent avec beaucoup d'agilité de haut en bas , & tombent toujours sur leurs quatre pattes ; ils aiment à être sur des endroits élevés ; leurs jambes de derrière sont plus longues que celles de devant , ce qui fait que leur démarche ressemble plus à celle du cochon d'Inde que de tout autre animal ; mais ils ont celle du cochon quand ils courent ; ils ne dorment point pendant le jour ; quand la nuit arrive, ils se retirent dans leur nid, où ils se fourrent au milieu du foin, dont ils se couvrent tout le corps. On dit qu'au Cap, ils ont leur nid dans les fentes des rochers, où ils se font un lit de mousse & de feuilles d'épines qui leur servent aussi de nourriture, de même que les autres feuilles qui sont peu charnues ; au moins celui qui est à Amsterdam paroît les préférer aux racines & au pain qu'on lui donne ; il ne mange pas volontiers des noix ni des amandes ; quand il mâche, sa mâchoire inférieure se meut comme celle des animaux qui ruminent, quoiqu'il n'appartienne point

à cette classe. Si l'on peut juger de toute l'espèce par lui, ces animaux ne parviennent pas aussi vite à toute leur grandeur que les cochons d'Inde : quand il a été pris, il étoit de la grosseur d'un rat, & étoit vraisemblablement âgé de cinq ou six semaines ; depuis onze mois qu'il est dans ce pays, il n'a pas encore la taille d'un lapin sauvage, quoique ces animaux parviennent à celle de nos lapins domestiques.

Les Hottentots estiment beaucoup une sorte de remède que les Hollandois nomment *pissat de blaireau* ; c'est une substance noirâtre, sèche & d'assez mauvaise odeur, qu'on trouve dans les fentes des rochers & dans des cavernes ; on prétend que c'est à l'urine de ces bêtes qu'elle doit son origine ; ces animaux, dit-on, ont la coutume de pisser toujours dans le même endroit, & leur urine dépose cette substance, qui, séchée avec le temps, prend de la consistance, cela est assez vraisemblable ; celui qui est à Amsterdam lâche presque toujours son urine dans le même coin de la loge où il est renfermé.

des Animaux quadrupèdes. 93

Sa tête est petite à proportion de son corps ; ses yeux n'ont guère que la moitié de la grandeur de ceux du lapin ; la mâchoire inférieure est un peu plus courte que celle de dessus ; ses oreilles sont rondes & peu élevées , elles sont bordées de poils très-fins , mais qui deviennent plus longs à mesure qu'ils approchent de ceux de la tête ; son cou est plus haut que large , & il en est de même de tout le corps ; ses pieds de devant sont sans poils en dessous & partagés en lobes ; en dessus , ils sont couverts de poils jusqu'à la racine de ongles. M. Vosmaër dit que ses pieds sont nus , cela ne doit s'entendre que de la partie inférieure ; quand il court , les jambes de derrière ne paroissent guère plus longues que celles de devant ; leurs pieds n'ont que trois doigts , dont deux sont toujours appliqués contre terre quand ils marchent , mais le troisième ou l'intérieur , est plus court & séparé des deux autres ; quelque mouvement que l'animal fasse , il le tient toujours élevé , ce doigt est armé d'un ongle dont la construction est singulière. M. Vosmaër se

94 *Supplément à l'Histoire*

contente de dire qu'il a un ongle dont la construction est singulière. M. Vosmaër se contente de dire qu'il a un ongle courbe (*b*); M. Pallas n'en dit pas davantage, & la figure qu'il en a donnée ne le fait pas mieux connoître (*c*). Cet ongle forme une gouttière, dont les bords sont fort minces, ils se rapprochent à leur origine, & s'éloignent en avançant au-devant, puis ils se recourbent en dessous & ils se réunissent en se terminant en une petite pointe, qui s'étend dans la cavité de la gouttière, presque jusqu'à son milieu. Ces ongles sont situés de façon que la cavité de celui du pied droit est en partie tournée vers celle du pied gauche, & en partie vers en bas, placés au bout du doigt que l'animal tient toujours élevé,

(*b*) Celui qui a traduit ce passage pour M. de Buffon, s'est trompé en disant que c'est le doigt du milieu qui a cet ongle; il auroit dû dire le doigt intérieur, comme il y a dans le texte Hollandois.

(*c*) Voyez ses *Spicilegia zoologica*. Fascic. II, tab. III, fig. IV.

des Animaux quadrupèdes. 95

ils ne touchent jamais le sol sur lequel il marche ; il ne paroît pas vraisemblable qu'ils servent à jeter en arrière la terre , comme M. Pallas l'a soupçonné , ils sont trop tendres pour cela. M. Klockner a mieux vu quel étoit leur usage ; l'animal s'en sert pour se gratter le corps & se délivrer des insectes ou des ordures qui se trouvent sur lui ; ses autres ongles , vu leur figure , lui seroient inutiles pour cela. Le Créateur n'a pas voulu qu'aucun des animaux qu'il a formés, manquaient de ce qui leur étoit nécessaire pour se délivrer de tout ce qui pourroit les incommoder.

On voit sur le corps de notre klipdas quelques poils noirs parsemés , un peu plus longs que les autres ; c'est une singularité qui mérite d'être remarquée ; cependant je n'en voudrois pas conclure avec M. Pallas , que ces poils peuvent être comparés aux épines du porc-épic , ils ne leur ressemblent en rien.

La longueur du corps de cet animal que M. Klockner a observé à Amsterdam , est , depuis le museau jusqu'à l'anus , de onze pouces trois quarts ; celui

ongle
M. Vos-
un on-
dit pas
donnée
(c). Cet
ont les
appro-
ment en
recour-
unissent
pointe ,
a gout-
eu. Ces
la ca-
n partie
, & en
bout du
s élevé,

our M. de
est le doigt
dû dire le
le texte
ascic. II,

96 Supplément à l'Histoire

que j'ai placé au Cabinet de notre Académie, n'a que dix pouces, mais celui qui a été décrit par M. Pallas, étoit long d'un pied trois pouces trois lignes; & la longueur de sa tête égaloit trois pouces quatre lignes; celle de l'individu d'Amsterdam n'étoit que de trois pouces & demi.

Les femelles de ces animaux n'ont que quatre mamelles, deux de chaque côté, & si elles font plusieurs petits à-la-fois, comme il est très-vraisemblable, c'est une nouvelle confirmation de ce qu'a dit M. de Buffon (d); savoir, que le nombre des mamelles n'est point relatif, dans chaque espèce d'animal, au nombre des petits que la femelle doit produire & allaiter.

(d) Voyez tome V. de cet Ouvrage, édition de Hollande, page 47.



DE



Aca-
celui
étoit
ignes ;
trois
dividu
pouces
n'ont
chaque
tirs à
plable,
de ce
r, que
int re-
al, au
e doit

édition

DE



LE DAMAN ISRAEL.





LE DAMAN DU CAP.

N
ne p
& c
voif
ne c
vent
restr
les
le p
s'y
tancc
circo
le p
appu
premi
besoi
autre
on va
ce q
mon
a bie
octob
privée
Sup

DE LA LOUTRE.

NOUS AVONS DIT que la Loutre ne paroïssoit pas susceptible d'éducation, & que nous n'avions pu réussir à l'appri-voiser ; mais des tentatives sans succès ne démontrent rien, & nous avons souvent reconnu qu'il ne falloit pas trop restreindre le pouvoir de l'éducation sur les animaux : ceux même qui semblent le plus s'y refuser, cèdent néanmoins & s'y soumettent dans certaines circonstances ; le tout est de rencontrer ces circonstances favorables, & de trouver le point flexible de leur naturel, d'y appuyer ensuite assez pour former une première habitude de nécessité ou de besoin, qui bientôt s'assujettit toutes les autres. L'éducation de la loutre dont on va parler, en est un exemple : voici ce que M. le Marquis de Courtivron, mon confrère à l'Académie des Sciences, a bien voulu m'écrire en date du 15 octobre 1779, sur une loutre très-privée & très-docile qu'il a vue à Autun.

Supplément. Tome XII. E

« Vous autorisez, Monsieur, ceux qui ont quelques observations sur les animaux à vous les communiquer, même quand elles ne sont pas absolument conformes à ce qui peut paroître avoir été votre première opinion. En relisant l'article de la loutre, j'ai vu que vous doutez de la facilité qu'on auroit d'appriivoiser cet animal. Dans ce que je vais vous dire, je ne rapporterai rien que je n'aie vu, & que mille personnes n'aient vu comme moi, à l'abbaye de Saint-Jean-le-grand, à Autun, dans les années 1775 & 1776; j'ai vu, dis-je, pendant l'espace de près de deux ans, à différentes fois, une loutre femelle qui avoit été apportée peu de temps après sa naissance dans ce couvent, & que les Tourrières s'étoient plu à élever; elles l'avoient nourrie de lait jusqu'à deux mois d'âge, qu'elles commencèrent à accoutumer cette jeune loutre à toutes sortes d'alimens; elle mangeoit des restes de soupe, de petits fruits, des racines, des légumes, de la viande & du poisson, mais elle ne vouloit point de poisson cuit, & elle ne mangeoit le poisson cru que lorsqu'il

étoit de la plus grande fraîcheur ; s'il avoit plus d'un jour, elle n'y touchoit pas. J'essayai de lui donner de petites carpes, elle mangeoit celles qui étoient vives, & pour les mortes, elle les visitoit en ouvrant l'ouïe avec sa patte, la flairait & le plus souvent les laissoit, même quand on les lui présentait avant de lui en donner de vives. Cette loutre étoit privée comme un chien, elle répondoit au nom de *loup - loup*, que lui avoient donné les Tourrières ; elle les suivoit, & je l'ai vu revenir à leur voix du bout d'une vaste cour où elle se promenoit en liberté, & quoiqu'étranger, je m'en faisois suivre en l'appelant par son nom ; elle étoit familiarisée avec le chat des Tourrières, avec lequel elle avoit été élevée, & jouoit avec le chien du Jardinier, qu'elle avoit aussi connu de bonne heure ; pour tous les autres chiens & chats, quand ils approchoient d'elle, elle les battoit. Un jour, j'avois un petit épagneul avec moi, elle ne lui dit rien d'abord ; mais, le chien ayant été la flairer, elle lui donna vingt soufflets avec ses pattes de devant, comme

les chats ont coutume de faire lorsqu'ils attaquent de petits chiens, & le poursuivent, à coups de nez & de tête, jusqu'entre mes jambes; & depuis, toutes les fois qu'elle le vit, elle le poursuivit de même; tant que les chiens ne se défendoient pas, elle ne se servoit pas de ses dents; mais, si le chien faisoit tête & vouloit mordre, alors le combat devenoit à outrance; & j'ai vu des chiens assez gros déchirés & bien mordus, prendre le parti de la fuite.

Cette loutre habitoit la chambre des Tourrières, & la nuit elle couchoit sur leur lit; le jour elle se tenoit ordinairement sur une chaise de paille, où elle dormoit couchée en rond; &, quand la fantaisie lui en prenoit, elle alloit se mettre la tête & les pattes de devant dans un seau d'eau qui étoit à son usage, ensuite elle se secouoit & venoit se remettre sur sa chaise, ou alloit se promener dans la cour ou dans la maison extérieure; je l'ai vu plusieurs fois couchée au soleil, alors elle fermoit les yeux; je l'ai portée, manée, prise par les pattes & flattée, elle jouoit avec mes mains, les

mo
den
dit
Je
flaq
lais
vou
noit
voit
n'y
mou
la fi
rega
forte
tent
peut
seul
pas
qu'a
qu'il
une
C
beso
subit
quel
meul
com

mordoit insensiblement, & faisoit petites dents, si cela peut se dire, comme on dit que les chats font patte de velours. Je la menai un jour auprès d'une petite flaqué d'eau, où la rivière d'Aroux en laisse lorsqu'elle est débordée : ce qui vous paroîtra surprenant, & ce qui m'étonnoit aussi, c'est qu'elle parut craindre de voir de l'eau en si grand volume ; elle n'y entra pas, passé le bord où elle se mouilla la tête comme dans le seau ; je la fis jeter à quelques pas dans l'eau, elle regagna le bord bien vite, avec une sorte d'effroi, & nous suivit, très-contente de retrouver ses Tourrières. Si on peut raisonner d'après un seul fait & un seul individu, la Nature paroît n'avoir pas donné à cet animal le même instinct qu'aux canards, qui barbottent aussitôt qu'ils sont éclos, en sortant de dessous une poule.

Cette loutre étoit très-malpropre ; le besoin de se vider paroissoit lui prendre subitement, & elle se satisfaisoit de même, quelque part qu'elle fût, excepté sur les meubles, mais à terre & dans la chambre comme ailleurs ; les Tourrières n'avoient

jamais pu, même par des corrections, l'accoutumer à aller, pour ses besoins, à la cour, qui étoit peu éloignée; dès qu'elle s'étoit vidée, elle venoit flaire ses excréments, ainsi que les chats, & faisoit un petit saut d'allégresse ensuite, comme satisfaite de s'être débarrassée de ce poids.

J'ai souvent eu occasion de voir cette loutre, parce que je ne passois point à Autun sans aller à l'abbaye de Saint-Jean-le-grand, où Madame de Courtivron avoit une tante; & j'ai dîné dix fois avec la loutre, qui étoit de très-bonne compagnie. On me l'offrit, je l'aurois acceptée pour la mettre enchaînée sur le fossé de ma maison à Courtivron, où elle auroit eu occasion de se marier, si je n'avois reconnu la difficulté de l'enchaîner, à cause que le cou de cet animal est presque du même diamètre de sa tête & son corps; je pensai qu'elle pourroit s'échapper, & multiplier chez moi les loutres, qui n'y sont que trop communes.

Je me reproche de m'être si fort étendu sur cet article des loutres, comme

a
ful
ma
exe
Bo
ple
exi
son
célé
vou
de

des Animaux quadrupèdes. 103

susceptibles d'être bien apprivoisées ; mais j'ai cru devoir vous donner un exemple de ce que j'ai vu dans notre Bourgogne : ainsi, sans recourir aux exemples de Danemarck & de Suède, s'ils existent, tels que le P. Vaniere, dans son Poëme du *Pradium rusticum*, les a célébrés : voilà des choses sur lesquelles vous pouvez compter, & il n'y a rien de poétique dans ce que je vous dis. »



DE LA SARICOVIENNEou **LOUTRE MARINE.** (a)

NOUS AVONS DIT à l'article de la Loutre-saricovienne ou *Cariguibegu* de Marcgrave, que cet animal paroïssoit se trouver sur la plupart des côtes poissonneuses & des embouchures des grands fleuves, dans les plages désertes de l'Amérique méridionale; mais nous ignorions alors que ce même animal se retrouve au Kamtschatka & sur les côtes & les îles de toute cette partie du nord-est de l'ancien continent, & sans que la différence de climat paroisse avoir influé sur l'espèce qui semble être par - tout la même. Ces saricoviennes de Kamtschatka ont été soigneusement décrites par M. Steller, & l'on ne peut douter, en

(a) Suite de cet article, tome XIII, page 319 de l'Histoire Naturelle; & supplément, vol. III, page 158.

comparant la description avec celle de Marcgrave, que l'espèce de ces saricoviennes de Kamtschatka, ne soit la même que celle du carigueibeju ou saricovienne de l'Amérique; on verra de même que les lions marins, les ours marins & la plupart des phoques se retrouvent les mêmes dans les mers les plus éloignées les unes des autres, & sous les climats les plus opposés.

Les Russes, qui demeurent au Kamtschatka, donnent à la saricovienne le nom de *bobr* ou *castor*, quoiqu'elle ne ressemble au castor que par la longueur de son poil, & qu'elle n'ait que peu de rapport avec lui par sa forme extérieure; car c'est une véritable loutre à laquelle non-seulement nous rapporterons ces grandes loutres de la Guyane & du Brésil, dont nous avons parlé (*Supplément, volume III, page 158*); mais aussi cette loutre du Canada, dont nous avons donné la notice (*vol. XIII, page 322*), & qui paroît être de la taille & de l'espèce des saricoviennes.

On voit ces saricoviennes ou loutres marines sur les côtes orientales du

Kamtschatka & dans les îles voisines, depuis le 50.^e degré jusqu'au 56.^e, & il ne s'en trouve que peu ou point dans la mer intérieure à l'occident du Kamtschatka, ni au-delà de la troisième île des Kuriles; elles ne sont ni féroces, ni farouches, étant même assez sédentaires dans les lieux qu'elles ont choisis pour demeure; elles semblent craindre les phoques, ou du moins elles évitent les endroits qu'ils habitent, & n'aiment que la société de leur espèce; on les voit en très-grand nombre dans toutes les îles inhabitées des mers orientales du Kamtschatka; il y en avoit, en 1742, une si grande quantité à l'île de Bering, que les Russes en tuèrent plus de huit cens. « Comme ces animaux n'avoient jamais vu d'hommes auparavant, dit M. Steller, ils n'étoient ni timides, ni sauvages; ils s'approchoient même des feux que nous allumions, jusqu'à ce qu'instruits par leur malheur, ils commencèrent à nous fuir (b). »

(b) *Novi commentarii Academiae Petropol.* tome II, 1751.

des Animaux quadrupèdes. 107

Pendant l'hiver, ces faricoviennes se tiennent tantôt dans la mer sur les glaces, & tantôt sur le rivage; en été, elles entrent dans les fleuves, & vont même jusque dans les lacs d'eau douce, où elles paroissent se plaire beaucoup; dans les jours les plus chauds, elles cherchent, pour se reposer, les lieux frais & ombragés; en sortant de l'eau, elles se secouent & se couchent en rond sur la terre comme les chiens; mais, avant que de s'endormir, elles cherchent à reconnoître, par l'odorat plutôt que par la vue, qu'elles ont foible & courte, s'il n'y a pas quelques ennemis à craindre dans les environs; elles ne s'éloignent du rivage qu'à de petites distances, afin de pouvoir regagner promptement l'eau dans le péril; car, quoiqu'elles courent assez vite, un homme lesté peut néanmoins les atteindre; mais en revanche elles nagent avec une très-grande célérité & comme il leur plaît, c'est-à-dire, sur le ventre, sur le dos, sur les côtés, & même dans une situation presque perpendiculaire.

Le mâle ne s'attache qu'à une seule

E vj

femelle, avec laquelle il va de compagnie, & qu'il paroît aimer beaucoup, ne la quittant ni sur mer, ni sur terre; il y a apparence qu'ils s'aiment en effet dans tous les temps de l'année, car on voit des petits nouveaux-nés dans toutes les saisons, & quelquefois les peres & mères sont encore suivis par des jeunes de différens âges des portées précédentes, parce que leurs petits ne les quittent que quand ils sont adultes & qu'ils peuvent former une nouvelle famille; les femelles ne produisent qu'un petit à-la-fois, & très-rarement deux; le temps de la gestation est d'environ huit à neuf mois; elles mettent bas sur les côtes ou sur les îles les moins fréquentées, & le petit, dès sa naissance, a déjà toutes ses dents, les canines sont seulement moins avancées que les autres; la mère l'allaitte pendant près d'un an, d'où l'on peut présumer qu'elle n'entre en chaleur qu'environ un an après qu'elle a produit; elle aime passionnément son petit, & ne cesse de lui prodiguer des soins & des caresses, jouant continuellement avec lui, soit sur la terre, soit dans l'eau;

ell
est
po
rep
jet
tab
tio
qu
ave
&
tôt
céc
&
ram
fan
ils
tem
fon
ph
ils
con
fru
mê
me
ritu
sui

des Animaux quadrupèdes. 109

elle lui apprend à nager, &, lorsqu'il est fatigué, elle le prend dans sa gueule pour lui donner quelques momens de repos; si l'on vient à le lui enlever, elle jette des cris & des gémissemens lamentables; il faut même user de précautions, lorsqu'on veut le lui dérober, car, quoique douce & timide, elle le défend avec un courage qui tient du désespoir, & se fait souvent tuer sur la place, plutôt que de l'abandonner.

Ces animaux se nourrissent de crustacées, de coquillages, de grands polypes & autres poissons mous qu'ils viennent ramasser sur les grèves & sur les rivages fangeux, lorsque la marée est basse, car ils ne peuvent demeurer assez longtemps sous l'eau pour les prendre au fond de la mer, n'ayant pas, comme les phoques, le trou ovale du cœur ouvert; ils mangent aussi des poissons à écailles, comme des anguilles de mer, &c. des fruits rejetés sur le rivage en été, & même des fucus, faute de tout autre aliment; mais ils peuvent se passer de nourriture pendant trois ou quatre jours de suite; leur chair est meilleure à manger

que celle des phoques, sur-tout celle des femelles, qui est grasse & tendre lorsqu'elles sont pleines & prêtes à mettre bas; celle des petits, qui est très-délicate, est assez semblable à la chair de l'agneau, mais la chair des vieux est ordinairement très-dure (c). « Ce fut,

(c) « Les Russes, jetés dans cette île (de » Bering), après s'être réservé une provision » de huit cens livres de farine, pour faire le » trajet du Kamtschatka, dès que la saison & » leur santé le permettoient, eurent recours » aux loutres marines; un de ces animaux leur » fournissoit quarante ou cinquante livres de » chair, mais si dure, du moins celle des mâ- » les, qu'il falloit la hacher & l'avaler presque » sans mâcher; on en préparoit les viscères » pour les malades. Du reste, quoique M. Steller » prétende que la loutre est bonne contre le scor- » but, M. Muller en doute, puisque les Russes, qui » moururent de cette maladie, en avoient mangé » comme les autres; cependant on en tua beau- » coup, même quand on eut cessé de s'en » nourrir, parce que les peaux en sont très- » belles, & valent aux Russes, qui les vont » porter à la Chine, jusqu'à quatre-vingts ou » cent roubles la pièce; aussi ramassa-t-on neuf » cens de ces peaux à la chasse des loutres, qui » dura jusqu'au mois de mars, alors elles dis-

dit
pa
au
pa
les
fen

dan
vie

ver

tem

çon

riq

s'an

de

mer

les

au

qui

env

paru

des

leur

Voye

(

II,

des Animaux quadrupèdes. 111

dit M. Steller, notre nourriture principale à l'île de Bering, elle ne nous fit aucun mal, quoique mangée seule & sans pain, & souvent à demi-crue; le foie, les rognons & le cœur, sont absolument semblables à ceux du veau (*d*).

On voit souvent au Kamtschatka & dans les îles Kuriles, arriver les saricoviennes sur des glaçons poussés par un vent d'Orient, qui règne de temps en temps sur ces côtes en hiver; les glaçons, qui viennent du côté de l'Amérique, sont en si grande quantité, qu'ils s'amoncellent & forment une étendue de plusieurs milles de longueur sur la mer: les chasseurs s'exposent, pour avoir les peaux des saricoviennes, à aller fort au loin sur ces glaçons avec des patins qui ont cinq ou six pieds de long sur environ huit pouces de large, & qui

parurent, & l'équipage eut recours à la pêche « des chiens, des ours & des lions, que la mer « leur offrit. » *Voyage de Bering; Histoire générale des Voyages, tome XLX, page 379.*

(*d*) *Novi commentarii Academia Petropol. tome II, 1751.*

par conséquent leur donnent la hardiesse d'aller dans les endroits où les glaces ont peu d'épaisseur ; mais, lorsque ces glaces sont poussées au large par un vent contraire, ils se trouvent souvent en danger de périr ou de rester quelquefois plusieurs jours de suite errans sur la mer, avant que d'être ramenés à terre avec ces mêmes glaces par un vent favorable ; c'est dans les mois de février, de mars & d'avril, qu'ils font cette chasse périlleuse, mais très-profitable, car ils prennent alors une plus grande quantité de ces animaux qu'en toute autre saison ; cependant ils ne laissent pas de les chasser en été, en les cherchant sur la terre, où souvent on les trouve endormis ; on les prend aussi, dans cette même saison, avec des filets que l'on tend dans la mer, où bien on les poursuit en canot jusqu'à ce qu'on les ait forcées de lassitude.

Leur peau fait une très-belle fourrure ; les Chinois les achettent presque toutes, & ils les paient jusqu'à soixantedix, quatre-vingts & cent roubles chacune ; & c'est par cette raison qu'il en

des Animaux quadrupèdes. 113

vient très-peu en Russie. La beauté de ces fourrures varie suivant la saison; les meilleures & les plus belles, sont celles des saricoviennes tuées aux mois de mars, d'avril & de mai; néanmoins ces fourrures ont l'inconvénient d'être épaisses & pesantes, sans cela, elles seroient supérieures aux zibelines, dont les plus belles ne sont pas d'un aussi beau noir. Il ne faut cependant pas croire que le poil de ces saricoviennes soit également noir dans tous les individus, car il y en a dont la couleur est brunâtre, comme celle de la loutre de rivière, d'autres qui ont de couleur argentée sur la tête, plusieurs qui ont la tête, le menton & la gorge variés de longs poils très-blancs & très-doux; enfin d'autres qui ont la gorge jaunâtre, & qui portent plutôt un feutre crépu, brun & court sur le corps, qu'un véritable poil propre à la fourrure; au reste, les poils bruns ou noirs ne le sont que jusqu'à la moitié de leur longueur; tous sont blancs à leur racine, & leur longueur est en tout d'environ un pouce ou un pouce & demi sur le dos, la queue & les côtés

114 *Supplément à l'Histoire*

du corps; ils sont plus courts sur la tête & sur les membres; mais, au-dessous de ce premier long poil, il y a, comme dans les ours marins, une espèce de luvet ou de feutre qui est de couleur brune ou noire, comme l'extrémité des grands poils du corps. On distingue aisément les peaux des femelles de celles des mâles, parce qu'elles sont plus petites, plus noires, & qu'elles ont le poil plus long sous le ventre; les petits ont aussi, dans le premier âge, le poil noir ou très-brun & très-long; mais, à cinq ou six mois, ils perdent ce beau poil, & à un an ils ne sont couverts que de leur feutre, & les longs poils ne le recouvrent que dans l'année suivante; la mue se fait, dans les adultes, d'une manière différente de celle des autres animaux, quelques poils tombent aux mois de juillet & d'août, & les autres prennent alors une couleur un peu plus brune.

Communément les faricoviennes ont environ deux pieds dix pouces de longueur, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, qui a douze

ou
est
la
ref
me
fen
riè
qua
con
dan
de
geu
vir
piè
liè
gra
diff
bru
aut
ang
our
cou
très
lèvr
éga
ver
n'ay

des Animaux quadrupèdes. 115

ou treize pouces de long; leur poids est de soixante-dix à quatre-vingts livres; la saricovienne ressemble à la loutre terrestre par la forme du corps, qui seulement est beaucoup plus épais en tout sens; toutes deux ont les pieds de derrière plus près de l'anus que les autres quadrupèdes; les oreilles sont droites, coniques, & couvertes de poils comme dans l'ours - marin, elles sont longues de près d'un pouce, sur autant de largeur, & distantes l'une de l'autre d'environ cinq pouces; les yeux & les paupières sont assez semblables à ceux du lièvre, & sont à-peu-près de la même grandeur; la couleur de l'iris varie dans différens individus, car cette couleur est brune dans les uns, & noirâtre dans les autres; il y a une membrane au grand angle de chaque œil, comme dans les ours-marins, mais qui ne peut guère couvrir l'œil qu'à moitié; les narines sont très-noires, ridées & sans poil, & les lèvres sont d'une épaisseur à-peu-près égale à celles du phoque commun; l'ouverture de la gueule est médiocre, n'ayant qu'environ deux pouces trois

lignes de longueur, depuis le bout du museau jusqu'à l'angle; la mâchoire supérieure s'avance d'un demi-pouce sur la mâchoire inférieure, toutes deux sont garnies de moustaches blanches dirigées en bas, & dont les poils roides ont trois pouces de longueur à côté des coins de la gueule, mais qui ne sont longs que d'un pouce auprès des narines; la mâchoire supérieure est armée de quatorze dents; il y a d'abord quatre incisives très-aiguës & longues de deux lignes, ensuite une canine de chaque côté, de figure conique, un peu recourbée en arrière, & d'environ un pouce de longueur; après les canines, il y a quatre molaires de chaque côté, qui sont larges & épaisses, sur-tout celles du fond; & ces dernières dents sont très-propres à casser les coquilles & broyer les crustacées.

Dans la mâchoire inférieure, le nombre des dents est ordinairement de seize; il y a d'abord, comme dans la mâchoire supérieure, quatre incisives & deux canines; ces dernières n'ont qu'environ huit lignes de longueur, mais il y a

cin
les
go
de
nai
inc
laine
sup
des
la
son
tro
po
pill
ce
jus
eng
&
pèc
vie
qu
que
&
rien
ce
par

des Animaux quadrupèdes. 117

cinq dents molaires de chaque côté, dont les deux dernières sont situées dans la gorge; ainsi, le nombre total des dents de la saricovienne, est de trente ordinairement; néanmoins, comme il y a des individus qui ont aussi cinq dents molaires de chaque côté à la mâchoire supérieure, il se trouve que ce nombre des dents est quelquefois de trente-deux; la langue, depuis son insertion jusqu'à son extrémité, est longue de trois pouces trois lignes, sur une largeur d'un demi-pouce seulement; elle est garnie de papilles & un peu fourchue à l'extrémité.

Les pieds, tant ceux de devant que ceux de derrière, sont couverts de poil jusqu'auprès des ongles, & ne sont point engagés dans la peau, ils sont apparens & extérieurs comme ceux des quadrupèdes terrestres; en sorte que l. saricovienne peut marcher & courir, quoiqu'assez lentement; ceux de devant n'ont que onze ou douze pouces de longueur, & sont plus courts que ceux de derrière, qui ont quatorze ou quinze pouces, ce qui fait que cet animal est plus élevé par le train de derrière, & que son dos

paroît un peu voûté; les pieds de devant sont assez semblables, par les ongles, à ceux des chats, & ils diffèrent de ceux de la loutre terrestre, en ce qu'ils sont réunis par une membrane qui est couverte de poil; la plante du pied, qui est brune, avec des tubercules par-dessous, est arrondie & divisée en cinq doigts: les deux du milieu sont un peu plus longs que les autres, & l'interne est un peu plus court que l'externe; ces ongles, crochus des pieds de devant, servent à détacher les coquillages des rochers; les pieds de derrière ont aussi cinq doigts, qui sont de même joints par une membrane velue, & qui ont la forme de ceux des oiseaux palmipèdes; le tarse, le métatarse & les doigts de ces pieds de derrière sont beaucoup plus longs & plus larges que ceux des pieds de devant; les ongles en sont aigus, mais assez courts; le doigt externe est un peu plus long que les autres, qui vont successivement en diminuant, & la peau de la plante de ces pieds de derrière est aussi de couleur brune ou noire, comme dans les pieds de devant.

cel
pla
elle
du
épa
ferr
I
un
ce
long
d'en
qui
ren
men
la v
& t
l'au
N
indi
sous
bien
quo

(e
page

des Animaux quadrupèdes. 119

La queue est tout-à-fait semblable à celle de la loutre de terre, c'est-à-dire, plate en dessus & en dessous, seulement elle est un peu plus courte à proportion du corps, elle est recouverte d'une peau épaisse, garnie de poils très-doux & très-ferrés.

La verge du mâle est contenue dans un fourreau sous la peau, & l'orifice de ce fourreau est situé à un tiers de la longueur du corps; cette verge, longue d'environ huit pouces, contient un os qui en a six; les testicules ne sont point renfermés dans une bourse, mais seulement recouverts par la peau commune; la vulve de la femelle est assez grande, & située à un pouce au-dessous de l'anus.

Nous devons observer que l'animal indiqué par M. Kracheninnikow (e), sous le nom de *castor-marin*, pourroit bien être le même que la saricovienne, quoiqu'il le dise aussi grand que celui qu'il

(e) Histoire générale des Voyages, tome XIX, page 260.

nomme *chat-marin*, & qui est l'ours-marin, car il y a des faricoviennes beaucoup plus grandes que celles dont nous venons de donner les dimensions d'après M. Steller; & on en a vu à la Guyane & au Brésil de beaucoup plus grosses que celles du Kamtschatka; d'ailleurs il paroît, par l'indication même de M. Kracheninnikow, que son castor-marin a les mêmes habitudes que la faricovienne, qui porte le nom de *bobr* ou *castor* chez les Russes de Sibérie. M. Steller, qui a demeuré si long-temps dans les parages du Kamtschatka, & qui en a décrit tous les animaux, ne fait nulle mention de ce castor-marin gros comme l'ours-marin, & il y a toute apparence que M. Kracheninnikow n'en a parlé que sur des relations peut-être exagérées. On peut ajouter à ces preuves les inductions que l'on peut tirer du résultat des observations de différens Voyageurs au Kamtschatka, dont la récapitulation se trouve *tome XIX, page 365 des Voyages*, où il est dit, « que les peaux de castor-marins sont d'un profit considérable pour la Russie; que les Kamtschatdales peuvent,

ve
fa
qu
po
Ru
me
tem
est
but
cast
quo
tag
roul
rapp
tout
s'est
mar
mar
A
pelle
nom
kala
chez
Je
Guy
sujet
par
Su

vent, avec ces peaux, acheter des Cosaques tout ce qui leur est nécessaire, & que les Cosaques troquent ces fourrures pour d'autres effets avec les marchands Russes, qui gagnent beaucoup dans le commerce qu'ils en font à la Chine, & que le temps de la chasse des castors-marins, est le plus favorable pour lever les tributs, car les Kamtschatdales donnent un castor pour un renard ou une zibeline, quoiqu'il vaille au moins cinq fois davantage, & qu'il se vend quatre-vingt-dix roubles, &c.» On voit que tout cela se rapporte à la saricovienne, & qu'il y a toute apparence que Kracheninnikow s'est trompé lorsqu'il a dit que son *castor-marin* étoit aussi grand que son *chat-marin*, c'est-à-dire, l'ours-marin.

Au reste, la saricovienne, qui s'appelle *bobr* ou *castor* en langue Russe, est nommée *kaikon* en langue Kamtschatdale, *kalaga* chez les Koriaques, & *rakkon* chez les Kouriles.

Je dois ajouter, qu'ayant reçu de la Guyane de nouvelles informations au sujet des saricoviennes d'Amérique, il paroît qu'elles varient beaucoup par la

grandeur & pour la couleur; l'espèce en est commune sur les côtes basses & à l'embouchure des grandes rivières de l'Amérique méridionale.

Leur peau est très-épaisse, & leur poil est ordinairement d'un gris plus ou moins foncé, & quelquefois argenté; leur cri est un son rauque & enrôlé; ces animaux vont en troupes, & fréquentent les savannes noyées; ils nagent la tête hors de l'eau, & souvent la gueule ouverte, quelquefois même au lieu de fuir, ils entourent en grand nombre un canot en jetant des cris, & il est aisé d'en tuer un grand nombre: au reste, l'on dit qu'il est assez difficile de prendre une saricovienne dans l'eau, lors même qu'on l'a tuée, qu'elle se laisse aller au fond de l'eau dès qu'elle est blessée, & qu'on perdrait son temps à attendre le moment où elle pourroit reparoître, sur-tout si c'est dans une eau courante qui puisse l'entraîner.

Les jaguars ou cougars leur font la guerre, & ne laissent pas d'en ravir & d'en manger beaucoup; ils se tiennent

de
à l'
pass
fonde
ensu
N
men
gnag
Caye
diffé
grand
des
fort
diffic
même
quer,
l'espè
celle
maux
sont p
habita
terres
& qu
prend

des Animaux quadrupèdes. 123

à l'affût, & , lorsqu'une saricovienne passe, ils s'élancent dessus, la suivent au fond de l'eau, l'y tuent & l'emportent ensuite à terre pour la dévorer.

Nous avons dit (*page 158 du supplément, volume III*), d'après le témoignage de M. de la Borde, qu'il y a à Cayenne trois espèces de loutres très-différentes par la grandeur; les deux plus grandes de ces loutres paroissent être des saricoviennes, qui se ressemblent si fort par la forme, que l'on peut, sans difficulté, les rapporter à une seule & même espèce, d'autant qu'on doit remarquer, comme un fait général, que, dans l'espèce de la saricovienne, ainsi que dans celle du jaguar & de plusieurs autres animaux des contrées presque désertes, ils sont plus petits dans les lieux voisins des habitations, que dans la profondeur des terres, parce qu'on les tue plus jeunes, & qu'on ne leur donne pas le temps de prendre leur entier accroissement.



ADDITION à l'article qui a pour titre : des MORSES ou VACHES-MARINES, vol. XIII, page 358.

NOUS AJOUTERONS à ce que nous avons dit du Morsé, quelques observations que M. Crantz a faites sur cet animal dans son Voyage au Groënland.

« Un de ces morsés ; dit-il, avoit dix-huit pieds de longueur, & à-peu-près autant de circonférence dans sa plus grande épaisseur ; sa peau n'étoit pas unie, mais ridée par tout le corps, & plus encore autour du cou ; sa graisse étoit blanche & ferme comme du lard, épaisse d'environ trois pouces ; la figure de sa tête étoit ovale ; la bouche étoit si étroite, qu'on pouvoit à peine y faire entrer le doigt ; la lèvre inférieure est triangulaire, terminée en pointe, un peu avancée entre les deux longues défenses qui partent de la mâchoire supérieure ;

d
sur
du
d'o
épa
pou
brin
fort
prin
mar
pou
étoi
& c
qu'a
tre
ving

Se
les m
n'en
les e
riviè
dit-i

(a
page
(b
tome

des Animaux quadrupèdes. 125

sur les deux lèvres, & de chaque côté du nez, on voit une peau spongieuse, d'où sortent des moustaches d'un poil épais & rude, longues de six ou sept pouces, tressées comme une corde à trois brins, ce qui donne à cet animal une sorte de majesté hideuse. Il se nourrit principalement de moules & d'algue marine; les défenses avoient vingt-sept pouces de longueur, dont sept pouces étoient cachés dans l'épaisseur de la peau & dans les alvéoles qui s'étendent jusqu'au crâne; chaque défense pesoit quatre livres & demie, & le crâne entier vingt-quatre livres (a). »

Selon le Voyageur Kracheninnikow (b), les morfes, qu'il appelle *chevaux-marins*, n'entrent pas, comme les phoques, dans les eaux douces, & ne remontent pas les rivières. « On voit peu de ces animaux, dit-il, dans les environs de Kamtschatka,

(a) Histoire générale des Voyages, tome XIX, page 60 & suivantes.

(b) Histoire du Kamtschatka; Lyon, 1767; tome I, page 283.

&, si l'on en trouve, ce n'est que dans les mers qui sont au Nord; on en prend beaucoup auprès du cap *Tchukotskoï*; où ils sont plus gros & plus nombreux que par-tout ailleurs; le prix de leurs dents dépend de leur grandeur & de leur poids; les plus chères sont celles qui pèsent vingt livres, mais elles sont fort rares; on en voit même peu qui pèsent dix à douze livres, leur poids ordinaire n'étant que de cinq ou six livres.»

Frédéric Martens avoit déjà observé quelques-unes des habitudes naturelles de ces animaux; il assure qu'ils sont forts & courageux, & qu'ils se défendent les uns les autres avec une résolution extraordinaire. «Lorsque j'en bleissois un, dit-il, les autres s'assembloient autour du bateau, & le perçoient à coups de défenses, d'autres s'élevoient hors de l'eau, & faisoient tout leur possible pour s'élan- cer dedans; nous en tuâmes plusieurs centaines à l'île de *Muff*... & l'on se contente ordinairement d'en emporter la tête pour arracher les défenses (c).

(c) Voyage au Groënland.

des
Co
en tr
autre
brab
septe
qu'en
tuère
cens
tuère
1710
trouv
sur l
appa
ceux
nom
Tsch
en m

O
Voy
du M
truct
l'espè
nom
sont

(d)

des Animaux quadrupèdes. 127

Ces animaux, comme l'on fait, vont en très - grandes troupes, & ils étoient autrefois en quantité presque innombrable dans plusieurs endroits des mers septentrionales. M. Gmelin rapporte, qu'en 1705 & 1706, les Anglois en tuèrent, à l'île de Chery, sept à huit cens en six heures; qu'en 1708, ils en tuèrent en sept heures neuf cens; & en 1710, en une journée, huit cens. « On trouve, dit-il, les dents de ces animaux sur les bas bords de la mer; & il y a apparence que ces dents viennent de ceux qui meurent; on trouve en grand nombre de ces dents du côté des Tschutschis, où ces peuples les ramassent en monceaux pour en faire des outils (d).

On voit, par les relations de tous les Voyageurs qui ont fréquenté les mers du Nord, qu'on a fait une énorme destruction de ces grands animaux, & que l'espèce en est actuellement bien moins nombreuse qu'elle ne l'étoit jadis; ils se sont retirés vers le Nord & dans les

(d) Voyage de Gmelin, tome II.

lieux les moins fréquentés par les pêcheurs, qui n'en rencontrent plus dans les mêmes endroits où ils étoient anciennement en si grand nombre : nous verrons qu'il en est à-peu-près de même des phoques & de tous ces amphibies marins, dont le naturel les porte à se réunir en troupeaux, & former une espèce de société; l'homme a rompu toutes ces sociétés, & la plupart de ces animaux vivent actuellement dans un état de dispersion, & ne peuvent se rassembler qu'auprès des terres désertes & inconnues.



de
 —
 AD
 L
 il y
 nois
 mais
 plus
 tena
 leur
 caract
 tifier
 j'ai
 tant
 recu
 J
 dée
 très
 gen
 pho
 & h
 trou
 Cet
 app
 attr

*ADDITION à l'article des PHOQUES ,
volume XIII, page 330.*

LORSQUE j'ai écrit sur les Phoques, il y a plus de vingt ans, l'on n'en connoissoit alors que deux ou trois espèces; mais les Voyageurs récents en ont reconnu plusieurs autres, & nous sommes maintenant en état de les distinguer, & de leur appliquer les dénominations & les caractères qui leur sont propres. Je rectifierai donc en quelques points ce que j'ai dit au sujet de ces animaux, en ajoutant ici les nouveaux faits que j'ai pu recueillir.

J'établirai d'abord une distinction fondée sur la nature & sur un caractère très-évident, en divisant en deux le genre entier des phoques; savoir, les phoques qui ont des oreilles externes, & les phoques qui n'ont que de petits trous auditifs sans conque extérieure. Cette différence est non-seulement très-apparente, mais semble même faire un attribut essentiel, le manque d'oreilles

extérieures étant un des traits par lesquels ces amphibies se rapprochent des cétacées, sur le corps desquels la Nature semble avoir effacé toute espèce de tubérosités & de proémînences qui eussent rendu la peau moins lisse & moins propre à glisser dans les eaux, tandis que la conque externe & relevée de l'oreille paroît faire tenir de plus près aux quadrupèdes ceux des phoques, qui sont pourvus de cette partie extérieure, qui ne manque à aucun animal terrestre.

Nous ne connoissons que deux espèces bien distinctes de phoques à oreilles; la première est celle du lion-marin, qui est très-remarquable par la crinière jaune qu'il porte autour du cou, & la seconde, celle que les Voyageurs ont indiquée sous le nom d'ours-marin, & qui est composée de deux variétés très-différentes entr'elles par la grandeur; nous joindrons donc à cette espèce le *petit phoque à poil noir*, dont j'ai donné la description & la figure (*volume XIII*), & qui étant pourvu d'oreilles externes, ne fait qu'une variété dans l'espèce de l'ours-marin; des inductions assez plau-

des Animaux quadrupèdes. 131

sibles m'avoient fait regarder alors ce petit ours-marin, comme le *phoca* des Anciens; mais comme Aristote, en parlant du *phoca*, dit expressément qu'il n'a pas d'oreilles externes & seulement des trous auditifs; je vois qu'on doit chercher ce *phoca* des Anciens dans quelque une des espèces de phoques sans oreilles, dont nous allons faire l'énumération.



LES PHOQUES SANS OREILLES
ou **PHOQUES** proprement dits.

NOUS CONNOISSONS neuf ou dix espèces ou variétés distinctes dans le genre des Phoques sans oreilles, & nous les indiquerons ici dans l'ordre de leur grandeur, & par les caractères que les Voyageurs ont saisis pour les dénommer & les distinguer les uns des autres.



LE GRAND PHOQUE

A MUSEAU RIDÉ.

Première espèce.

LA PLUS GRANDE ESPÈCE est celle du *Phoque à museau ridé*, dont nous avons déjà parlé sous le nom de *lion-marin* (volume XIII , page 351 & suivantes), parce que plusieurs Voyageurs, & particulièrement le rédacteur du voyage d'Anson, l'avoient indiqué sous cette dénomination, mais mal-à-propos, puisque le vrai lion-marin porte une crinière que celui-ci n'a pas, & qu'ils diffèrent encore entr'eux par la taille & par la forme de plusieurs parties du corps; en sorte que le phoque à museau ridé n'a de commun avec le vrai lion-marin; que d'habiter les côtes & îles désertes, & de se trouver comme lui dans les mers des deux hémisphères. Il faut donc se rappeler ici ce que nous avons déjà dit de ce grand phoque à museau ridé,

sous le nom mal appliqué de lion-marin. Dampier & Byron, ont trouvé comme Anson, ce phoque à l'île de Juan Fernandès (a), & sur la côte occidentale des terres Magellaniques. M. de Bougainville, Dom Pernetti & Bernard

(a) « Le lion-marin (phoque à museau
 » ridé) est un grand animal de douze à qua-
 » torze pieds de long, &, au plus gros du
 » corps, il est de la grosseur d'un taureau; il est
 » de la figure d'un veau-marin, mais six fois
 » aussi gros; sa tête est faite comme celle du
 » lion, sa face est large, ayant plusieurs longs
 » poils aux lèvres comme un chat; ses yeux
 » sont gros comme ceux d'un bœuf; ses dents,
 » longues de trois pouces, sont grosses environ
 » comme le gros doigt d'un homme . . . il est
 » extraordinairement gras. Un lion-marin coupé
 » & bouilli, rendra un muid d'huile très-douce
 » & fort bonne à frire; le maigre est noir & à
 » gros grains & d'assez mauvais goût. Cet ani-
 » mal demeure quelquefois des semaines entières
 » à terre, s'il n'en est pas chassé; quand ils y
 » viennent trois ou quatre de compagnie, ils se
 » couchent les uns auprès des autres, & gro-
 » gnent comme les cochons, en faisant un bruit
 » horrible; ils mangent le poisson, & je crois
 » que c'est leur nourriture ordinaire. » Voyage
 » de Dampier; Rouen, 1715, tome I, pages 118
 » & 119.

des Animaux quadrupèdes. 135

Penrose, l'ont reconnu sur la côte orientale de ce continent, & aux îles Malouines ou Falkland; M.^r Forster ont aussi vu deux femelles de cette espèce dans une île à laquelle le capitaine Cook a donné le nom de *nouvelle Georgie* (b), & qui est située au cinquante-quatrième degré de latitude australe, dans l'Océan atlantique; ces deux femelles étoient endormies sur le rivage, & on les tua dans leur sommeil; d'autre côté, M. Steller a vu & décrit (c) ce même grand phoque à museau ridé dans l'île de Bering & près des côtes de Kamtschatka. Cette grande espèce se trouve donc également dans les deux hémisphères, & probablement sous toutes les latitudes.

Nous nommons aujourd'hui cet ani-

(b) Cette île avoit été découverte dans le siècle précédent, par Antoine de la Roche, & avoit été reconnue de nouveau, en 1756, par Duclos Guyot, sur le Vaisseau espagnol le *Lyon*, qui l'avoit nommée *l'île de Saint-Pierre*.

(c) Voyez son *Traité des animaux marins*.

museau
à qua-
ros du
; il est
x fois
lle du
longs
yeux
dents,
viron
il est
coupé
douce
& à
t ani-
nières
ils y
ils se
gro-
bruit
crois-
oyage
118

mal phoque à museau ridé (*d*), parce qu'il a sur le nez une peau ridée & mobile, qui peut se remplir d'air ou se gonfler, & se gonfle en effet lorsque l'animal est agité de quelque passion; mais nous devons observer que cette peau en forme de crête est monstrueusement exagérée dans la figure donnée par le rédacteur du voyage d'Anson, & qu'elle est réellement beaucoup plus petite dans la nature.

Ce grand & gros animal est d'un naturel très-indolent, c'est même de tous les phoques celui qui paroît être le moins redoutable malgré sa forte taille. Penrose dit que ses matelots s'amusoient à monter sur ces phoques comme sur des chevaux, & que, quand ils n'alloient pas assez vite, ils leur faisoient doubler

(*d*) Les mariniens Anglois l'ont nommé *clapmatzh seal*, nom évidemment corrompu de celui de *clap-mâtze*, que les Allemands & les Danois donnent à un animal tout différent, qui a un capuchon, dans lequel il peut renfermer sa tête, & que les Groënlandois appellent *neitserfoak*. Voyez, ci-après, l'article du *phoque à capuchon*.

le pas
ou de
des in
M. Cl
phoqu
ques,
des au
chans

Celu
très-co
drée,
teinte
gueur
huit p
vingt-c
auprès
minuan
tuée pa
pieds
adulte
rence
les fen
supérie
lèvre i
est mo
du mu

des Animaux quadrupèdes. 137

le pas en les piquant à coups de stilet ou de couteaux, & leur faisant même des incisions dans la peau. Cependant M. Clayton, qui a fait mention de ce phoque dans les Transactions philosophiques, dit que les mâles, comme ceux des autres phoques, sont assez méchans dans le temps de leurs amours.

Celui-ci est couvert d'un poil rude très-court, luisant & d'une couleur cendrée, mêlée quelquefois d'une légère teinte d'olive; son corps, dont la longueur est ordinairement de quinze à dix-huit pieds anglois, & quelquefois de vingt-quatre à vingt-cinq, est assez épais auprès des épaules, & va toujours en diminuant jusqu'à la queue; une femelle tuée par M. Forster, n'avoit que treize pieds de longueur, & en la supposant adulte, il y auroit une grande différence pour la taille entre les mâles & les femelles dans cette espèce; la lèvre supérieure avance de beaucoup sur la lèvre inférieure; la peau de cette lèvre est mobile, ridée & bouffie tout le long du museau, & cette peau que l'animal

remplit d'air à son gré, peut être comparée, pour la forme, à la caroncule du dindon; & c'est par ce caractère qu'on l'a désigné sous le nom de *phoque à museau ridé*; il n'y a dans la tête que deux petits trous auditifs & point d'oreilles externes; les pieds de devant sont conformés comme ceux du phoque commun, mais ceux de derrière sont plus informes & faits en manière de nageoires; en sorte que cet animal beaucoup plus fort & plus grand que notre phoque, est moins agile & encore plus imparfaitement conformé par les parties postérieures; & c'est probablement par cette raison qu'il paroît indolent & très-peu redoutable.

M. Clayton a fait mention d'un phoque qui se trouve dans l'hémisphère austral, il dit qu'on le nomme *furrseal* ou *phoque à fourrure*, parce que son poil est plus fourni que celui des autres phoques, quoique sa peau soit plus mince. Nous ne sommes pas en état de juger par d'aussi foibles indications si ce phoque à fourrure est d'une espèce voisine de

de
celle
de
de
rure
celle

des Animaux quadrupèdes. 139

celle du phoque à museau ridé, à côté de laquelle M. Clayton l'a placé, ou de celle de l'ours-marin, dont la fourrure est en effet bien plus fournie que celle des autres phoques.



LE PHOQUE A VENTRE BLANC.*Seconde espèce.*

NOUS DONNONS ici la figure (*planche XLIV*), de ce grand Phoque à ventre blanc, que nous avons vu vivant au mois de décembre 1778, & qui est d'une espèce très-différente de celle du phoque à museau ridé; nous allons rapporter aussi les observations que nous avons faites sur ce phoque, auxquelles nous ajouterons quelques faits qui nous ont été fournis par ses conducteurs.

Le regard de cet animal est doux; & son naturel n'est point farouche; ses yeux sont attentifs & semblent annoncer de l'intelligence; ils expriment du moins les sentimens d'affection, d'attachement pour son maître auquel il obéit avec toute complaisance; nous l'avons vu s'incliner à sa voix, se rouler, se tourner, lui tendre une de ses nageoires antérieures, se dresser en élevant son buste, c'est-à-dire, tout le devant

des

de fo
d'eau
fermé
signes
partir
pou
roué
l'anim
aussi-l
est un
& pl
que l
il mon
loit le
mens
vint e
touch
gueul
auprè
tête
l'app
qu'il
yeux
qu'il
mens
tém
gros

des Animaux quadrupèdes. 141

de son corps hors de la caisse remplie d'eau, dans laquelle on le tenoit renfermé; il répondoit à sa voix ou à ses signes par un son rauque, qui sembloit partir du fond de la gorge, & qu'on pourroit comparer au beuglement enroué d'un jeune taureau; il paroît que l'animal produit ce son en expirant l'air aussi-bien qu'en l'aspirant, seulement il est un peu plus clair dans l'aspiration, & plus rauque dans l'expiration. Avant que son maître ne l'eût rendu docile, il mordoit très-violemment lorsqu'on vouloit le forcer à faire quelques mouvemens; mais, dès qu'il fut dompté, il devint doux, au point qu'on pouvoit le toucher, lui mettre la main dans sa gueule & même se reposer sans crainte auprès de lui & appuyer le bras ou la tête sur la sienne; lorsque son maître l'appelloit, il lui répondoit quelque éloigné qu'il fût; il sembloit le chercher dès yeux lorsqu'il ne le voyoit pas, & dès qu'il l'apercevoit, après quelques momens d'absence, il ne manquoit pas d'en témoigner sa joie par une espèce de gros murmure.

ANC.

anche
entre
mois
l'une
pho-
por-
vons
nous
ont

oux,
; les
non-
t du
d'at-
el il
s l'a-
ier,
eoi-
vant
vant

Quand cet animal, qui étoit mâle ; éprouvoit les irritations de l'amour, ce qui lui arrivoit à-peu-près de mois en mois, sa douceur ordinaire se changeoit tout-à-coup en une espèce de fureur qui le rendoit dangereux ; son ardeur se déclaroit alors par des mugissemens accompagnés d'une forte érection ; il s'agitoit & se tourmentoit dans sa caisse, se donnoit des mouvemens brusques & inquiets, & mugissoit ainsi pendant plusieurs heures de suite ; c'est par des cris assez semblables qu'il exprimoit son sentiment de douleur lorsqu'on le maltraitoit ; mais il avoit d'autres accens plus doux, très-expressifs & comme articulés pour témoigner sa joie & son plaisir.

Dans ces accès de fureurs amoureuses, occasionnés par un besoin que l'animal ne pouvoit satisfaire pleinement & qui duroit huit ou dix jours, on l'a vu sortir de sa caisse après l'avoir rompue ; & , dans ces momens, il étoit fort dangereux & même féroce, car alors il ne connoissoit plus personne, il n'obéissoit plus à la voix de son maître, & ce n'é-

toit qu
quelqu
proche
manche
à lui
la guer
fois il
lui éc
exerço
jets qu
l'échau
couvri
& en
1779.

Il n
la resp
doit l'a
roit qu
ses nar
& , da
que c
longitu
seau ;
l'air p
pour
referm
il se p

des Animaux quadrupèdes. 143

toit qu'en le laissant se calmer pendant quelques heures qu'il pouvoit s'en approcher ; il le saisit un jour par la manche, & l'on eut beaucoup de peine à lui faire lâcher prise en lui ouvrant la gueule avec un instrument ; une autre fois il se jeta sur un assez gros chien & lui écrasa la tête avec les dents, & il exerçoit ainsi sa fureur sur tous les objets qu'il rencontroit : ces accès d'amour l'échauffoient beaucoup, son corps se couvrit de galle, il maigrit ensuite, & enfin il mourut au mois d'août 1779.

Il nous a paru que cet animal avoit la respiration fort longue, car il gardoit l'air assez long-temps & ne l'aspiroit que par intervalles, entre lesquels ses narines étoient exactement fermées ; &, dans cet état, elles ne paroissoient que comme deux gros traits marqués longitudinalement sur le bout du museau ; il ne les ouvre que pour rendre l'air par une forte expiration, ensuite pour en reprendre, après quoi il les referme comme auparavant, & souvent il se passe plus de deux minutes entre

chaque aspiration; l'air dans ce mouvement d'aspiration formoit un bruit semblable à un reniflement très-fort; il découloit presque continuellement des narines une espèce de mucus blanchâtre, d'une odeur désagréable.

Ce grand phoque, comme tous les animaux de ce genre, s'assoupissoit & s'endormoit plusieurs fois par jour; on l'entendoit ronfler de fort loin, & lorsqu'il étoit endormi on ne l'éveilloit qu'avec peine; il suffisoit même qu'il fût assoupi pour que son maître ne s'en fit pas entendre aisément, & ce n'étoit qu'en lui présentant près du nez quelques poissons qu'on pouvoit le tirer de son assoupissement; il reprenoit dès-lors du mouvement & même de la vivacité; il élevoit la tête & la partie antérieure de son corps en se haussant sur les deux palmes de devant jusqu'à la hauteur de la main qui lui présenteoit le poisson, car on ne le nourrissoit pas avec d'autres alimens, & c'étoit principalement des carpes, & des anguilles qu'il aimoit encore plus que les carpes: on avoit soin de les assaisonner, quoi-
que

qu
il
po
pa
go
&
off
ou
cho
mar
bon
den
leur
fiel
les
avale
S
très-
nâtr
étoit
boul
assur
jours
dans
soin
de l'e
boiss
Su

des Animaux quadrupèdes. 145

que crues, en les roulant dans du sel ; il lui falloit environ trente livres de ces poissons vivans & saupoudrés de sel par vingt-quatre heures ; il avaloit très-goulument les anguilles toutes entières & même les premières carpes qu'on lui offroit ; mais, dès qu'il avoit avalé deux ou trois de ces carpes entières, il cherchoit à vider les autres avant de les manger, & pour cela il les faisoit d'abord par la tête qu'il écrasoit entre ses dents, ensuite il les laissoit tomber, leur ouvroit le ventre pour en tirer le fiel avec ses appendices, & finissoit par les reprendre par la tête pour les avaler.

Ses excrémens répandoient une odeur très-fétide, ils étoient de couleur jaunâtre & quelquefois liquides, & lorsqu'ils étoient solides ils avoient la forme d'une boule. Les conducteurs de cet animal nous assurèrent qu'il pouvoit vivre plusieurs jours & même plus d'un mois sans être dans l'eau, pourvu néanmoins qu'on eût soin de le bien laver tous les soirs avec de l'eau nette, & qu'on lui donnât pour boisson de l'eau claire & salée, car lors-

qu'il buvoit de l'eau douce & sur-tout de l'eau trouble, il en étoit toujours incommode.

Le corps de ce grand phoque, comme celui de tous les animaux de ce genre, est de forme presque cylindrique, cependant il diminue de grosseur sans perdre sa rondeur en approchant de la queue; son poids total pouvoit être de six ou sept cens livres; sa longueur étoit de sept pieds & demi, depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité des nageoires de derrière; il avoit près de cinq pieds de circonférence à l'endroit de son corps le plus épais, & seulement un pied neuf pouces de tour auprès de l'origine de la queue; sa peau est couverte d'un poil court très-ras, lustré & de couleur brune, mêlée de grisâtre, principalement sur le cou & la tête où il paroît comme tigré: le poil est plus épais sur le dos & sur les côtés du corps que sous le ventre, où l'on remarque une grande tache blanche qui se termine en pointe en se prolongeant sur les flancs; & c'est par ce caractère que nous avons cru devoir le désigner en l'ap-

des

pellan

Les

poëses

quadr

étend

du m

ou qu

le hau

doigt

ces na

l'une

& lor

chacun

geur,

ovales

Les

de cou

ceux

pouces

distanc

d'envir

mal est

son fan

devien

gles.

La

tonnée

des Animaux quadrupèdes. 147

pellant le grand phoque à ventre blanc.

Les narines ne sont ni inclinées, ni posées horizontalement comme dans les quadrupèdes terrestres, mais elles sont étendues verticalement sur l'extrémité du museau, elles sont longues de trois ou quatre pouces, & s'étendent depuis le haut du museau jusqu'à un travers du doigt au-dessus de la lèvre supérieure; ces narines ou naseaux sont éloignées l'une de l'autre d'environ cinq pouces, & lorsqu'elles sont ouvertes, elles ont chacune près de deux pouces de largeur, ressemblent alors à deux petits ovales resserrés par leurs extrémités.

Les yeux sont grands, bien ouverts, de couleur brune & assez semblables à ceux du bœuf; ils sont situés à cinq pouces de l'extrémité du nez, & la distance entre leurs angles internes est d'environ quatre pouces; lorsque l'animal est long-temps sans entrer dans l'eau, son sang s'échauffe & le blanc des yeux devient rouge, sur-tout vers les angles.

La gueule est assez grande & environnée de grosses soies ou moustaches

presque semblables à des arêtes de poissons; les mâchoires étoient garnies de trente-deux dents fort jaunes & qui paroissent usées; nous avons compté vingt mâchelières, huit incisives, & quatre canines.

Les oreilles ne sont que deux petits trous presque cachés dans la peau; ces trous sont placés à environ trois pouces des yeux, & à huit ou neuf pouces du bout du nez; &, quoiqu'ils n'aient guère qu'une ligne d'ouverture, l'animal paroît néanmoins avoir l'ouïe très-fine, puisqu'il ne manque jamais d'obéir ou de répondre, même de loin, à la voix de son maître.

Les pieds ou nageoires de devant, mesurées depuis l'endroit où elles sortent du corps, jusqu'à leur extrémité, ont environ quinze pouces de longueur sur autant de largeur lorsqu'elles sont entièrement déployées; elles ont chacune cinq ongles noirs un peu courbés, & sont conformées de manière que le doigt du milieu est le plus court, & les deux de côté les plus longs.

Les nageoires de derrière ont la



de
form
mité
lieu
côtés
ont
sur e
lorsq
due;
les c
coupe
avoit
geoir
manq
dent,
ment
ces na
de sa
nageoi
& déc
La
deux
de lon
forme
naissan
extrém
& par
duc.

des Animaux quadrupèdes. 149





forme de celles de devant à leur extrémité, c'est-à-dire, que le doigt du milieu est aussi plus court que ceux des côtés; elles accompagnent la queue & ont douze à treize pouces de longueur, sur environ dix-sept pouces de largeur lorsque la membrane est entièrement étendue; elles sont grosses & charnues par les côtés, minces dans le milieu & découpées en festons sur les bords, il n'y avoit pas d'ongles apparens sur ces nageoires postérieures; mais ces ongles ne manquoient sans doute que par accident, & parce que cet animal se tourmentoit beaucoup & frottoit fortement ces nageoires de derrière contre le fond de sa caisse; la membrane même de ces nageoires étoit usée par les frottemens & déchirée en plusieurs endroits.

La queue, qui est située entre ces deux nageoires, n'a que quatre pouces de long sur trois de large; elle est de forme presque triangulaire, large à sa naissance, & en pointe arrondie à son extrémité; elle n'est pas fort épaisse & paroît aplatie dans toute son étendue.





**IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)**



**Photographic
Sciences
Corporation**

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

5
4
3
2
1
E 2.8
E 3.2
E 3.6
E 4.0
E 4.5
E 5.0
E 5.6
E 6.3
E 7.1
E 8.0
E 9.0
E 10.0
E 11.2
E 12.5
E 14.0
E 16.0
E 18.0
E 20.0
E 22.5
E 25.0
E 28.0
E 31.5
E 36.0
E 40.0
E 45.0
E 50.0
E 56.0
E 63.0
E 71.0
E 80.0
E 90.0
E 100.0


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Ce grand phoque fut pris le 28 octobre 1777, dans le golfe adriatique près de la côte de Dalmatie, dans la petite île de *Guarnero*, à deux cens milles de Venise; on lui avoit donné plusieurs fois la chasse sans succès, & il avoit déjà échappé cinq ou six fois en rompant les filets des pêcheurs; il étoit connu depuis plus de cinquante ans, au rapport des anciens pêcheurs de cette côte, qui l'avoient souvent poursuivi, & qui croyoient que c'étoit à son grand âge qu'il devoit sa grande taille; & ce qui semble confirmer cette présomption, c'est que ses dents étoient très-jaunes & usées, que son poil étoit plus foncé en couleurs que celui de la plupart des phoques qui nous sont connus, & que ses moustaches étoient longues, blanches & très-rudes.

Cependant quelques autres phoques de la même grandeur ont été pris dans ce même golfe adriatique, ils ont été vus & menés, comme celui-ci, en France & en Allemagne dès l'année 1760. Les conducteurs de ces animaux ayant intérêt de les conserver vivans,

re
28 oc-
riatique
dans la
x cens
donné
ès, & il
fois en
il étoit
ans, au
de cette
oursuivi,
on grand
e; & ce
omption,
aunes &
foncé en
part des
, & que
blanches

phoques
pris dans
ont été
-ci, en
l'année
animaux
vivans,



LE PHOQUE à ventre blanc.

q
p
&
p
p
re
de
av
ch
co
ju
l'ap
no
qu
per
apr
assu
tion
aval
du
N
vatic
baro
dec
sur
paro

des Animaux quadrupèdes. 151

ont trouvé le moyen de les guérir de quelques maladies qui leur surviennent par leur état de gêne & de captivité, & que probablement ils n'éprouvent pas dans leur état de liberté; par exemple lorsqu'ils cessent de manger & refusent le poisson, ils les tirent hors de l'eau, leur font prendre du lait mêlé avec de la thériaque; ils les tiennent chaudement en les enveloppant d'une couverture, & continuent ce traitement jusqu'à ce que l'animal ait repris de l'appétit & qu'il reçoive avec plaisir sa nourriture ordinaire; il arrive souvent que ces animaux refusent tout aliment pendant les cinq ou six premiers jours après avoir été pris, & les pêcheurs assurent qu'on les verroit périr d'inanition si on ne les contraignoit pas à avaler une dose de thériaque avec du lait.

Nous ajouterons ici quelques observations qui ont été faites par M. Sabarot de la Vernière, Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier; sur un grand phoque femelle, qui nous paroît être de la même espèce que le

152 *Supplément à l'Histoire*

mâle dont nous venons de donner la description.

« Cet amphibie, dit-il, parut à Nîmes dans l'automne de l'année 1777 ; il étoit dans un cuvier rempli d'eau, & avoit plus de six pieds de longueur ; sa peau lisse & un peu tigrée affectoit agréablement la vue & le tact ; sa tête plus grosse que celle d'un veau, en avoit à-peu-près la figure, & ses yeux grands, saillans & pleins de feu intéressoient les spectateurs ; son cou très-souple se recourboit assez facilement ; & ses mâchoires armées de dents aiguës & tranchantes, lui donnoient un air redoutable ; on lui voyoit deux trous auditifs sans oreilles externes ; il avoit la gueule d'un rouge-de corail, & portoit une moustache fort grande ; deux nageoires en forme de main tenoient aux côtés du thorax & le corps de l'animal se terminoit en une queue qui étoit accompagnée de deux nageoires latérales, lesquelles lui tenoient lieu de pieds ; ce phoque docile à la voix de son maître, prenoit telle position qu'il lui ordon-

de
noit
care
chan
font
milie
un r
fois d
couch
sec ;
lorsqu
temps
il vive
l'eau ;
die se
& il n
comme
parlé,
page 2
m'appr
que vo
ces an
ment f
rente,
lunaire
artériel
la tuni
marbré

des Animaux quadrupèdes. 133

noit; il s'élevoit hors de l'eau pour le caresser & le lécher; il éteignoit une chandelle du souffle de ses narines qui sont percées d'une petite fente dans le milieu de leur étendue; sa voix étoit un rugissement obscur, mêlé quelquefois de gémissement; son conducteur se couchoit auprès de lui lorsqu'il étoit à sec; l'eau de son cuvier étoit salée, & lorsqu'il s'y plongeoit, il élevoit de temps en temps la tête pour respirer; il vivoit d'anguilles qu'il dévoroit dans l'eau; il mourut à Nîmes, d'une maladie semblable à la morve des chevaux; & il nous parut intérieurement conformé comme le veau-marin, dont vous avez parlé, Monsieur (*tome XI, in-12, page 288*). Voici ce que la dissection m'apprit sur cet animal; le trou ovale que vous dites être toujours ouvert dans ces animaux amphibies, étoit exactement fermé par une membrane transparente, disposée en forme de poche semi-lunaire; je ne pus pas trouver le canal artériel; son estomac étoit très-fort, & la tunique charnue paroissoit comme marbrée; le foie étoit composé de cinq

lobes , ainsi que les reins qui avoient onze pouces de hauteur ; leur substance corticale étoit un amas de corps pentagones vasculieux , liés entr'eux par un tissu cellulaire très-lâche , les quatre tuniques des intestins se séparoient par la macération , & nous vîmes très-bien les membranes cellulaire , charnue , tendineuse & veloutée , ainsi que la disposition spirale entrelacée des trous qui servent de passage aux vaisseaux sanguins qui percent ces tuniques , sans pouvoir être lésés par le resserrement péristaltique : la mauvaise odeur développée par le temps humide , nous empêcha de suivre plus loin la dissection de cet animal , & j'ai l'honneur de de vous offrir , Monsieur , l'estomac entier de ce phoque que j'ai conservé (e). »

Ayant répondu à M. de la Vernière , qu'il me feroit plaisir de m'envoyer cet estomac ou sa description détaillée , & qu'il me paroïssoit probable que le trou

(e) Lettre de M. de Sabarot de la Vernière , Nîmes , le 3 janvier 1780.

des Animaux quadrupèdes. 155

ovale du cœur, qui est ordinairement ouvert dans ces animaux, habitans de la mer & ne s'étoit fermé que par le changement d'habitudes & son séjour dans l'air. M. de la Vernière me fit réponse le 20 janvier 1780 : " Que l'estomac de ce phoque n'avoit point été injecté, & que c'étoit une simple insufflation; ce viscère, dit-il, me paroît contenir quelques grains qui font du bruit par la plus légère agitation & à l'égard de la membrane qui fermoit le trou ovale, elle étoit semilunaire & disposée en forme de poche; le segment, qui terminoit le bord concave du croissant, me parut plus dur; les lames qui formoient cette poche, quoique pellucides, étoient organisées ou tissues de fibres régulières; je ne vis cependant pas de vaisseaux sanguins, elles glissoient l'une sur l'autre par la pression digitale, & paroissoient d'un tissu tendineux. Je ne fais pas si le changement d'habitudes que cet animal avoit contracté, auroit pu former une membrane de cette structure; mais il me suffit, Monsieur, que vous en affirmiez la possibilité pour être

156 *Supplément à l'Histoire*

de votre sentiment. Au reste, M. Montagnon, qui disséqua avec moi ce phoque, assure avoir remarqué qu'il avoit plusieurs inflations dans les voies alimentaires, qui lui parurent être quatre estomacs; je n'ai pas vu cet animal ruminer, ni entendu dire qu'il ruminât. »

M. de la Vernière a apporté à Paris, au mois de novembre dernier 1780, cet estomac: & j'ai reconnu qu'il ne formoit qu'un seul viscère avec des poches ou appendices, & non pas quatre estomacs semblables à ceux des animaux ruminans.

J'ai dit, *volume XIII, page 333*, à la fin de la note, que le grand phoque dont M. Parson a donné la description & la figure dans les *Transactions philosophiques*, n.º 469, pourroit bien être le même que le lion-marin d'Anson. A présent que ce dernier animal est mieux connu & bien désigné par le nom de *phoque à museau ridé*, nous reconnoissons que le grand phoque de M. Parson se rapporte bien mieux à ce phoque à ventre blanc, dont nous venons de faire

la description, quoique ce dernier soit plus petit; mais nous ne sommes pas convaincus de ce que ce savant Médecin paroît avoir observé sur la structure intérieure de cet animal, & particulièrement sur celle de son estomac. M. Parson m'écrivit, il y a plusieurs années, que ce phoque qu'il a décrit dans les Transactions philosophiques, est très-réellement, par sa structure intérieure, aussi différent des autres phoques, qu'une vache l'est d'un cheval; & il ajoutoit qu'il a non-seulement disséqué ce grand phoque, mais deux petits phoques d'espèces différentes, & qu'il avoit trouvé que ces deux petits phoques différoient aussi entr'eux par la conformation des parties intérieures, l'un de ces petits phoques ayant deux estomacs & l'autre n'en ayant qu'un; il me marquoit encore, dans cette lettre, que les espèces de ce genre sont fort nombreuses; que le grand phoque qu'il a disséqué avoit une large poche (*marsupium*) remplie de poissons, & une autre poche qui communiquoit à celle-ci, laquelle étoit pleine de petites pierres anguleuses, & de plus

deux autres poches plus petites qui contenoient de la matière blanche & fluide qui passoit dans le *duodenum*, & que certainement ce grand phoque étoit, à tous égards, un animal ruminant (f). Quoique M. Parson fût un Médecin célèbre, & qu'il ait même publié de bons Ouvrages de physique, nous avons toujours douté des faits qu'on vient de lire; ne pouvant croire sur son seul témoignage, qu'aucun animal du genre des phoques soit ruminant, ni que leurs estomacs soient conformés comme ceux de la vache; il paroît seulement que dans quelques-uns de ces animaux, tels que celui dont M. de la Vernière a fait la dissection, l'estomac est divisé, comme en plusieurs poches, par différens étranglemens, mais cela n'est pas suffisant pour faire mettre les phoques au nombre des animaux ruminans; d'ailleurs ils ne vivent que de poissons, & l'on fait que tous les animaux, qui ne se nour-

(f) Lettre de M. Parson à M. de Buffon
Londres, 10 mai 1765.



LE PROQUE de M. Parson.

qui
he &
m, &
étoit,
nt (f).
édecin
lié de
avons
ent de
cul té-
genre
e leurs
e. ceux
nt que
ux, tels
e a fait
comme
étran-
suffisant
i nom-
ailleurs
& Pon-
se nour-

Buffon

de

riffe
ainfi
dem
pho
rum
phil
l'au

A
figu
de
imp
des
que
de n

XLI
no H
que
le m
bien
de

XIX
rum
capit
Dicit

rissent que de proie, ne ruminent pas; ainsi, on peut donc présumer avec fondement que les animaux du genre des phoques, n'ont pas plus la faculté de ruminer que les loutres & autres amphibies qui vivent sur la terre & dans l'eau.

Au reste, nous avons fait copier la figure (*planche XLV*) de ce phoque de M. Parson, quoiqu'elle soit assez imparfaitement rendue dans la planche des *Transactions philosophiques*, afin que l'on puisse le comparer avec celle de notre phoque à ventre blanc (*planche XLIV*).

Il me paroît aussi que le grand phoque dont parle M. Crantz (*g*), sous le nom d'*urkfuk* ou *urksuk* (*h*), pourroit bien être de la même espèce que celui de M. Parson, quoiqu'il soit encore

(*g*) *Histoire générale des Voyages*, tome

XIX. (*h*) *Urksuk species phocarum majoris molis, quarum pellibus Groenlandi utuntur ad contexendos funes captura balenarum et phocarum inservientes.* Egede. *Dict. Groënl. Copenhagen, 1750.*

plus grand, puisque M. Crantz dit qu'il se trouve de ces phoques utluk qui ont jusqu'à douze pieds de longueur & qui pèsent huit cens livres.

Le grand phoque dont parle le P. Charlevoix (i), & qu'il dit se trouver sur les côtes de l'Acadie, pourroit bien être encore de la même espèce de celui-ci; cependant il observe que ces phoques de l'Acadie ont le nez plus pointu que les autres, & il ajoute, d'après Denys, qu'ils sont si gros, « que leurs petits ont plus de volume de corps que nos plus grands porcs; que, peu de temps après qu'ils sont nés, le père & la mère les amènent à l'eau, & de temps en temps les ramènent à terre pour leur donner à têter; que la pêche s'en fait au mois de février, pour avoir les petits, qui, dans ce temps, ne vont point à l'eau; qu'au premier bruit les pères & mères prennent la fuite en jetant des cris pour avertir les petits de les suivre; mais qu'on en tue un grand nom-

(i) Description de la nouvelle France, t. III, page 143 & suiv.

des Animaux quadrupèdes. 161

bre avant qu'ils puissent se jeter dans la mer (k). »

J'avoue que ces indications ne sont pas assez précises pour qu'on puisse prononcer sur l'identité ou la diversité de ces espèces de phoques dont nous venons de parler; nous ne les rapportons ici que pour servir de renseignement aux Voyageurs qui se trouveront à portée de les reconnoître, & qui pourront nous mieux instruire.

(k) Description de la nouvelle France, t. III, page 143 & suiv.



LE PHOQUE A CAPUCHON.*Troisième espèce.*

LA TROISIÈME ESPÈCE de grand Phoque , est celle que les Groënlandois nomment *neitser-soak* (1) ; cet animal a pour attribut distinctif, un capuchon de peau dans lequel il peut renfoncer sa tête jusqu'aux yeux. Les Danois & les Allemands l'ont appelé *klap-mûtze*, ce qui signifie bonnet rabattu. Ce phoque, dit M. Crantz (m), est remarquable par la laine noire qui revêt la peau sous un poil blanc, ce qui le fait paroître d'une assez belle couleur grise ; mais le caractère qui le distingue des autres phoques, est ce capuchon d'une peau épaisse & velue qu'il a sur le front, & qu'on ap-

(1) *Phoca majoris generis, cujus caput cute crassiori mobili tegitur, quâ faciem contra ictus tuetur. Egede, ubi supra.*

(m) *Histoire générale des Voyages, t. XIX, page 61.*

des Animaux quadrupèdes. 163

pelle *cache-museau*, parce que l'animal a la faculté d'abattre cette peau sur ses yeux, pour se garantir des tourbillons de sable & de neige que le vent chasse trop impétueusement.

Ces phoques font régulièrement deux voyages par an; ils sont fort nombreux au détroit de Davis, & y résident depuis le mois de septembre jusqu'au mois de mars; ils en sortent alors pour aller faire leurs petits à terre, & reviennent avec eux au mois de juin fort maigres & fort épuisés; ils en partent une seconde fois en juillet, pour aller plus au Nord, où ils trouvent probablement une nourriture plus abondante, car ils reviennent fort gras en septembre; leur maigreur, dans les mois de mai & juin, semble indiquer que c'est alors la saison de leurs amours, & que, dans ce temps, ils oublient de manger, & jeûnent comme les lions & les ours-marins.



cute cras-
tus tuetur.

t. XIX,

LE PHOQUE A CROISSANT:*Quatrième espèce.*

LA QUATRIÈME ESPÈCE de grand Phoque sans oreilles externes, est appelée *attarsoak* (n) par les Groënlandois ; il diffère du précédent par quelques caractères, & change de nom dans cette langue à mesure que son poil prend de teintes différentes ; le fœtus, qui est tout blanc & couvert d'un poil laineux, se nomme *iblau* ; dans la première année d'âge, le poil est un peu moins blanc, & l'animal s'appelle *attarak* ; il devient gris dans la seconde année, & il porte le nom d'*atteisfiak* ; il varie encore plus dans la troisième, & on l'appelle *aglektok* ; il est tacheté dans la quatrième, ce qui lui fait donner le nom de *milektok* ; & ce n'est qu'à la cinquième année que le

(n) *Phoca nigri lateris*. Egede, Dict. Groënland. Copenhagen, 1750.

d
poi
fur
poi
dan
d'at
por
les
du
anim
L

(o
ou de
doise
cufari
troup
sursac
nulloar
leur,
ou s'e
nomm
sous l
pirer,
est ip
pour
chasse
course
tirée
Bexon

des Animaux quadrupèdes. 165

poil est d'un beau gris-blanc, & qu'il a sur le dos deux croissans noirs, dont les pointes se regardent; ce phoque est alors dans toute sa force, & il prend le nom d'*attarsoak* (o). J'ai cru devoir rapporter tous ces différens noms, pour que les Voyageurs qui fréquenteront les côtes du Groënland, puissent reconnoître ces animaux.

La peau de ce phoque à croissant, est

(o) Outre ces noms, qui désignent des espèces ou des variétés du phoque, la langue Groënlandoise en a d'autres qui ont rapport à plusieurs particularités de l'histoire de ces animaux; *amiam*, est le troupeau des phoques; le phoque se jouant à la surface de l'eau & nageant à la renverse, se dit *nulloarpok*; flottant sur l'eau, assoupi par la chaleur, il s'appelle *terlikpok*; couché sur les glaces ou s'efforçant de sortir par leurs fentes, il se nomme *outok*; le trou que le phoque, enfermé sous la glace, y ouvre avec ses ongles pour respirer, est *aglo*; le javelot court dont on le frappe, est *iperak*; & l'homme qui rampe sur le ventre pour les atteindre, *aurnarpok*; *outtulliarok* est le chasseur dans sa nacelle, qui les poursuit à grande course; leur peau dépilée s'appelle *erisak*; l'huile tirée de leur graisse, *igunak*. Recueilli par M. l'abbé Bexon, de la lecture du Dictionnaire Groënlandois.

revêtue d'un poil roide & fort; son corps est couvert d'une graisse épaisse & dont on tire une huile qui, pour le goût, l'odeur & la couleur, ressemble assez à de la vieille huile d'olive (p).

Au reste, il me paroît que c'est à cet animal qu'on peut rapporter la troisième espèce de phoque indiquée par M. Kracheninnikow (q), qui porte, dit-il, de grands cercles couleur de cerise sur une fourrure jaunâtre, & qui se trouve dans la mer orientale. M. Pallas (r) rapporte aussi à cette espèce un phoque que l'on prend quelquefois aux embouchures du Lena, de l'Obi & du Jeniscé, & que les Russes appellent *lièvre de mer* (*morskoizæitx*), à cause de sa blancheur, les lièvres étant tous blancs dans ce pays pendant l'hiver. Si ce dernier animal est en effet

(p) Histoire générale des Voyages, t. XIX, page 61.

(q) Idem, ibidem, page 256.

(r) Voyage de Pallas, troisième partie, p. 91.

de
le n
&
on
dans
rons
côte
scha
pho
teint
roit
grés
geurs
anim
à cr
(f);

(f)
(Histo
il par
aussi d
l'Améri
ont le
font to
à mesu
noirs,
toutes
comme
nous v
nous c

des Animaux quadrupèdes. 167

le même que l'*attarsoak* de M. Crantz ; & que celui de M. Kracheninnikow , on voit qu'il se trouve non-seulement dans le détroit de Davis & aux environs du Groënland , mais encore sur les côtes de la Sibérie & jusqu'au Kamtschatka. Au reste, comme le poil de ce phoque à croissant, prend différentes teintes de couleur avec l'âge, il se pourroit que les phoques gris, tachetés, tigrés & cerclés, dont parlent les Voyageurs du Nord, ne fussent que les mêmes animaux, & tous de l'espèce du phoque à croissant vu dans des âges différens (f) ; & , dans ce cas, nous serions fondés

(f) A en juger par ce que dit Charlevoix (*Histoire de la nouvelle France, tome III, p. 143*), il paroît que ce phoque à croissant se trouve aussi dans les mers près des côtes orientales de l'Amérique septentrionale. « Ces animaux, dit-il, ont le poil de diverses couleurs ; il y en a qui sont tous blancs, & tous le sont en naissant ; à mesure qu'ils vieillissent, les uns deviennent noirs, d'autres roux, & d'autres prennent toutes ces couleurs ensemble. » Ce passage, comme l'on voit, se rapporte assez à ce que nous venons de dire du phoque à croissant, & nous croyons devoir le lui appliquer.

à lui rapporter encore une autre espèce de phoque qui, selon M. Kracheninnikow, a le ventre blanc-jaunâtre; le reste de la peau parsemée de taches comme celles du léopard, & dont les petits sont blancs comme de la neige lorsqu'ils viennent de naître.



LE PHOQUE

des

LE

LA
sans c
soak
petit
mêlé
celles
variée
est hé
rin (e)

(e)
in&a (C
confecta
memorata
joribus a
catulus g
Copenhag

Supp

LE PHOQUE NEIT-SOAK.

Cinquième espèce.

LA CINQUIÈME ESPÈCE de Phoque sans oreilles externes, est appelée *neit-soak* par les Groënlandois; il est plus petit que les précédens; son poil est mêlé de soies brunes & aussi rudes que celles du cochon; la couleur en est variée par de grandes taches, & il est hérissé comme celui de l'ours-marin (t).

(t) *Phoca majoris generis, maculis majoribus distincta* (item *veitis hirsuta è pellibus phocarum confecta*) *neitsik-fiak*. — *Phoca minor speciei supra memoratæ, atak*. — *Species phocæ cum maculis majoribus ateit fiak, minor ejusdem speciei, atarak; catulus generis superioris, atestak*. Diction. Groënl. Copenhague, 1750.



LE PHOQUE LAKTAK
DE KAMTSCHATKA.

Sixième espèce.

LA SIXIÈME ESPÈCE est celle que les habitans de Kamtschatka appellent *laktak* (*u*); elle ne se prend qu'au-delà du cinquante-sixième degré de latitude, soit dans la mer de Pengina, soit dans l'océan oriental, & paroît être une des plus grandes du genre des phoques.

(*u*) Kracheninnikow ; Histoire générale des Voyages, tome XIX, page 260.



LE PHOQUE GASSIGIAK.

Septième espèce.

LA SEPTIÈME ESPÈCE de phoques sans oreilles externes, est appelée *kassigiak* par les Groënlandois; la peau des jeunes est noir sur le dos & blanche sous le ventre, & celle des vieux est ordinairement tigrée. Cette espèce n'est pas voyageuse & se trouve toute l'année à *Balsriver*.



LE PHOQUE COMMUN.*Huitième espèce.*

LA HUITIÈME ESPÈCE est celle du Pho- que commun d'Europe (*x*), dont nous avons donné la description & la figure (*volume XIII, planche XLV*), & que l'on nomme assez indifféremment *veau- marin, loup-marin & chien-marin*; on donne aussi ces mêmes noms à quel- ques-uns des autres phoques dont nous venons de parler. Cette espèce se trouve non-seulement dans la mer Baltique & dans tout l'Océan, depuis le Groënland jusqu'aux îles Canaries & au cap de Bonne-espérance, mais encore dans la Méditerranée & dans la mer noire.

(*x*) Les mariniers françois l'appellent *veau- marin* ou *loup-marin*; les Anglois *common seal*, c'est-à-dire, *phoque commun*; les Espagnols & les Por- tugais *lobo de mer*. Note communiquée par M. Forster; mais ces noms de veau & de loup- marin, ont été également appliqués à tous les phoques,

des

M. H
difer
Casp
l'eau
que
en
que
ment
égale
douce
Nous
la fig
avons
roit
espèc
quelq
du co
avec
che x

Le
de p
trouv
P. Du
ces p
beau

(y)

des Animaux quadrupèdes. 173

M. Kracheninnikow & M. Pallas (y), disent qu'il y en a même dans la mer Caspienne & dans le lac Baikal, où l'eau est douce & non salée; ainsi que dans les lacs Onéga & Ladoga en Russie; ce qui semble prouver que cette espèce est presque universellement répandue, & qu'elle peut vivre également dans la mer & dans les eaux douces des climats froids & tempérés. Nous donnons ici (*planche XLVI*), la figure d'un de ces phoques que nous avons fait dessiner vivant, & qui pourroit bien être une variété dans cette espèce du phoque commun, n'ayant que quelques légères différences dans la forme du corps & dans les couleurs du poil, avec le phoque du *volume XIII*, *planche XLV*.

Le voyageur Denis parle d'une espèce de phoque, de taille moyenne, qui se trouve sur les côtes de l'Acadie; & le P. Dutertre rapporte, d'après lui, que ces petits phoques ne s'éloignent jamais beaucoup du rivage. « Lorsqu'ils sont


(y) Voyage de Pallas, *tome III.*

174 *Supplément à l'Histoire*

sur la terre, il y en a toujours quel-
 qu'un, dit il, qui fait sentinelle: au pre-
 mier signal qu'il donne tous se jettent
 dans la mer: au bout de quelques temps,
 ils se rapprochent de terre & s'élèvent
 sur leurs pattes de derrière pour voir
 s'il n'y a rien à craindre; mais, malgré
 cela, on en prend un très-grand nom-
 bre à terre, & il n'est presque pas pos-
 sible de les avoir autrement . . . Mais,
 quand ces phoques entrent avec la
 marée dans les anses, il est aisé de les
 prendre en très-grande quantité; on en
 ferme l'entrée avec des filets & des pieux,
 on n'y laisse de libre qu'un fort petit
 espace par où ces phoques se glissent
 dès que la marée est haute; on bouche
 cette ouverture dès que la mer est
 retirée, & ces animaux étant restés à
 sec on n'a que la peine de les assom-
 mer; on les suit en canot dans les en-
 droits où il y en a beaucoup, & quand
 ils mettent la tête hors de l'eau pour
 respirer on tire dessus; s'ils ne sont que
 blessés, on les prend sans peine, mais
 s'ils sont tués roides, ils vont d'abord
 au fond, où de gros chiens dressés



quel-
pre-
tentent
mps,
èvent
voir
malgré
nom-
s pos-
Mais,
ec la
de les
on en
vieux,
petit
glissent
ouche
er est
stés à
ssom-
es en-
quand
pour
nt que
mais
abord
dressés



Variété du PHOQUE COMMUN.



des
pour
à sep
(2).

Ces
dont
cation
aux e
triona
l'Asie
lion-n
phoqu
lemen
phère
du ph
que à
Russes
sous l
(a); i

(2)
pages
(a)
rins, &
du Can
agitent

des Animaux quadrupèdes. 175

pour cette chasse, vont les pêcher à sept ou huit brasses de profondeur (2). »

Ces huit ou neuf espèces de phoques, dont nous venons de donner les indications, se trouvent pour la plupart aux environs des terres les plus septentrionales dans les mers de l'Europe, de l'Asie & de l'Amérique, tandis que le lion-marin, l'ours-marin & même le phoque à museau ridé se trouvent également répandus dans les deux hémisphères. Tous ces animaux, à l'exception du phoque à museau ridé & du phoque à ventre blanc, sont connus par les Russes & autres peuples septentrionaux, sous les noms de *chien* & de *veau-marin* (a); il en est de même au Kamtschatka,

(2) Description de la nouvelle France, t. III, pages 143 & suiv.

(a) Les François les appellent aussi *veaux-marins*, & quelquefois *loups-marins*; & les pêcheurs du Canada nomment les uns *brasseurs*, parce qu'ils agitent l'eau & la font tournoyer; les autres *nan*,

176 *Supplément à l'Histoire*

aux îles Kouriles & chez les Koriaques; où on les appelle *kolkha*, *betarkar* & *memel*, ce qui signifie également veau-marin dans les trois Langues; « Ils ont tous la peau ferme & velue comme les quadrupèdes terrestres, à cela près, dit M. Crantz, que le poil est épais, court & lisse dans la plupart, comme s'il étoit huilé. Ces animaux ont les deux pieds de devant formés pour marcher, & ceux de derrière pour nager; à chaque pied il y a cinq doigts, avec quatre jointures à chacun, armés d'ongles pour grimper sur les rochers ou se cramponner sur la glace; leurs pieds de derrière ont les doigts joints en patte-d'oie, de sorte qu'en nageant ils se déploient comme un éventail; ce sont des espèces d'amphibies, la mer est leur élément & le poisson leur nourriture;

& ils ont donné à un autre le nom de *grosse tête*; mais il ne faut pas les confondre avec l'ours de mer, que plusieurs Voyageurs ont appelé *veau* & *loup-marin*, quoiqu'il en diffère essentiellement par les oreilles, qui sont saillantes & externes.

d
ils
ron
est
des
lanc
vîte
les
char
com
corp
cône
aide

C
la gl
& qu
elles
plus
aller
suite
exerc
faire

(b)
pages
(c)
Franc

des Animaux quadrupèdes. 177

ils vont dormir à terre, & même ils ronflent si profondément au soleil, qu'il est aisé de les surprendre; ils courent des pieds de devant & sautent ou s'élancent avec ceux de derrière, mais si vite, qu'un homme a de la peine à les attraper; ils ont des dents tranchantes & des poils au museau, forts comme des soies de sanglier... leurs corps est gros au milieu & terminé en cône par les deux extrémités, ce qui les aide beaucoup à nager (b). »

C'est sur les rochers & quelquefois sur la glace que ces animaux s'accouplent, & que les mères font leurs petits (c); elles les allaitent dans l'eau, mais bien plus souvent à terre; elles les laissent aller de temps en temps à la mer, ensuite elles les ramènent à terre, & les exercent ainsi jusqu'à ce qu'ils puissent faire, en nageant, de plus longs voyages.

(b) Histoire générale des Voyages, tome XIX pages 60 & 61.

(c) Charlevoix; Description de la nouvelle France, tome III, pages 143 & suivantes.

Non-seulement ces animaux fournissent aux Groënlandois le vêtement & la nourriture (d), mais leurs peaux sont encore employées à couvrir leurs tentes & leurs canots; ils en tirent aussi de l'huile pour leurs lampes, & se servent des nerfs & des fibres tendineuses pour coudre leurs vêtemens; les boyaux bien nettoyés & amincis, sont employés au lieu de verre pour leurs fenêtres; & la vessie de ces animaux leur sert de vase pour contenir leur huile; ils en font sécher la chair pour la conserver pendant le temps qu'ils ne peuvent ni chasser ni pêcher: en un mot, les

(d) Les Russes & les habitans de Kamtschatka tirent aussi un très-grand parti de la chasse des phoques; ils font de la chandelle de leur graisse, que les naturels du pays préfèrent à toute autre graisse pour assaisonner leurs alimens; ils en mangent aussi la chair, & la font sécher au soleil, pour la conserver pendant les temps où ils ne peuvent pêcher; on fait avec leurs peaux des semelles de souliers, & les *Korelli*, les *Olutores*, & les *Tschukotskoi* en font des bateaux. *Histoire de Kamtschatka*, par M. Kracheninnikow, tome 1, page 277.

des
phoq
Groën
qu'ils
chasse
réussi
gloire
comb
M
anima
mont
en si
îles é
mer,
ral, il
trente
cepté
lorsqu
pour
rissent
des q
verfan
elles r
petit,

(e)
page 25

des Animaux quadrupèdes. 179

phoques font la principale ressource les Groënlandois, & c'est par cette raison qu'ils s'exercent de bonne-heure à la chasse de ces animaux, & que celui qui réussit le mieux, acquiert autant de gloire que s'il s'étoit distingué dans un combat.

M. Kracheninnikow, qui a vu ces animaux au Kamtschatka, dit qu'ils remontent quelquefois dans les rivières en si grand nombre, que les petites îles éparfes ou voisines des côtes de la mer, en sont couvertes (e): en général, ils ne s'éloignent guère qu'à vingt ou trente lieues des côtes ou des îles; excepté dans le temps de leurs voyages, lorsqu'ils remontent les rivières, c'est pour suivre le poisson dont ils se nourrissent; ils s'accouplent différemment des quadrupèdes, les femelles se renversant sur le dos pour recevoir le mâle; elles ne produisent ordinairement qu'un petit, ainsi que nous l'avons déjà dit,

(e) Histoire générale des Voyages, tome XIX, page 256.

dans les grandes espèces, & deux dans les petites; la voix de tous ces animaux, selon Kracheninnikow, est fort désagréable; les jeunes ont un cri plaintif & tous ne cessent de grogner ou murmurer d'un ton rauque; ils sont dangereux dès qu'on les a blessés: ils se défendent alors avec une sorte de fureur, lors même qu'ils ont le crâne brisé en plusieurs pièces (f).

On voit, par tout ce que nous venons d'exposer, que non-seulement ce genre des phoques est assez nombreux en espèces, mais que chaque espèce est aussi très-nombreuse en individus, si l'on en juge par la quantité de ceux que les Voyageurs ont trouvés rassemblés sur les

(f) Ils sont, dit M. Kracheninnikow, vifs & courageux; j'en ai vu un qui, s'étant pris à l'hameçon dans l'embouchure de la grande rivière, s'élança sur nos gens avec beaucoup de férocité, après même qu'ils lui eurent brisé le crâne; on ne l'eut pas plutôt tiré à terre, qu'il essaya de se jeter dans la rivière, &, lorsqu'il vit que la chose lui étoit impossible, il commença à pleurer, & plus on le frappoit, plus il étoit féroce. *Histoire du Kamtschatka, tome I, page 275.*

des
terres
extré
tes d
asyle
fui le
plus
réelle
troupe
Ancie
& qu
terran
peu l'
se tro
nos cé
puisse
dont l
ils son
berté
sociale
les me
zones

des Animaux quadrupèdes. 181

terres nouvellement découvertes & aux extrémités des deux continens ; ces côtes désertes sont en effet le dernier asyle de ces peuplades marines qui ont fui les terres habitées, & ne paroissent plus que dispersées dans nos mers. Et réellement ces phoques en bandes, ces *troupeaux du vieux Prothée*, que les Anciens nous ont si souvent peints, & qu'ils doivent avoir vus sur la Méditerranée, puisqu'ils connoissoient très-peu l'Océan, ont presque disparu & ne se trouvent plus que dispersés près de nos côtes, où il n'est plus de désert qui puisse leur offrir la paix & la sécurité dont leurs grandes sociétés ont besoin ; ils sont allés chercher ailleurs cette liberté qui est nécessaire à toute réunion sociale, & ne l'ont trouvée que dans les mers peu fréquentées, & sous les zones froides des deux pôles.



dans
naux,
agréa-
atif &
urmur-
gereux
ndent
, lors
n plu-
us ve-
ent ce
breux
èce est
si l'on
ue les
sur les

vifs &
pris à
rivière,
rocité,
ne ; ou
aya de
que la
leurer,
Histoires

L'OURS-MARIN. (a)

TOUS LES PHOQUES dont nous venons de parler, n'ont que des trous auditifs & point d'oreilles externes; & l'ours-marin n'est pas le plus grand des phoques à oreilles, mais c'est celui dont l'espèce est la plus nombreuse & la plus répandue (b); c'est un animal tout différent de l'ours de mer blanc, dont nous avons parlé ci-devant, & *volume III* de

(a) *Phoca ursina*. Linnæus. — *Ursine seal*. Pen-
nant, *Synopsf. quadrup.* page 271. — Il est appelé
kot par les Russes; *phoque ursin*, par M. Forster;
phoque commun, par plusieurs Voyageurs; *chat-*
marin, par M. Kracheninnikow; *loup de mer*, par
les François; & *veau-marin*, par les Anglois.

(b) On l'a reconnu à l'île de Juan Fernandès,
située à 36 degrés de latitude australe, à l'île
Saint-Pierre, à celle de Sandwich, nouvellement
découverte, à la côte des Patagons, aux îles
Malouines, à la terre des États, à la nouvelle
Hollande, à la nouvelle Guinée, aux îles Gala-
pagos, situées presque sous l'Équateur; & enfin,
depuis le cap Horn, tout le long des côtes de
l'Amérique, & jusqu'à Kamtschatka.

des
nos fu
est un
terrest
ici, et
mille
vu pl
Voyag
en a d
me do
a grav
comme
sur leu
observ
& de
front
assez e
présen
tres pl
L'ef
trouve
Voyag
ces an
& sou
quante
misphe
en ait
sous le

des Animaux quadrupèdes. 183

nos supplémens, page 200; ce dernier est un quadrupède du genre de l'ours terrestre, & l'ours-marin dont il s'agit ici, est un véritable amphibie de la famille des phoques. M. Forster, qui a vu plusieurs de ces animaux dans son Voyage avec le capitaine Cook, & qui en a dessiné quelques-uns, a bien voulu me donner le dessin d'après lequel on a gravé la planche XLVII; il m'a aussi communiqué plusieurs faits historiques sur leurs habitudes naturelles, & ses observations réunies à celles de M. Steller & de quelques autres Voyageurs, suffiront pour donner une connoissance assez exacte de cet animal, qui jusqu'à présent avoit été confondu avec les autres phoques.

L'espèce de l'ours-marin paroît se trouver dans tous les océans; car les Voyageurs ont rencontré & reconnu ces animaux dans les mers de l'Équateur, & sous toutes les latitudes jusqu'au cinquante-sixième degré dans les deux hémisphères. Dampier est le premier qui en ait parlé, & qui les ait indiqués sous le nom d'*ours-marin*; quelques au-

tres Navigateurs l'ont appelé *phoque commun*, parce qu'on le trouve en effet très-communément dans toutes les mers australes ou boréales; mais nous devons observer que ce nom lui a été mal appliqué, puisqu'il appartient spécifiquement au phoque commun qui se trouve sur nos côtes d'Europe, qui n'est pas à beaucoup près aussi grand & qui de plus n'a point d'oreilles extérieures.

De tous les animaux de ce genre, l'ours-marin paroît être celui qui fait les plus grands voyages; son tempérament n'est pas soumis ou s'accommode à l'influence de tous les climats; on le trouve dans toutes les mers & autour des îles peu fréquentées; on le rencontre en troupes nombreuses dans la mer de Kamtschatka, & sur les îles inhabitées qui sont entre l'Asie & l'Amérique. M. Steller a eu le temps de l'observer à l'île de Bering (c), après son mal-

(c) Il y a une si grande quantité de ces animaux dans l'île de Bering, qu'ils couvrent tout

des

heureux
ces ani
les côtes
revient
mencer
l'autom
du dép
les fem
& il pa
ces ani
qu'ils
pour f
& se li

le rivage
à quitter
montagn
trouve c
à-vis Ka
c'est la
allant du
Kamtsch
tome I,

(d)

ces anim
individu
réunie f
nageant

des Animaux quadrupèdes. 185

heureux naufrage ; il nous apprend que ces animaux quittent au mois de juin les côtes de Kamtschatka , & qu'ils y reviennent à la fin d'août ou au commencement de septembre pour y passer l'automne & l'hiver (d). Dans le temps du départ, c'est-à-dire au mois de juin, les femelles sont prêtes à mettre bas, & il paroît que l'objet du voyage de ces animaux, est de s'éloigner le plus qu'ils peuvent de toute terre habitée pour faire tranquillement leurs petits, & se livrer ensuite sans trouble aux plai-

le rivage ; ce qui oblige souvent les Voyageurs à quitter la plaine , & à gravir les rochers & les montagnes. Il est bon d'observer qu'on n'en trouve que sur la côte méridionale, qui est vis-à-vis Kamtschatka ; la raison en est peut-être, que c'est la première terre qu'ils rencontrent en allant du cap Kronotzkoi vers l'orient. *Hist. du Kamtschatka* , par Kracheninnikow ; Lyon , 1767 , tome 1 , page 307.

(d) M. Steller dit qu'une seule famille de ces animaux est souvent composée de cent vingt individus ; que non-seulement cette famille est réunie sur le rivage , mais qu'elle l'est encore en nageant dans la mer.

firs de l'amour, car les femelles entrent en chaleur un mois après qu'elles ont mis bas; tous reviennent fort maigres au mois d'aôût; ceux que M. Steller a disséqués dans cette saison, n'avoient rien dans l'estomac ni dans les intestins, & il présume qu'ils ne mangent que peu ou point du tout tant que durent leurs amours; cette saison de plaisirs est en même temps celle des combats, les mâles se battent avec fureur pour maintenir leur famille & en conserver la propriété; car, lorsqu'un ours-marin mâle vient pour enlever à un autre ses filles adultes ou ses femmes, ou qu'il veut le chasser de sa place, le combat est sanglant & ne se termine ordinairement que par la mort de l'un des deux.

Chaque mâle a communément huit à dix femelles & quelquefois quinze ou vingt; il en est fort jaloux & les garde avec grand soin; il se tient ordinairement à la tête de toute sa famille qui est composée de ses femelles & de leurs petits de deux sexes; chaque famille se tient séparée, & quoique ces animaux

soient p
droits,
& chac
la tête
les régi
quelque
mille ar
de ceux
guerre
queur s
vaincus

Ces
des aut
dant ils
marin,
approch
blis s'it

(e) de
de la ter
de mer,
se tenoie
tres, &
entr'eux.
tome IV
mer occu
les ours
Ibid. page

des Animaux quadrupèdes. 187

soient par milliers dans de certains endroits, les familles ne se mêlent jamais, & chacune forme une petite troupe, à la tête de laquelle est le chef mâle qui les régit en maître; cependant il arrive quelquefois que le chef d'une autre famille arrive au combat pour protéger un de ceux qui sont aux prises, & alors la guerre devient plus générale, & le vainqueur s'empare de toute la famille des vaincus qu'il réunit à la sienne.

Ces ours-marins ne craignent aucun des autres animaux de la mer, cependant ils paroissent fléchir devant le lion-marin, car ils l'évitent avec soin & ne s'en approchent jamais quoique souvent établis sur le même terrain (e); mais ils

(e) « Nous observâmes (sur une petite île près de la terre des États, que les ours & les lions « de mer, quoique campés sur la même grève, « se tenoient toujours fort loin les uns des au- « tres, & qu'ils ne se communiquoient point « entr'eux. » Forster. *Second Voyage de Cook*, tome IV, pages 55 & suivantes. « Les lions de mer occupent la plus grande partie de la côte; « les ours de mer habitent l'intérieur de l'île. » *Ibid.* page 73.

des Animaux quadrupèdes. 189

c'est toujours à regret qu'ils punissent leurs femelles ou leurs petits (*f*); le mâle semble être en même temps un bon père de famille & un chef de troupe impérieux, & jaloux de conserver son autorité, & qui ne permet pas qu'on lui manque.

Les jeunes mâles vivent pendant quelque temps dans le sein de la famille, & la quittent lorsqu'ils sont adultes & assez forts pour se mettre à la tête de quelques femelles dont ils se font suivre, & cette petite troupe devient bientôt une famille plus nombreuse; tant que la vigueur de l'âge dure & qu'ils sont en état de jouir de leurs femelles, ils les régissent en maîtres & ne les quittent pas; mais lorsque la vieillesse a diminué leurs forces & amorti leurs desirs, ils les abandonnent & se reti-

(*f*) M. Steller dit que ces animaux maltraitent leur famille pour le moindre manquement, mais qu'il suffit à la femelle ou à un petit, lorsqu'ils ont déplu, de venir caresser le mâle, en lui léchant les pieds, pour désarmer sa colère.

rent pour vivre solitaires; l'ennui ou le regret semble les rendre plus féroces, car ces vieux mâles retirés ne témoignent aucune crainte, & ne fuient pas comme les autres à l'aspect de l'homme (g); ils grondent en montrant les dents,

(g) « Les vieux mâles, dit Kracheninnikow, »
 » dorment quelquefois un mois entier, sans
 » prendre de nourriture, ils sont très-féroces,
 » & attaquent les passans, & ils sont si obstinés,
 » qu'ils aiment mieux se faire tuer que de quit-
 » ter leur place, lorsqu'ils voient venir un
 » homme, quelques-uns se jettent sur lui, &
 » les autres se tiennent prêts pour les défendre;
 » ils mordent les pierres qu'on leur jette, &
 » courent sur celui qui les a jetés, encore qu'on
 » leur casse les dents & qu'on leur crève les
 » yeux; ils ne bougent pas de l'endroit où ils
 » sont. Il y a plus, aucun n'oseroit abandonner
 » son poste, &, s'il le faisoit, les autres le
 » dévoreroient; si quelqu'un fait mine de vou-
 » loir se retirer, les autres le serrent de près
 » pour empêcher qu'il ne s'enfuit; &, si quel-
 » qu'un se méfie du courage de son camarade,
 » ou le soupçonne de s'enfuir, il se jette sur
 » lui. » *Histoire de Kamtschatka, tome I, page 299.*
 » Nous eûmes aussi beaucoup de peine à tuer
 » les veaux & les lions-marins (sur une petite
 » île, près de la terre des États); leur museau

& se jette
celui qui

étoit la p
quames, l
attaqués p
sur un roc
taines de r
dre l'issue
son cou d
ramasser,
tra les den
mon cama
l'animal r
au même
champion
plusieurs s
sautèrent à
laire sur
ne se firent
peau est t
élastique,
Forster. Se
« Cet am
tant de fo
d'une dem
la présenc
fait pas fu
sa colère;
course. »
ont servi d
orientales,

des Animaux quadrupèdes. 191

& se jettent même avec audace contre celui qui les attaque sans jamais reculer

étoit la partie la plus sensible. Nous man-
quames, le docteur Sparrman & moi, d'être
attaqués par un des plus vieux ours de mer,
sur un rocher où il y en avoit plusieurs cen-
taines de rassemblés, qui sembloient tous atten-
dre l'issue du combat ; le docteur avoit tiré
son cou de fusil sur un oiseau, & il alloit le
ramasser, lorsque le vieux ours gronda & mon-
tra les dents, & parut se disposer à s'opposer à
mon camarade ; dès que je fus assis, j'étendis
l'animal roide mort d'un coup de fusil, &
au même instant toute la troupe, voyant son
champion terrassé s'enfuit du côté de la mer ;
plusieurs s'y jetèrent avec tant de hâte, qu'ils
sautèrent à dix ou quinze verges perpendicu-
laires sur des rochers pointus ; je crois qu'ils
ne se firent point de mal, parce que leur
peau est très-dure, & que leur graisse, très-
élastique, se prête aisément à la compression. »
Forster. *Second Voyage de Cook, tome IV, p. 60.*
« Cet amphibie paroît affreux, & mord avec
tant de force, qu'il peut trancher la hampe
d'une demi-pique, ainsi qu'on l'éprouva, &
la présence de deux ou trois hommes ne le
fait pas fuir ; il ose même les attaquer dans
sa colère, quand il peut les joindre à la
course. » G. Spilbert. *Recueil des Voyages qui
ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes
orientales, tome II, page 438.*

ni fuir ; en sorte qu'ils se laissent plutôt tuer que de prendre le parti de la retraite.

Les femelles , plus timides que les mâles , ont un si grand attachement pour leurs petits , que même dans les plus pressans dangers , elles ne les abandonnent qu'après avoir employé tout ce qu'elles ont de force & de courage pour les en garantir & les conserver , & souvent , quoique blessées , elles les emportent dans leur gueule pour les sauver.

M. Steller assure que les ours-marins ont plusieurs cris différens , tous relatifs aux circonstances ou aux passions qui les agitent ; lorsqu'ils sont tranquilles sur la terre , on distingue aisément les femelles & les jeunes d'avec les vieux mâles par le son de leurs voix , dont le mélange ressemble de loin aux bêlemens d'un troupeau composé de moutons & de veaux ; quand ils souffrent ou qu'ils sont ennuyés , ils beuglent ou mugissent , & lorsqu'ils ont été battus ou vaincus , ils gémissent de douleur , & font entendre un sifflement
d'affliction

des

d'affliction
de la s
ils rugit
& enfin
ils font
plusieur

Ils on
dorât tr
ce sens
ils s'éve
eux quo

Ils ne
que la c
bleroit
bon cour
ils nager
& au po
une éter

(h) Ste
. II, ann.
ces animau
pèce est de
lentement
replets, ils
Note comm
Vaisseaux

Suppl

des Animaux quadrupèdes. 193

d'affliction à-peu-près semblable au cri de la saricovie ne ; dans les combats, ils rugissent & frémissent comme le lion, & enfin dans la joie & après la victoire ils font un petit cri aigu qu'ils réitérent plusieurs fois de suite.

Ils ont tous les sens & sur-tout l'odorat très-bons, car ils sont avertis par ce sens même pendant le sommeil, & ils s'éveillent lorsqu'on s'avance vers eux quoiqu'on en soit encore loin.

Ils ne marchent pas aussi lentement que la conformation de leurs pieds sembleroit l'indiquer, il faut même être bon coureur pour les atteindre (*h*) ; ils nagent avec beaucoup de célérité, & au point de parcourir en une heure une étendue de plus d'un mille d'Al-

(*h*) Steller. *Novi Commentarii Academiae Petropol.* . II, ann. 1751. Cependant M. de Pagès, qui a vu ces animaux au cap de Bonne-espérance, où l'espèce est de petite taille, dit qu'ils marchent fort lentement, & que, comme ils sont fort gras & replets, ils ont peine à se retourner sur la terre. Note communiquée par M. de Pagès, Enseigne des Vaisseaux du Roi.

Allemagne (*i*); lorsqu'ils se délectent ou qu'ils s'amuseut près du rivage, ils font dans l'eau différentes évolutions; tantôt ils nagent sur le dos & tantôt sur le ventre; ils paroissent même assez souvent se tenir dans une situation presque verticale; ils se roulent, ils se plongent & s'élancent quelquefois hors de l'eau à la hauteur de quelques pieds (*k*); dans la pleine-mer, ils se tiennent presque toujours sur le dos, sans néanmoins que l'on voie leurs pieds de devant, mais seulement ceux de derrière qu'ils élèvent de temps en temps au-dessus de l'eau; &, comme ils ont le trou ovale

(*i*) « Le chat-marin (ours-marin), dit M. Kracheninnikow, nage si vite, qu'il peut aisément faire dix werstes par heure. Lorsqu'il se sent blessé, il saisit le bateau du pêcheur avec les dents, & l'entraîne avec tant de rapidité, qu'on diroit qu'il vole sur l'eau; il arrive souvent qu'il le renverse, & que ceux qui sont dedans se noyent, à moins que le timonier ne sache le conduire, & qu'il n'observe la route que l'animal prend. » *Histoire de Kamtschatka*, tome I, page 306.

(*k*) Note communiquée par M. de Pagès, Enseigne des Vaisseaux du Roi.

du cœur
rester lon
respirer,
mer les c
coquillages
que le po
Les fem
de juin, d
mispère b
en chaleur
on peut en
gestation es
portées son
très-raremen
naissant son
les femelles
avec l'âge,
tre les jam
mâles & fe
verts & o
mais les de
paroissent d
mères nour

(1) *Histoire*
cheninnikow,

des Animaux quadrupèdes. 195

du cœur ouvert, ils ont la faculté d'y rester long-temps sans avoir besoin de respirer, ils prennent au fond de la mer les crabes & autres crustacées & coquillages dont ils se nourrissent lorsque le poisson leur manque.

Les femelles mettent bas au mois de juin, dans les îles désertes de l'hémisphère boréal; & comme elles entrent en chaleur au mois de juillet suivant, on peut en conclure que le temps de la gestation est au moins de dix mois; leurs portées sont ordinairement d'un seul, & très-rarement de deux petits; les mâles en naissant sont plus gros & plus noirs que les femelles qui deviennent bleuâtres avec l'âge, & tachetées ou tigrées entre les jambes de devant (*l*); tous, mâles & femelles naissent les yeux ouverts & ont déjà trente-deux dents, mais les dents canines ou défenses ne paroissent que quatre jours après; les mères nourrissent leurs petits de leur lait

(*l*) Histoire du Kamtschatka, par M. Kracheninnikow, tome I, page 296.

jusqu'à leur retour sur les grandes terres, c'est-à-dire, jusqu'à la fin d'août ; ces petits déjà forts, jouent souvent ensemble, & lorsqu'ils viennent à se battre, celui qui est vainqueur est caressé par le père, & le vaincu est protégé & secouru par la mère.

Ils choisissent ordinairement le déclin du jour pour s'accoupler ; une heure auparavant le mâle & la femelle entrent tous deux dans la mer ; ils y nagent doucement ensemble & reviennent ensuite à terre ; la femelle, qui, pour l'ordinaire, sort de l'eau la première, se renverse sur le dos, & le mâle la couvre dans cette situation ; il paroît très-ardent & très-actif ; il presse si fort la femelle par son poids & par ses mouvemens, qu'il l'enfonce souvent dans le sable au point qu'il n'y a que la tête & les pieds qui paroissent ; pendant ce temps, qui est assez long, le mâle est si occupé, qu'on peut en approcher sans crainte & même le toucher avec la main (*m*).

(*m*) « J'ai vu, dit M. Steller, un de ces

Ces anir
& long, il
corps, &
pieds & lo
poil une e
un second
qui est au
dans la vie
viennent g
qui les fait
un peu for
cou de lon
comme les
différent si
leur, ainsi
feroit tent
animaux d'
longs poils
drés & ta

animaux acc
d'heure, auq
main . . . ce
en colère, c
rugissement ;
continuer &
mentarii Acad

des Animaux quadrupèdes. 197

Ces animaux ont le poil hérissé, épais & long, il est de couleur noire sur le corps, & jaunâtre ou roussâtre sur les pieds & les flancs; il y a sous ce long poil une espèce de feutre, c'est-à-dire, un second poil plus court & fort doux qui est aussi de couleur roussâtre; mais, dans la vieillesse, les plus longs poils deviennent gris ou blancs à la pointe, ce qui les fait paroître d'une couleur grise un peu sombre; ils n'ont pas autour du cou de longs poils en forme de crinière comme les lions-marins. Les femelles diffèrent si fort des mâles par la couleur, ainsi que par la grandeur, qu'on seroit tenté de les prendre pour des animaux d'une autre espèce; leurs plus longs poils varient, ils sont tantôt cendrés & tantôt mêlés de roussâtre; les

animaux accouplé depuis plus d'un quart-
d'heure, auquel je donnai un coup de ma
main . . . ce coup le fit regarder, & le mit
en colère, ce qu'il témoigna par un terrible
rugissement; mais cela ne l'empêcha pas de
continuer & d'achever son ouvrage. » *Novi Com-
mentarii Academiæ Petropolit. ann. 1751, tome II.*

petits sont du plus beau noir en naissant, on fait de leurs peaux des fourrures qui sont très-estimées ; mais, dès le quatrième jour après leur naissance, il y a du roussâtre sur les pieds & sur les côtés du ventre ; c'est par cette raison que l'on tue souvent les femelles qui sont pleines pour avoir la peau du fœtus qu'elles portent, parce que cette fourrure des fœtus est encore plus soyeuse & plus noire que celle des nouveaux-nés.

Le poids des plus grands ours-marins des mers de Kamtschatka, est d'environ vingt puds de Russie, c'est-à-dire, de huit cens de nos livres, & leur longueur n'excède pas huit à neuf pieds ; il en est de même de ceux qui se trouvent à la terre des États (*n*), & dans

(*n*) « Nous montames au sommet de l'île
 » (près de la terre des États), sur lequel il y
 » avoit une infinité de petits mondrains, sur
 » chacun desquels croissoient une large touffe
 » d'herbes ou de glayeuls (*dactylis glomerata*) ;
 » les intervalles, entre ces touffes, étoient très-
 » vaseux & très-sales. . . . Nous découvrîmes

plusieur
 où les V
 ours-ma
 bien pl
 Pend
 animaux
 Kamtsch
 mois d'
 ont sou
 de près
 la graisse
 goût très

bientôt qu
 cette parti
 de ce qu'
 terre ; ce
 nous avio
 Zélande ;
 breux, &
 égaloit cé
 font cepe
 mer, les
 neuf pied
 portionnée
 comme le
 du corps
 tement les
 Cook, tom

des Animaux quadrupèdes. 199

plusieurs îles de l'hémisphère austral ; où les Voyageurs ont reconnu ces mêmes ours-marins, & en ont observé d'autres bien plus petits.

Pendant les neuf mois que ces grands animaux séjournent sur les côtes de Kamtschatka , c'est-à-dire , depuis le mois d'août jusqu'au mois de juin , ils ont sous la peau un panicule graisseux de près de quatre pouces sur le corps ; la graisse des mâles est huileuse & d'un goût très-désagréable , mais celle des fe-

bientôt qu'une espèce de phoques occupoit « cette partie de l'île , & que cette vase venoit « de ce qu'ils abordoient tous mouillés sur la « terre ; ceux-ci étoient les ours de mer que « nous avons vu à la baie *Duski* , à la nouvelle « Zélande ; mais ils étoient infiniment plus nom- « breux , & leur grosseur , plus considérable , « étoit celle que leur donne M. Steller ; ils « sont cependant fort inférieurs aux lions de « mer , les mâles n'ont jamais plus de huit à « neuf pieds de long , & leur grosseur est pro- « portionnée. . . Ils n'ont pas de crinière « comme le lion-marin , mais la coupe générale « du corps & la forme des nageoires sont exac- « tement les mêmes. » Forster. *Second Voyage de Cook* , tome IV , page 57.

melles, qui est moins abondante, est aussi d'un goût plus supportable ; on peut manger de leur chair, & celle des petits est même assez bonne, tandis que celle des vieux est noire & de très-mauvais goût, quoique dépouillée de sa graisse ; il n'y a que le cœur & le foie qui soient mangeables (o).

La longueur de celui qui a été décrit par M. Steller, n'étoit que de sept pieds trois pouces, depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité des nageoires de derrière ; & de sept pieds un pouce six lignes, depuis la même extrémité du museau jusqu'au bout de la queue.

Si l'on compare l'ours-marin avec l'ours terrestre, on ne leur trouvera

(o) „ Nous tirames sur-tout de l'huile des
 „ vieux lions & des ours-marins que l'on tue ;
 „ car, excepté leurs fressures, assez bonnes, la
 „ chair est trop rance pour être mangée ; les
 „ petits ourfins étoient bons, & même la chair
 „ de quelques vieilles lionnes, n'étoit pas mau-
 „ vaïse ; mais celle des vieux mâles nous parut
 „ détestable. „ Forster, *Second Voyage de Cook*, tome
 IV, page 61.

d'autre r
 lette de l
 partie an
 & charnu
 naturel, c
 feux d'un
 fait paroî
 celle de l
 deux pied
 derrière l
 d'environ
 du museau

(p) „ L
 beth) resse
 des loups.
 tout-à-fait
 hormis que
 ressemblent
 font & par
 ils sont cor
 térieure du
 après eux
 rière ; néan
 un homme
Recueil des
la Compagn
 & 438.

des Animaux quadrupèdes. 201.

d'autre ressemblance que par le squelette de la tête & par la forme de la partie antérieure du corps qui est épaisse & charnue (*p*) ; la tête, dans son état naturel, est revêtu d'un panicule graisseux d'un pouce d'épaisseur, ce qui la fait paroître beaucoup plus ronde que celle de l'ours de terre ; elle a en effet deux pieds cinq pouces six lignes de tour derrière les oreilles, & n'est longue que d'environ huit pouces, depuis le bout du museau jusqu'aux oreilles ; mais, après

(*p*) « Les ours-marins (de l'île Sainte-Élisabeth) ressemblent plus en effet aux ours qu'à des loups. . . leur couleur & leur tête sont tout-à-fait approchantes de celle des ours, hormis que leur museau est plus aigu ; ils leur ressemblent encore par les mouvemens qu'ils font & par la manière dont ils les font ; mais ils sont comme paralytiques par la partie postérieure du corps, car ils ne font que traîner après eux leurs jambes ou nageoires de derrière ; néanmoins ils courent si vite, qu'à peine un homme peut les atteindre. » G. Spilberg. *Recueil des Voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes orientales, tome II, p. 437 & 438.*

l'avoir dépoillée de sa graisse, le squelette de cette tête de l'ours-marin est très-ressemblant à celui de l'ours de terre. Du reste, la forme de ces deux animaux est très-différente; le corps de l'ours-marin est fort mince dans sa partie postérieure, & devient presque de figure conique, depuis les reins jusqu'auprès de la queue qui n'a que deux pouces de longueur; en sorte que la grosseur du corps qui est de quatre pieds huit pouces de tour auprès des épaules, se réduit à un pied six pouces trois lignes auprès de la queue.

L'ours-marin a des oreilles externes comme le lion-marin & la saricovienne; ces oreilles ont un pouce sept lignes de longueur, elles sont pointues, coniques, droites, lisses & sans poil à l'extérieur, elles ne sont ouvertes que par une fente longitudinale que l'animal peut resserrer & fermer lorsqu'il se plonge en entier dans l'eau; les yeux sont proéminens & gros à-peu-près comme ceux du bœuf; l'iris en est noire; ils sont garnis de cils & de paupières, & défendus comme ceux des phoques par

des

une r
grand
couvr

La

bout

pouce

mousta

huit li

déborc

& la

lorsqu

viron

comme

un pe

quatre

de long

Les

posées

nière q

pond

pare l'e

trente-s

seize en

périeure

en deu

deux ca

longues

des Animaux quadrupèdes. 203

une membrane qui prend naissance au grand angle de l'œil, & qui peut le recouvrir à la volonté de l'animal.

La gueule, depuis l'angle jusqu'au bout du museau, n'a qu'environ trois pouces de longueur, elle est garnie de moustaches dont les soies ont cinq pouces huit lignes de long; la lèvre supérieure débordé l'inférieure d'un pouce & demi, & la distance entre les deux lèvres, lorsque la gueule est ouverte, est d'environ quatre pouces; la langue qui est, comme celle de tous les phoques, un peu fourchue à son extrémité, a quatre pouces & demi ou cinq pouces de longueur.

Les dents sont très-pointues, & disposées dans chaque mâchoire de manière que la pointe de chacune correspond exactement à l'intervalle qui sépare l'extrémité des autres; il y en a trente-six en tout, vingt en haut & seize en bas; 1.^o dans la mâchoire supérieure quatre dents incisives divisées en deux pointes à leur extrémité; 2.^o deux canines, une de chaque côté, longues d'environ quatre lignes, lesquelles

font courbées en dedans; 3.^o deux autres dents canines ou défenses très-aiguës, une de chaque côté d'environ huit à neuf lignes de longueur, c'est avec celles-ci que ces animaux se déchirent & se blessent cruellement; 4.^o six autres dents de chaque côté qui sont aiguës comme toutes les autres, & qui occupent la place des molaires.

Dans la mâchoire inférieure, il y a comme dans la supérieure; 1.^o quatre incisives sur le devant de la mâchoire; 2.^o deux canines seulement, une de chaque côté, elles sont tranchantes sur la face intérieure & longues de plus d'un pouce; l'ours-marin s'en sert dans les combats comme les sangliers se servent de leurs défenses, mais il n'y a pas de secondes dents canines comme dans la mâchoire supérieure; 3.^o cinq dents de chaque côté qui sont pointues, & qui tiennent, comme dans la mâchoire supérieure, la place de dents molaires.

Un caractère qui est commun aux ours & aux lions marins, & qui les distingue de tous les autres animaux,

des

c'est la
armés
dans le
doigts
dans c
aussi un
à-peu-p
palmipe
à l'anim
ceux de
pour n
après lu
sur la t
du corp
son ven
si grand
marche
cette ra
les roch

Les p
est d'en
pouces
en par
des ph
ces piec
à l'exce
& des

des Animaux quadrupèdes. 205

c'est la forme de leurs pieds; ils sont armés d'une pinne ou nageoire qui, dans les pieds de devant, réunit les doigts en une seule masse, tandis que dans ceux de derrière les doigts sont aussi unis par une pinne, & qu'ils ont à-peu-près la forme de ceux des oiseaux palmipèdes; les pieds de devant servent à l'animal à marcher sur la terre, & ceux de derrière ne lui sont utiles que pour nager & se gratter, il les traîne après lui comme des membres nuisibles sur la terre, car ces parties de l'arrière du corps, ramassent & accumulent sous son ventre du sable & de la vase en si grande quantité, qu'il est obligé de marcher circulairement; & c'est par cette raison qu'il ne peut grimper sur les rochers.

Les pieds antérieurs, dont la longueur est d'environ deux pieds, sur sept à huit pouces de largeur, ne sont pas cachés en partie sous la peau comme ceux des phoques, mais ils sortent en entier; ces pieds ou bras sont couverts de poil, à l'exception du carpe, du métacarpe & des doigts, dont la peau est noire,

nue, lisse à la partie supérieure & ridée à la partie inférieure ; ils sont à l'intérieur composés de l'os humérus, de ceux du bras, de l'avant-bras, du carpe, du métacarpe & des phalanges des doigts ; il y en a cinq à chaque pied, dont les ongles ont deux lignes de longueur ; le pouce est le plus long des doigts, & les quatre autres vont toujours en diminuant de longueur jusqu'au cinquième & dernier qui est le plus court ; le pouce, ainsi que le second doigt, sont composés de trois phalanges, le troisième & le quatrième en ont quatre, & le cinquième n'en a que deux.

Les pieds postérieurs, dont la longueur totale est d'environ vingt à vingt-un pouces, sur une largeur de cinq ou six pouces, sont composés du fémur, du tibia, du péroné, du tarse, du métatarse & des phalanges des doigts ; le tibia & le péroné sont cachés sous la peau du corps ; le tarse & le métatarse paroissent à l'extérieur & sont couverts de poils ; il y a aussi cinq doigts armés chacun d'un ongle oblong, aigu, convexe en dessus & concave en dessous ;

ces ongles
rieur sont
autres d
longueur
lignes à
comme
verts d'u
en dess
large qu
même le
mais le
court ; c
épais qu
langes d
plus pla
mité de
épiphys
les extre
des pied
nageoire
trémité ;
langes, r
ont cha

La v
pouces,
térieure
de long

des Animaux quadrupèdes. 207

ces ongles du pouce & du doigt extérieur sont très-petits, mais ceux des trois autres doigts ont environ un pouce de longueur, sur une largeur de quatre lignes à la base ; ces doigts sont courts, comme ceux des pieds de devant, couverts d'une peau lisse en dessus & ridée en dessous ; le pouce est d'un tiers plus large que les autres doigts, il est de la même longueur que les trois suivans ; mais le cinquième est beaucoup plus court ; ces pieds de derrière sont moins épais que ceux de devant, & les phalanges des doigts en sont plus larges, plus plates & plus minces ; à l'extrémité des phalanges commencent des épiphyses cartilagineuses qui en rendent les extrémités assez semblables à celles des pieds des oiseaux palmipèdes, & la nageoire est divisée en cinq à son extrémité ; le pouce n'a que deux phalanges, mais les quatre autres doigts en ont chacun trois.

La verge est longue de dix à onze pouces, elle contient dans sa partie antérieure un os de près de cinq pouces de longueur, semblable à celui qui se

trouve dans la verge de la faricovienne; la peau du scrotum, qui est située sous l'anus & qui renferme deux testicules de figure oblongue, est de couleur noire, ridée & sans poil; la femelle n'a que deux mamelles situées près de la vulve.

La longueur des intestins, dans l'individu décrit par M. Steller, étoit de cent douze pieds cinq pouces, mesurés depuis l'œsophage jusqu'à l'anus; en sorte que pris tous ensemble, les intestins étoient seize fois plus longs que le corps de cet animal, dont la grandeur n'étoit que de sept pieds un pouce six lignes, depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité des doigts des pieds de derrière. Dans un de ces animaux nouveau-né, la longueur des intestins n'étoit que treize fois plus grande que celle du corps entier.

Nous devons encore observer & répéter ici que le petit phoque noir, dont nous avons donné la figure (*volume XIII, planche LIII*), a tant de rapport avec l'ours-marin, qu'on ne peut se dissimuler que ce ne soit un individu

qui appa
n'en est
absolument
forme du
qui sont
nuées de
incisives
mité; pa
nentes à
qualité so
de sa fou
sumer qu
petite tai
puisqu'il
mées; on
seconde e
petite qu
cette seco
ce que le
ours-mar
différens
(r), m

(q) M.
(r) A.
à la nouv
latitude au
tome I &

des Animaux quadrupèdes. 209

qui appartient à cette espèce, ou qui n'en est qu'une variété; car il ressemble absolument au grand ours-marin par la forme du corps, par celle des pattes qui sont manchottes & entièrement dénuées de poil; par la forme des dents incisives qui sont fendues à leur extrémité; par les oreilles qu'il a proéminentes à l'extérieur; & enfin par la qualité soyeuse & la couleur noirâtre de sa fourrure. Et comme il est à présumer que cet animal, quoique de très-petite taille, étoit néanmoins adulte, puisqu'il avoit toutes ses dents bien formées; on pourroit croire qu'il existe une seconde espèce ou race d'ours-marin plus petite que la première, & que c'est à cette seconde espèce qu'on doit rapporter ce que les Voyageurs ont dit des petits ours-marins (*q*), qu'ils ont vus dans différens endroits de l'hémisphère austral (*r*), mais que jusqu'ici l'on ne con-

(*q*) M.^{rs} Forster & de Pagès.

(*r*) A la baie Dusky, à la nouvelle Zélande; à la nouvelle Georgie, sous le 54.^e degré de latitude australe; Forster. *Second Voyage de Cook*; tome I & tome IV, pages 174 & 84. M. de Pagès

noissoit pas dans l'hémisphère boréal.
 Au reste, cette petite race ou es-

a aussi vu cette petite espèce au cap de Bonne-
 espérance; & je crois qu'on peut lui rapporter
 ce que dit Dampier des *veaux-marins*, qui se
 trouvent en quantité à l'île de Juan Fernandès.
 « Ces animaux, dit-il, sont par milliers sur
 » cette île; ils sont de la grosseur d'un veau
 » ordinaire; leur tête est faite comme celle d'un
 » chien. . . . leur poil est de diverses cou-
 » leurs, comme noir, gris-brun, tacheté, pa-
 » roissant fort lisse & fort agréable d'abord qu'ils
 » sortent de la mer. . . . ils ont une fourrure
 » si fine & si courte, que je n'en ai vu de
 » pareils ailleurs; il y en a toujours autour de
 » l'île des milliers assis dans les baies, ou allant
 » à la mer, ou en revenant; à un mille ou
 » deux de terre, vous voyez l'île & ses environs
 » tout couverts de ces animaux, qui se jouent
 » à la superficie de l'eau, ou sont au soleil à terre;
 » quand ils sortent de la mer, ils appellent leurs
 » petits, & bêlent comme les brebis; &, quoi-
 » qu'ils passent auprès d'une infinité d'autres
 » petits, avant que de venir aux leurs, ils ne se
 » laissent néanmoins teter qu'aux leurs propres;
 » les jeunes ressemblent à des petits chiens, &
 » aiment fort la terre; mais, quand ils sont
 » chassés, ils gagnent la mer aussi-bien que les
 » vieux, & nagent fort vite & fort légèrement,
 » quoiqu'ils soient à terre d'une très-grande

pèce d'o
 à la gran
 & la for
 & les
 seuleme

pareffe, &
 qu'après
 jettent su
 sur le ne
 trouvent
 chauds;
 pièces de
 chauffent
 Juan Fer
 en a bea
 de l'Afri
 de Bonn
 au détroit
 la côte
 nent, d
 ligne équ
 la Ligne,
 tude; je
 orientales
 les endro
 la mer,
 ils en vi
 les me-
 dans sur
 pier, tom

des Animaux quadrupèdes. 211

pèce d'ours-marin ressemble entièrement à la grande, tant par les couleurs du poil & la forme du corps, que par les mœurs & les habitudes naturelles. Il paroît seulement qu'étant bien plus petits, ils

pareffe, & qu'ils ne s'écartent de leur chemin « qu'après qu'on les a battus; mais, s'ils se « jettent sur ceux qui les frappent, un coup « sur le nez les tue incontinent. . . ils se « trouvent également dans les climats froids & « chauds; dans les climats froids, ils aiment les « pièces de glace, où ils se couchent & se « chauffent au soleil, comme ils font à l'île de « Juan Fernandès, quand ils font à terre. Il y « en a beaucoup dans les parties méridionales « de l'Afrique, comme aux environs du cap « de Bonne-espérance, ainsi qu'en Amérique, « au détroit de Magellan. . . il y en a sur toute « la côte de la mer méridionale de ce conti- « nent, depuis la terre del Fuego jusqu'à la « ligne équinoxiale; mais, du côté du Nord de « la Ligne, je n'en ai vu qu'à 21 degrés de lati- « tude; je n'en ai jamais vu dans les Indes « orientales; en général, ces animaux cherchent « les endroits déserts des côtes & les plages de « la mer, où il y a beaucoup de poissons, car « ils en vivent; les poissons qu'ils mangent sont « les merlus, les tâtonneurs, &c. qui sont abon- « dans sur les côtes pierreuses. » *Voyage de Dam- pier, tome I, pages 116 & suiv.*

sont aussi bien plus timides que les grands. « Ces animaux, dit M. de Pagès, ne cherchent qu'à se sauver du côté de la mer, & ne mordent jamais que ce qui se trouve directement sur leur passage; plusieurs, en se sauvant, passoient même entre nos jambes; ils se familiarisent promptement avec les hommes; j'en ai conservé deux vivans pendant huit jours dans un cuvier de cinq pieds de diamètre; le premier jour, j'y avois fait mettre de l'eau de la mer à la hauteur d'un demi-pied, mais comme ils faisoient des efforts pour l'éviter, je les mis dans de l'eau douce, ils s'y trouvèrent aussi gênés & je les laissai à sec; dès que l'eau étoit vidée ils se secouoient comme les chiens, ils se grattoient, se nettoyoient avec leur museau & se serroient l'un contre l'autre, ils étternuoient aussi comme les chiens.

Lorsqu'il faisoit soleil je les lâchois sur le gaillard du Vaisseau, où ils ne cherchoient à fuir que quand ils voyoient la mer; sur terre, ils se grattoient & même ils prenoient plaisir à se laisser gratter par les hommes, auprès desquels ils

march
loient
page,
élevés

Ils
tre; i
mutue
ils che
il suff
faire l
poisso
dans c
ce qu
l'aval
suite.

des p
très-fc
dant
geoit
à la m
dans
rien,
nageo
plong
temps
qu'au
de p

des Animaux quadrupèdes. 213

marchoient assez familièrement ; ils alloient même flairer les gens de l'Équipage, & ils aimoient à grimper sur les lieux élevés pour être mieux exposés au soleil.


Ils avoient de l'amitié l'un pour l'autre ; ils se frottoient & se grattoient mutuellement, & lorsqu'on les séparoit ils cherchoient bientôt à se rejoindre ; il suffisoit d'en emporter un pour se faire suivre de l'autre ; on leur offrit du poisson, du goëmon, du pain trempé dans de l'eau, ils flairoient & prenoient ce qu'on leur présentoit, mais ils ne l'avaloiènt pas & le rendoient tout de suite. Le septième jour un d'eux eut des palpitations & des sanglottemens très-forts, il ouvroit la gueule en rendant une liqueur verdâtre, & il rongeoit le bois de sa cuve, je le fis jeter à la mer ; le lendemain, je lâchai l'autre dans une prairie, mais il n'y mangea rien, je le chassai à la mer, d'abord il nageoit assez lentement, mais s'étant plongé sous l'eau pendant fort longtemps, il revint à sa surface plus leste qu'auparavant ; il venoit apparemment de prendre de la nourriture. »

214 *Supplément à l'Histoire*

M. de Pagès ajoute que les plus grands ours-marins qu'il ait vus au cap de Bonne-espérance, n'avoient que quatre pieds de longueur, & que la plupart (apparemment les femelles & les jeunes) n'avoient que deux pieds & demi, ce qui diffère prodigieusement pour la taille de l'espèce décrite par M. Steller.

« Le poil des jeunes est noirâtre ; continue M. de Pagès, mais avec l'âge il devient d'un gris-argenté à la pointe ; leurs dents sont petites ; leurs moustaches assez longues ; la physionomie est douce, & leur tête ressemble assez à celle d'un chien qui n'auroit que de petites oreilles ; celles de ces ours-marins sont étroites, peu ouvertes & n'ont que dix-sept à dix-huit lignes de longueur ; le cou est gros & presque de niveau avec la tête, l'endroit le plus gros de l'animal est la poitrine, d'où le corps va en diminuant jusqu'à la queue qui n'a qu'environ deux pouces de longueur.

Les pattes de devant sont formées par une membrane cartilagineuse qui a





L'OURS MARIN .

des Anin

presque la
membrane
térieure qu
cinq doigts
que la mem
le mieux
phalanges,
& les deux
chaque doig
petit & à p
le poil.

Les patte
doigts, don
leurs phala
marqués, la
rifés à cet é
petit & très
joint par u
de l'oie (f)

(f) Note
Enseigne des
marins du cap

des Animaux quadrupèdes. 215

presque la forme des nageoires ; cette membrane est plus forte à sa partie antérieure qu'en arrière : ces pattes ont cinq doigts qui ne s'étendent pas autant que la membrane, le plus intérieur est le mieux marqué, de même que ses phalanges, les deux suivans le sont moins & les deux extérieurs le sont à peine ; chaque doigt est armé d'un ongle très-petit & à peine visible étant caché par le poil.

Les pattes de derrière ont aussi cinq doigts, dont les trois du milieu ont leurs phalanges & leurs ongles bien marqués, les autres sont moins caractérisés à cet égard ; ils ont un ongle très-petit & très-mince ; tous ces doigts sont joints par une membrane comme celle de l'oie (*f*).

(*f*) Note communiquée par M. de Pagès, Enseigne des Vaisseaux du Roi, sur les oursmarins du cap de Bonne-espérance.



LE LION-MARIN. (a)

LA PLUS GRANDE des espèces de phoques à oreilles externes, est celle du lion-marin : il est, sans comparaison, plus puissant & plus gros que l'ours-marin ; cependant jusqu'à ce jour il étoit peu connu, & nous avons déjà observé que le vrai lion-marin dont il

(a) *Lion de mer ou lion-marin.* Beauchêne Gonnin ; *Navigations aux terres australes*, tome II. — Bougainville, *Voyage autour du monde*. — François Pretty, *Collection d'Ackluyt*, tome III. — Sir Richard Hauwkins. sir John Narborough. Labbe, *Lettres des Missionnaires*, tome XV. — Dom Perretty, Bernard Penrose, *Account of the last expedition to port Egmont in Falklands Islands*. London, in-8.º 1775. — M. Clayton, *Transactions philosophiques*, volume LXXVI, partie I, page 102. — Kracheninnikow, *Histoire de Kamtschatka* ; Lyon, 1767, tome I. — *Phoca leonina*. Steller, *Novi Commentarii Academiae Petropol.* tome II, ann. 1751. — *Phoque à cinière*, par M. Forster. — *Siwutchá*, par les Russes. — *Siout*, par les Habitans de Kamtschatka. — *Oulon*, par les Korïaques. — *Etarpé*, par les Kouriles.

de.
est ie
quel
a ma
figure
ridé,
cripti
ni cr
lion-m
tères
fausse
voit
connu
ces an
fruits
en éta
rences
pour
espèces
& sépa
XLVII
dessiné
savant
nous

(b) M
Supp

des Animaux quadrupèdes. 217

est ici question, n'est pas l'animal auquel le rédacteur du Voyage d'Anfon a mal-à-propos appliqué ce nom ; la figure représente le *phoque à museau ridé*, dont nous avons donné la description, & qui n'a ni oreilles externes ni crinière, & qui diffère encore du lion-marin par plusieurs autres caractères ; cette méprise ou plutôt cette fautive application de ce nom, ne pouvoit être rectifiée tant qu'on n'a pas connu distinctement l'un & l'autre de ces animaux ; mais des Voyageurs instruits (b), nous ont récemment mis en état de prononcer sur leurs différences, qui sont plus que suffisantes pour en faire, avec fondement, deux espèces, & même deux genres distincts & séparés. Nous donnons ici (*planche XLVIII*), la figure du vrai lion-marin, dessiné d'après nature par M. Forster, savant Naturaliste, Voyageur, auquel nous devons aussi plusieurs bonnes

(b) M.^{rs} Steïler & Forster, père & fils.

observations sur quelques autres animaux.

Il a vu des troupes de ces lions-marins sur les côtes des terres magellaniques, & dans quelques endroits de l'hémisphère austral. (c); d'autres Voyageurs ont reconnu ces mêmes lions-marins dans les mers du Nord, sur les îles Kuriles & au Kamtschatka. M. Steller (d), a, pour ainsi dire, vécu au milieu d'eux pendant plusieurs mois dans l'île de Bering. Ainsi, l'espèce en est répandue dans les deux hémisphères, & peut-être sous toutes les latitudes, comme celle des ours-marins, de la saricovienne & de la plupart des phoques.

(c) Les lions-marins sont ces animaux décrits par les Navigateurs aux terres australes, comme ayant le cou & la tête garnis d'une crinière (Voyez la citation, article des Phoques, p. 305, in-12), & que nous avons peine à reconnoître (Voyez *ibid.*), quand nous n'avions, pour y rapporter, que le faux lion-marin d'Anfon, ou le grand phoque à museau ridé. Voyez l'article des phoques.

(d) *Novi Commentarii Academiae Petropol.* t. II, ann. 1751.

Les lions
en grande
nombreuse
avec lesque
le même r
dinairement
de dix à
quinze à v
il y a mêm
avoir un ph
mais il y e
coup moins

(e) M.^{rs} F
& M. Steller
trois & quatre
M.^{rs} Forster p
au nombre de
on peut croire
espèce, ont l
donne. Au res
semelles varie
car il est dit,
a vu un mâle e
qu'il étoit très
mais qu'il y av
qu'une ou deu
page 70.

des Animaux quadrupèdes. 219

Les lions-marins se tiennent & vont en grandes familles, cependant moins nombreuses que celles des ours-marins, avec lesquels on les voit quelquefois sur le même rivage; chaque famille est ordinairement composée d'un mâle adulte, de dix à douze femelles (e), & de quinze à vingt jeunes des deux sexes; il y a même des mâles qui paroissent avoir un plus grand nombre de femelles, mais il y en a d'autres qui en ont beaucoup moins; tous nagent ensemble dans

(e) M.^{rs} Forster disent dix à douze femelles, & M. Steller ne leur en donne que deux, trois & quatre; mais, comme le sentiment de M.^{rs} Forster paroît le mieux fondé, relativement au nombre des petits qui suivent chaque famille, on peut croire qu'en effet les mâles, dans cette espèce, ont le nombre de femelles qu'il leur donne. Au reste, il paroît que ce nombre de femelles varie dans de certaines circonstances; car il est dit, dans le Voyage de Cook, qu'on a vu un mâle entouré de vingt à trente femelles, qu'il étoit très-occupé à retenir auprès de lui; mais qu'il y avoit d'autres mâles qui n'en avoient qu'une ou deux. *Second Voyage de Cook, t. IV, page 70.*

ani-
marins
ques,
émif-
geurs
dans
uriles
) , a,
d'eux
é Be-
e dans
e sous
e des
de la

décrits
comme
crinière
p. 305,
annoître
pour y
on, ou
l'article
t. II,

la mer & demeurent aussi réunis lorsqu'ils se reposent sur la terre; la présence ou la voix de l'homme les fait fuir & se jeter à l'eau; car, quoique ces animaux soient bien plus grands & plus forts que les ours-marins, ils sont néanmoins plus timides; lorsqu'un homme les attaque avec un simple bâton, ils se défendent rarement & fuient en gémissant: jamais ils n'attaquent ni n'offensent, & l'on peut se trouver au milieu d'eux sans avoir rien à craindre (f); ils ne deviennent dangereux que

(f) « Il n'étoit pas dangereux de marcher
 „ au milieu d'eux (sur une île près de la terre
 „ des États); car ils s'enfuoient alors, ou ils
 „ restoient tranquilles; on couroit seulement des
 „ risques à se placer entr'eux & la mer; si quel-
 „ que chose les épouvante, ils se précipitent
 „ vers les flots en si grand nombre, que, si
 „ vous ne sortez pas de leur chemin, vous seriez
 „ terrassés. Quelquefois, lorsque nous les sur-
 „ prenions tout-à-coup, ou que nous les éveillions
 „ (car ils dorment beaucoup & ils sont très-
 „ stupides), ils élevoient leur tête, ils ronfloient
 „ & montroient les dents d'un air si farouche,
 „ qu'ils sembloient vouloir nous dévorer; mais,

quand on
 les rédui-
 leur don-
 face à l'
 d'autant p
 maltraités
 surprind
 la mer, p
 les barqu
 Comme c
 sifs & tr
 gloire pa
 tuer un li
 l'état de
 nous du-

dès que no
 fuioient. . .
 sauvages ou
 permirent d
 à coups de
 avec le fust
 seroit peut-ê
 Förster. *Seco*
 & 72.

(g) *Stelle*
pol. t. II, at

des Animaux quadrupèdes. 221

quand on les blesse grièvement ou qu'on les réduit aux abois (g); la nécessité leur donne alors de la fureur, ils font face à l'ennemi, & combattent avec d'autant plus de courage qu'ils sont plus maltraités. Les chasseurs cherchent à les surprendre sur la terre plutôt que dans la mer, parce qu'ils renversent souvent les barques lorsqu'ils se sentent blessés. Comme ces animaux sont puissans, massifs & très-forts, c'est une espèce de gloire parmi les Kamtschadales que de tuer un lion-marin mâle; l'homme dans l'état de Nature fait plus de cas que nous du courage personnel; ces Sau-

dès que nous avançons sur eux, ils s'en-
fuijoient. . . . En général, ils étoient si peu
sauvages ou plutôt si stupides, qu'ils nous
permirent d'approcher assez pour les assommer
à coups de bâtons; mais nous tirâmes les gros
avec le fusil, parce que nous crûmes qu'il
seroit peut-être dangereux de les approcher. »
Forster. *Second Voyage de Cook*, tome IV, pages 53
& 72.

(g) Steller. *Novi Commentarii Academiae Petro-*
pol. t. II, ann. 1751.

des Animaux quadrupèdes. 223

Quoique ces animaux soient d'un naturel brut & assez sauvage, il paroît cependant qu'à la longue ils se familiarisent avec l'homme. M. Steller dit qu'en les traitant bien, on pourroit les apprivoiser; il ajoute qu'ils s'étoient si bien accoutumés à le voir, qu'ils ne fuyoient plus à son aspect, comme au commencement; qu'ils le regardoient paisiblement, en le considérant avec une espèce d'attention; qu'enfin ils avoient si bien perdu toute crainte, qu'ils agissoient en toute liberté, & même s'accoupoient devant lui. M. Forster dit aussi qu'il en

& ne pouvant supporter la douleur que lui cause l'eau de la mer qui entre dans sa plaie, gagne le rivage, où on l'achève de le tuer à coups de dard ou de flèche, ou, si l'endroit n'est pas sûr, on attend qu'il meure de sa première blessure, ce qui arrive au bout de vingt-quatre heures. Cette chasse est si honorable, que celui qui en a tué le plus, passe pour un héros, & c'est ce qui fait que plusieurs s'y adonnent, bien moins pour la chair, qui passe pour être très-délicate, que pour acquérir de l'honneur.» Kracheninnikow, *Histoire du Kamtschatka*, tome 1, page 287.

a vu quelques-uns qui s'étoient si bien habitués à voir les hommes, qu'ils suivoient les chaloupes en mer, & qu'ils avoient l'air d'examiner ce que l'on y faisoit.

Cependant quoique les lions-marins soient d'un naturel plus doux que les ours-marins, les mâles se livrent souvent entr'eux des combats longs & sanglans; on en a vu qui avoient le corps entamé & couverts de grandes cicatrices. Ils se battent pour défendre leurs femelles (i), contre un rival qui vient s'en saisir & les enlever; après le combat le vainqueur devient le chef & le maître de la famille entière du vaincu; ils se battent aussi pour conserver la place que chaque mâle occupe toujours sur une grosse pierre qu'il a choisie pour domicile; &, lorsqu'un autre mâle vient pour l'en chasser, le combat commence

(i) « Je les ai vu se battre pendant deux ou trois jours de suite pour une femelle qu'un autre mâle vouloit enlever. » Steller. *Novi Commentarii Academiae Petropol.* tome II, ann. 1751.

& ne finit
du plus

Les fem
tr'elles ni
être dans
chef de
rement su
sexes; ma
à-dire,
rentes for
nelles ar
témoins
quelque
à ce spe
contre l'
exemple

(k) « Les
grosses trou
les plus gra
choisit une
prochent p
les avons v
de rage,
plusieurs p
reçues dans
*de Cook,

des Animaux quadrupèdes. 225

& ne finit que par la fuite ou par la mort du plus foible (*k*).

Les femelles ne se battent jamais entr'elles ni avec les mâles, elles semblent être dans une dépendance absolue du chef de la famille; elles sont ordinairement suivies de leurs petits des deux sexes; mais lorsque deux mâles, c'est-à-dire, deux chefs de familles différentes sont aux prises, toutes les femelles arrivent avec leur suite pour être témoins du combat; & si le chef de quelque autre troupe arrive de même à ce spectacle & prend parti pour ou contre l'un des deux combattans, son exemple est bientôt suivi par plusieurs

(*k*) « Les lions de mer vivent ensemble en grosses troupes, les mâles les plus vieux & les plus gras se tiennent à part; chacun d'eux choisit une large pierre, dont les autres n'approchent pas sans un combat furieux. Nous les avons vu souvent se saisir avec un degré de rage, qu'il est impossible de décrire, & plusieurs portoient sur le dos des balafres reçues dans ces attaques. » Forster. *Second Voyage de Cook*, tome IV, page 55.

K. v

autres chefs, & alors la bataille devient presque générale & ne se termine que par une grande effusion de sang, & souvent par la mort de plusieurs de ces mâles, dont les familles se réunissent au profit des vainqueurs. On a remarqué que les trop vieux mâles ne se mêlent point dans ces combats; ils sentent apparemment leur foiblesse, car ils ont soin de se tenir éloignés & de rester tranquilles sur leur pierre, sans néanmoins permettre aux autres mâles ni même aux femelles d'en approcher (1). Dans la mêlée, la plupart des femelles oublient leurs petits, & tâchent de s'éloigner du lieu de la scène en fuyant; ce qui suppose un naturel bien différent de celui des ours-marins, dont les femelles emportent leurs pe-

(1) « Nous observions çà & là un lion-marin, couché seul, en grondant, dans un lieu écarté, sans souffrir que les mâles ni les femelles se tinssent dans les environs; nous jugeâmes que ceux-là étoient vieux & accablés par l'âge. » Forster. *Second Voyage de Cook*, tome IV, page 71.

tits, lon
dre; ce
mères l
petits c
qui ont
point a
assomme
les défe
soit une
positive
roissent
pour le
leur en
en être
des peti
le père

(m) «
notre ap
troupe ét
coup de
portoient
la plupart
abandonn
Voyage de
(n) M
à M. de

des Animaux quadrupèdes. 227

tits, lorsqu'elles ne peuvent les défendre; cependant il y a quelquefois des mères lionnes qui emportent aussi leurs petits dans leur gueule (*m*), d'autres qui ont assez de naturel pour ne les point abandonner, & qui se font même assommer sur la place en cherchant à les défendre (*n*); mais il faut que ce soit une exception, car M. Steller dit positivement que ces femelles ne paroissent avoir que très-peu d'attachement pour leurs petits, & que quand on les leur enlève, elles ne paroissent point en être émues; il ajoute qu'il a pris des petits plusieurs fois lui-même devant le père & la mère, sans courir le moi-

(*m*) « Les lions-marins attendoient communément notre approche; mais, dès que l'un de la troupe étoit tué, le reste s'enfuoit avec beaucoup de précipitation; quelques femelles emportoient alors un petit dans leur gueule, mais la plupart étoit si épouvantées, qu'elles les abandonnoient par-derrière. » Forster. *Second Voyage de Cook, tome IV, page 55.*

(*n*) Mémoire sur les phoques, communiqué à M. de Buffon, par M. Forster.

dre risque & sans que ces animaux insensibles ou dénaturés se soient mis en devoir de les secourir ou de les venger.

Au reste, dit-il, ce n'est qu'entr'eux que les mâles sont féroces & cruels; ils maltraitent rarement leurs petits ou leurs femelles; ils ont pour elles beaucoup d'attachement, & ils se plaisent à leurs caresses qu'ils leur rendent avec complaisance; mais ce qui paroîtroit singulier, si l'on n'en avoit pas l'exemple dans nos ferraills, c'est que, dans le temps des amours, ils sont moins complaisans & plus fiers; il faut que la femelle fasse les premières avances (o); non-seule-

(o) « L'acte d'amour est précédé de plusieurs
 » caresses étranges; c'est le sexe le plus foible
 » qui fait les avances. . . . la femelle se tapit
 » aux pieds du mâle, rampant cent fois autour
 » de lui, & de temps à autre rapprochant son
 » museau du sien comme pour le baiser; le
 » mâle, pendant cette cérémonie, sembloit avoir
 » de l'humeur, il grondoit & montrait les dents
 » à la femelle, comme s'il eût voulu la mordre:
 » à ce signal, la souple femelle se retira, &

ment l
 fèrent
 encore
 n'est q
 fois ses
 cher d
 stances
 mer, i
 & apr
 quelque
 vient l
 verse s
 voir fo
 qui du
 se sout
 comme

vint enf
 les pieds
 de cette
 la mer
 poursuiv
 sortit la
 renversa
 de près
 l'accoup
 Extrait d

des Animaux quadrupèdes. 229

ment le mâle Sultan paroît être indifférent & dédaigneux, mais il marque encore de la mauvaise humeur, & ce n'est qu'après qu'elle a réitéré plusieurs fois ses prévenances qu'il se laisse toucher de sensibilité, & se rend à ses instances; tous deux alors se jettent à la mer, ils y font différentes évolutions, &, après avoir nagé doucement pendant quelque temps ensemble, la femelle revient la première à terre & s'y renverse sur le dos pour attendre & recevoir son maître. Pendant l'accouplement, qui dure huit à dix minutes, le mâle se soutient sur ses pieds de devant, & comme il a la taille d'un-tiers plus grande

vint ensuite recommencer ses caresses & lécher « les pieds du mâle. Après un long préambule « de cette sorte, ils se jetèrent tous deux dans « la mer, & y firent plusieurs tours en se « poursuivant l'un & l'autre; enfin la femelle « sortit la première sur le rivage, où elle se « renversa sur le dos; le mâle, qui la suivoit « de près, la couvrit dans cette situation, & « l'accouplement dura huit ou dix minutes. »

Extrait du Mémoire communiqué par M. Forster.

que celle de la femelle, il la déborde de toute la tête.

Ces animaux, ainsi que les ours-marins, choisissent toujours les îles désertes pour y aller faire leurs petits, & s'y livrer ensuite aux plaisirs de l'amour. M. Forster, qui les a observés sur les côtes des terres Magellaniques, dit avoir été témoin de leurs amours & de leur accouplement dans les mois de décembre & janvier, c'est-à-dire, dans la saison d'été de ces climats. M. Steller qui les a de même observés sur les côtes de Kamtschatka & dans les îles voisines, assure qu'ils s'accouplent toujours dans les mois d'août & de septembre, & que les femelles mettent bas au mois de juillet (*p*); il paroît donc que, dans les climats opposés, c'est toujours en été que les lions-marins se recherchent, & que le temps de la gestation est de près de onze mois; cependant le même Steller dit positivement que les femelles

(*p*) M. Kracheninnikow dit la même chose dans son histoire du Kamtschatka.

ne port
n'eût pa
d'août
mais di
geurs q
cordent
que la
selon M
selon M
mais il
ordinair
il se pe
condes
Magellan
comme
suivent
suivante
tingués,
deux pe
portent
les mâle
durent l

(*q*) M
trois & q
(*r*) "

des Animaux quadrupèdes. 231

ne portent que neuf mois , comme s'il n'eût pas compté que de septembre & d'août en juillet , il n'y a pas neuf mois , mais dix & onze mois. Ces deux Voyageurs que nous venons de citer ne s'accordent pas sur le nombre des petits que la femelle produit à chaque portée ; selon M. Steller , elle n'en fait qu'un , & selon M. Forster , elle en fait deux (q) ; mais il se peut qu'elles ne produisent ordinairement qu'un & quelquefois deux ; il se peut aussi qu'elles soient moins fécondes au Kamtschatka qu'aux terres Magellaniques , & enfin il se peut que , comme les petits de l'année précédente suivent leur mère avec ceux de l'année suivante , M. Forster ne les ait pas distingués , en voyant la femelle suivie de deux petits. Les mêmes Voyageurs rapportent que ces animaux , & sur-tout les mâles , ne mangent rien tant que durent leurs amours (r) , en sorte qu'a-

(q) M. Kracheninnikow dit même *jusqu'à* trois & quatre , ce qui n'est pas vraisemblable.

(r) « Tant que les phoques sont en chaleur,

232 Supplément à l'Histoire

près ce temps ils sont toujours fort maigres & très-épuisés; ceux qu'ils ont ouverts dans cette saison n'avoient dans leur estomac que de petites pierres, tandis que, dans tout autre temps, ils sont très-gras, & que leur estomac est farci des poissons & des crusta-

„ dit M. Forster, c'est-à-dire, pendant l'espace de
„ quelques semaines, ils ne prennent point de nour-
„ riture, de sorte qu'ils retournent à la mer, après
„ cette saison, fort maigres & épuisés; nous
„ trouvâmes dans leur estomac plusieurs cailloux
„ arrondis, de la grosseur du poing; &, dans
„ quelques-uns, il y eut jusqu'à vingt cailloux,
„ sans savoir à quoi sert un instinct qui fait
„ avaler des pierres à ces animaux. Nous remar-
„ quons seulement que Beauchêne Gonin,
„ Navigateur françois, très-habile & digne de
„ foi, rapporte le même fait, & ajoute, ce
„ qu'on aura peut-être bien de la peine à croire,
„ que les pierres avoient déjà l'apparence d'être
„ digérées en partie. Le *liquor gastricus* de ces
„ animaux seroit-il si âcre qu'ils eussent besoin
„ de pierres pour lui donner quelque occupation
„ pendant qu'ils ne mangent pas. „ Extrait du
„ Mémoire de M. Forster déjà cité; voyez aussi le
„ second Voyage de Cook, tome IV, page 56;
„ & l'Histoire des Navigations aux terres australes,
„ tome II.

des A

cées qu'i

La vo

rente, s

aisé de

cri des

& des f

gissement

reau (f)

marqu

flement;

pièce de

que celui

beugleme

petits a h

agneau à

que de lo

peaux de

(f) „

animaux,

mâles beu

reaux en

melles bê

& les petit

Forster,

page 55.

des Animaux quadrupèdes. 233

cées qu'ils mangent en grande quantité.

La voix des lions-marins est différente, selon l'âge & le sexe, & il est aisé de distinguer, même de loin, le cri des mâles adultes, de celui de jeunes & des femelles; les mâles ont un mugissement semblable à celui du taureau (*f*), & lorsqu'ils sont irrités, ils marquent leur colère par un gros ronflement; les femelles ont aussi une espèce de mugissement, mais plus foible que celui du mâle, & assez semblable au beuglement d'un jeune veau; la voix des petits a beaucoup de rapport à celle d'un agneau âgé de quelques mois; de sorte que de loin on croiroit entendre des troupeaux de bœufs & de moutons qui se-

(*f*) „ Le bruit que produisoient tous ces animaux, assourdissoit nos oreilles; les vieux mâles beuglent & rugissent comme des taureaux en colère ou comme les lions; les femelles bêlent exactement comme les veaux, & les petits (lions-marins) comme des agneaux.” Forster, *Second Voyage de Cook*, tome IV, page 55.

roient répandus sur les côtes, quoique ce ne soit réellement que des troupes de lions-marins, dont les mugissemens, sur des accens & des tons différens, se font entendre d'assez loin pour avertir les Voyageurs qu'ils approchent de la terre (t), que les brumes, dans ces parages, dérobent souvent à leurs yeux.

Les lions-marins marchent de la même manière que les ours-marins, c'est-à-dire, en se traînant sur la terre à l'aide de leurs pieds de devant, mais c'est encore plus pesamment & de plus mauvaise grâce; il y en a qui sont si lourds, & ce sont probablement les vieux, qu'ils ne quittent pas la pierre qu'ils ont choisie pour leur siège, & sur laquelle ils passent le jour entier à ronfler & à dormir; les jeunes ont aussi moins de vivacité que les jeunes ours-marins, on les trouve souvent endormis sur le ri-



(t) Kracheninnikow, *Histoire du Kamtschatka*; Lyon, 1767, tome I, page 285.

des
vage, r
fond,
lent &
que les
se mett
le père
& les
forcer
dans l'e
tous ce
jeunes
& de le
fort lon
ils exh
répand
noire
celle d
dit qu
de de
mais p
Voyag
ceux-c
de tou
chair
se mar
& asse
est très





des Animaux quadrupèdes. 235

vage, mais leur sommeil est si peu profond, qu'au moindre bruit ils s'éveillent & fuient du côté de la mer; lorsque les petits sont fatigués de nager, ils se mettent sur le dos de leur mère, mais le père ne les y souffre pas long-temps & les en fait tomber, comme pour les forcer de s'exercer & de se fortifier dans l'exercice du nage. En général, tous ces lions-marin tant adultes que jeunes, nagent avec beaucoup de vitesse & de légèreté; ils peuvent aussi demeurer fort long-temps sous l'eau sans respirer; ils exhalent une odeur forte & qui se répand au loin; leur chair est presque noire & d'assez mauvais goût, sur-tout celle des mâles; cependant M. Steller dit que la chair des pieds ou nageoires de derrière est très-bonne à manger, mais peut-être n'est-ce que pour des Voyageurs, d'autant moins difficiles que ceux-ci manquoient; pour ainsi dire, de tout autre aliment; ils disent que la chair des jeunes est blanchâtre & peut se manger, quoiqu'elle soit un peu fade & assez désagréable au goût; leur graisse est très-abondante & assez semblable à





**IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)**



**Photographic
Sciences
Corporation**

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

1.8
2.0
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
4.0
4.5

5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10

celle de l'ours-marin, & quoique moins huileuse que celle des autres phoques, elle n'en est pas plus mangeable. Cette grande quantité de graisse & leur fourrure épaisse, les défendent contre le froid dans les régions glaciales; mais il semble qu'elles devraient leur nuire dans les climats chauds, d'autant qu'on ne s'est point aperçu d'aucune mue dans le poil, ni de diminution de leur embonpoint dans quelque latitude qu'on les ait rencontrés (*u*); ces animaux amphibies diffèrent donc en cela des animaux terrestres qui changent de poil lorsqu'on les transporte dans des climats différens.

Le lion-marin diffère aussi de tous

(*u*) Le lion-marin (des côtes du Brésil) ne diffère du loup-marin (qui y est encore commun, & qui probablement est l'ours-marin), que par de longues soies qui lui pendent sur le cou; nous en vîmes d'aussi gros que des taureaux; on en tua quelques-uns, leur corps n'est qu'une masse de graisse dont on tire de l'huile, &c. *Lettres édifiantes, quinzième Recueil, pages 344 & suivantes.*

les autres caractères & qui sembleroit estre, ondoyant & de couleur le front de cette couleur & lui donne une femelle mince vestige est couleur jaunâtre

(*x*) Odisch, (Desiré) chiens-marin hauts, & leur corps celui d'un se présent long & Voyages orientales & 15.

des Animaux quadrupèdes. 237

les autres animaux de la mer, par un caractère qui lui a fait donner son nom; & qui lui donne en effet quelque ressemblance extérieure avec le lion terrestre, c'est une crinière de poil épais, ondoyans, longs de deux à trois pouces & de couleur jaune-foncé qui s'étend sur le front, les joues, le cou & la poitrine; cette crinière se hérissé lorsqu'il est irrité, & lui donne un air menaçant (*x*); la femelle, qui a le corps plus court & plus mince que le mâle, n'a pas le moindre vestige de cette crinière, tout son poil est court, lisse, luisant & d'une couleur jaunâtre assez claire; celui du mâle, à

(*x*) On fit; dans le Voyage de Thomas Candisch, qu'il y a quelques îles dans ce port (Desiré), où l'on voit une grande quantité de chiens-marins, qui sont extrêmement puissans & hauts, & d'une vilaine figure; le devant de leur corps ne peut être mieux comparé qu'à celui d'un lion; leur cou & toute la partie qui se présente au-dessous, sont couverts d'un poil long & rude. *Olivier de Noort*; Recueil des Voyages qui ont servi à l'établissement des Indes orientales. *Amsterdam*, 1702, tome II, pages 14 & 15.

l'exception de la crinière, est de même luisant, poli & court, seulement il est d'un fauve-brunâtre & plus foncé que celui de la femelle; il n'y a point de feutre ou petits poils lanugineux au-dessous des longs poils comme dans l'ours-marin; au reste, la couleur de ces animaux varie suivant l'âge; les vieux mâles ont le pelage fauve comme les femelles, & ils ont quelquefois du blanc sur le cou & la tête; les jeunes ont ordinairement la même couleur fauve-foncée des mâles adultes, mais il y en a qui sont d'un brun presque noir, & d'autres qui sont d'un fauve-pâle comme les vieux & les femelles.

Le poids de ce gros animal est d'environ quinze à seize cens livres, & sa longueur de dix à douze pieds lorsqu'il a pris tout son roissement (y);

(y) Les Voyageurs sont d'accord sur le poids des lions-marins, mais ils ne le sont pas également sur sa taille; les uns leur donnent douze à quatorze pieds de longueur, & Dom Pernetti les fait encore plus grands. M. Steller dit que

les femelles
minces, sont
communément
de longueur

leur corps n'est
des ours-marins
épais; & M.
de près ces
marins ont,
longueur, qu'
d'autant qu'
la pesanteur
de Cook, tome

(z) " En
Jacques Lem
où on prit d
de bon goût
d'un petit ch
celle d'un li
rude, mais le
sont pas de l
on ne les p
sous la gorge
mousquets ch
cent coups d
dre le sang p
ne laissoient
Recueil des V
tome II, page

des Animaux quadrupèdes. 239

les femelles, qui sont beaucoup plus minces, sont aussi plus petites, & n'ont communément que sept à huit pieds de longueur (2) ; le corps des uns &

leur corps ne surpasse guère en longueur celui des ours-marins, mais qu'il est beaucoup plus épais ; & M. Forster, qui paroît avoir examiné de près ces animaux, dit que les vieux lions-marins ont, en général, dix à douze pieds de longueur, qui est celle que nous adoptons ici, d'autant qu'elle paroît être la plus conforme à la pesanteur de l'animal. *Voyez le Second Voyage de Cook, tome IV, page 54.*

(2) « En venant du port de Desiré, dit Jacques Lemaire, on relâcha à l'île du Roi, « où on prit de jeunes lions-marins qui étoient « de bon goût ; ces lions sont de la grandeur « d'un petit cheval, ayant la tête semblable à « celle d'un lion, avec une crinière longue & « rude, mais les lionnes n'en ont point, & ne « sont pas de la moitié si grosses que les mâles ; « on ne les pouvoit tuer qu'en leur donnant « sous la gorge ou dans la tête, des coups de « mousquets chargés à balles ; on leur donnoit « cent coups de levier, jusqu'à leur faire ren- « dre le sang par la geule & par le nez, qu'ils « ne laissoient pas de s'enfuir & de se sauver. » *Recueil des Voyages de la Compagnie des Indes, tome II, page 14.*

des autres, dont le diamètre est à-peu-près égale au tiers de sa longueur, a presque partout une épaisseur égale, & se présente aux yeux comme un gros cylindre, plutôt fait pour rouler que pour marcher sur la terre; aussi ce corps trop arrondi n'y trouve d'assiette que parce qu'étant recouvert par-tout d'une graisse excessive, il prête aisément aux inégalités du terrain & aux pierres sur lesquelles l'animal se couche pour se reposer (a).

(a) A quelques légères circonstances près, on ne peut guère douter que le passage suivant du Voyage de Coréal ne désigne nos lions-marins.

« A midi, je pris les deux chaloupes, &
 » j'entrai dans le havre de l'île des Veaux-
 » marins, avec quarante hommes armés chacun
 » d'une massue & d'un bâton; étant à terre,
 » nous chassâmes les veaux-marins en troupes;
 » nous les entourâmes, &, en une demi-heure
 » de temps, nous en tuâmes quatre cens. . . .
 » Les mâles, quand ils sont vieux, sont ordi-
 » nairement aussi grands qu'un veau, & ressem-
 » blent, du cou, du poil & de la tête, du
 » museau & du crin, à un lion; la femelle

La tête

des A

La tête
proportion

ressemble a
cepté qu'el
uni comme
ne l'a uni c
le derrière
jusqu'à deu
qu'ils ont
deux autres
vent marche
sur des roch
Ils se plaisir
sur le rivage
huit pieds
portion; po
pieds de lon
les plus com
fort gras; il
deux homm
un des gros
leur arme
occasion. . .
& aussi belle
à manger fra
quand on l'a
ces veaux d
plus jeunes,
Dès qu'elles
les petits vie
Supplém

des Animaux quadrupèdes. 241

La tête paroît être trop petite à proportion d'un corps aussi gros ; le

ressemble aussi pardevant à une lionne, excepté qu'elle est toute velue, & a le poil uni comme un cheval, au lieu que le mâle ne l'a uni qu'au derrière ; ils sont difformes, le derrière leur va toujours en rapetissant jusqu'à deux nageoires ou pieds fort courts qu'ils ont à l'extrémité du corps ; ils en ont deux autres à la poitrine, de sorte qu'ils peuvent marcher sur la terre, & même grimper sur des rochers & des montagnes assez hautes. Ils se plaisent à coucher au soleil & à dormir sur le rivage ; il y en a qui ont plus de dix-huit pieds de long, & qui sont gros à proportion ; pour ceux qui n'ont que quatorze pieds de long, il y en a des milliers, mais les plus communs n'en ont que cinq, & sont fort gras ; ils ouvrent toujours la gueule, & deux hommes ont assez de peine à en tuer un des gros avec un épieu, qui est la meilleure arme dont on puisse se servir en cette occasion. . . . La chair en est aussi blanche & aussi belle que celle d'agneau, & très-bonne à manger fraîche ; mais elle est bien meilleure quand on l'a tenue un peu dans le sel. Tous ces veaux que nous apprêtâmes étoient des plus jeunes, & qui étoient encore leurs mères. Dès qu'elles viennent à terre, elles bêlent, & les petits viennent auprès en bêlant comme

Supplément. Tome XII.

L

242 *Supplément à l'Histoire*

musseau est assez semblable à celui d'un gros dogue, étant un peu relevé & comme tronqué à son extrémité; la lèvre supérieure déborde sur la lèvre inférieure, & toutes deux sont garnies de cinq rangs de soies rudes en forme de moustaches qui sont longues, noires, & s'étendent le long de l'ouverture de la gueule; ces soies sont des tuyaux dont on peut faire des cure-dents (*b*); elles deviennent blanches dans la vieillesse; les oreilles sont coniques & longues seulement de six à sept lignes, leur cartilage est ferme &

» des agneaux; une vieille femelle en allaite
 » quatre ou cinq, & chasse les autres petits qui
 » s'approchent d'elle, d'où je juge qu'elles ont
 » quatre petits d'une ventrée; les petits, que
 » nous tuâmes & mangeâmes, étoient aussi gros
 » qu'un chien de moyenne grandeur; nous dé-
 » graissâmes les plus gros, & en fîmes de l'huile
 » pour les lampes & pour les usages du Vaif-
 » seau; mais nous gardâmes pour la friture l'huile
 » qu'on tire des jeunes; mes gens la trou-
 » voient aussi bonne que l'huile d'olive.»
Voyage de François Coréal; Paris, 1522, tome II,
page 180.

(*b*) Mémoire sur les phoques, par M. Forster.

des A

roide, ne
 l'extrémi
 lisse, &
 verte de
 & proémi
 angles en
 couleur r
 les yeux
 dens & é
 le reste d
 tits filets s
 (*membra*
 rieur qui
 en entier
 fourcils co
 forts surm
 couverte
 & elle eff
 trémité: l
 transversal
 sibles; les
 trente-six
 & sont di
 supérieures
 sont term
 lieu que le
 il y en a o

des Animaux quadrupèdes. 243

roide, néanmoins elles sont repliées vers l'extrémité; la partie intérieure en est lisse, & la surface extérieure est couverte de poil; les yeux sont grands & proéminens; les caroncules des grands angles en sont fort apparentes & d'une couleur rouge assez vive, en sorte que les yeux de cet animal paroissent ardens & échauffés; l'iris en est verte & le reste de l'œil est blanc, varié de petits filets sanguins; il y a une membrane (*membrana nictitans*) à l'angle intérieur qui peut au besoin recouvrir l'œil en entier à la volonté de l'animal; des sourcils composés de crins noirs assez forts surmontent les yeux; la langue est couverte de petites fibres tendineuses, & elle est un peu fourchue à son extrémité: le palais est canelé & sillonné transversalement par des rides assez sensibles; les dents sont au nombre de trente-six, comme dans l'ours-marin, & sont disposées de même; les incisives supérieures (*planche XLIX, figure 1*), sont terminées par deux pointes, au lieu que les inférieures n'en ont qu'une, il y en a quatre tant en haut qu'en bas;

celui
re-
extré-
sur
sont
s en
ques,
l'ou-
sont
s cu-
nches
t co-
fix à
ne &

allaité
its qui
es ont
, que
si gros
ous dé-
l'huile
Vaif-
l'huile
trou-
ive. »
me II,

Forster.

les dents canines (*figure 2*), sont bien plus longues que les incisives & d'une forme conique, un peu crochues à l'extrémité, avec une canelure au côté intérieur; il y a, comme dans l'ours-marin, des doubles dents canines à la mâchoire supérieure qui sont placées l'une auprès de l'autre entre les incisives & les molaires, & une canine seulement de chaque côté à la mâchoire inférieure; mais toutes ces dents canines, ainsi que les incisives & les molaires, sont du triple plus longues que celles de l'ours-marin; ces dents molaires (*figure 3*), sont au nombre de six de chaque côté dans la mâchoire supérieure, & au nombre de cinq seulement de chaque côté dans la mâchoire inférieure; elles ont à-peu-près la même figure que les canines, seulement elles sont plus courtes; on remarque sur ces dents molaires une proéminence ou tubérosité osseuse, qui paroît faire partie constituante de la dent.

Le lion-marin, au lieu de pieds de devant, a des rageoires qui sortent de chaque côté de la poitrine, elles sont

lisses &
rence de
d'ongle a
peine; c
ment cin
leurs arti
la forme
d'une su
au tiers
en la m
forme de
d'un tria
pointe,
de poil
intérieure

Les na
celles de
noirâtre,
elles sont
doigts f
terminés
comprim
l'extrémi
qui sont
vent à l
corps.

Dans

des Animaux quadrupèdes. 245

lisses & de couleur noirâtre sans apparence de doigts, avec une foible trace d'ongle au milieu que l'on distingue à peine; cependant ces nageoires renferment cinq doigts avec des phalanges & leurs articulations; ces petits ongles ont la forme de tubercules arrondis, & sont d'une substance cornée; ils sont situés au tiers de la longueur de la nageoire en la mesurant depuis l'extrémité; la forme de la nageoire entière est celle d'un triangle alongé & tronqué vers la pointe, & elle est absolument dénuée de poil & comme crénelée sur la face intérieure.

Les nageoires postérieures sont, comme celles de devant, couvertes d'une peau noirâtre, lisse & sans aucun poil, mais elles sont divisées à l'extérieur en cinq doigts fort longs & aplatis, qui sont terminés par une membrane mince, comprimée & qui s'étend au-delà de l'extrémité des doigts; les petits ongles qui sont au-dessus de ces doigts ne servent à l'animal que pour se gratter le corps.

Dans les phoques, la conformation

246 *Supplément à l'Histoire*

des pieds est très-différente, tous ont des pattes en devant assez bien conformées, avec des doigts distincts & bien marqués qui sont seulement joints par une membrane; leurs pieds & leurs doigts sont aussi garnis de poil comme le reste du corps, au lieu que, dans le lion-marin, comme dans l'ours-marin, ces quatre extrémités sont plutôt des nageoires que des pattes; aussi croyons-nous devoir rapporter à l'une ou l'autre de ces espèces du lion-marin ou de l'ours-marin ce que dit Frézier des phoques, qui se trouvent sur les côtes occidentales de l'Amérique. « Ils diffèrent, dit ce Voyageur, des loups-marins du Nord, en ce que ceux-là ont des pattes, & que ceux-ci ont des nageoires alongées à-peu-près comme des ailes vers les épaules, & deux autres petites qui enferment le croupion. La Nature a néanmoins conservé au bout des grandes nageoires quelque conformité avec les pattes, car on y remarque des ongles qui en terminent l'extrémité, peut-être que ces animaux s'en servent pour marcher à terre où ils se plaisent fort, &

des A
où ils po
rissent de
cris comm
les a fait
leur tête
chien qu
avec rais
pellent
couverte
& leur
mauvais
de Child
leurs pro
équipages
l'huile po
est fort
peine sur
les tue d
en a de
Sud, ils
mâtins, d
ont plus

La ver

(c) Voy
in-4.^o pages

des Animaux quadrupèdes. 247

où ils portent leurs petits qu'ils nourrissent de poisson Ils jettent des cris comme les veaux, & c'est ce qui les a fait appeller *veaux-marins*; mais leur tête ressemble plutôt à celle d'un chien qu'à tout autre animal; & c'est avec raison que les Hollandois les appellent *chiens-marins*. Leur peau est couverte d'un poil fort ras & touffu, & leur chair est fort huileuse & de mauvais goût . . . néanmoins les Indiens de Chiloë la font sécher, & en font leurs provisions pour se nourrir; les équipages des Vaisseaux en tirent de l'huile pour leurs besoins. La pêche en est fort facile, on en approche sans peine sur la terre & sur la mer, & on les tue d'un seul coup sur le nez. Il y en a de différentes grandeurs; dans le Sud, ils sont de la grosseur des forts mâtins, & au Pérou on en trouve qui ont plus de douze pieds de long (c).»

La verge du lion-marin est à-peu-près

(c) Voyage à la mer du Sud; Paris, 1732, in-4.º pages 74 & 75.

248 *Supplément à l'Histoire*

de la grosseur de celle du cheval, & la vulve, dans la femelle, est placée fort bas vers la queue; qui n'a qu'environ trois pouces de longueur; cette courte queue est de forme conique & couverte d'un poil semblable à celui du corps; lorsque l'animal est dans une situation alongée, la queue se trouve cachée entre les nageoires de derrière qui, dans cette situation, sont très-voisines l'une de l'autre.

M. Forster nous a donné les dimensions suivantes, prises sur une femelle, qui probablement n'avoit pas encore acquis tout son accroissement.

	pieds.	pouces.	lignes.
Du bout du nez à l'extrémité des doigts du milieu de la nageoire de derrière	6.	6.	3.
Du bout du nez jusqu'à l'extrémité de la queue.	5.	6.	"
Du bout du nez jusqu'à l'origine de la queue..	5.	3.	"
Circonférence du corps aux épaules.	3.	11.	"
Circonférence de la tête derrière les oreilles. . .	2.	1.	5.

des A

Longueur d
devant .
Longueur d
derrière
mité du
Depuis l'e
lèvre sup
gle de la
Depuis l'e
lèvre sup
la base d
Longueur d
Longueur d
Longueur
doigt du
nageoire
Hauteur des

Si l'on nous avon que nous v on peut v logie entr habitudes caractères il y a des l'on a qu espèces, i principales

des Animaux quadrupèdes. 249

	pieds.	pouces.	lignes.
Longueur des nageoires de devant	1.	9.	"
Longueur des nageoires de derrière, jusqu'à l'extrémité du pouce	1.	5.	"
Depuis l'extrémité de la lèvre supérieure à l'angle de la bouche	"	3.	8.
Depuis l'extrémité de la lèvre supérieure jusqu'à la base des oreilles	"	8.	"
Longueur des moustaches	"	5.	3.
Longueur de la queue	"	2.	10.
Longueur de l'ongle du doigt du milieu de la nageoire postérieure	"	"	11.
Hauteur des oreilles	"	"	7.

Si l'on veut comparer tout ce que nous avons dit de l'ours-marin avec ce que nous venons de dire du lion-marin, on peut voir qu'il y a beaucoup d'analogie entre ces animaux, tant par les habitudes naturelles que par plusieurs caractères extérieurs; néanmoins comme il y a des différences essentielles, & que l'on a quelquefois confondu ces deux espèces, il est bon de résumer ici leurs principales différences.

250 *Supplément à l'Histoire*

1.° Le lion-marin a, comme le lion terrestre, une crinière fauve, & tout le reste de son poil est court, lisse, luisant & couché sur la peau, au lieu que l'ours-marin n'a point de crinière, & que le poil du cou & de tout le corps est long & hérissé; il y a de plus à la racine du long poil, un second poil plus court; c'est une espèce de fourrure ou feutre lanugineux qui manque au lion-marin.

2.° La couleur du lion-marin est fauve & jaunâtre, tirant sur le brun, & à-peu-près semblable à celle du lion terrestre; tandis que la couleur de l'ours-marin est d'un brun-foncé presque noir, moucheté quelquefois de petits points blancs.

3.° La taille des lions-marins est ordinairement de dix à douze pieds, & celle des ours-marins les plus grands, n'excède jamais huit à neuf pieds.

4.° Les lions-marins sont indolens & fort lourds, & ils ne marquent que bien peu d'attachement pour leur progéniture; au contraire, les ours-marins sont très-vifs & donnent des preuves





LE LION-MARIN .

lion
ut le
lui-
que
, &
corps
s à la
poil
rrure
e au

fauve
& à-
n ter-
ours-
noir,
points

ft or-
s, &
ands,

ens &
t que
pro-
marms
reuves



MIRAM-MOIS. P. I.

supl.
n. XII. Tom.

Fig. 1.



I



DENTS DU LION - MARIN.

des An


d'un gran
par les so

5.^o E
ours-mar
terrein &
dant ils y
séparées &
& s'ils so
quelquefo
bituer en
tôt la fam

des Animaux quadrupèdes, 251

d'un grand amour pour leurs petits ;
par les soins qu'ils en prennent.

5.^o Enfin , quoique les lions & les
ours-marins soient souvent sur le même
terrein & dans les mêmes eaux ; cepen-
dant ils y vivent toujours en troupes
séparées & éloignées les unes des autres ;
& s'ils sont assez voisins pour se mêler
quelquefois , ce n'est jamais pour s'ha-
bituer ensemble , & chacun rejoint bien-
tôt sa famille.



LES LAMANTINS. (a)

NOUS AVONS DIT que la Nature semble avoir formé les Lamantins pour faire la nuance entre les quadrupèdes amphibies & les cétacées: ces êtres mi-toyens placés au-delà des limites de cha-

(a) Voyez sur l'étymologie de ce nom *Lamantin*, ce que j'ai dit dans la note * *vol. XIII*, page 377.

Manati, par les Hollandois; *sea-cow*, par les Anglois; *moiskaia*, *korowa*, par les Russes; *manatée*, *manatte*, par les François; *pezzemouller* & *piexe-molker* ou *poisson-femme*, par les Portugais; *ambira gulo*, *pefien goni*, par les Nègres du Congo; *ngulla'umafa* ou *la truie d'eau*, par d'autres Nègres; & *lereou*, par ceux du Sénégal; on a aussi donné au lamantin le nom de *vache-marine*, parce qu'on a cru trouver dans la forme extérieure de sa tête, quelques rapports avec celle du bœuf, & que d'ailleurs il se nourrit aussi d'herbes; plusieurs Voyageurs l'ont même appelée *Syrène*, & c'est peut-être en effet la véritable *syrene* des Anciens, qui a donné lieu à tant de contes & de récits fabuleux.

des

que cl
quoiqu
& anor
attentio
possède
pour
occupe

Auff
à l'exté
organis
perfect
du sent
être pl
térieur
semblen
telligen
ne crai
ils affect
de le f
cet inst
plus ha
semblab
jours en
les autr
d'eux,
tout acc
danger

des Animaux quadrupèdes. 253

que classe, nous paroissent imparfaits; quoiqu'ils ne soient qu'extraordinaires & anomaux; car, en les considérant avec attention, l'on s'aperçoit bientôt qu'ils possèdent tout ce qui leur étoit nécessaire pour remplir la place qu'ils doivent occuper dans la chaîne des êtres.

Aussi les lamantins, quoiqu'informes à l'extérieur, sont à l'intérieur très-bien organisés, & si l'on peut juger de la perfection d'organisation par le résultat du sentiment, ces animaux seront peut-être plus parfaits que les autres à l'intérieur, car leur naturel & leurs mœurs semblent tenir quelque chose de l'intelligence & des qualités sociales; ils ne craignent pas l'aspect de l'homme, ils affectent même de s'en approcher & de le suivre avec confiance & sécurité; cet instinct pour toute société est au plus haut degré pour celle de leurs semblables; ils se tiennent presque toujours en troupes & ferrés les uns contre les autres avec leurs petits au milieu d'eux, comme pour les préserver de tout accident; tous se prêtent dans le danger des secours mutuels; on en a

vu essayer d'arracher le harpon du corps de leurs compagnons blessés (b), & souvent l'on voit les petits suivre de près le cadavre de leurs mères jusqu'au rivage, où les pêcheurs les amènent en les tirant avec des cordes (c); ils montrent autant de fidélité dans leurs amours que d'attachement à leur société; le mâle n'a communément qu'une seule femelle qu'il accompagne constamment avant & après leur union; ils s'accouplent dans l'eau la femelle renversée sur le dos, car ils ne viennent jamais à terre & ne peuvent même se traîner dans la vase; ils ont le trou ovale du cœur ouverte, & par conséquent la femelle peut rester sous l'eau pendant la copulation.

Ces animaux ne se trouvent pas dans les hautes mers à une grande distance des terres, ils habitent au voisinage

(b) Voyez, ci-après, l'article du lamantin de Kamtschatka.

(c) Voyez Dutertre, *Histoire des Antilles*.

des côtes
sur les p
& les aut
nourrisse
font éga
c'est par
guerre o
diminuée
les hom
bre.

Nous
pèces de
petite, l
& très-g
mence l
minuant
gine de
mine cet
tail éten
yeux so
situés à
auditifs
trous q
indiqués
qu'on n
d'une in

des Animaux quadrupèdes. 253

des côtes & des îles, & particulièrement sur les plages qui produisent les *fucus* & les autres herbes marines dont ils se nourrissent; leur chair & leur graisse sont également bonnes à manger, & c'est par cette raison qu'on leur fait une guerre cruelle, & que l'espèce en est diminuée sur la plupart des côtes où les hommes se sont habitués en nombre.

Nous connoissons quatre ou cinq espèces de lamantins; tous ont la tête très-petite, le cou fort court, le corps épais & très-gros jusqu'à l'endroit où commence la queue, & allant ensuite en diminuant de plus en plus jusqu'à l'origine de la pinne ou nageoire qui termine cette queue en forme d'un éventail étendu dans le sens horizontal; les yeux sont très-petits & ordinairement situés à égale distance, entre les trous auditifs & l'extrémité du museau; ces trous qui leur servent d'oreilles, sont indiqués par deux petites ouvertures qu'on ne peut apercevoir qu'au moyen d'une inspection attentive; la peau du

256 *Supplément à l'Histoire*

corps est raboteuse, très-épaisse, & dans quelques espèces elle est parsemée de poils rares; la langue est étroite, d'une moyenne longueur & assez menue relativement au volume du corps; la verge est placée dans un fourreau adhérent à la peau du ventre qui s'étend jusqu'au nombril; les femelles ont la vulve assez grande avec un clitoris apparent; cette partie n'est pas située comme dans les autres animaux, au-dessous mais au-dessus de l'anus; elles ont les mamelles placées sur la poitrine & très-proéminentes dans le temps de la gestation & de l'allaitement de leurs petits; mais, dans tout autre temps, elles ne sont apparentes que par leurs boutons.

Voilà les caractères généraux & communs à tous les lamantins, mais il y en a de particuliers par lesquels on peut distinguer les espèces; par exemple, le grand lamantin de Kamtschatka manque absolument de doigts & d'ongles dans les deux mains ou nageoires; il manque aussi de dents, & n'a dans chaque mâchoire qu'un os fort & robuste qui lui

des

sert à
les lam
ont des
dents r
gueule.

des Animaux quadrupèdes. 257

sert à broyer les alimens : au contraire, les lamantins d'Amérique & d'Afrique ont des doigts & des ongles, & des dents molaires dans le fond de la gueule.



LE GRAND LAMANTIN**DE KAMTSCHATKA.**

CETTE ESPÈCE se trouve en assez grand nombre dans les mers orientales au-delà de Kamtschatka, sur-tout aux environs de l'île Bering, où M. Steller en a décrit & même disséqué quelques individus (a). Ce grand lamantin paroît aimer les plages vaseuses des bords de la mer, il se tient aussi volontiers à l'embouchure des rivières, mais il ne les remonte pas pour se nourrir de l'herbe qui croît sur leurs bords, car il habite constamment les eaux salées ou saumâtres; il diffère donc, à cet égard, du petit lamantin de la Guyane & de celui du Sénégal, comme il en diffère

(a) Celui dont il est ici question, a été décrit par ce Voyageur dans les *Novi Commentarii Academiae Petropol.* tome II, 1751; & tué à l'île de Bering le 12 juillet 1742.

des A

aussi par
ou bras
cher sur
que pou
ler, au
animaux
se mouv
on le tu
ches & c

Ces g
en trou
si peu fa
cher &
lent si p
ger ne l
ils la tē
font me
le temps
il faut l
qu'ils p
mais, u

(b) K
Lyon, 17

des Animaux quadrupèdes. 259

aussi par la grandeur du corps ; ses mains ou bras ne peuvent lui servir à marcher sur la terre, & ne lui sont utiles que pour nager. « J'ai vu, dit M. Steller, au reflux de la marée, un de ces animaux à sec, il lui fut impossible de se mouvoir pour regagner le rivage, & on le tua sur la plage à coups de haches & de perches.

Ces grands lamantins que l'on voit en troupe autour de l'île Bering, sont si peu farouches qu'ils se laissent approcher & toucher avec la main ; ils veillent si peu à leur sûreté, qu'aucun danger ne les émeut, & qu'à peine lèvent-ils la tête hors de l'eau (b) lorsqu'ils sont menacés ou frappés, sur-tout dans le temps qu'ils prennent leur nourriture, il faut les frapper très-rudement pour qu'ils prennent le parti de s'éloigner ; mais, un moment après, on les voit re-

(b) Kracheninnikow, *Histoire de Kamtschatka* ; Lyon, 1767, tome I, page 317.

venir au même lieu, & ils semblent avoir oublié le mauvais traitement qu'ils viennent d'essuyer ; & si la plupart des Voyageurs ne disoient pas à-peu-près la même chose des autres espèces de lamantins, on croiroit que ceux-ci ne sont si confians & si peu sauvages autour de l'île déserte de Bering, que parce que l'expérience ne leur a pas encore appris ce qu'il en coûte à tous ceux qui se familiarisent avec l'homme (c).

Chaque mâle ne paroît s'attacher qu'à une seule femelle, & tous deux sont ordinairement accompagnés ou suivis d'un petit de la dernière portée, & d'un autre plus grand de la portée

(c) « Les loutres-marines (faricoviennes), les phoques, les isatis de l'île de Bering, ne connoissant pas l'homme, dit M. Steller, n'en avoient nulle crainte, & ces animaux sont très-farouches au contraire sur les côtes de Kamtschatka, parce qu'ils ont éprouvé la puissance de l'homme, dont la seule odeur les fait fuir. » *Novi Commentarii Academiae Petropol.* tome II, 1751.

précédent
produit
temps d
an (d)
jeunes n
que qua
conduire
âgés 1-ou
d'une ne

Ces a
temps,
du jour
fitent ce
est la p

(d) A
ninnikow
page 316
gestation
mois, car
en autom
temps; m
temps ces
les a très
adopter s
son récit.
temps de
un an.

des Animaux quadrupèdes. 261

précédente ; ainsi, dans cette espèce, le produit n'est que d'un ; & , comme le temps de la gestation est d'environ un an (d) , on peut en inférer que les jeunes ne quittent leurs père & mère , que quand ils sont assez forts pour se conduire eux-mêmes, & peut-être assez âgés pour devenir à leur tour les chefs d'une nouvelle famille.

Ces animaux s'accouplent au printemps, & plus souvent vers le déclin du jour qu'à toute autre heure ; ils profitent cependant des momens où la mer est la plus tranquille , & préludent à

(d) A en juger par ce que dit M. Krachenninikow (*Histoire du Kamtschatka*, tome I, page 316), il sembleroit que le temps de la gestation ne devoit être que de huit ou neuf mois, car il assure que les femelles mettent bas en automne, & qu'elles s'accouplent au printemps ; mais, comme M. Steller a observé longtemps ces animaux à l'île de Bering, & qu'il les a très-bien décrits, nous croyons devoir adopter son témoignage, & prononcer, d'après son récit, que, dans l'espèce de ce lamantin, le temps de la gestation est en effet d'environ un an.

leur union par des signes & des mouvemens qui annoncent leurs desirs : la femelle nage doucement , en faisant plusieurs circonvolutions comme pour inviter le mâle qui bientôt s'en approche, la suit de très-près & attend impatiemment qu'elle se renverse sur le dos pour le recevoir ; dans ce moment , il la couvre avec des mouvemens très-vifs ; ils sont non-seulement susceptibles des sentimens d'un amour fidèle & mutuel , mais aussi d'un fort attachement pour leur famille & même pour leur espèce entière ; ils se donnent des secours réciproques lorsqu'ils sont blessés ; ils accompagnent ceux qui sont morts & que les pêcheurs traînent au bord de la mer. « J'ai vu , dit M. Steller , l'attachement de ces animaux l'un pour l'autre , & sur-tout celui du mâle pour la femelle , en ayant harponné une , le mâle la suivit à mesure qu'on l'entraînoit au rivage , & les coups qu'on lui donnoit de toutes parts , ne purent le rebuter ; il ne l'abandonna pas même après sa mort , car le lendemain , comme les matelots alloient pour mettre en pièces

la femelle
trouvèrent
qui ne l'a

On ha
plus aisém
que jamais
est plus ai
petits ou l
niers nage
souvent il
harpon. te
leur chair
est de fer ,
quatre ou
une barqu
tient & la
frappé &
ou trente
trémité de
chent de

des Animaux quadrupèdes. 263

la femelle qu'ils avoient tuée la veille ; ils trouvèrent le mâle au bord de la mer qui ne l'avoit pas quittée (e).

On harponne les lamantins d'autant plus aisément qu'ils ne s'enfoncent presque jamais en entier sous l'eau ; mais il est plus aisé d'avoir les adultes que les petits ou les jeunes , parce que ces derniers nagent beaucoup plus vite , & que souvent ils s'échappent en laissant le harpon teint de leur sang ou chargé de leur chair. Le harpon, dont la pointe est de fer, est attaché à une longue corde, quatre ou cinq hommes se mettent sur une barque, le premier qui est en avant tient & lance le harpon, & lorsqu'il a frappé & percé le lamantin, vingt-cinq ou trente hommes qui tiennent l'extrémité de la corde sur le rivage, tâchent de le tirer à terre, ceux qui

(e) *Novi Commentarii Academiæ Petropol. tom. II, ann. 1751.*

sont sur la barque tiennent aussi une corde qui est attachée à la première, & ils ne cessent de tirer l'animal jusqu'à ce qu'il soit tout-à-fait hors de l'eau.

Le lamantin rend beaucoup de sang par ses blessures ; « & j'ai remarqué, dit M. Steller, que le sang jaillissoit comme une fontaine, & qu'il s'arrêtoit dès que l'animal avoit la tête plongée dans l'eau ; mais que le jet se renouveloit toutes les fois qu'il l'élevoit au-dessus pour respirer ; d'où j'ai conclu que, dans ces animaux, comme dans les phoques, le sang avoit une double voie de circulation ; savoir, sous l'eau, par le trou ovale du cœur, & dans l'air, par le poumon (f).

Les *fucus* & quelques autres herbes qui croissent dans la mer, sont la seule nourriture de ces animaux ; c'est avec leurs lèvres, dont la substance est très-

(f) *Novi Commentarii Academiae Petropol.* tom. II, 1751.

dure,

dure, qu'ils enfoncent pour saisir, & n'ont pas l'air & en suite, par le nez, toujours l'air dans l'eau. La partie plongeable lorsqu'ils sont sur le dos, est entièrement dans l'eau, elle produit une quantité de vertèbres sur leur dos qui sont très-dures, & sont si aisément brisées, que leurs vertèbres sont dans

(g) *Krachs* tome I, page

Supplément

des Animaux quadrupèdes. 265

dure, qu'ils coupent la tige des herbes; ils enfoncent la tête dans l'eau pour les saisir, & ne la relèvent que pour rendre l'air & en prendre de nouveau; en sorte que, pendant qu'ils mangent, ils ont toujours la partie antérieure du corps dans l'eau, la moitié des flancs & toute la partie postérieure au-dessus de l'eau; lorsqu'ils sont rassasiés, ils se couchent sur le dos, sans sortir de l'eau, & dorment dans cette situation fort profondément (g); leur peau, qui est continuellement lavée, n'est pas plus nette, elle produit & nourrit une grande quantité de vermines, que les mouettes & quelques autres oiseaux viennent manger sur leur dos. Au reste, ces lamantins, qui sont très-gras au printemps & en été, sont si maigres en hiver, qu'on voit aisément, sous la peau, le dessin de leurs vertèbres & de leurs côtes; & c'est dans cette saison qu'on en rencon-

(g) Kracheninnikow, *Histoire de Kamtschatka*,
tome I, page 318.

tre quelques-uns qui ont péri entre les glaces flottantes.

La graisse, épaisse de plusieurs pouces, enveloppe tout le corps de l'animal; lorsqu'on l'expose au soleil, elle y prend la couleur jaune du beurre; elle est de très-bon goût & même de bonne odeur, on la préfère à celle de tous les quadrupèdes, & la propriété qu'elle a d'ailleurs de pouvoir être conservée longtemps, même pendant les chaleurs de l'été, lui donne encore un plus grand prix; on peut l'employer aux mêmes usages que le beurre, & la manger de même, celle de la queue sur-tout est très-délicate, elle brûle aussi très-bien sans odeur forte ni fumée désagréable; la chair a le goût de celle du bœuf, seulement elle est moins tendre & exige une plus longue cuisson, sur-tout celle des vieux, qu'il faut faire bouillir longtemps pour la rendre mangeable.

La peau est une espèce de cuir d'un pouce d'épaisseur; plus ressemblant à l'extérieur à l'écorce rude d'un arbre, qu'à la peau d'un animal; elle est de couleur noirâtre & sans poil; il y a

seulement
gues auto
gueule &
qui doit
ne les a
temps fe
l'intérieur
cette pea
tout lorsqu
à l'entam
chis s'en
comme
font avec
ques.

Le lam
pesoit de
à-dire, e
gueur éto
fort petite
de figure
sommets,
jusqu'à l'e
rabbattue,
trouve to

des Animaux quadrupèdes. 267

seulement quelques soies rudes & longues autour des nageoires, autour de la gueule & dans l'intérieur des narines, ce qui doit faire présumer que le lamantin ne les a pas aussi souvent ni aussi longtemps fermées que les phoques, dont l'intérieur des narines est dénué de poil; cette peau du lamantin est si dure, surtout lorsqu'elle est sèche, qu'on a peine à l'entamer avec la hache. Les Tschutchis s'en servent pour faire des nacelles, comme d'autres peuples du Nord en font avec la peau des grands phoques.

Le lamantin, décrit par M. Steller, pesoit deux cens *puds* de Russie, c'est-à-dire, environ huit milliers; sa longueur étoit de vingt-trois pieds; la tête fort petite en comparaison du corps, est de figure oblongue, elle est aplatie au sommet, & va toujours en diminuant jusqu'à l'extrémité du museau, qui est rabattue, de manière que la gueule se trouve tout-à-fait au-dessous (*h*); l'ou-

(*h*) Clusius & Hernandès, qui ont donné la
M ij

verture en est petite & environnée de doubles lèvres, tant en haut qu'en bas; les lèvres supérieures & inférieures externes sont spongieuses, épaisses & très-gonflées; l'on voit à leur surface un grand nombre de tubercules, & c'est de ces tubercules que sortent des soies blanches ou moustaches de quatre ou cinq pouces de longueur: ces lèvres font les mêmes mouvemens que celles des chevaux, lorsque l'animal mange; les narines, qui sont situées vers l'extrémité du museau, ont un pouce & demi de longueur, sur autant de largeur environ quand elles sont entièrement ouvertes (i).

La mâchoire inférieure est plus courte que la supérieure; mais ni l'une ni l'autre ne sont garnies de dents, il y a seule-

description du lamantin des Antilles, ne paroissent pas l'avoir bien observé, car il n'a pas la tête telle qu'ils la représentent, mais assez semblable à celle de ce lamantin de Kamtschatka.

(i) Kracheninnikow, *Histoire du Kamtschatka*, tome 1, page 314.

ment de
est fixé
la mâch
blés de
face exté
crénelée
broye en
temps.

Les ye
précisème
l'extrémit
qui tienne
de sourci
de chaque
brane car
qui peut,
(sarcovie
en entier,

Il n'y a
ne sont qu
si petits,
faire entre
comme ces
à l'œil de
ont cru qu
d'autant qu
M. Steller

des Animaux quadrupèdes. 269

ment deux os durs & blancs, dont l'un est fixé au palais supérieur, & l'autre à la mâchoire inférieure; ces os sont criblés de plusieurs petits trous, leur surface extérieure est néanmoins solide & crénelée de manière que la nourriture se broye entre ces deux os en assez peu de temps.

Les yeux sont fort petits, & sont situés précisément dans les points milieux, entre l'extrémité du museau & les petits trous qui tiennent lieu d'oreilles; il n'y a point de sourcils, mais, dans le grand angle de chaque œil, il se trouve une membrane cartilagineuse en forme de crête, qui peut, comme dans la loutre-marine (saricovienne), couvrir le globe de l'œil en entier, à la volonté de l'animal.

Il n'y a point d'oreilles externes, ce ne sont que deux trous de figure ronde, si petits, que l'on pourroit à peine y faire entrer une plume à écrire; &, comme ces conduits auditifs ont échappé à l'œil de la plupart des Voyageurs, ils ont cru que les lamantins étoient sourds, d'autant qu'ils semblent être muets, car M. Steller assure que ceux de Kamts-

chatka ne font jamais entendre d'autre bruit que celui de leur forte respiration; cependant Kracheninnikow dit qu'il braie ou qu'il beugle (*k*), & le P. Magnien de Fribourg (*l*) compare le cri du lamantin d'Amérique à un petit mugissement.

Dans le lamantin de Kamtschatka, le cou ne se distingue presque pas du corps, il est seulement un peu moins épais auprès de la tête, que sur le reste de sa longueur; mais un caractère singulier par lequel cet animal diffère de tous les autres animaux terrestres ou marins, c'est que les bras qui partent des épaules auprès du cou, & qui ont plus de deux pieds de longueur, sont formés & articulés comme le bras & l'avant-bras dans l'homme; cet avant-bras du lamantin finit avec le métacarpe & le carpe, sans aucun vestige de doigts ni d'ongles:

(*k*) Histoire du Kamtschatka, tome I, page 321.

(*l*) Extrait d'un Manuscrit traduit de l'Espagnol, par M. de la Condamine.

caractères
mal de
carpe &
de graiss
recouver

On a
ce laman
la vingt-
cinq autr
corps n'e
des Antis
le cou ju
dans un f
il y en a
seize dan
en tout c
posant q
cou du l
roit en t
va toujou
& la form
qu'aplatie
elle est t

(*m*) Vo
page 385.

des Animaux quadrupèdes. 271

caractères qui éloignent encore cet animal de la classe des quadrupèdes ; le carpe & le métacarpe sont environnés de graisse & d'une chair tendineuse, recouverte d'une peau dure & cornée.

On a compté soixante vertèbres dans ce lamantin, & la queue commence à la vingt-sixième, & continue par trente-cinq autres ; en sorte que le tronc du corps n'en a que vingt-cinq ; le lamantin des Antilles en a cinquante-deux, depuis le cou jusqu'à l'extrémité de la queue ; dans un fœtus de lamantin de la Guyane, il y en avoit vingt-huit dans la queue ; seize dans le dos, & six dans le cou, en tout cinquante (m) : ainsi, en supposant qu'il y eût sept vertèbres dans le cou du lamantin des Antilles, il en auroit en tout cinquante-neuf ; la queue va toujours en diminuant de grosseur, & la forme extérieure est plutôt quarrée qu'aplatie ; dans celui de Kamtschatka, elle est terminée par une pinne épaisse

(m) Voyez l'article du lamantin, vol. XIII, page 385.

272 *Supplément à l'Histoire*

& très-dure, qui s'élargit horizontalement, & dont la substance est à-peu-près pareille à celle du fanon de la baleine.

Le membre du mâle, qui ressemble beaucoup à celui du cheval, mais dont le gland est encore plus gros, a deux pieds & demi de longueur; il est situé dans un fourreau adhérent à la peau du ventre; & il s'étend jusqu'au nombril; dans la femelle, la vulve est située à huit pouces de distance au-dessus de l'anus; le clitoris est apparent, il est presque cartilagineux & long de six lignes; les deux mamelles sont placées sur la poitrine; elles ont environ six pouces de diamètre dans le temps de la gestation, & tant que la mère allaite son petit; mais, dans tout autre temps, elles n'ont que l'apparence d'une grosse verrue ou d'un simple bouton; le lait est gras, & d'un goût à-peu-près semblable à celui de la brebis.

des A

*Dimensio
de Be
au pie*

Longueur
depuis l.
jusqu'à
queue.
Longueur
mité d
rieure a
Du milieu
gle de
Largeur d
deux an
Distance
Largeur
narines.
De l'extré
supérieu
gueule.
De l'extré
supérieu
De l'extré
supérieu
la vulve
De la lè
sternum
Diamètre

des Animaux quadrupèdes. 273

Dimensions du lamantin tué dans l'île de Bering, le 12 juillet 1742, réduites au pied-de-roi de France.

	pieds.	pouces.	lignes.
Longueur du corps entier, depuis la lèvre supérieure jusqu'à l'extrémité de la queue	23.	1.	6.
Longueur depuis l'extrémité de la lèvre supérieure aux narines	//	7.	6.
Du milieu du nez à l'angle de l'œil	1.	//	7.
Largeur de l'œil entre ses deux angles	//	//	7 $\frac{1}{2}$.
Distance entre les yeux ..	1.	4.	3.
Largeur & hauteur des narines	//	2.	3.
De l'extrémité de la lèvre supérieure au coin de la gueule	1.	2.	//
De l'extrémité de la lèvre supérieure à l'épaule ...	4.	//	9.
De l'extrémité de la lèvre supérieure à l'orifice de la vulve	15.	2.	//
De la lèvre inférieure au sternum	4.	2.	8.
Diamètre de la gueule,			

274 *Supplément à l'Histoire*


	pieds.	pouces.	lignes;
pris aux coins de son ouverture	1.	6.	9.
Circonférence de la tête à l'endroit des narines..	2.	5.	1.
Circonférence de la tête aux yeux	3.	9.	"
Hauteur du museau à son extrémité	"	7.	9 $\frac{1}{2}$.
Circonférence du corps aux épaules	11.	3.	"
Circonférence du cou prise à la nuque	6.	4.	11.
Circonférence du corps à l'abdomen	19.	"	9.
Circonférence de la queue à l'insertion de la pinne.	4.	4.	6.
Distance entre l'anus & la vulve	"	7.	6.
Longueur de la vulve	"	9.	6 $\frac{1}{2}$.
Distance entre les deux extrémités des deux cornes de la queue	6.	1.	2.
Longueur de la tête, depuis les narines à l'occiput, prise sur le squelette.	2.	1.	3.
Longueur de la tête à l'occiput	"	9.	9.
Longueur de l'os de l'épaule	1.	1.	6.
Longueur de l'os du bras.	"	11.	5.
Longueur ou plutôt longueur			

des

de l'
 Longue
 tins,
 qu'à
 soixa
 pouc
 ving
 le co
 mal.
 Hauteu
 Largeur
 Longue
 Largeur
 Longue
 Largeur

des Animaux quadrupèdes. 275

lignes,		pieds.	pouces.	lignes,
	de l'estomac.....	3.	6.	3.
9.	Longueur totale des intestins, depuis la gorge jusqu'à l'anus, quatre cens soixante-six pieds trois			
1.	pouces, c'est-à-dire,			
"	vingt fois aussi longs que			
9 $\frac{1}{2}$.	le corps entier de l'animal.....	466.	3.	"
"	Hauteur du cœur.....	1.	8.	6.
	Largeur du cœur.....	1.	11.	6.
11.	Longueur des reins.....	2.	6.	"
	Largeur des reins.....	1.	4.	11.
9.	Longueur de la langue...	"	11.	3.
	Largeur de la langue....	"	2.	3.



LE GRAND LAMANTIN**DES ANTILLES.**

NOUS APPELONS cette espèce *le grand Lamantin des Antilles*, parce qu'elle paroît se trouver encore aujourd'hui aux environs de ces îles, quoiqu'elle y soit néanmoins devenue rare depuis qu'elles sont bien peuplées. Ce lamantin diffère de celui de Kamtschatka, par les caractères suivans : la peau rude & épaisse n'est pas absolument nue, mais parsemée de quelques poils qui sont de couleur d'ardoise, ainsi que la peau (a) ; il a, dans les mains, cinq ongles apparens (b), assez semblables à ceux de l'homme ; ces ongles sont fort

(a) La peau du lamantin des Antilles est épaisse, ridée en quelques endroits, & parsemée de petits poils ; étant sèche, elle peut servir de rondache impénétrable aux flèches des Indiens. *Histoire naturelle & morale des Antilles*, page 178.

(b) *Hist. mex. pages 323 & suivantes.*

des

courts
une cal
mâcho
molaire
au con
le lama
absolun
sans pi
les mâ
férence
en fair
rées ;
différen
la gran
tilles
Kamsto
épais ;
quatorz
de vin
très-âgé
nouvea
que, i

(c)

(d)

tome 12

des Animaux quadrupèdes. 277

courts (c); il a de plus non-seulement une callosité offeuse au-devant de chaque mâchoire, mais encore trente-deux dents molaires au fond de la gueule (d); &, au contraire, il paroît certain que, dans le lamantin de Kamtschatka, la peau est absolument dénuée de poil, les mains sans phalanges ni doigts ni ongles, & les mâchoires sans dents; toutes ces différences sont plus que suffisantes pour en faire deux espèces distinctes & séparées; ces lamantins sont d'ailleurs très-différens par les proportions & par la grandeur du corps; celui des Antilles est moins grand que celui de Kamtschatka; il a aussi le corps moins épais; sa longueur n'est que de douze, quatorze, quinze, dix-huit & rarement de vingt pieds, à moins qu'il ne soit très-âgé; celui qui est décrit dans le nouveau Voyage aux îles de l'Amérique, imprimé à Paris en 1722, n'avoit

(c) Voyez Clusius.

(d) Voyez Oexmelin; *Histoire des Avanturiers*, tome 12, pages 134 & suivantes.

que huit pieds de circonférence , sur quatorze de longueur , tandis que le lamantin de Kamtschatka , dont nous venons de parler , avoit environ dix-huit pieds de circonférence , & vingt-trois pieds quelques pouces de longueur. Malgré toutes ces différences , ces deux espèces de lamantin se ressemblent par tout le reste de leur conformation ; ils ont aussi les mêmes habitudes naturelles , tous deux également aiment la société de leur espèce , & sont d'un naturel doux , tranquille & confiant ; ils semblent ne pas craindre la présence de l'homme.

On voit les lamantins des Antilles toujours en troupes dans le voisinage des côtes , & quelquefois aux embouchures des rivières , & c'est probablement ce qui a fait dire à Oviédo (*e*) & à Gomara (*f*) , qu'ils fréquentoient aussi-bien les eaux des fleuves , que celles de la mer ; cependant ce fait ne paroît vrai que pour le petit lamantin,

(*e*) *Hist. Ind. occid.* lib. XIII, cap. X.

(*f*) *Hist. gener.* cap. XXXI.

dont n
paroît
des A
Kamts
rivières
les eau

Le
comme
fort co
épais j
queue,
jusqu'à
deux c
& de t
tous d
d'autres
mer, &
qu'ils n
lement
produit
embras
mains;
quoi il
même,
dant,

des Animaux quadrupèdes. 279

dont nous parlerons dans la suite ; & il paroît certain que les grands lamantins des Antilles, non plus que ceux de Kamtschatka ne remontent point les rivières, & se tiennent toujours dans les eaux salées & saumâtres.

Le grand lamantin des Antilles a, comme celui de Kamtschatka, le cou fort court, le corps très-gros & très-épais jusqu'à l'endroit où commence la queue, qui va toujours en diminuant jusqu'à la pinne, qui la termine ; tous deux ont encore les yeux fort petits, & de très-petits trous au lieu d'oreilles ; tous deux se nourrissent de fucus & d'autres herbes qui croissent dans la mer, & leur chair & leur graisse, lorsqu'ils ne sont pas trop vieux, sont également bonnes à manger ; tous deux ne produisent qu'un seul petit, que la mère embrasse & porte souvent entre ses mains ; elle l'allaitte pendant un an, après quoi il est en état de se pourvoir lui-même, & de manger de l'herbe. Cependant, selon Oviédo (g), le lamantin

(g) *Hist. Ind. occident. lib. XIII, cap. x.*

280 *Supplément à l'Histoire*

des Antilles produiroit deux petits : mais, comme il paroît que, dans cette espèce, ainsi que dans celle du lamantin de Kamtschatka, les petits ne quittent leurs mères que deux ou trois ans après leur naissance, il se pourroit que, cet auteur ayant vu deux petits de portées différentes suivre la même mère, il en eût conclu qu'elles produisoient en effet deux petits à-la-fois.



des

LE

D.

Nous

pag. 3

Leguat

tins qu

aux PH

avoir p

avec le

cepend

soient

car il n

maux a

que aux

l'article

qu'ils n

parcou

LE GRAND LAMANTIN

DE LA MER DES INDES.

NOUS AVONS RAPPORTÉ (v. XIII, pag. 392 & 393), ce que les Voyageurs Leguat & Dampier ont dit des lamantins qu'ils ont vus à l'île Rodrigue & aux Philippines, & qui nous paroissent avoir plusieurs rapports de ressemblances avec les grands lamantins des Antilles; cependant nous ne croyons pas qu'ils soient absolument de la même espèce, car il n'est guère possible que ces animaux aient fait la traversée de l'Amérique aux grandes Indes: l'on verra, dans l'article suivant, les faits qui prouvent qu'ils ne peuvent voyager au loin, ni parcourir les hautes mers.



LE PETIT LAMANTIN**D'AMÉRIQUE.**

CETTE QUATRIÈME ESPÈCE, plus petite que les trois précédentes, est en même temps plus nombreuse & plus répandue que la seconde, dans les climats chauds du nouveau monde; elle se trouve non-seulement sur presque toutes les côtes, mais encore dans les rivières & les lacs qui se trouvent dans l'intérieur des terres de l'Amérique méridionale (a), comme sur l'Orénoque (b), l'Oyapoc,

(a) « A sept lieues de la ville (d'Ilhéos au Brésil), dans l'intérieur des terres, on rencontre un lac d'eau potable long & large de trois lieues . . . dans lequel on trouve différentes espèces de poissons très-gros, sur-tout des manatées, qui pèsent environ huit cens livres. » *Histoire générale des Voyages, tome XIV, page 230.*

(b) *Histoire de l'Orénoque, par le P. Cumilla.*

des

l'Amaz
les riv
Campè
font au

Les
quitten
tin pré
dans le
de la r
a vu d
qu'à la
laquelle
roit qu
que fré
de la
qu'ils y
habiter
des cô
sent le
on ne
droits
les eau

(c) V
M. de l
(d)
& suivan

des Animaux quadrupèdes. 283

l'Amazone, &c. on les trouve aussi dans les rivières, & enfin dans la baie de Campèche & autour des petites îles qui sont au midi de celle de Cuba.

Les grands lamantins des Antilles ne quittent pas la mer, mais le petit lamantin préfère les eaux douces, & remonte dans les fleuves à mille lieues de distance de la mer (c); M. de la Condamine en a vu dans la rivière des Amazones jusqu'à la cataracte de Borja, au-dessus de laquelle il ne s'en trouve plus. Il paroît que ces petits lamantins d'Amérique fréquentent alternativement les eaux de la mer & celles des fleuves, selon qu'ils y trouvent de la pâture; mais ils habitent constamment sur les fonds élevés des côtes basses, & les rivières où croissent les herbes dont ils se nourrissent; on ne les rencontre jamais dans les endroits voisins des côtes escarpées, où les eaux sont profondes (d), ni dans les

(c) Voyage sur la rivière des Amazones, par M. de la Condamine.

(d) Voyage de Dampier, tome I, pages 46 & suivantes.

hautes mers à de grandes distances des terres, car ils n'y pourroient vivre, puisqu'il ne paroît pas qu'ils mangent du poisson ; ils ne fréquentent donc que les endroits qui produisent de l'herbe ; & c'est par cette raison qu'ils ne peuvent traverser les grandes mers, dont le fond ne produit point de végétaux, & où par conséquent ils périroient d'inanition : ainsi, nous ne croyons pas que les lamantins de la mer des Indes & ceux des côtes du Sénégal, soient de même espèce que les lamantins d'Amérique, petits ou grands.

Les Voyageurs (e) s'accordent à dire que le petit lamantin d'Amérique, dont il est ici question, se nourrit non-seulement des herbes qui croissent sous les eaux, mais qu'il broute encore celles qui bordent les rivages, lorsqu'il peut les atteindre, en avançant sa tête, sans sortir entièrement de l'eau, car il n'a pas

(e) Binet ; Voyage à Cayenne, page 346 ; le P. Magnien de Fribourg ; Manuscrit communiqué par M. de la Condamine ; le P. Gumilla, *Histoire de l'Orénoque*.

plus qu
de mar
s'y traî

Les
duisent
au lieu
duisent
petits
contre
rent p
puisse
devenu
suivent
nent p
après f
compa
avec de

La p
tes, es
& fort
bonne
criptio
Ouvrag

des Animaux quadrupèdes. 285

plus que les autres lamantins, la faculté de marcher sur la terre, ni même de s'y traîner.

Les femelles, dans cette espèce, produisent ordinairement deux petits (*f*), au lieu que les grands lamantins n'en produisent qu'un; la mère porte ces deux petits sous chacun de ses bras & serrés contre ses mamelles, dont ils ne se séparent point, quelque mouvement qu'elle puisse se donner; &, lorsqu'ils sont devenus assez forts pour nager, ils la suivent constamment, & ne l'abandonnent pas lorsqu'elle est blessée, ni même après sa mort, car ils persistent à l'accompagner lorsque les pêcheurs la tirent avec des cordes pour l'amener au rivage.

La peau de ces petits lamantins adultes, est, comme celle des grands, rude & fort épaisse; leur chair est aussi très-bonne à manger: on peut voir la description d'un de ces animaux dans notre Ouvrage (*volume XIII, page 425*).

(*f*) Gumilla, *Histoire de l'Orénoque*.

LE PETIT LAMANTIN
DU SÉNÉGAL.

NOUS AVONS DONNÉ (*vol. XIII, page 390*), d'après M. Adanson, la description de ce petit lamantin du Sénégal, qui est de la même grandeur que celui de Cayenne, mais qui paroît en différer ; en ce qu'il a des dents molaires & quelques poils sur le corps : caractères qui suffisent pour le distinguer de celui d'Amérique auquel les Voyageurs ne donnent ni dents molaires, ni poil sur le corps ; ainsi, nous présumons qu'on peut compter cinq espèces de lamantin : la première est le grand lamantin de Kamtschatka, qui, comme nous l'avons dit, surpasse tous les autres en grandeur, & qui n'a ni dents molaires, ni ongles au bout des mains, ni poil sur le corps : la seconde, le grand lamantin des Antilles, qui a des dents molaires, des ongles & quel-

des
ques p
gueur
vingt p
tin de
trois p
tin de
encore
d'une
Kamts
l'une
hautes
sent p
se nou
lamant
fréquer
les ear
des tro
est de
& la
Sénéga
fleuves

(g)
animal
quelque
Soffala,
" rivièr

des Animaux quadrupèdes. 287

ques poils sur le corps, & dont la longueur n'est au plus que de dix-huit à vingt pieds, tandis que celle du lamantin de Kamtschatka est de plus de vingt-trois pieds : la troisième, le grand lamantin de la mer des Indes, qui n'est pas encore bien connu, mais qui doit être d'une espèce différente de celle du Kamtschatka & des Antilles, puisque ni l'une ni l'autre ne peut traverser les hautes mers, parce qu'elles ne produisent point les herbes dont ces animaux se nourrissent : la quatrième, le petit lamantin de l'Amérique méridionale, qui fréquente également les eaux salées & les eaux douces, & diffère beaucoup des trois premiers par la grandeur, qui est de plus de deux tiers au-dessous : & la cinquième, le petit lamantin du Sénégal, qui se trouve dans plusieurs fleuves de l'Afrique (g), comme le

(g) On doit présumer que c'est le même animal que les Voyageurs disent avoir vu dans quelques rivières du Congo, d'Angola, de Soffala, &c. voici ce qu'ils en ont écrit : " Les rivières de Congo & d'Angola abondent en

petit lamantin de la Guyane, dans ceux de l'Amérique. Ces deux petites

» poissons de différentes espèces ; celle de Zaire
 » en produit un fort remarquable La
 » Nature lui a donné deux mains, & lui a
 » formé le dos comme une targette ; sa chair
 » est fort bonne il se nourrit de l'herbe
 » qui croît sur les bords de la rivière, sans jamais
 » monter sur la rive ; quelques-uns de ces pois-
 » sons pèsent cinq cens livres. » *Histoire générale*
 » *des Voyages, tome V, page 2.* — « Ces animaux se
 » trouvent dans les lacs, sur-tout dans ceux
 » d'Angola, de Quihite & d'Angolon ils
 » ont huit pieds de longueur & deux bras avec
 » des mains, dont les doigts sont cachés dans
 » la chair leur tête est de forme ovale ;
 » ils ont les yeux petits, le nez plat, la bouche
 » grande, sans aucune apparence d'oreilles
 » les parties naturelles du mâle ressemblent à
 » celles du cheval ; la femelle a deux mamelles
 » bien formées. » *Idem, ibidem.* — « On prend les
 » mêmes animaux vers Soffala, sur la côte orien-
 » tale d'Afrique ; on les sale pour les provisions
 » de la mer, & on se trouve fort bien de cette
 » nourriture, lorsqu'elle n'a pas eu le temps de
 » vieillir ; mais, conservée long-temps, elle s'al-
 » tère & devient dangereuse pour ceux qui sont
 » incommodés de quelque maladie vénérienne. »
 » *Idem, page 93.* — « La manatée de la rivière de
 » la Sierra-Léona, a des dents au fond de la
 espèces

des
 espèces
 mière
 trous
 la sec

guelle
 peine
 les ore
 larges
 de long
 & la p
 pour p
 cent u
 de boi
 d
 se
 sert de
 est arr
 pour l
 est enf
 générale
 suivante
 cate .
 qui ap
 le lard
 le cède
 préten
 rivière
 qu'ils
 fouin.
 tins sur
 Su

des Animaux quadrupèdes. 189

espèces différent en ce que la première n'a point de dents, & que les trous auditifs sont plus grands que dans la seconde.

gueule les yeux sont fort petits, & à peine peut-on faire entrer un poinçon dans les oreilles ; fort près des oreilles, il y a deux larges nageoires de seize ou dix-huit pouces de longueur. . . . la queue est fort large . . . & la peau du corps est épaisse d'un doigt . . . pour prendre cet animal, les Nègres lui lancent un harpon de fer au bout d'un manche de bois fort long; l'animal, se sentant blessé, prend la fuite, mais le manche du harpon, qui se fait voir souvent au-dessus de l'eau, sert de guide pour le suivre de vue; lorsqu'il est arrêté, on s'en approche une seconde fois pour lui lancer d'autres dards, & , lorsqu'il est enfin épuisé, on l'amène au rivage. » *Histoire générale des Voyages, tome III, pages 240 & suivantes.* — « La chair de ces animaux est délicate . . . les meilleures parties sont celles qui approchent du ventre & des mamelles; le lard a plusieurs pouces d'épaisseur, & ne le cède point à celui du porc. . . . Lemaire prétend qu'il y a plus de lamantins dans la rivière du Sénégal, que dans la Gambia, & qu'ils n'y sont que de la grosseur du marfouin. » *Idem, page 316.* » Il y a aussi des lamantins sur la côte d'Or. » *Idem, tome IV, page 261.*

Supplément. Tome XII. N

290 *Supplément à l'Histoire, &c.*

Voilà ce que j'ai pu recueillir de moins incertain au sujet des différentes espèces de lamantins, qui, comme l'on voit, ne sont pas encore parfaitement connues. Quelques Voyageurs ont parlé des lamantins des Philippines, & M. Forster m'a dit en avoir vu aussi sur les côtes de la nouvelle Hollande; mais nous ignorons si ces espèces des Philippines & de la nouvelle Hollande, peuvent se rapporter à celles dont nous venons de parler, ou si elles en diffèrent assez pour qu'on doive les regarder comme des espèces différentes.

Fin du Tome douzième.

DES

A F R
mérie
aucun
il n'y
chevi
ALPAC
mal c
diaire
— Se
lama.
ticité.
lama
gnes,
en lu
389.
A N I M
renne
mieux
les an
parce
hiver
Vol. X

T A B L E

*DES MATIÈRES contenues dans
ces deux Volumes.*

A

AFRIQUE. On ne connoît, dans l'Afrique méridionale, suivant M. le capitaine Gordon, aucun quadrupède qui perde ses cornes, & il n'y a par conséquent ni élans, ni cerfs, ni chevreuils, *Volume XI*, page 213.

ALPACA ou **PACO** (P) n'est pas le même animal que la vigogne; c'est une espèce intermédiaire entre la vigogne & le lama, *Vol. XI*, 382.

— Ses ressemblances & ses différences avec le lama. — L'alpaca n'a pas été réduit en domesticité. — Sa laine est plus estimée que celle du lama, 385. — Il est plus hardi que les vigognes, & souvent il en sauve la troupe entière en lui montrant à franchir le piège, 388, 389.

ANIMAUX du Nord : raison pourquoi les rennes & autres animaux du Nord supportent mieux les extrêmes du froid & du chaud que les animaux des contrées moins froides; c'est parce qu'ils sont gras & fourrés de poils en hiver, & secs & vêtus légèrement pendant l'été, *Vol. XI*, 370.

N ij

ANTILOPE, espèce de gazelle ; sa description par M. Pallas, *Vol. XI*, 297, 301. — Cette gazelle a vécu & même multiplié en Hollande, quoiqu'agée de plus de dix ans ; le mâle étoit très-sauvage & ne s'est jamais apprivoisé ; au contraire, la femelle étoit très-douce & très-familière, 298. — Habitudes de ces deux animaux en domesticité. — La femelle porte près de neuf mois, & ne produit qu'un petit à-la-fois, 299. — Ce n'est guère qu'au bout de trois ans que le mâle est en état d'engendrer ; mais la femelle produit au bout de deux ans d'âge. — Différences entre le mâle & la femelle, 300.

ATTARSOAK. Voyez **PHOQUE** à croissant.

AUROCHS. M. Forster assure que la race de l'aurochs ne se trouve actuellement qu'en Moscovie ; & que les aurochs, qui étoient en Prusse & sur les confins de la Lithuanie, ont péri pendant la dernière guerre, *Vol. XI*, 75.

B

BÉZOARD. Discussion historique sur le bézoard, par M. Allamand, *Vol. XI*, 284 & suivantes.

BISON. M. Forster assure que le bison est encore aujourd'hui commun en Moldavie, où on l'appelle *zimbr*, *Vol. XI*, 75. — Le bison a, dans l'Amérique, une variété constante, qu'on appelle *bœuf musqué*, qui diffère par la forme & la position des cornes, du bison commun, 77. — Ce bison, ou bœuf musqué, se trouve dans les parties les plus septentrionales de

PAm
natur
B I S O
Écos
où c
aussi
— C
pèce
grand
B O U
de F
très-
la ré
long
pieds
cour
mêm
77.
B O U
B O U
B O S B
cap c
M. A
Vol.
feme
natur
est u
B O U
feme
cet e
& le
terre
B R E
reme

DES MATIÈRES. *iiij*

l'Amérique. — Sa description. — Ses habitudes naturelles, *Vol. XI, 78, 79.*

BISON blanc. Sa race subsiste encore en Écosse, mais ce n'est que dans de grands parcs où on la conserve; ses habitudes. — Elle est aussi farouche que dans son plein état de liberté. — Ce bison blanc ne se mêle jamais avec l'espèce commune du bœuf. Sa description, sa grandeur, son poids, *Vol. XI, 79 & suivantes.*

BŒUFS de Sicile; ils diffèrent de nos bœufs de France par la forme des cornes, qui sont très-remarquables par leur longueur, & par la régularité de leur figure; ces cornes sont longues de trois pieds, & quelquefois de trois pieds & demi, & ne sont que légèrement courbées. — Elles sont constamment de la même forme sur tous les individus, *Vol. XI, 77.*

BŒUF gris du Mogol. Voyez NILGAULT.

BŒUF musqué. Voyez BISON.

BOSBOK. Très-jolie gazelle qui se trouve au cap de Bonne-espérance. — Sa description par M. Allamand. — Ses différences avec le ritbok, *Vol. XI, 350.* — Ses dimensions, 351. — Les femelles n'ont point de cornes. — Habitudes naturelles de cette espèce de gazelle; son cri est une espèce d'aboïement, 352.

BOUC, dont les sabots avoient pris un accroissement extraordinaire; ce défaut, ou plutôt cet excès, est assez commun dans les boucs & les chèvres qui habitent les plaines & les terrains humides, *Vol. XI, 254.*

BREBIS de Flandres (les) produisent ordinairement quatre agneaux chaque année; elles

- viennent originairement des Indes orientales, *Vol. XI, 256.*
- BREBIS de l'île de France;** exemple de mélange de races & de variétés dans les brebis de l'île de France & de Bourbon, *Vol. XI, 265, 266.*
- BREBIS de Moldavie.** Il y a trois races ou espèces de brebis en Moldavie, *Vol. XI, 256.* — Les deux premières paroissent être les mêmes que les brebis Valachiennes, *Vol. XI, 258.*
- BREBIS de bois de Moldavie;** sa description, *Vol. XI, 257.* — Il y a toute apparence que c'est le même animal que le saïga, 257.
- BREBIS de Tartarie;** chez les Calmouques, les Mongous & les Kirghises, les brebis ont la queue très-courte & composée seulement de trois ou quatre articulations, *Vol. XI, 263.*
- BREBIS des pays méridionaux;** la différence de la graisse des brebis dans les pays méridionaux vient probablement de la différence de nourriture, & des plantes grasses dont elles s'y nourrissent. — Manière dont on les traite & nourrit dans ces climats chauds, *Vol. XI, 262.*
- BREBIS du cap de Bonne-espérance** (les) ressemblent, pour la plupart, au bélier de Barbarie; mélange & variété dans les brebis que les Hollandois ont propagées au Cap, *Vol. XI, 259.* — Différence de la graisse de ces brebis & de celle des brebis d'Europe, 260. — Discussion historique sur la variété des brebis qui se trouvent actuellement dans les terres du cap de Bonne-espérance, *Ibid, 261.*
- BUBALE,** son naturel est doux, mais sa figure est moins élégante, & sa forme plus robuste que celle des autres grandes gazelles; il a quelques ressemblances avec la vache. — Sa gran-

deur
regar
gaze
culié
du v
— L
l'Af
terro
trou
des
desc
Les
une
plain
est l
que
font
Sep
BUFF
de c
tins
les
Ces
affe
Les
fort
Gae
une
des
plu
ord
riet
à c
exc
La

deur & sa description, *Vol. XI*, 240. — On doit regarder le bubale non pas comme une grande gazelle, mais comme faisant une espèce particulière & moyenne entre celle des bœufs & celle du cerf. — Description d'un bubale, 241, 242. — L'espèce du bubale est répandue dans toute l'Afrique. — Elle est très-nombreuse dans les terres du cap de Bonne-espérance, & on la trouve aussi en Barbarie; c'est bien le *bubalus* des anciens Grecs & Romains, 244, 245. — Sa description & ses dimensions, 246 & *suiv.* — Les bubales vont en troupes, & courent avec une très-grande vitesse; ils se tiennent dans les plaines plutôt que sur les montagnes; leur chair est bonne à manger, 250. — Les femelles n'ont que deux mamelles, & pour l'ordinaire elles ne font qu'un petit à-la-fois; elles mettent bas en Septembre & quelquefois aussi en Avril, 251.

BUFFLE; discussion critique sur les étimologies de ce nom, *Vol. XI*, 82, 83. — Les marais Pontins & les marennes de Sienne, sont, en Italie, les lieux les plus favorables à ces animaux. — Ces marais Pontins sont réservés & spécialement affectés pour la nourriture des buffles, 87. — Les buffles ont naturellement une mauvaise & forte odeur de musc, 89. — Selon Monsignor Gaëtani, ils ont la vue courte & confuse, mais une mémoire supérieure à celle de la plupart des autres animaux; ils reviennent seuls & de plusieurs lieues de distance à leurs habitations ordinaires, 99. — Le lait de la buffle est supérieur, tant par la blancheur que par la saveur, à celui de la vache, & l'on en fait du beurre excellent, & de bons petits fromages, 102. — La femelle a quatre mammelons, cependant

elle ne produit ordinairement qu'un petit & très-rarement deux; elle met bas au printemps & une seule fois l'année. — Elle produit communément deux années de suite & se repose la troisième. — Sa fécondité commence à l'âge de quatre ans & finit à douze. — Manière dont on élève & conduit les buffles; leur castration, *Vol. XI, 103.* — Spectacle de chasse aux buffles, 105. — le terme de la vie du buffle est à-peu-près le même que celui de la vie du bœuf, c'est-à-dire; à dix-huit ans, quoiqu'il y en ait qui vivent vingt-cinq ans; les dents lui tombent assez communément quelque temps avant que de mourir, 106. — Usage de sa chair, de sa peau & de ses cornes, 107. — Son tempérament. — Ses maladies particulières, *ibid. 108.* — Les buffles amenés à Astracan & dans les provinces méridionales de la Russie, par ordre de l'Impératrice Catherine II, s'y sont bien multipliés. — Cet exemple peut suffire pour nous encourager à faire en France l'acquisition de cette espèce utile, qui remplaceroit celle des bœufs à tous égards, & sur-tout dans les temps où la grande mortalité de ces animaux fait un si grand tort à la culture de nos terres, 116, 117.

C

CANNA; c'est un des plus grands animaux à pieds fourchus de l'Afrique méridionale, *Vol. XI, 207.* — Il a été appelé *élan* par Kolbe, mais ce nom ne lui convient en aucune façon. — Ses dimensions, son poids & sa description, 209 & *suiv.* — Description de ses cornes; celles de la femelle

font
& p
213
ibid.
des
mar
— I
très-
— I
pro
Le
Il n
de
CHAN
non
nen
que
dion
CHAN
affu
277
CHEV
vau
le c
qui
sau
CHE
vau
des
XI
for
—
la
ibi
ta

DES MATIÈRES. vij

sont pour l'ordinaire plus menues, plus droites & plus longues que celles du mâle, *Vol. XI, 212, 213.* — Différences entre le mâle & la femelle, *ibid.* — Les cannas se trouvent dans les terres des Hottentots à quelques distances du Cap; ils marchent en troupes de cinquante ou soixante. — Leur naturel dans l'état de liberté. Ils sont très-doux, leur chair est une excellente vénaison. — Leur peau est très-ferme; les femelles ne produisent qu'un petit à-la-fois, 214, 215. — Le canna n'est point l'oryx des Anciens, 217. Il ne leur étoit pas même connu; description de la femelle canna, 218, 219.

CHAMEAU. Les chameaux sont actuellement en nombre & presque naturalisés dans les gouvernemens d'Astracan & d'Orembourg, aussi-bien que dans quelques parties de la Sibérie méridionale, *Vol. XI, 53, 54.*

CHAMOIS (le) s'accouple avec les chèvres; on assure même qu'ils produisent ensemble, *Vol. XI, 277.*

CHEVAUX domestiques; les Tartares ont des chevaux domestiques qui vivent néanmoins dans le désert en grandes troupes, & ce sont ceux qui s'échappent de ces troupes qui deviennent sauvages; exemples à ce sujet, *Vol. XI, 58.*

CHEVAUX sauvages; il se trouve des chevaux sauvages dans toute l'étendue du milieu de l'Asie, depuis le Volga jusqu'à la mer du Japon, *Vol. XI, 57.* — Les chevaux noirs & les chevaux pies sont fort rares parmi ces chevaux sauvages, 60. — Ils sont tous de petite taille, quoiqu'ils aient la tête plus grosse que les chevaux domestiques, *ibid.* — Leur description, 61. — On les nomme *tarpan* dans le pays des Tartares Mongous, 62.

CHÈVRE; grande fécondité dans l'espèce de la chèvre; exemple à ce sujet, *Vol. XI, 254.* — Les chèvres d'Europe ont produit à l'île de Bourbon avec les chèvres des Indes, & avec une très-petite race de chèvres qui venoient de Goa, & qui sont très-fécondes. — On obtient aisément des métis ou mulets qui se reproduisent en mêlant les espèces de la chèvre & celle de la brebis, 255.

CHÈVRE bleue du cap de Bonne-espérance; sa description par M. Forster. — Dans cette espèce, la femelle porte des cornes comme le mâle, *Vol. XI, 254, 255.*

CHÈVRE sautante du cap de Bonne-espérance (la), doit plutôt être rapportée au genre des gazelles, qu'à celui des chèvres; l'espèce en est extrêmement nombreuse dans les terres du Cap, elles sont en troupes par centaines & par milliers; il y a deux espèces de ces chèvres sautantes; leurs différences & leurs ressemblances, l'une est appelée *chèvre sautante*, & l'autre *sauteur des rochers*, *Vol. XI, 319.* — Observations sur la première espèce de ces chèvres sautantes, par M. Forster, 330 & suiv.

CHEVREUIL des Indes orientales; espèce très-voisine de celle du chevreuil d'Europe, mais qui en diffère par la conformation des os de la tête & la position des bois, *Vol. XI, 356.* — Ce chevreuil des Indes est beaucoup plus petit que le chevreuil d'Europe. — Ses dimensions. — Sa description, 357 & suiv. — Comparaison de la position des bois de cet animal avec les bois de nos chevreuils d'Europe, 361.

— So
fions.
CHEVR
gazelle
espèce
descri
COATI
nairer
relles
mité
riger
— M
préfe
COCHO
diffé
leur r
de d
pour
nom
tudes
celui
dans
cript
féren
le ta
d'A
d'A
les f
tach
cho
cet
par
mar
CONI
02f

DES MATIÈRES. ix

— Son naturel; sa jolie figure & ses dimensions, *Vol. XI*, 363 & *suiv.*

CHEVROTAIN; espèce d'animal appelé *petite gazelle* à Java, & qui est à-peu-près de la même espèce que le chevrotain *memina* de Ceylan; sa description, *Vol. XII*, 1, 2.

COATI; on assure que les coatis produisent ordinairement trois petits. — Leurs habitudes naturelles. — Ils sont très-habitués à manger l'extrémité de leur queue, & on ne peut pas les corriger de cette habitude qui leur devient funeste. — Manière dont on pourroit peut-être les en préserver, *Vol. XII*, 18, 19.

COCHON de terre (le) est un animal d'Afrique, différent des fourmilliers d'Amérique, & il ne leur ressemble qu'en ce qu'il est de même privé de dents, & qu'il a une langue assez longue pour l'introduire dans les fourmillières. — Le nom de cochon de terre est relatif à ses habitudes naturelles, & même à sa forme; & c'est celui sous lequel il est communément connu dans les terres du Cap, *Vol. XII*, 3. — Sa description par M. Allamand, 4, & *suiv.* — Ses différences très-reconnoissables avec le tamanoir, le tamandua & le fourmillier qui sont tous trois d'Amérique, tandis que le cochon de terre est d'Afrique, 9, 10. — Il introduit sa langue dans les fourmillières & avale les fourmis qui s'y attachent, 10. — Ses petits rapports avec le cochon commun & ses grandes différences avec cet animal. — Description du cochon de terre par Kolbe, 11. — Ses dimensions par M. Allamand, 12, 13.

CONDOMA (le) est appelé par les Hollandois *voëfdoës*, qui se prononce *coudqus*. — Description

- d'une peau de condoma & de belles cornes de cet animal, *Vol. XI, 222, & suiv.* — Ses dimensions. — La femelle porte des cornes comme le mâle. — Variétés dans le pelage de ces animaux. — Ils se trouvent dans l'intérieur des terres au cap de Bonne-espérance, & ils ne vont point en troupes; leur force & leur légèreté pour sauter; on peut les apprivoiser, 225, 226. — Description d'un condoma vivant, par MM. Al-Janand & Klockner, 228 & suiv. — Sa nourriture en domesticité & en liberté dans son pays natal, 235. — Ses dimensions, 236, 237.
- COUAGGA**, animal dont l'espèce paroît intermédiaire entre le cheval & le zèbre; ou peut-être entre le zèbre & l'onagre. — Ses ressemblances & ses différences avec le zèbre. — Sa description, *Vol. XI, 150.* — Son naturel; il se défend très-bien contre les chiens & même contre les hyènes, 152. — Ses habitudes naturelles, *ibid.* — Conjecture sur l'origine de cet animal, dont l'espèce paroît être métive, & qui n'est probablement qu'une race bâtarde provenant de l'union du cheval & du zèbre, 153. — Son nom *couagga* est tiré de son cri *kwah, kwah.* — Sa chair n'est pas bonne à manger. — Dimensions d'un *couagga* jeune, 155, 156.
- CZIGITAI**; animal qui se trouve dans la Tartarie; ce mot signifie dans la langue des Mongous, *longue oreille.* — Les *czigitais* vont par troupes de vingt, trente & même cent. — Ils sont indomptables. — Chaque troupe a son chef comme dans les *tarpan*s ou *chevaux sauvages.* — Habitudes naturelles des *czigitais*, *Vol. XI, 62, 63.* — Ils forment une espèce moyenne entre l'âne & le cheval, qu'on a nommé *mulet fécond de Daourie.*

DES MATIÈRES. xj.

— Ils sont plus beaux que les muets; dimensions & description d'un de ces animaux. — Leur ressemblance avec l'âne, *Vol. XI, 64.* — Leur course très-rapide. — Les Tartares regardent leur chair comme une viande délicieuse, 65.

D

DAMAN; le daman-israël n'est point une gerboise. — Il est fort commun aux environs du mont Liban, & encore plus dans l'Arabie-pétrée; il se trouve aussi dans les montagnes de l'Arabie-heureuse, & dans toutes les parties hautes de l'Abyssinie; sa forme & sa grandeur. — Il n'a point du tout de queue. — Sa description. — Ses habitudes naturelles, *Vol. XII, 85.* — Sa chair est très-bonne à manger, 87.

DAMAN du Cap; animal différent du daman-israël. — Leurs différences, *Vol. XII, 87.* — C'est le même animal que celui dont j'ai donné la figure, *rome III du supplément, planche XXIIX, sous le nom de marmotte du Cap, 88.* — Ce daman du Cap, est aussi le même animal que le *kliptaas* ou *blaireau des rochers*, décrit par M. Allamand, *ibid.* — Sa description, par MM. Allamand & Klokner, 89, 90. — Ses habitudes naturelles, 90, 91. — Sa grandeur, lorsqu'il est adulte, est égale à celle du lapin domestique, 92. — Ses dimensions, 95, 96.

E

ÉLÉPHANT: la hauteur d'un éléphant nouveau-né n'est guère que de trois pieds du Rhin; selon

M. Marcellus Bleff, il croît jusqu'à l'âge de seize à vingt ans, & peut vivre soixante-dix & même jusqu'à cent ans, *Vol. XI, 41.* — La femelle ne produit qu'un petit à-la-fois. — Observations sur les habitudes naturelles de l'éléphant dans l'état de liberté, & sur la manière de le prendre & de le réduire en domesticité, 42. — Les éléphants dans l'état de liberté, vivent dans une espèce de société durable; chaque bande ou troupe reste séparée & n'a aucun commerce avec une autre troupe, & même elles paroissent s'entr'éviter très-soigneusement. — Manière dont ces animaux se conduisent & marchent en troupes, & comment ils traversent les eaux. — Il y a des éléphants solitaires qui paroissent bannis de toute société, & ils sont féroces & très-méchans, 44, 45. — Au lieu que les autres qui vont en troupes sont doux & même timides. — Ces éléphants farouches sont tous mâles. — Les éléphants à longues & grosses défenses, sont très-rare à Ceylan. — Et le plus grand nombre n'a que de petites défenses longues d'environ un pied; on ne peut voir, avant l'âge de douze à quatorze ans, si leurs défenses deviendront longues ou si elles resteront à ces petites dimensions, 46. — Les éléphants ont existé dans tous les climats de la terre, car on trouve par-tout leurs ossemens; nouvel exemple à ce sujet, 47. — Le petit éléphant ne tète pas par la trompe comme cela m'avoit paru probable, mais il tète avec la gueule & de la même manière que les autres animaux, 55.

GAZEL
chèvr
GAZEL
M. A
GAZEL
plus l
tion,
de gr
des p
GERBO
de dev
longs
grosse
Vol. X
GERBO
anima
Cook
— Sa
Vol. X
livres
ibidem
Parkin
71. —
de M
GERBO
espéra
du lap
vicon
sur cet
cripti
per,

G

GAZELLES (les) forment la nuance entre les chèvres & les cerfs, *Vol. XI, 241.*

GAZELLE à bourse sur le dos; sa description, par M. Allamand, *Vol. XI, 328.*

GAZELLE, sauteur des rochers (la), est l'animal le plus lesté de tous ceux de son genre; sa description, par M. Forster. — Il franchit, d'un saut, de grands intervalles d'un rocher à l'autre & sur des profondeurs affreuses, *Vol. XI, 332.*

GERBOISES; il se trouve dans ce genre à pieds de devant très-courts, & à pieds de derrière très-longs, des espèces vingt & même cent fois plus grosses & plus grandes les unes que les autres, *Vol. XII, 54.*

GERBOISE (très-grosse) appelée *Kangaroo*; cet animal a été trouvé par l'équipage du capitaine Cook, dans les terres de la nouvelle Hollande. — Sa grosseur approche de celle d'un mouton, *Vol. XII, 70.* — Elle pèse quatre-vingt-quatre livres; ses autres différences avec les gerboises, *ibidem.* — Sa description d'après le dessinateur Parkinson, qui néanmoins l'a très-mal dessinée, 71. — Notice sur cet animal, tirée du Voyage de M. le capitaine Cook, 80 & *suiv.*

GERBOISE (grande) appelée au cap de Bonne-espérance, *lièvre sauteur*; elle est de la grandeur du lapin d'Europe. — Sa description par M. le vicomte de Querhoënt, *Vol. XII, 54.* — Notice sur cet animal, par M. Forster, 55. — Autre description de cette grande gerboise, par M. Klockner, 72, 73. — Ses dimensions, 77, 78. — Le

docteur Shaw lui a donné improprement le nom de daman, 83.

GERBOISE commune; sa description, par M. Alamand, & observations sur ses habitudes en captivité, par M. Klockner, *Vol. XII*, 59, 60. — Ses dimensions, 65, 66.

GERBOISE du désert de Barca; ses différences avec la gerboise commune, dont cependant elle n'est qu'une variété. — Sa description, *Vol. XII*, 53.

GNUU; animal d'Afrique qui n'étoit pas connu quoiqu'il soit d'une grandeur & d'une forme très-remarquables. — Description de son pelage. — Il est ordinairement de la grandeur d'un grand cerf. — Sa nourriture en captivité, *Vol. XI*, 159. — Sa forme & ses membres semblent l'assimiler en partie au cheval & en partie au bœuf, 161. — Il est animal ruminant, 163. — Description d'une jeune femelle gnou. — Elle avoit dans la mâchoire inférieure huit dents incisives semblables par la forme à celles du bœuf commun, *ibid.* — Le corps de cet animal semble approcher de la forme de celui du cheval. — Ressemblances & différences du gnou avec le cheval & le bœuf, 164. — Il tient beaucoup du cheval, du taureau & du cerf, sans être de l'espèce d'aucun de ces animaux, 169. — Description d'un gnou adulte, 170. — Il n'a point de dents incisives à la mâchoire supérieure. — Son naturel tient un peu de la férocité, 172. — L'espèce en est nombreuse & fort répandue dans l'Afrique méridionale, & peut-être en Abyssinie, 173. — Le gnou constitue une espèce singulière, qui réunit en soi la force de la tête & des cornes du taureau; la légèreté &

le pel
du co

HIPPO
figure
trouv
du ch
qui s
▼ éto
hippo
terres
cap d
où l'e
à-peu
& à ?
Descr
potan
onze
du C
tie d
du N
seize
ces a
varie
rense
sous
une f
de n
petit
bon
pieds
popo

le pelage du cerf, & la beauté de la crinière, du corps & de la queue du cheval, 178.

H

HIPPOTAME; on a remarqué dans les petites figures de fonte, tirées des anciens tombeaux trouvés en Sibérie, celle de l'hippopotame & du chameau, ce qui prouve que ces animaux qui sont actuellement étrangers à cette contrée, y étoient connus autrefois, *Vol. XI, 52.* — Les hippopotames sont en grand nombre dans les terres de l'Afrique, à une certaine distance du cap de Bonne-espérance; exemple d'une chasse où l'on en a tué plus de vingt sur une rivière, à-peu-près à 7 degrés de longitude à l'est du Cap, & à 30 degrés de latitude méridionale, 120. — Description des parties extérieures de l'hippopotame. — Sa longueur est communément de onze à douze pieds dans les terres de l'intérieur du Cap. — Ainsi, les hippopotames de cette partie de l'Afrique, sont bien plus petits que ceux du Nil, qui, selon Zerenghi, avoient plus de seize pieds. — Le nombre des dents varie dans ces animaux, 122. — La longueur de leur queue varie aussi, 124. — Les testicules ne sont pas renfermés dans un *scrotum* extérieur, mais sont sous la peau du ventre, 125. — La femelle a une *follicule* au-dessous de la vulve; elle n'a point de mamelles pendantes, mais seulement deux petits mammelons; son lait est aussi doux & aussi bon que celui de la vache. — Description des pieds & de quelques parties intérieures de l'hippopotame, *ibid.* 126. — Il n'a qu'un estomac &

ne rumine point. — Il est presque certain qu'il ne mange pas de poisson, & qu'il ne vit que d'herbes — Il entre dans la mer jusqu'à plus de deux lieues de distance, *Vol. XI, 128.* — Mais il préfère d'habiter les eaux douces. — Ses habitudes naturelles & ses combats, 129. — Les femelles ne produisent qu'un petit. — Description d'un fœtus d'hippopotame. — La chair des hippopotames, & sur-tout des jeunes, est fort bonne à manger, particulièrement celle des pieds & de la queue, 131. — Dimensions prises sur deux hippopotames mâle & femelle, 132 & *suiv.*

K

KOB & KOKA ; leurs différences. — Ce sont deux races ou variétés de la même espèce, *Vol. XI, 252.*

KOULAN ; outre les tarpans ou chevaux sauvages, & les czigitaïs ou mulets féconds de Daourie, on trouve dans les grands déserts, au-delà du Jaik, du Yemba, du Sarafon & dans le voisinage du lac Aral, une troisième espèce d'animal, que les Kirgises ou les Kalmouks appellent *koulan*, qui paroît être l'*onagre* des auteurs, & qui semble faire nuance entre le czigitaï & l'âne, *Vol. XI, 65.* — Habitudes naturelles des *koulans*. — Ils courent très-rapidement & sont indomptables, & il y en a des troupes très-nombreuses ; ils sont plus grands que les chevaux sauvages ou tarpans, mais moins grands que les czigitaïs. — Leur description, 66, 67.

KOURI, est une petite espèce d'umau, qui se trouve à Cayenne. — Ses ressemblances avec

le gra
Sa c
petit
seule
gran

LAM
nutri
ces
du
Son
natu
une
ne
pes
à ap
que
me
Le
dan
tici
fait
ne
fi c
pré
pa
qu
un
LAM
an
à
ga

DES MATIÈRES. xvij

le grand unau; ses différences, *Vol. XII*, 29. — Sa description, 30. — Il y a apparence que ce petit unau ne forme avec le grand unau qu'une seule & même espèce, qui peut varier pour la grandeur, 31.

L

LAMA; sa grandeur. — Il semble être un diminutif, en beau, du chameau; comparaison de ces deux animaux, *Vol. XI*, 371. — Description du lama, 372, 373. — Ses dimensions, 375. — Son naturel, *ibid.* — Ses allures. — Ses habitudes naturelles. — Il n'a pas besoin de boire ayant une très-grande abondance de salive. — Les lamas ne craignent point le froid; marchent par troupes dans leur état de liberté, & ils sont très-aisés à apprivoiser, 376. — Lama est un nom générique que les Indiens du Pérou donnent indifféremment à toutes sortes de bêtes à laine, 383. — Le lama produit dans les climats chauds comme dans les climats froids, & dans l'état de domesticité comme dans celui de liberté. La femelle ne fait qu'un petit à chaque portée, 384. — Le lama ne trotte ni ne galope, mais son pas ordinaire est si doux, qu'au Pérou les femmes s'en servent de préférence à toute autre monture; on les envoie paître dans les campagnes en toute liberté, sans qu'ils cherchent à s'enfuir, *ibid.* — On les tond une fois l'an, 385.

LAMANTINS (les) forment la nuance entre les amphibies & les cétacées. — Quoique informes à l'extérieur, ils sont à l'intérieur très-bien organisés, *Vol. XII*, 252. — Leur naturel & leurs

mœurs semblent tenir quelque chose de l'intelligence & des qualités sociales. — Ils se tiennent presque toujours en troupes. — Ils se présentent dans le danger des secours mutuels, *Vol. XII, 253.* — Le mâle n'a communément qu'une femelle. — Leur manière de s'accoupler. — Ils ne viennent jamais à terre. — Ils ont le trou ovale du cœur ouvert. — Ils n'habitent pas les hautes mers, & se nourrissent de fucus & d'autres herbes marines, 254. — Leur chair & leur graisse sont également bonnes à manger. — Description de quelques unes de leurs parties extérieures. — Ils n'ont que de très-petits trous auditifs & point d'oreilles externes, 255. — La partie génitale de la femelle n'est pas située comme dans les autres animaux, au-dessous, mais au-dessus de l'anus. — Caractères généraux & particuliers des différentes espèces de lamantins, 256. — On peut compter cinq espèces de lamantins; savoir, le grand lamantin de Kamtschatka, le grand lamantin des Antilles, le grand lamantin de la mer des Indes orientales & méridionales, le petit lamantin d'Amérique & le petit lamantin du Sénégal. — Différence caractéristiques de ces cinq espèces, 286 & *suiv.*

LAMANTIN (grand) de Kamtschatka; il manque absolument de doigts & d'ongles dans les deux mains ou nageoires; il manque aussi de dents, & n'a dans chaque mâchoire qu'un os fort & robuste qui lui sert à broyer les alimens, tandis que les lamantins d'Amérique & d'Afrique ont des doigts & des ongles, & des dents molaires au fond de la gueule, *Vol. XII, 256.* — Le lamantin de Kamtschatka se trouve dans la mer orientale, au-delà de Kamtschatka. — Ses habitudes naturelles, 258. — La femelle ne produit qu'un petit

D
à-la-fois
un an,
s'accou
dent à
aisé de
petits
ponne
— Ils o
Ils ne
ment
Leur m
très-gra
— Leu
— La
La pea
est si d
à l'ent
crit pa
longue
d'un d
lequel
tous l
270. —
dans l
LAMANT
roît ét
lament
LAMANT
avec
XII,
descri
— Le
voisin
des A
ne fr

DES MATIÈRES. xix

à-la-fois, & le temps de la gestation est d'environ un an, *Vol. XII*, 260. — Le mâle & la femelle s'accouplent dans l'eau; manière dont ils préfont à l'accouplement, 261, 262. — Il est plus aisé de harponner les lamantins adultes que les petits ou les jeunes; manière dont on les harponne, & comment on les tire au rivage, 263. — Ils ont le trou ovale du cœur ouvert, 264. — Ils ne mangent point de poisson, mais seulement des fucus & plusieurs autres herbes. — Leur manière de dormir dans l'eau. — Ils sont très-gras en été, & fort maigres en hiver, 265. — Leur graisse est aussi bonne que le beurre. — La chair des jeunes est assez bonne à manger. La peau des vieux est très-épaisse, 266. — Elle est si dure, lorsqu'elle est sèche, qu'on a peine à l'entamer avec la hache. — Un lamantin décrit par M. Steller, pesoit huit milliers, & sa longueur étoit de vingt-trois pieds; description d'un de ces animaux, 267. — Caractères par lequel le lamantin de Kamtschatka diffère de tous les autres animaux terrestres ou marins, 270. — Dimensions d'un de ces animaux tué dans l'île de Bering, 273 & suiv.

LAMANTIN (grand) *de la mer des Indes*, paroît être d'une espèce voisine de celle du grand lamantin des Antilles, *Vol. XII*, 281.

LAMANTIN (grand) *des Antilles*; ses différences avec le grand lamantin de Kamtschatka, *Vol. XII*, 276. Ses dimensions; ses proportions; sa description, 277. — Ses habitudes naturelles. — Les lamantins sont toujours en troupes au voisinage des côtes, 278. — Le grand lamantin des Antilles, ainsi que celui de Kamtschaka, ne fréquentent que la mer, & quelquefois les

embouchures des fleuves. — Il ne produit qu'un petit, que la mère emporte & embrasse & portent entre ses mains, & qu'elle ait allaité pendant un an. — Les petits ne quittent leur mère que deux ou trois ans après leur naissance, *Vol. XI, 279, 280.*

LAMANTIN (petit) *d'Amérique*; cette espèce est plus petite, plus nombreuse & plus répandue que celles des grands lamantins : elle fréquente non-seulement les côtes de la mer, mais remonte les rivières à de grandes distances dans les terres de l'Amérique méridionale, *Vol. XII, 282.* — Ses habitudes naturelles, 283. — La femelle produit ordinairement deux petits, qu'elle porte sous ses deux bras. — Attachement réciproque des petits & de la mère, 285.

LAMANTIN (petit) *du Sénégal*; ses différences & ses ressemblances avec le petit lamantin d'Amérique, *Vol. XII, 286.*

LIÈVRE sauteur. *Voyez* grande gerboise, appelée, au cap de Bonne-espérance, *lièvre sauteur.*

LION-MARIN (le) est la plus grande espèce de phoques qui ait des oreilles externes, *Vol. XII, 216.* — On a trouvé des lions-marins dans les deux hémisphères aux latitudes les plus élevées, comme dans les mers du Kamtschatka, & dans celles des terres Magellaniques, & peut-être cette espèce d'amphibie fréquente toutes les latitudes, ainsi que la plupart des autres phoques. — Les lions-marins vont en grande familles, 218, 219. Chaque famille est ordinairement composée d'un mâle adulte, de dix à douze femelles, & de quinze à vingt jeunes des

deux
foci
fenc
Ils t
Mar
sent
s'hal
—L
serv
gros
Leur
fem
cher
fem
les t
moir
amor
lude
L'ét
de la
port
230.
que
rifier
lages
Leur
lour
reste
— C
crini
fem
crip
de f
Pour
gran

DES MATIÈRES. xxj

deux sexes, *Vol. XII*, 219. — Leurs habitudes en société, tant sur mer que sur terre; la présence & la voix de l'homme les fait fuir. — Ils sont d'un naturel doux & timide, 220. — Manière dont les habitans de Kamtschatka chassent & tuent ces animaux, 221, 222. — Ils s'habitueroient aisément avec l'homme, 223. — Les mâles se battent souvent entr'eux pour conserver ou ravir les femelles. — Ils choisissent une grosse pierre pour domicile sur la terre 224. — Leurs combats particuliers & généraux. — Les femelles ne paroissent pas avoir un grand attachement pour leurs petits. — Les mâles & les femelles semblent s'aimer beaucoup dans tous les temps, & cependant les mâles paroissent moins complaisans & plus fiers dans celui des amours, 225, 226. — Manière dont ils préludent à leur accouplement, 228, 229. — L'été est la saison de leurs amours. — Le temps de la gestation est de près de onze mois. — La portée n'est ordinairement que d'un petit, 230. — Ils ne mangent que peu ou rien, tant que durent leurs amours, 231. — Ils se nourrissent de poissons, de crustacées & de coquillages, 232. — Leur voix & leurs cris, 233. — Leur manière de marcher, 234. — Ils sont lourds, & dorment sur le rivage. — Ils peuvent rester long-temps sous l'eau sans respirer, 235. — On l'appelle *lion-marin*, parce qu'il porte une crinière jaune comme le lion terrestre. — La femelle n'a point cette crinière, 237. — Description du lion-marin, 238. — Il n'y a point de feutre sous les grands poils comme dans l'ours-marin. — Poids & dimensions des plus grands lions-marins, *ibid.* — Dimensions d'une

jeune femelle, *Vol. XII*, 239. — Différence entre l'ours-marin & le lion-marin, 250.

M

MARMOSE; observations de M. Roume de Saint-Laurent, sur la génération des marmoses, par lesquelles il paroît que ces animaux, & peut-être les sarigues & les cayopolins accouchent par les mamelles, *Vol. XII*, 25. — Ce fait si extraordinaire dans la nature, n'est cependant pas impossible, & mérite qu'on cherche à le vérifier, en élevant ces animaux, & observant la manière dont ils naissent, 27, 28.

MARMOTTE du Cap. Voyez DAMAN du Cap.

MARTINS; oiseaux utiles, auxquels les deux îles de France & de Bourbon doivent la conservation de leurs récoltes; ils n'existent dans ces îles que depuis vingt ans, quoiqu'il y en ait peut-être déjà plusieurs centaines de milliers, *Vol. XI*, 266, 267.

MORSES; observations que M. Crantz sur ces animaux; il y en a qui ont jusqu'à dix-huit pieds de longueur, sur une circonférence à peu-près égale. — Descriptions d'un de ces animaux, *Vol. XII*, 124. — Leurs habitudes naturelles. — Leur courage 126. — Leur grand nombre dans certains parages des mers du Nord. — On a fait une énorme destruction de ces animaux, & l'espèce en est actuellement bien moins nombreuse qu'elle ne l'étoit jadis, 127.

MUSC; il paroît que cet animal, qui n'est commun que dans les parties orientales de l'Asie, pourroit s'habituer, & peut-être même se propager

D.
piger da
riture e
son ode
sur-tout
cription
403. —
cription

NAGOR
sines. —
riétés :
donné
notices
ter, *Vo*
deux e

NANGUE
NANGUE
un car
font le
solent
toutes
vres, l
tout-à-
guer on

NEITSE
NILGAU
blances
& la t
la que
& de l
gazelle
— Pre

Supp

DES MATIÈRES. xxij

pager dans nos climats, *Vol. XI*, 401. — Sa nourriture en captivité. — Il ne répandoit point de son odeur de musc en hiver, mais en été, & sur-tout dans les jours les plus chauds. — Description de cet animal, par M. de Sève, 402, 403. — Son naturel, ses habitudes & la description, par M. Daubenton, 405, 406.

N

NAGOR; l'espèce de nagor a des espèces voisines. — Comparaison de ces espèces ou variétés avec le nagor du Sénégal, dont j'ai donné la figure & la description, *Vol. XII*; notices sur ces variétés du nagor, par M. Forster, *Vol. XI*, 335, 36. — Elles sont, selon moi, deux espèces ou races distinctes, 339.

NANGUER. *Voyez NAGOR*.

NANGUER & NAGOR; ces deux animaux ont un caractère qui n'appartient qu'à eux; ce sont les deux seuls animaux dont les cornes soient courbées en avant, au lieu que, dans toutes les autres espèces de gazelles & de chèvres, les cornes sont recourbées en arrière ou tout-à-fait droites. — La femelle & le mâle nanguer ont également des cornes, *Vol. XI*, 334.

NEITSERSOAK. *Voyez PHOQUE à capuchon*.

NILGAULT; quoique cet animal ait des ressemblances assez marquées avec le cerf par le cou & la tête, & avec le bœuf par les cornes & la queue, il est néanmoins plus éloigné de l'un & de l'autre, de ces genres, que de celui des gazelles ou des grandes chèvres, *Vol. XI*, 181. — Preuve de cette assertion, 182. — Il est seul

Supplément. Tome XII. O

de son genre & d'une espèce particulière. — Ses habitudes naturelles. — Il est animal ruminant. — Sa description. — Son naturel, *Vol. XI*, 182. — Cet animal pourroit devenir utile, si l'on pouvoit le naturaliser dans notre climat, 183. — Description plus détaillée du mâle & de la femelle, 184. — Variété dans cette espèce. — Différences entre le mâle & la femelle, 185, 186. — Leur attachement l'un pour l'autre. — Leur description, par *M. William Hunter*, 187. — Le nilgaut est un animal très-doux ; il a l'odorat excellent, & flaire tout ce qu'on lui présente ; il craint beaucoup les odeurs fortes, 196. — Combats des mâles, 197. — Deux individus de cette espèce, mâle & femelle, ont produit en Angleterre, chez *Mylord Clive*, pendant quelques années, 201. — Les nilgauts sont en grand nombre dans les parties septentrionales de l'empire du Mogol, jusqu'au royaume de Cachemire ; mais ils sont tous sauvages, & l'on n'a pas connoissance que les Indiens les aient réduits en domesticité, 203, 204. — Il s'en trouve aussi dans les environs de Surate & de Bombay, & on les croit indigènes dans la province de Guzaratte, 204.

O

ONAGRE. Voyez KOULAN.

OURS-MARIN (P) a des oreilles externes, & son espèce est très-répan due dans toutes les mers ; ses différences avec l'ours de mer ou l'ours blanc, qui est un animal quadrupède,

Vol.
four
les
cette
entre
mis
tant
batte
a tou
il est
laque
jamai
marin
bitan
reux
leurs
tiren
plus
l'hom
pour
Ils on
vite
habitu
mouv
ovale
poisso
195.
melle
font
de de
melle
— Le
par la
— Le
une

DES MATIÈRES. xxv

Vol. XII, 182. — Son tempérament n'est pas soumis ou s'accommode à l'influence de tous les climats. — Il vit en grandes troupes dans cette partie du monde, 184. — Les femelles entrent en chaleur un mois après qu'elles ont mis bas. — Les ours-marins mangent très-peu tant que durent leurs amours. — Les mâles se battent avec fureur entr'eux. — Chaque mâle a toujours un grand nombre de femelles dont il est fort jaloux. — Leur espèce de société dans laquelle les familles particulières ne se mêlent jamais, 186. — Ces animaux évitent les lions-marins, & ne craignent aucun des autres habitans de la mer, 187. — Ils ne sont ni dangereux, ni redoutables. — Leurs habitudes dans leurs familles, 188. — Les vieux mâles se retirent pour vivre solitairement; ils sont alors plus féroces, 189. — Ils ne fuient plus devant l'homme, 190. — Attachement des femelles pour leurs petits. — Leurs différens cris, 192. Ils ont l'odorat très-bon. — Ils marchent assez vite & nagent encore plus vite, 193. — Leurs habitudes naturelles sur les rivages, & leurs mouvemens dans la mer. — Ils ont le trou ovale du cœur ouvert; ils se nourrissent de poisson, de crustacées & de coquillages, 194, 195. — Le temps de la gestation dans les femelles est au moins de dix mois; leurs portées sont ordinairement d'un seul & très-rarement de deux petits: manière dont le mâle & la femelle préludent à leur accouplement, 195, 196. — Les femelles diffèrent beaucoup des mâles par la grandeur & par les couleurs du poil, 197. — Les petits, & sur-tout les fœtus, donnent une très-belle fourrure noire. — Poids & di-

mensions des plus grands ours-marins , *Vol. XII*, 198. — Comparaison de ces animaux avec l'ours de terre , 200. — Description de l'ours-marin , 220.

OURS-MARIN (petit), n'est point le *phoca* des Anciens, parce qu'il a des oreilles externes, & que, suivant Aristote, le *phoca* n'en a point, *Vol. XII*, 131. Les petits ours-marins paroissent être une variété ou une espèce voisine de celle des grands, 208. — Leurs habitudes naturelles, 212. — Leur description, 214.

P

PAZAN ; dans la gazelle *pazan*, les cornes de la femelle ne sont pas si grandes que celles du mâle. Description de cette gazelle, par M.^{rs} Forster & Klockner, *Vol. XI*, 280, 287. — Elle ne va point en troupes, mais seulement par paires, 282. — Singularité des couleurs, & leur distribution sur la face du *pazan*, 288, 289. — Ses dimensions, 294.

PÉCARI ou **TAJACU** (le) n'a pas trois estomacs, mais un seul partagé par deux étranglemens, *Vol. XI*, 12.

PHOQUES. Le genre entier des phoques doit se diviser en deux tributs ; savoir, les phoques sans oreilles externes, & les phoques qui ont des oreilles ou conques extérieures, *Vol. XII*, 129. — Nous ne connoissons que deux espèces bien distinctes de phoques à oreilles ; la première est celui du lion-marin, remarquable par sa crinière jaune ; la seconde, celle de l'ours-marin, qui est composée de deux variétés, l'une

plu
ce
no
Au
nar
plu
c'es
For
com
que
leur
que
péd
le d
fent
espè

PHOQ
men
terra
Casp
habit
— V

PHOQ
lequ
Vol.
natu
au d
mang
des a

PHOQ
phoc
chor
vant
du p

DES MATIÈRES. xxvij

plus grande que l'autre, *Vol. XII, 130, 131.* — Pour ce qui est des phoques sans oreilles, nous en connoissons neuf ou dix espèces ou variétés, 132. Aucun animal du genre des phoques n'est ruminant ; leur estomac est seulement divisé en plusieurs poches par différens étranglemens, & c'est ce qui a trompé le docteur Parsons, 158. Forme de corps & de membres, & habitudes communes à tous les phoques, 176. — Usage que font les Groënlandois de leur peau, de leur graisse & de leurs nerfs, 178. — Les phoques s'accouplent différemment des quadrupèdes terrestres ; les femelles se renversent sur le dos pour recevoir le mâle ; elles ne produisent ordinairement qu'un petit dans les grandes espèces, & deux dans les petites, 179.

PHOQUE commun ; l'espèce se trouve non-seulement dans tous les océans, mais dans la Méditerranée, la mer Noire, & même dans la mer Caspienne & le lac Baikal, *Vol. XII, 172.* — Ses habitudes naturelles. — Manière de les chasser. — Variété dans cette espèce, 173, 174.

PHOQUE à capuchon ; il a un capuchon dans lequel il peut renfoncer sa tête jusqu'aux yeux, *Vol. XII, 162.* — Sa description. — Ses habitudes naturelles. — Cette espèce est très-nombreuse au détroit de Davis. — Ses voyages. — Elle ne mange que peu ou point du tout dans la saison des amours, 163.

PHOQUE à croissant (le) est encore un grand phoque ; ses différences avec le phoque à capuchon. — Ses différens noms en Groënland suivant ses différens âges dans lesquels les couleurs du poil varient beaucoup, *Vol. XII, 164.* — Sa

description; sa graisse ou plutôt son huile, *Vol. XII, 165, 166.*

PHOQUE à museau ridé; c'est le plus grand des phoques sans oreilles; on lui a donné mal-à-propos le nom de lion-marin, *Vol. XII, 133.* — Il se trouve sur les côtes, à la pointe de l'Amérique, & dans l'île de la nouvelle Géorgie, découverte par le capitaine Cook, 134. — Il se trouve de même dans l'hémisphère boréal, sur les côtes de Kamtschatka & à l'île Bering, & probablement il se trouve sous toutes les latitudes., 135 — Je l'ai nommé *phoque à museau ridé*, parce qu'il a sur le nez une peau ridée & mobile, qui peut se remplir d'air ou se gonfler. — Ce grand & gros animal est d'un naturel très-indolent & très-peu redoutable, 136. — Il n'est méchant que dans le temps des amours, 137. — Sa description, *ibid.* — Il n'y a dans la tête que deux petits trous auditifs, & point d'oreilles externes. — Il est plus imparfaitement conformé par les parties postérieures du corps, que le phoque commun, 138.

PHOQUE à ventre blanc; sa description, son naturel, ses habitudes en captivité, sa voix qui semble se produire en expirant & en aspirant, *Vol. XII, 140, 141.* — Le mâle de cette espèce, que nous avons vu, éprouvoit les irritations de l'ampur tous les mois à-peu-près; il étoit alors dangereux. — Ses différens accens & murmures, 142. — Il avoit la respiration fort longue, car il gardoit l'air assez long-temps, & ne respiroit que par intervalles, entre lesquels ses narines étoient exactement fermées. — Il ne les ouvroit que pour rendre l'air par une forte expiration, 143. — Il s'assoupiroit ou s'endormoit plusieurs

fois
carp
mar
heu
viv
ne
est
Sa
hist
esp
— C
sur
fem
qua
P H O
espè
& n
PHOQ
mau
Vol.
P H O
169
PHOQ
pou
pho
mê
le P

R A T
mér
ress
le

DES MATIÈRES. xxix

huile,
nd des
mal-à-
133. —
nte de
e Géor-
k, 134.
hémisphère
k à File
s toutes
à muscu
au ridée
n se gon-
naturel
36. — Il
amours,
y a dans
& point
litement
corps,

fois par jour. — On ne le nourrissoit que de carpes & d'anguilles roulées dans le sel, & il en mangeoit environ trente livres par vingt-quatre heures, *Vol. XII, 144, 145.* — Cet animal peut vivre plusieurs jours sans être dans l'eau. — Il ne boit que de l'eau salée, 145. — Son poids est d'environ six ou sept cens livres, 146. — Sa description, *ibid. 147 & suivantes.* — Son histoire, 150. — Manière dont on traite cette espèce de phoques dans certaines maladies, 151. — Observations de M. Sabarot de la Vernière, sur une femelle de cette espèce, 152. — Cette femelle n'avoit qu'un estomac, & non pas quatre, comme le dit le docteur Parsons, 156.

PHOQUE *gaffigiak*; sa description. — Cette espèce se trouve sur les côtes de Groënland, & n'est pas voyageuse, *Vol. XII, 171.*

PHOQUE *laktah* (le) est un des plus grands animaux de ce genre, & se trouve au Kamtschatka, *Vol. XII, 170.*

PHOQUE *neit-soak*; sa description, *Vol. XII, 169.*

PHOQUE *ursuk* ou *ursuk*; (le) de M. de Crantz pourroit bien être de la même espèce que le phoque à ventre blanc; il en est peut-être de même du grand phoque de l'Acadie, dont parle le P. Charlevoix, *Vol. XII, 159, 160.*

R

RATON-CRABIER; animal de l'Amérique méridionale, que j'ai ainsi nommé parce qu'il ressemble au raton par la figure, & que, comme le crabier, il se nourrit principalement de

crabes, *Vol. XII*, 14. — Ses dimensions. — Sa description, 15. — Ses différences avec le raton, 16, 17.

R E N N E; observation sur le craquement qui se fait entendre dans les pieds & les jambes du renne, & sur la maladie dont deux de ces animaux sont morts en France, *Vol. XI*, 367, 368. — En Lapponie & dans les provinces septentrionales de l'Asie, il y a peut-être plus de rennes domestiques que de rennes sauvages; mais, dans le Groënland, les Voyageurs disent qu'ils sont tous sauvages. — Les plus forts de ces rennes du Groënland ne sont pas plus gros qu'une génisse de deux ans, 369.

RHINOCÉROS; différence entre les rhinocéros d'Asie & ceux d'Afrique, *Vol. XI*, 137, 138.

RHINOCÉROS d'Afrique (le), n'a pas de plis sur la peau comme celui d'Asie; & sa peau n'est pas à l'épreuve d'une grosse balle de mousquet, *Vol. XI*, 138, 139. — Il a toujours deux cornes, 140. — Sa description, 142. — On ne trouve de rhinocéros qu'à cent cinquante lieues de distance du cap de Bonne-espérance, dont ils étoient autrefois plus voisins; on n'en voit guère que deux ou trois ensemble, & quelquefois cependant ils marchent en plus grand nombre, 145. — Leurs mouvemens, leurs courses. — Ils aiment à faire des fillo sur la terre avec leurs cornes. — Les femelles ne produisent qu'un petit à-la-fois; elles ont deux cornes sur le nez comme le mâle, mais qui sont plus petites. — Grognement & cris du rhinocéros, 146. — Ses dimensions, 147 & suivantes.

RITBOK; cet animal paroît être une troisième

van
par
plu
il
bitu
poi
mâ
34
34

Saïo
ne
Ta
XI
M
rah
—
na
lon
&
qu
pa
M
pe
no
qu
tit
&
m
au
&
fu

DES MATIÈRES. xxxj

variété dans l'espèce du nagor ; sa description, par M. Allamand, *Vol. XI*, 340. — Il appartient plus au genre des gazelles qu'à tout autre. — Il ne va qu'en petite troupe. — Ses autres habitudes naturelles, 341. — Les femelles n'ont point de cornes, & sont plus petites que les mâles. — Différences du ritbok & du nanguer, 343, 344. — Dimensions du ritbok mâle, 346, 347.

S

SAÏGA ; sa description, par **Smelin**. — Le saïga ne doit pas être confondu avec le saïga des Tartares *inkutzk*, qui est l'animal du musc, *Vol. XI*, 268. — L'espèce du saïga se trouve, selon M. Forster, depuis la Moldavie & la Bessarabie, jusqu'à la rivière d'Irtisch en Sibérie. — Sa nourriture dans l'état de liberté, son naturel, 270. — Il a la lèvre supérieure plus longue que l'inférieure ; elle paroît pendante, & c'est probablement à cette forme des lèvres qu'on doit attribuer la manière dont cet animal pâit, car il ne broute qu'en retrogradant. Selon M. Forster, les saïgas vont la plupart en troupeaux, qu'on assure être quelquefois jusqu'au nombre de dix mille. Ce qui est plus certain, c'est que les mâles se réunissent pour défendre leurs petits & leurs femelles contre les attaques des loups & des renards. — Leur voix ressemble au bêlement des brebis. — Les femelles mettent bas au printemps, & ne font qu'un petit à-la-fois, & rarement deux, 271. — On trouve quelquefois des saïgas à trois cornes, & même on en

voit qui n'en ont qu'une seule, ce qui est confirmé par M. Pallas. — Description du saïga, par M. Forstier, *Vol. XI*, 272. — Il n'y a que les mâles qui aient des cornes, les femelles en sont dépourvues. — *Saïga* est un mot Tartare, qui signifie chèvre sauvage; mais communément ils appellent le mâle *matgatch*, & la femelle *saïga*, 273.

SARICOVIENNE : la saricovienne ou grande loutre-marine, se trouve non-seulement sur les côtes de l'Amérique, mais aussi sur les côtes de Kamtschatka & des autres parties du nord-est de l'ancien continent, *Vol. XII*, 104. — Faits historiques au sujet des saricoviennes de Kamtschatka. — Leur naturel; elles évitent les phoques & n'aiment que la société de leur espèce. — Elles se tiennent en très-grandes troupes, 105, 106. — Leurs habitudes naturelles. — Elles ont l'odorat très-bon, mais la vue foible & courte. — Leur manière de courir. — Elles nagent avec une très-grande célérité. — Le mâle ne s'attache qu'à une seule femelle, 107. — Les femelles ne produisent qu'un petit à la-fois, & rarement deux. — Le temps de la gestation est d'environ huit à neuf mois. — Les petits, en naissant, ont déjà toutes leurs dents, 108. — Les saricoviennes vivent de coquillages & de poissons mous. — Elles n'ont pas, comme les phoques, le trou ovale du cœur ouvert. — La chair des jeunes est assez bonne à manger, 109. — Chasse périlleuse des saricoviennes, 111, 112. — Les peaux de ces animaux sont de très-belles fourrures, & sont d'un grand prix, 112, 113. — Variétés dans la couleur de leurs fourrures, dont les

D
plus
Vol.
feutr
petit
noir
anim
lout.
vien
SARI
beau
Leu
enne
121
S A
sari
diff
crip
com
l'esp
SARI
sari
blan
Sa
S I N
de
int
mê
Fra
T A
Vo
cet

DES MATIÈRES. xxxiiij

plus belles sont celles qui sont de couleur noire, *Vol. XII, 113.* — Il y a, sous les longs poils, un feutre bien fourni, *ibid.* — La femelle est plus petite que le mâle, & sa fourrure est plus noire. — Manière dont se fait la mue dans ces animaux, 114. — Leurs ressemblances avec la loutre terrestre. — Description d'une saricovienne de Kamtschatka, *ibid.* 115.

SARICOVIENNES de la *Guyade* (les) varient beaucoup pour la grandeur & la couleur. — Leurs habitudes naturelles. — Elles ont pour ennemis les jaguars & les cougars, *Vol. XII, 121, 122.*

SARIGUE à long poil, il est plus grand que le sarigue des Illinois. — Ses ressemblances & ses différences avec ce dernier animal. — Sa description, *Vol. XII, 23.* — Il ne paroît être, comme celui des Illinois, qu'une variété dans l'espèce du sarigue commun, 24.

SARIGUE des Illinois; variété dans l'espèce du sarigue commun. — Ses différences & ses ressemblances avec ce dernier animal, *Vol. XII, 20.* — Sa description, 21.

SINGES (les) n'ont pas encore passé à l'île de Bourbon, & l'on a grand intérêt d'en interdire l'introduction, pour se garantir des mêmes dommages qu'ils causent à l'île de France, *Vol. XI, 266.*

T

TAPIR; comparaison du tapir avec l'éléphant, *Vol. XI, 1.* — Notre climat ne convient guère à cet animal. — C'est le plus gros quadrupède

de l'Amérique méridionale, *Vol. XI, 2.* — Il va très-souvent à l'eau pour se baigner ; il ne mange point de poisson, mais des herbes & des feuilles d'arbrisseaux. — La femelle ne produit qu'un petit. — Habitudes naturelles du tapir. — Les mâles vont toujours seuls, à l'exception du temps où les femelles sont en chaleur, 3. — L'espèce du tapir est assez nombreuse dans les forêts écartées des habitations. — Il est d'un naturel tranquille & doux, & ne devient dangereux que quand il est blessé. — Il fait de larges sentiers battus dans les forêts, & il faut éviter sa rencontre, parce que son allure est brusque, 4. — Manière de le chasser. — Sa peau est très-ferme & très-épaisse, & on le tue rarement d'un seul coup de fusil, 5. — Il n'a pas d'autre cri qu'un sifflet aigu. — On en élève quelques-uns à Cayenne en domesticité, 6. — Sa chair n'est pas d'un bon goût. — Sa description, par M. Bajon, 7. — Le tapir n'est point animal ruminant, & n'a pas trois estomacs, comme il est dit dans la description de M. Bajon ; preuve de ces faits, 10, 11. — Le mâle est plus grand que la femelle. — Description de cet animal, 13, 14. — Les femelles entrent en chaleur au mois de novembre & de décembre. — Chaque mâle suit une femelle, & c'est-là le seul temps où l'on trouve deux tapirs mâle & femelle ensemble. — Le temps de la gestation est de dix à onze mois. — Cet animal n'est point amphibie, mais il fait constamment son gîte sur la terre, & même sur les endroits les plus élevés & les moins humides ; il fréquente les lieux marécageux pour chercher sa subsistance, & parce qu'il y trouve plus de feuilles

&
15.
& l
ti-e
pir
qu
il
rel
cep
ex
qu
éta
La
ger
int
ces
tap
de
ma
co
&
Il
de
pa
m
un
de
de
3
TAI
b
ti
TAI
la


DES MATIÈRES. XXXV



& d'herbes que sur les terrains élevés, *Vol. XI*, 15. — Il fréquente aussi les eaux pour se baigner & laver. — Il nage & plonge très-bien, & il tire souvent sa trompe hors de l'eau pour respirer. — Il cherche sa nourriture plutôt la nuit que le jour. — Il se promène aussi le jour quand il fait humide. — Ses autres habitudes naturelles, 16. — En domesticité il semble être susceptible d'attachement. — On a même des exemples qu'on peut le laisser aller en liberté, qu'il revient de lui-même les soirs à son étable, 17. — Manière de dresser cet animal. La chair des jeunes n'est pas mauvaise à manger, 18, 19. — Observations sur les parties intérieures, & dimensions de quelques-unes de ces mêmes parties, 19, 20. — L'espèce du tapir ne s'est pas étendue au-delà de l'Isthme de Panama, 25. — Sa description par M. Allamand, 28, 29. — Le nez de cet animal a beaucoup de rapport avec la trompe de l'éléphant, & il s'en sert à-peu-près de la même façon. — Il n'y a cependant point d'appendice ou de doigt à son extrémité, 30. — La femelle n'a pas une crinière comme le mâle, mais seulement quelques poils plus longs & éloignés les uns des autres sur cette partie. — Elle n'a que deux mamelles situées entre les jambes de derrière, 36. — Dimensions d'une femelle tapir, 37 & suivantes.

TARSIER (le) est un animal du genre des gerboises, qui ne se trouve que dans l'ancien continent, *Vol. XII*, 57.





TAUPE blanche (la) est plus commune en Hollande qu'en France, & se trouve encore plus







**IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)**



**Photographic
Sciences
Corporation**

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

2.8
3.2
3.6
4.0
4.5

5.0
5.6
6.3
7.1
8.0

fréquemment dans les contrées septentrionales,
Vol. XII, 33.

TAUPE d'*Afrique* (grande), très-nombreuse dans les terres du Cap, *Vol. XII, 37.* — Sa description, par M. Allamand, 38, 39.

TAUPE de l'*île de Java*, *Vol. XII, 35.*

TAUPE de *Virginie*, *ibid.*

TAUPE du *Canada*; sa description, par M. de Faille. — Elle se rapproche, par la forme & par la queue, du genre des rats, *Vol. XII, 45.* — Description particulière de son museau & de sa moustache, qui sont d'une forme très-singulière. — Ses habitudes naturelles & ses manœuvres, 46, 47.

TAUPE du *Cap* (très-grande) ou *taupes des Dunes*. — Ses différences & ses ressemblances avec la taupe commune, *Vol. XII, 48.* — La taupe du Cap, suivant M. le capitaine Gordon, habite dans les Dunes qui sont aux environs du cap de Bonne-espérance & près de la mer. On n'en trouve point dans l'intérieur du pays, 49. — Elle a un pied de longueur depuis le museau jusqu'à la queue; ses autres dimensions; sa description, 50, 51. — Ses habitudes naturelles, 52. — On mange sa chair au Cap, & on la dit fort bonne. — Ses allures & sa façon de marcher. — Elle creuse la terre très-vite. — Son naturel & sa méchanceté, *ibid.*

TAUPE *sauve* (la) ne se trouve guère en France que dans le pays d'Aunis. — Elle se trouve dans le même terrain que la taupe blanche, *Vol. XII, 33, 34.*

TAUPE *jaune-verdâtre* ou *couleur de citron*; elle se trouve dans le territoire d'Alais en Languedoc, *Vol. XII, 34.*

DES MATIÈRES. xxxvij

TAUPE rouge d'Amérique ; espèce différente de la taupe d'Europe ; sa description, *Vol. XII*, 36.

TAUPE tachetée ou variée ; se trouve dans plusieurs contrées de l'Europe. Celle de l'Ost-frise a tout le corps parsemé de taches blanches & noires, *Vol. XII*, 34, 35.

TZEÏRAN ; habitudes naturelles de cet animal, & manière dont on le chasse, par M. Forster, *Vol. XI*, 304. — Les femelles entrent en chaleur à la fin de l'automne, & mettent bas au mois de Juin. Les mâles ont une espèce de sac sous le ventre, semblable à celui du musc, & une proéminence au larynx ; les jeunes sont très-aisés à apprivoiser ; ils s'attachent même à ceux qu'ils connoissent ; ils vont en troupes dans leur état de liberté, 305, 306. — Leur description. — La femelle n'a point de cornes, 306. — Description du tzeïran, par M.^{rs} Allamand & Klockner, 307, 308. — Ses dimensions, 314, 315.

V

VIGOGNE (la) est un animal plus petit que le lama. — Ses dimensions, *Vol. XI*, 378. — Sa description, 379. — Ses habitudes naturelles en captivité. — Il paroît que la vigogne a, comme le lama, une si grande abondance de salive, qu'elle n'a nul besoin de boire ; elle jette aussi son urine en arrière, 381. — L'espèce n'a pas été réduite en domesticité. — Nourriture de la vigogne en captivité, 386. — Sa laine est encore plus fine que celle de l'alpaca. — Les vigognes vont toujours par troupes nombreuses, & se tiennent sur la croupe des

xxxvii] *T A B L E, &c.*

hautes montagnes du Pérou, du Tucuman & du Chily. — Manière de les chasser, *Vol. XI*, 387. — Leur propreté, leur timidité. — On les prend & on les tue en très grand nombre, 387. — Projet pour se procurer en Europe des vigognes, des alpacas & des lamas, 388. — Il seroit aussi possible qu'il est important de naturaliser en France les vigognes, les alpacas & les lamas, 400.

Z

ZÈBRE; il y a, dans l'espèce du zèbre, une variété qui paroît, constante, *Vol. XI*, 62. — Description de cette variété, 66. — Cette variété, qui n'est pas rayée, est d'un naturel plus doux & plus souple que les autres zèbres, 67. — Exemple de l'accouplement d'un âne avec une femelle zèbre, & de la production d'un petit métis de ces deux animaux, 68, 69.

ZIMBR. *Voyez BISON.*

FIN de la Table des Matières.

man &
ol. XI,
- On les
e, 387.
ope des
8. — Il
de natu-
pacas &

re, une
, 62.—
ette va-
naturel
zèbres,
un âne
oduction
ux, 68,

