

CANADA
MINISTÈRE DES MINES
HON. ARTHUR MEIGHEN, MINISTRE; R.-G. McCONNELL, SOUS-MINISTRE
COMMISSION GÉOLOGIQUE
WILLIAM McINNES, DIRECTEUR

MÉMOIRE 104

N° 3, SÉRIE BIOLOGIQUE

Les Oiseaux de l'Est du Canada

par
P. A. Taverner



OTTAWA
THOMAS MULVEY
IMPRIMEUR DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI
1920

Prix 50 cents.

N° 1564

Hon. J.

Les C

Prix 50 cents.

Thomas Robert, printer.

CANADA
MINISTÈRE DES MINES
HON. ARTHUR MEIGHEN, MINISTRE; R.-G. McCONNELL, SOUS-MINISTRE

COMMISSION GÉOLOGIQUE
WILLIAM McINNES, DIRECTEUR

MÉMOIRE 104

N° 3, SÉRIE BIOLOGIQUE

Les Oiseaux de l'Est du Canada

par
P. A. Taverner



OTTAWA
THOMAS MULVEY
IMPRIMEUR DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI
1920

Prix 50 cents.

N° 1564

RL 685

73845

240209

TAVERNER, PA

Introduction.
 Remercie
 Classifica
 Distribut
 Migration
 Protection
 Moyens d'
 Ouvrages
 Clef pour l
 Explic
 Clef...
 Table syst
 Ornithologie d
 Index.....

AVIS

Cet ouvrage est la traduction du mémoire 104
 publié en anglais dans l'année 1919, sous le numéro 1563.

PLANCHE I. J
 F
 II. J
 E
 III. A
 F
 IV. A
 B
 V. A
 B
 VI. A
 B
 VII. A.
 B.
 VIII. A.
 B.
 IX. A.
 B.
 X. A.
 B.
 XI. A.
 B.
 XII. A.
 B.
 XIII. A.
 B.
 XIV. A.
 B.
 XV. A.
 B.
 XVI. A.
 B.
 XVII. A.
 B.

TABLE DES MATIÈRES.

	PAGES
Introduction.....	1
Remerciements.....	5
Classification.....	5
Distribution géographique.....	9
Migration.....	11
Protection.....	13
Moyens d'attirer les oiseaux.....	14
Ouvrages d'ornithologie.....	15
Clef pour les oiseaux de l'est du Canada.....	18
Explication.....	18
Clef.....	20
Table systématique.....	31
Ornithologie descriptive.....	41
Index.....	285

Illustrations.

PLANCHE I. A. Le Grèbe au bec bigarré.....	235
B. Le Plongeon à collier. Huard.....	235
II. A. Le Goéland argenté.....	236
B. La Sterne commune.....	236
III. A. Le Harle à poitrine rousse.....	237
B. Le Canard ordinaire.....	237
IV. A. Le Canard noir.....	238
B. La Sarcelle à ailes bleues.....	238
V. A. Le Canard huppé.....	239
B. La Bernache du Canada. Outarde.....	239
VI. A. Le Butor d'Amérique.....	240
B. Le Grand Héron bleu.....	240
VII. A. Le Râle de la Caroline.....	241
B. La Bécasse d'Amérique.....	241
VIII. A. La Bécassine de Wilson.....	242
B. La Maubèche tachetée.....	242
IX. A. Le Pluvier kildir.....	243
B. La Caille.....	243
X. A. Le Tétrás du Canada.....	244
B. La Gelinotte à fraise.....	244
XI. A. Le Pigeon voyageur et la Tourterelle de la Caroline.....	245
B. Le Busard des marais.....	245
XII. A. L'Epervier brun.....	246
B. L'Autour à tête noire.....	246
XIII. A. La Buse à queue rousse.....	247
B. La Buse à manteau roux.....	247
XIV. A. Le Faucon pèlerin.....	248
B. Le Faucon épervier.....	248
XV. A. Le Balbuzard d'Amérique.....	249
B. La Chouette du Canada.....	249
XVI. A. Le Hibou maculé.....	250
B. Le Due de Virginie.....	250
XVII. A. Le Coucou à bec noir. Le Coucou à bec jaune.....	251
B. Le Martin-pêcheur.....	251

	PAGES.	
XVIII. A. Le Pic minule.....	252	XLV.
B. Le Pic arctique.....	252	
XIX. A. Le Pic maculé.....	253	XLVI.
B. Le Pic à huppe écarlate.....	253	
XX. A. Le Pic à tête rouge.....	254	XLVII.
B. Le Pic doré.....	254	
XXI. A. L'Engoulevent d'Amérique.....	255	
B. Le Martinet des cheminées.....	255	XLVIII.
XXII. A. Le Colibri à gorge rubis.....	256	
B. Le Moucherolle de la Caroline.....	256	XLIX.
XXIII. A. Le Moucherolle brun.....	257	
B. L'Alouette ordinaire.....	257	
XXIV. A. Le Geai huppé.....	258	L.
B. Le Geai du Canada.....	258	
XXV. A. La Corneille d'Amérique.....	259	
B. Le Goglu.....	259	Figures 1 à 68.
XXVI. A. L'Étourneau ordinaire.....	260	
B. L'Étourneau à ailes rouges.....	260	
XXVII. A. L'Étourneau des prés.....	261	
B. L'Oriole de Baltimore.....	261	
XXVIII. A. Le Mainate bronzé.....	262	
B. Le Gros-bec des pins.....	262	
XXIX. A. Le Pinson pourpré.....	263	
B. Le Moineau domestique.....	263	
XXX. A. Le Chardonneret jaune.....	264	
B. Le Plectrophane des neiges.....	264	
XXXI. A. Le Pinson à ailes baies.....	265	
B. Le Pinson à couronne blanche.....	265	
XXXII. A. Le Pinson à gorge blanche.....	266	
B. Le Pinson de montagne.....	266	
XXXIII. A. Le petit Pinson à couronne rousse.....	267	
B. Le Pinson niverolle.....	267	
XXXIV. A. Le Pinson chanteur.....	268	
B. Gros-bec à poitrine rose.....	268	
XXXV. A. Le Tangara écarlate.....	269	
B. L'Hirondelle pourprée.....	269	
XXXVI. A. L'Hirondelle des granges.....	270	
B. L'Hirondelle bicolore.....	270	
XXXVII. A. L'Hirondelle de rivage.....	271	
B. Le Jaseur du cèdre.....	271	
XXXVIII. A. La Pie-grièche à croupion blanc.....	272	
B. Le Vireo aux yeux rouges.....	272	
XXXIX. A. Le Vireo gris olive.....	273	
B. La Fauvette noire et blanche.....	273	
XL. A. La Fauvette jaune.....	274	
B. La Fauvette bleue à gorge noire.....	274	
XLI. A. La Fauvette à croupion jaune.....	275	
B. La Fauvette à tête cendrée.....	275	
XLII. A. La Fauvette de Blackburn.....	276	
B. La Fauvette à poitrine noire.....	276	
XLIII. A. La Grive couronnée.....	277	
B. La Fauvette trichas.....	277	
XLIV. A. La Fauvette à queue rousse.....	278	
B. La Grive de la Caroline.....	278	

GES.		PAGES.
252	XLV. A. La Grive rousse.....	279
252	B. Le Troglodyte aëdon.....	279
253	XLVI. A. Le Grimpereau d'Amérique.....	280
253	B. La Sittelle de la Caroline.....	280
254	XLVII. A. La Mésange.....	281
254	B. Le Roitelet huppé.....	281
255	Le Roitelet à couronne rubis.....	281
255	XLVIII. A. La Grive des bois.....	282
256	B. La Grive de Wilson.....	282
256	XLIX. A. La Grive d'Alice.....	283
257	La Grive de Swainson.....	283
257	B. La Grive solitaire.....	283
258	L. A. Le Merle d'Amérique.....	284
258	B. Le Rouge-gorge bleu.....	284
259	Figures 1 à 68. Illustrations de la clef.....	20

Il s'est
public app
commence
de l'observ
jours plus v
sollicité l'at
la vie qui é
gnifiques; e
l'imaginatio
veaux aspec

L'ornit
s'attaquer
mins qu'il
d'une grand
qui s'offrira
vent fendre l
tra la puissa
animal peut
d'expérimen
nature fera s
tra l'occasion
aussi bien q
exercer ses d
rablement la
me qui ne v
sentiment, q
son attention

L'ouvra
l'intérêt, pou
que, en faver
faire voir l'in
science et du
fournir à l'éco
ceux qui sont
au mieux des
forme facilit
base à des me
pièges où se s
quer des mét

Les Oiseaux de l'Est du Canada.

INTRODUCTION.

OBJET DE CET OUVRAGE.

Il s'est fait, en ces dernières années, un sérieux réveil de l'intérêt que le public apporte aux sujets d'histoire naturelle. De plus en plus le monde commence à se rendre compte du plaisir et des avantages qu'on peut retirer de l'observation des choses ordinaires de la création. Dans ce champ toujours plus vaste des études de la nature, il est peu de sujets qui aient autant sollicité l'attention générale que celui des oiseaux, et il est peu de formes de la vie qui éveillent au même point le sens esthétique. Ces formes sont magnifiques; elles excitent la curiosité; leurs manifestations fugitives piquent l'imagination; et parce qu'elles se présentent constamment sous de nouveaux aspects, elles ne sont jamais banales.

L'ornithologie est un côté par lequel les problèmes de la nature peuvent s'attaquer avec succès sous toute sorte de points de vue et par tant de chemins qu'il y a là pour beaucoup de gens un travail d'un grand intérêt et d'une grande valeur qui pourra se faire selon le goût d'un chacun et l'occasion qui s'offrira. Ceux qui ont un penchant pour un travail systématique peuvent fendre leurs définitions au point de les rendre aussi ténues que le permettra la puissance d'observation propre à l'homme. Le psychologue du monde animal peut étendre ses problèmes aussi loin que s'y prêteront les méthodes d'expérimentation dont s'avisera son génie. L'admirateur ordinaire de la nature fera ses observations et ses notes aussi laborieusement que le permettra l'occasion; il pourra donner des renseignements d'un intérêt scientifique aussi bien que populaire; se complaire à observer des beautés passagères, exercer ses dons d'observation, et acquérir un savoir qui accroîtra considérablement la faculté qu'il a de goûter les choses de la nature. Même l'homme qui ne voit que le côté pratique des choses et n'entend rien à celui du sentiment, qui n'éprouve aucune sympathie pour la beauté abstraite, voit son attention éveillée par la valeur marchande des oiseaux.

L'ouvrage sur les "Oiseaux de l'Est du Canada" a été écrit pour éveiller l'intérêt, pour le surexciter là où il existe déjà, qu'il soit esthétique ou pratique, en faveur de l'étude des oiseaux canadiens; il a aussi pour buts: 1° de faire voir l'importance de cette étude sous le rapport du sentiment, de la science et du commerce; 2° d'aider à reconnaître les races indigènes; 3° de fournir à l'économiste des moyens faciles de distinguer les oiseaux nos amis de ceux qui sont nos ennemis, de manière à en user intelligemment à leur égard et au mieux des intérêts de l'homme et du pays entier; 4° de présenter sous une forme facilement accessible des données dignes de confiance pour servir de base à des mesures de législation protectrices; 5° de montrer quelques-uns des pièges où se sont pris dans le passé des gens sans expérience; enfin, 6° d'indiquer des méthodes propres à éviter ces pièges.

LE CADRE DE CET OUVRAGE.

Cet ouvrage comprend l'ensemble des oiseaux que l'observateur ordinaire a chance de rencontrer entre la côte de l'Atlantique et les prairies situées au nord de la frontière internationale. Cette région forme une aire zoologique naturelle (voir Distribution p. 9) comprenant ce qu'on peut appeler les terres forestières du Canada, section assez homogène au triple point de vue physique, géographique et zoologique. Les prairies sont absolument différentes de caractère et, par conséquent, offrent un aspect absolument différent de la vie des oiseaux. Les oiseaux de plein air sont naturellement autres que ceux des terres de forêts; de là vient que le Manitoba a été adopté comme frontière occidentale du territoire zoologique dont traite le présent ouvrage.

Bien que n'étant pas à proprement parler une liste complète des oiseaux du Canada oriental, ce livre s'en rapproche cependant beaucoup. On n'a pas tenu compte d'un petit nombre d'espèces dont le status canadien est douteux, qui se présentent ou rarement ou seulement par accident. On a usé à cet égard de la plus grande liberté, et certaines espèces ont été admises parce que cela était utile; quelques-unes comme pouvant probablement se rencontrer en cherchant bien, quelques autres comme faisant ressortir un cas généralement intéressant de façon plus piquante que ne feraient des espèces indigènes ordinaires, quelques-unes enfin parce qu'on les a confondues avec des formes plus communes.

LE PLAN DE L'OUVRAGE.

L'arrangement systématique (voir Classification p. 5 et la nomenclature p. 8) dont on s'est servi est celui du catalogue complet de l'Union des Ornithologistes américains, 3ème édition, 1910. Bien qu'il soit reconnu que cette classification est quelque peu imparfaite et que les détails en sont donnés à titre d'essai, c'est cependant celle sur laquelle est basée la plus grande partie de la littérature américaine récemment parue au sujet des oiseaux et qui est d'un usage général dans l'Amérique du Nord.

En traitant le sujet des sous-espèces, on s'est départi de la méthode ordinaire pour en adopter une que l'auteur croit plus strictement conforme aux faits de la nature et aux vues modernes. Les espèces ont été traitées comme des assemblages de sous-espèces, chacune de rang et d'importance identiques, et non plus, ainsi que c'est la coutume, comme des espèces avec des sous-espèces subordonnées qui dépendent des premières. L'espèce est d'abord donnée comme un tout, comprenant ses races sous-spécifiques, et sous un sous-titre il est fait mention des sous-espèces spéciales qui se présentent dans le cadre géographique de l'ouvrage. Il n'est résulté de cela aucune confusion, aucun changement, sauf dans l'emploi des noms dans la langue du pays, où le lecteur trouvera quelques innovations apportées aux noms donnés et autorisés par l'Union des Ornithologistes américains. Dans la nomenclature scientifique la véritable importance des espèces relativement aux sous-espèces a été exprimée; mais les noms ordinaires n'ont pas, jusqu'ici, rendu cette idée de subordination, et c'est ce fait qui, dans bien des cas, a entraîné l'usage de termes sous-spécifiques définis alors que, selon la nature du cas, il était impossible d'en déterminer l'exactitude, ou malavisé de les reconnaître. C'est ainsi qu'il y a eu une tendance dans l'opinion tant populaire que scientifique à attacher une importance indue à ces petites défini-

tions. Pe
res ont été
reçu. D'
les noms e
duire. D'
que recon
forme ainsi
l'usage cou
but en vue
saient, le n
adjectif, le
té à l'usage
soit pas do
nière de l'aj
ses commu
cas particul

L'alou
type *Otocor*
l'alouette o
races géogr
pour l'espèc
typique *Oto*
première dé
tion, sur d'
nom d'aloue
ordre, en le
alpestris.

La pie-g
que de proc
Louisiane, d
introduire ur
pèce a donc
"loggerhead"
dional pourr.
head" a jusq

Ce serai
tout le monde
jour où le cor
question et p

Dans les
aussi peu moc
la nomenclatu
tion française
me en-têtes sp
de Dionne: "I
en anglais est
latin en lettre:
Dr C. W. Tow
gie des provin
français corre
guillemets la t

tions. Pour corriger cet état de choses, certaines adaptations de noms vulgaires ont été nécessaires, mais on s'est écarté alors le moins possible de l'usage reçu. D'anciens termes ont été rétablis là où c'était possible, mais comme les noms courants étaient aussi donnés, aucune confusion ne pouvait se produire. Dans quelques cas il a été nécessaire d'appliquer le nom sous-spécifique reconnu du type à l'espèce entière et d'en adopter un nouveau pour la forme ainsi dépouillée. En procédant de la sorte, il était bon qu'il se fit dans l'usage courant un changement aussi petit que possible et compatible avec le but en vue. C'est pour cela que, sauf quand de bonnes raisons s'y opposaient, le nouveau nom sous-spécifique se formait en faisant précéder d'un adjectif, le terme spécifique employé jusque-là. Chaque changement apporté à l'usage en cours a été adopté d'après ses mérites propres. Quoiqu'il ne soit pas douteux que le principe de cette réforme ait sa raison d'être, la manière de l'appliquer a donné lieu à beaucoup de raisonnement, à de nombreuses communications avec d'autres gens, et à quelques hésitations dans des cas particuliers.

L'alouette ordinaire est un exemple de ce problème. La sous-espèce type *Otocoris alpestris alpestris*, a généralement été connue comme étant l'alouette ordinaire, en dépit du fait que l'une quelconque des quatorze autres races géographiques a autant de droit à ce nom et que c'est le seul nom pour l'espèce entière. La manière la plus simple c'est d'appeler la sous-espèce typique *Otocoris alpestris alpestris* (typique seulement en ce qu'elle est la première décrite, et non pas à cause de quelque supériorité, par la classification, sur d'autres formes) l'alouette ordinaire de l'Est, et d'appliquer le nom d'alouette ordinaire à la collection entière des sous-espèces du même ordre, en le faisant synonyme du nom scientifique à deux termes *Otocoris alpestris*.

La pie-grièche migratrice offrait d'autres difficultés. La manière logique de procéder consisterait à dénommer l'espèce entière la pie-grièche de Louisiane, d'après son nom scientifique de *ludovicianus*. Mais ce serait introduire un nom peu familier que peu de personnes reconnaîtraient. L'espèce a donc été appelée ici la pie-grièche, et l'oiseau du Canada oriental, le "loggerhead" migrateur, dans l'idée qu'un terme géographique tel que méridional pourrait s'appliquer à la race type à laquelle l'appellation "loggerhead" a jusqu'ici été restreinte.

Ce serait espérer beaucoup trop que de croire que ce résultat satisfera tout le monde; le présent auteur espère cependant qu'il sera accepté jusqu'au jour où le comité de l'Union des Ornithologistes américains sera saisi de la question et prendra des décisions qui feront autorité.

Dans les pages suivantes, le numéro et le nom, dans la langue du pays, aussi peu modifié que possible, ont été empruntés pour l'édition anglaise, à la nomenclature de l'Union des Ornithologistes américains. Pour la traduction française de ces noms, qui se présentent d'abord en caractères gras comme en-têtes spécifiques, on s'est guidé principalement sur l'excellent ouvrage de Dionne: "Les oiseaux de la province de Québec." Le terme correspondant en anglais est alors indiqué, entre parenthèses, puis vient le nom spécifique latin en lettres italiques. Plusieurs des noms français ont été fournis par le Dr C. W. Townsend qui a des connaissances très grandes dans l'ornithologie des provinces de l'Est. Là où nous n'avons pas pu trouver de noms français correspondant à l'anglais, nous avons cru devoir donner entre guillemets la traduction littérale soit du nom anglais soit du nom latin.

Précédée de l'initiale "L" la longueur des individus de l'espèce est donnée ensuite en pouces et dixièmes de pouce. La longueur d'un oiseau est déterminée en mesurant le corps, en ligne droite, depuis la pointe du bec jusqu'au bout de la plus longue plume de la queue, l'oiseau étant étiré juste assez pour redresser les courbes du cou. Les mesurages donnés sont ceux du mâle adulte moyen et indiquent la taille relative de l'espèce dont il est question. Ils ne visent pas à une identification spécifique, vu que dans la plupart des espèces il y a plus ou moins de variations soit individuelles soit sexuelles.

On ne donne qu'une description succincte des espèces et là où il y a des illustrations la description est omise et, à sa place, le lecteur est renvoyé à l'illustration.

Sous le titre de "Traits distinctifs," on a essayé de mettre en relief les points où les espèces, une fois dans la main, peuvent se distinguer d'autres formes semblables, et les travaux d'autres autorités ont été librement utilisés pour compléter les observations du présent auteur. Plusieurs des points distinctifs ne sont naturellement que superficiels, mais ils sont tous, autant que possible, dignes de confiance.

Sous le titre de "Indications sur le terrain," on fait allusion aux caractères grâce auxquels les espèces peuvent se reconnaître dans la vie. A cet égard, l'auteur s'est laissé guider surtout par sa propre expérience, et a indiqué les points qui lui ont paru les plus caractéristiques. Pour les espèces dont il n'avait qu'une faible connaissance, il s'en est rapporté à d'autres.

Sous le titre de "Discussion," nous avons ajouté d'autres faits d'un intérêt général et relatifs aux espèces, selon que la place permettait d'en faire plus ou moins mention, ou que l'importance de l'espèce l'exigeait. Eparses parmi les diverses espèces et recevables sous ce titre, de nombreuses questions sont discutées en même temps que sont énoncées les lois générales qui gouvernent la vie du monde animal. Plusieurs de ces questions se rapportent à un grand nombre d'espèces, et plusieurs d'entre elles pourraient se répéter pour chaque espèce séparée, n'était-ce qu'il faudrait se résigner à de constantes répétitions. Nous avons essayé d'encourager, vis-à-vis des oiseaux, une attitude sagement protectrice au point de vue esthétique.

La rubrique "Nid" ne comporte qu'une brève description du nid et de sa situation. Une bonne partie de ce sujet est tirée d'autres auteurs, surtout de l'inestimable "Handbook of Birds of Eastern North America".

Sous le titre de "Valeur économique," on donne un résumé des connaissances actuelles touchant les rapports des espèces avec l'homme. La majeure partie de ce sujet est tirée de l'admirable ouvrage publié par le "Biological Survey" des Etats-Unis. Ce n'est forcément qu'un bref sommaire qui peut se donner ici des faits sur lesquels se fondent les conclusions, et le lecteur est renvoyé aux ouvrages d'ornithologie (p. 15) pour plus amples détails.

Sous le mot "Habitat" on a trouvé que le mieux était d'indiquer cet habitat des espèces en termes si généraux et si clairs que chacun pourra se faire une idée générale de l'habitat de chaque espèce. Le résultat pourra être un peu vague par suite du manque de frontières bien marquées pour les habitats, mais les centres de distribution sont clairement indiqués. Pour les habitats bien définis, le lecteur est renvoyé au "Catalogue des Oiseaux du Canada" par John et James M. Macoun, publié par notre ministère en 1909.

Tout
techniques
nus. Quel
dans le lan
pour l'usag

L'aute
de son trav

M. Fr
comblent des
pour suggé
travail.

Le "Bi
conditions é

M. J.-F
se sont pas l
ment de cet

M. Fra
qui revient l
et le second

M. Jam
source d'util
travail de l'i

Je désir
bien d'autre
qu'elles m'on

Le prem
actuel du grc
dans un ouv
sui par les z
semble en ge
structure et n
découverte de
les lignes de d
a donné une
spécifiques d'
spécifique con
mun, etc., etc

Comme il
Nord, on peut
les plus grand
Les ordres son
Espèces. Ces
sous-familles,

évidente pour
Quoique l
un système

Tout le long de ce travail on s'est appliqué à éviter l'usage des termes techniques en les remplaçant autant que possible par des termes bien connus. Quelques termes techniques, cependant, n'ont pas leurs correspondants dans le langage populaire, et l'on en a donné un vocabulaire à la page 231 pour l'usage de ceux qui ne les connaissent pas.

REMERCIEMENTS.

L'auteur désire reconnaître le précieux secours qu'il a reçu dans le cours de son travail, et qui lui est venu des sources suivantes:

M. Frank Chapman, dont le "Handbook" a été inappréciable pour combler des lacunes dans les connaissances personnelles de l'auteur; et aussi pour suggérer des idées dans la construction, le plan et les méthodes du travail.

Le "Biological Survey" des Etats-Unis, pour des données au sujet des conditions économiques des oiseaux.

M. J.-H. Fleming, de Toronto, et M. W.-E. Saunders, de London, qui ne se sont pas lassés de prêter le concours de leurs conseils depuis le commencement de cet ouvrage jusqu'à sa terminaison.

M. Frank Hennessey, d'Ottawa, et Claude Johnson, de ce ministère, à qui revient le mérite de nos illustrations; le premier pour les images coloriées et le second pour les détails de la clef.

M. James M. Macoun, de notre ministère, qui a été constamment la source d'utiles conseils, et a aidé à la préparation des pages suivantes pour le travail de l'imprimeur.

Je désire exprimer mes remerciements à toutes ces personnes et à bien d'autres encore pour les ressources de nature privée, ou imprimées, qu'elles m'ont offertes.

CLASSIFICATION.

Le premier pas en toute science c'est la classification. Le système actuel du groupement générique des espèces fut d'abord avancé par Linné dans un ouvrage qui fit époque, son "Système de la Nature" et qui depuis a été suivi par les zoologistes. En vertu de ce système, les espèces sont groupées ensemble en genres (*genera*) conformément à des rapports fondamentaux de structure et non à des ressemblances accidentelles. Le fait que, grâce à la découverte des lois de l'évolution, ces rapports ont été trouvés d'accord avec les lignes de descendance, est une preuve de la logique du système auquel il a donné une signification de plus. C'est ainsi que les différents membres spécifiques d'un genre peuvent être considérés comme dérivant d'un ancêtre spécifique commun; les genres d'une famille, d'un ancêtre générique commun, etc., etc.

Comme il n'est question que des oiseaux qui existent dans l'Amérique du Nord, on peut les diviser en un certain nombre d'*Ordres* qui sont les groupes les plus grands dont doit s'occuper directement l'ornithologiste canadien. Les ordres sont divisés en *Familles*, les familles en *Genres* et les genres en *Espèces*. Ces divisions peuvent à leur tour être subdivisées en *sous-ordres*, *sous-familles*, *sous-genres* et *sous-espèces*, dont la place dans le tableau est évidente pour chaque catégorie d'après son titre.

Quoique les bornes assignées à qui veut composer un livre exigent un système de classification représenté comme une suite linéale de

formes qui se succèdent en file unique, il faut ne pas perdre de vue que le système n'est pas conçu comme linéal. Les espèces constituantes, au lieu de suivre une seule ligne de parenté et de succession depuis la plus basse jusqu'à la plus haute, présentent beaucoup de lignes parallèles du même rang identique ou d'un rang subordonné. La classe *Aves* ou Oiseaux peut être représentée par un arbre, la hauteur duquel représenterait le temps en âges géologiques depuis le plus ancien, tout en bas jusqu'à l'âge actuel, près du sommet. Le tronc sera montré comme étant double à sa base; une branche serait une souche morte, courte, et représenterait les oiseaux fossiles, à dents, race qui devint éteinte avant les temps géologiques actuels; l'autre branche, grosse et prospère, représenterait les formes modernes sans dents. Cette branche, à son tour, se partagerait en deux autres, à petite distance de la base, et représenterait les deux sous-classes, les oiseaux sans bréchet et les oiseaux à bréchet. Les premiers seraient représentés par la branche de beaucoup la plus petite; les derniers se diviseraient et se subdiviseraient en branches représentant d'abord des ordres, ensuite des familles, puis des genres et enfin des espèces.

La valeur de ces divisions, c'est-à-dire, la somme de différenciation nécessaire pour élever un groupe de genres au rang d'une famille, ou une collection de familles au rang d'un ordre, est quelque chose qui dépend de l'expérience et de la décision du savant, vu qu'il n'y a sur ce point aucune règle faisant autorité. Néanmoins il s'est créé peu à peu une entente approximative sur ce sujet, bien que la tendance constante parmi les spécialités a été de faire des distinctions de plus en plus subtiles et de multiplier le nombre des différents groupes.

La plus petite division, généralement adoptée, est celle de l'espèce. Bien que chacun de nous se fasse une idée plus ou moins exacte de ce qu'est une espèce, qu'on l'appelle de ce nom ou de tout autre, aucune définition satisfaisante n'a jamais été établie pour l'expliquer. C'est ce qu'on appelle communément une "sorte d'animal". Ainsi le cheval est une différente "sorte" ou espèce qu'un âne, le rouge-gorge bleu qu'un rouge-gorge. Ils ont des caractères différents bien tranchés, nichent régulièrement avec des oiseaux de même espèce seulement, et produisent des petits de même espèce. Des espèces différentes ne nichent pas communément ensemble, mais quand cela arrive il se forme des croisements ou des produits hybrides qui sont, en général, stériles. Jusqu'à un temps relativement récent on ne reconnaissait aucune division plus petite, mais grâce à une étude serrée du sujet il est devenu évident aux yeux des ornithologistes que, au sein de l'espèce, il y a des variations considérables, soit quant aux individus soit quant aux localités.

La variation quant aux individus est la différence naturelle qui peut se présenter à un moment quelconque entre ceux que relie une parenté commune, comme par exemple, entre frères et sœurs du même sang. De même que tout individu provient de son semblable on peut dire qu'un individu ne reproduit pas toujours son semblable, car, dans certaines limites, de deux créatures, l'une n'est jamais le pur double de l'autre. Il s'agit ici de la variation individuelle, ordinairement faible et irrégulière par l'apparence et la direction, mais qui quelquefois persiste progressivement de génération en génération dans une seule direction pour former la base par laquelle nos évolutionnistes expliquent l'origine des espèces. La variation des individus, toutefois, est négligée dans la classification, à moins qu'elle n'ait fait assez de

progrès pour
groupe nat

La va
comme le
agissant di
elle passe
giques loca
vent que
habitent c
des individ
déserte et
que ceux d'
foncés. Ce
fois elles se
grand nom
moyennes.
l'habitat gé
une importa
tion que se
naire est in
variation gé
ment spécifi
dans l'autre
l'une quelco
extrêmes et
eux la scien
puissent être
Quant à noi
dues à une
espèces géog
rant, et nous
que les phase
de la stérilité
d'isolement
s'oppose à
l'existence de
En sus de ce
autres variat
pas être rec
"Melanos",
L'albinisme
sporadique d'
couleur, et q
albinisme pe
pigment ou r
dérer comme
résultat, entr
de trop près.
touche pour
ou est une co
rose, parce qu
leur du sang

progrès pour produire une différenciation évidente et constante d'avec le groupe naturel et définissable d'une espèce.

La variation au point de vue géographique peut être considérée comme le résultat d'une tendance ordinaire de la variation individuelle agissant dans une société entière d'individus dirigée vers un but commun; elle passe pour être motivée et guidée par des conditions climatologiques locales et d'autres encore. C'est ainsi que nous trouvons souvent que parmi une espèce très disséminée, tous les individus qui habitent certaines localités ont certains caractères qui les séparent des individus des régions environnantes. Les individus d'une contrée déserte et aride sont volontiers plus petits et de couleur plus claire, tandis que ceux d'une contrée chaude et humide sont d'habitude plus gros et plus foncés. Ces différences sont quelquefois manifestes et très visibles; d'autres fois elles sont si légères qu'on ne les remarque qu'en comparant un très grand nombre de spécimens, et qu'on ne les découvre qu'en recourant à des moyennes. C'est ainsi qu'il y a tous les degrés d'une différenciation due à l'habitat géographique, depuis des différences prononcées qui ont presque une importance spécifique, jusqu'aux plus fines nuances d'une différenciation que seuls des spécialistes exercés peuvent distinguer et que l'œil ordinaire est incapable d'apprécier. Toutefois, le fait saillant qui empêche la variation géographique la plus patente d'être reconnue comme complètement spécifique, c'est que ces formes de moindre importance passent l'une dans l'autre et que dans des localités intermédiaires, il peut se rencontrer l'une quelconque des nuances de différenciation qui existent entre l'un des extrêmes et l'autre. De ce mélange graduel des signes caractéristiques entre eux la science n'est pas supposée tenir compte, et quelque subtiles que puissent être les distinctions, les divisions doivent être tranchées et précisées. Quant à nous, nous reconnaissons ces variations qui s'entremêlent et sont dues à une distribution géographique, en tant que race, variétés ou sous-espèces géographiques, ce dernier terme étant aujourd'hui d'un usage courant, et nous les considérons comme des espèces en voie de formation avant que les phases qui les rattachent à la souche originelle aient disparu, à cause de la stérilité croissante entre les variantes extrêmes. Sauf dans les cas rares d'isolement physique, tel que celui d'un habitat insulaire océanique qui s'oppose à un habitat continu, nous considérons, dans la pratique, l'existence des entremêlements comme la preuve d'un status sous-spécifique. En sus de ces divisions d'importance pour la classification il y a quelques autres variantes, qui par suite de leur survenance irrégulière, ne peuvent pas être reconnues dans notre classification. Ce sont les "Albinos", les "Melanos", et les "Formes dichromatiques".

L'albinisme, c'est-à-dire: blancheur inaccoutumée, c'est la présence sporadique d'individus blancs, dans des espèces qui ont d'habitude une autre couleur, et qui peut se rencontrer dans presque toutes les espèces. Cet albinisme peut être ou partiel ou complet; il est caractérisé par l'absence du pigment ou matière colorante dans les ailes ou la peau. On peut le considérer comme une manifestation de faiblesse physique et il passe pour être le résultat, entre autres choses, de l'accouplement entre individus apparentés de trop près. La couleur des pupilles des yeux est une excellente pierre de touche pour découvrir si une coloration purement blanche est de l'albinisme ou est une couleur normale. Chez les albinos les pupilles sont de couleur rose, parce que l'absence de couleur normale dans la rétine permet à la couleur du sang de se montrer.

Le mélanisme, ou la couleur noire anormale, est dû à un excès de pigment. Un bon exemple de mélanisme est fourni par le renard noir, qui est une variante noire de l'espèce commune qui est rouge.

Le dichromatisme est le terme qu'on emploie pour désigner la présence de deux types de coloration dans une seule espèce, indépendamment du sexe, de l'âge ou de la saison. C'est ainsi que le hibou maculé se rencontre dans les deux phases rouge et grise (voir planche XVII). Ils s'accouplent sans destruction de couleur et la progéniture pourra être de l'une ou de l'autre. La buse pattue et le labbe se rencontrent dans les phases claires et presque noires; la différence entre le dichromatisme et le mélanisme dans ces cas est légère.

Les hybrides constituent un autre écart du type spécifique. C'est la progéniture des parents de deux espèces distinctes. C'est seulement par occasion que ces accouplements sont prolifiques et, quand ils le sont, la progéniture est généralement stérile. Les hybrides se rencontrent le plus souvent chez les canards, surtout quand le canard ordinaire est l'un des parents.

Chaque oiseau de l'Amérique du Nord porte un nom vulgaire ou de la langue du pays, autorisé par l'usage et reconnu par les ornithologistes de renom; il est rarement nécessaire, dans ce cas, d'employer la nomenclature scientifique. Toutefois, il est bon que ceux qui s'intéressent aux oiseaux se familiarisent avec le plus grand nombre possible de noms scientifiques, car ils sont non seulement nécessaires dans les travaux plus avancés, mais ils sont d'un usage pratique pour bien comprendre les rapports généraux qui existent entre les différentes espèces.

Le présent système de nomenclature avec deux termes fut introduit par Linné, le grand botaniste suédois, et employé dans son "Système de la Nature", dixième édition, 1758, qui est l'autorité acceptée par les ornithologistes américains. Dans ce système chaque espèce a deux noms, le premier est celui du genre auquel elle appartient, le second est celui de l'espèce. Les noms génériques ne sont pas donnés en double dans la sphère de la zoologie, ni ceux de l'espèce à propos du genre. C'est ainsi que le rouge-gorge américain s'appelle *Planesticus migratorius*, c'est-à-dire que l'espèce du genre *Planesticus* est nommée *migratorius*. D'autres espèces du *Planesticus* ont d'autres noms que *migratorius*.

Les trois buts de toute nomenclature scientifique sont l'exactitude, l'universalité et la permanence. A cette fin la terminologie des sujets du monde zoologique est sujette à des lois strictes dont les principes sont universellement acceptés et employés, selon des règles très strictes. En vertu de ces lois le nom scientifique d'une espèce n'est pas une affaire de préférence personnelle, mais est invariable, de telle sorte que personne ne peut le mettre en question et qu'aucun changement ne peut s'introduire dans la nomenclature scientifique sauf ceux qui sont nécessaires pour corriger des erreurs courantes dans l'application des lois de ce code. A mesure que les connaissances avançaient il est devenu nécessaire de s'éloigner un peu de la lettre sinon de l'esprit du système à deux termes de Linné, et en ajoutant un troisième terme pour désigner la sous-espèce, d'en faire un nom à trois termes. Partout où un nom à trois termes est en usage, c'est le nom d'une sous-espèce de la forme primitive à deux noms. Le premier spécimen décrit, ou le premier spécimen auquel un nom a été attaché, est considéré comme la forme appelée "type". C'est pourquoi en divisant une espèce en sous-espèces la forme qui la première fut nommée comme une espèce devient

d'elle-même
tion de son
pour la pre
comme *mi*
distinguer
migratorius
celui-ci pou
Planesticus
der, en 1900
là où les no
d'usage de
lorius.

Les va
importance
lière est néc
des circons
apprécier, el
vateur ordi

Les fait
animés sur
attentif. L
les zones ter
serrée de plu
plus étroites
Mexique, il y
modo aux réj
sont subdivi
particuliers c

La zone
et il suffit de

La régio
géographie d
trale inférieu
inférieure poi
comprenant l
du tout au C
intéresse dire
frontière sur
du Niagara.
médionales i
lloppement le
fois notre fron
unes des vallé
nique méridic
forme la zone
plus cultivées
cours supérie

d'elle-même la race type, et son nom sous-spécifique est formé par la répétition de son nom spécifique. C'est ainsi que le rouge-gorge américain qui fut pour la première fois décrit et spécifiquement dénommé par Linné, en 1776, comme *migratorius*, quand il est mentionné sous-spécifiquement pour le distinguer du rouge-gorge méridional ou de l'occidental, devient *Planesticus migratorius migratorius*. Le rouge-gorge de l'Ouest qui fut distingué de celui-ci pour la première fois par Ridgway, en 1887, fut nommé par lui *Planesticus migratorius propinquus*, et le rouge-gorge du Sud, par Batchelder, en 1900, s'appelle *Planesticus migratorius achrusterus*. Dans la pratique là où les noms génériques ou spécifiques sont donnés par le contexte, il est d'usage de les indiquer par l'initiale comme *P. migratorius*, ou *P. m. migratorius*.

Les variétés sous-spécifiques sont des divisions de l'espèce de moindre importance, sauf dans certains ordres de travaux où une exactitude particulière est nécessaire. Comme ces sous-espèces sont aussi souvent basées sur des circonstances que seuls des observateurs très expérimentés peuvent apprécier, elles restent en dehors des choses qui sollicitent l'intérêt de l'observateur ordinaire.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Les faits les plus généraux de la distribution géographique des êtres animés sur la planète sautent aux yeux de l'observateur même le moins attentif. Les divisions fondamentales de cette distribution par les tropiques, les zones tempérées et arctiques, sont des plus manifestes, mais une étude serrée de plus près montre qu'au sein de ces larges divisions il s'en trouve de plus étroites et de moins évidentes. En Amérique, au nord du golfe du Mexique, il y a trois régions de la vie animale, lesquelles se conforment grosso modo aux régions susdites et appelées tropicale, australe et boréale. Celles-ci sont subdivisées en zones de vie, caractérisées chacune, par des assemblages particuliers de plantes et d'animaux.

La zone tropicale est suffisamment caractérisée par le nom qu'elle porte et il suffit de la mentionner.

La région australe correspond, de façon générale, à l'idée qu'on se fait en géographie de la zone tempérée. Elle est divisée en trois zones de vie: l'australe inférieure, l'australe supérieure, et la zone de transition. L'australe inférieure pourrait être désignée comme la sous-tropicale, et s'étend au nord comprenant les états du golfe et de l'Atlantique méridional; elle n'existe pas du tout au Canada. La zone australe supérieure est la première qui nous intéresse directement dans l'est du Canada; elle ne fait que traverser la frontière sur le rivage du lac Erié et comprend la fameuse zone à fruits dite du Niagara. La présence fréquente ou régulière de nombreuses espèces méridionales à Pointe Pelée dans le comté d'Essex (Ontario) indique le développement le plus fort de cette zone dans le Dominion. Elle frise encore une fois notre frontière méridionale dans la Saskatchewan et peut-être quelques-unes des vallées les plus chaudes qui aboutissent dans la Colombie britannique méridionale. La zone australe la plus au nord, ou zone tempérée, forme la zone de transition qui comprend la majeure partie des régions les plus cultivées du Canada. Elle occupe les rivages de la baie de Fundy, le cours supérieur du St-Laurent, le Québec et l'Ontario méridionaux, les

sections inférieures des provinces des prairies et une bande du rivage maritime dans la Colombie britannique; elle indique la limite de la culture extensive.

La région boréale est divisée en zones: canadienne, hudsonienne, et arctique. La zone canadienne comprend le reste des terres forestières, au nord de la zone de transition; elle est surtout conifère et se continue à travers le continent jusque vers la limite nord des terres généralement cultivées. La zone hudsonienne se trouve dans la région plus au nord, celle des petits arbustes ou des arbres rabougris, contrée impropre à l'agriculture; et la zone arctique s'étend à travers les terres stériles jusqu'au pôle.

Ces zones de vie basées sur la température, et qui suivent approximativement les lignes de latitude, sont cependant détournées de leur direction vers l'est et vers l'ouest par des circonstances locales assez variables comme le voisinage des courants marins ou froids ou chauds, la présence de grandes étendues d'eau, l'altitude au-dessus de la mer, l'influence des vents froids ou chauds, des barrières de montagnes, et d'autres causes encore. En sorte qu'au lieu de zones égales, on les trouve irrégulières et elles ne suivent qu'à peu près les parallèles de latitude.

L'altitude est un facteur important dans la distribution de la vie qui dépend de la température. Sous les tropiques lorsqu'on fait l'ascension d'une haute montagne on peut rencontrer la température de chaque zone, depuis celle de la plaine environnante jusqu'à la zone arctique du sommet couvert de neige, et l'on rencontrera aussi les assemblages correspondants d'espèces habitant chacune de ces zones. La jonction des zones arctique et hudsonienne au détroit de Belle Isle, sous la même latitude que Lands End en Angleterre, est une illustration de l'énorme influence du courant arctique qui descend du détroit de Davis et contraste avec l'influence du courant chaud du Gulf-Stream qui s'en va mourir sur les rivages d'Angleterre.

Nous pouvons également observer des groupements plus petits à l'Est et à l'Ouest basés sur des conditions autres que la température et ce sont les variations d'humidité qui sont les facteurs décisifs en ce cas. C'est ainsi que la vie dans les forêts de l'Est diffère manifestement de celle des plaines plus arides des provinces de la prairie et toutes deux diffèrent de façon frappante de la vie sur les pentes humides du Pacifique.

Si l'on prend les formes de l'Est comme typiques, dans l'acception ordinaire du mot, les oiseaux de prairie que l'on peut comparer seront trouvés légèrement plus petits et beaucoup plus pâles de couleur, tandis que sur la côte humide du Pacifique ils sont plus gros et beaucoup plus foncés de couleur. Grâce à ces influences nous trouverons donc dans l'Ouest beaucoup de sous-espèces des oiseaux de l'Est. Des espèces relativement peu nombreuses habitent sans modifications tout le continent; plusieurs sont représentées à l'Est et à l'Ouest par deux sous-espèces, ou même davantage qui laissent voir plus ou moins de différenciation et, en d'autres cas, elles sont remplacées par des espèces étroitement apparentées, ou ne le sont pas du tout.

En observant ces divisions de la faune il faut cependant se rappeler que, pour ce qui regarde les oiseaux, ces associations doivent dépendre entièrement des sujets reproducteurs. Les oiseaux voyagent si loin et par tant de détours dans leurs migrations qu'ils peuvent traverser mainte région de faune spéciale au printemps et en automne bien qu'ils ne nichent que dans

une seule, ou certain

Bien
qui suivent
des lignes
appelées:
les formes
à une espèce
populeuse
à des espèces
Les espèces
se trouvent

Zone australe
Cardinal
Oriole des
Roitelet de
Pinson des
Gobe-mou
Diekcissel

Zone de transition
Goglu
Grive des l
Vireo à fr
Oriole de B
Pinson aux
Coucou
Pinson des
Rouge-gorg
Grive de la

La migr
et saisonnièr
Le fait que t
ment connu
autrefois un l
dans tous ses
tage à mesur
imaginations
l'hiver et l'o
viennent et s'
sens, par des
ment très dév
qu'on leur su

La cause
décroissante
nord où ils sor
Plusieurs espè
peut vivre lor
seau persiste
suffit qu'à une

une seule. De là vient que, en déterminant l'habitat auquel il faut rapporter une certaine région, il ne faut pas tenir compte de ces oiseaux passagers.

Bien que les aires de distribution indiquées sous les titres spécifiques qui suivent, soient plutôt vagues et imprécises, il y en a plusieurs qui suivent des lignes générales assez semblables. C'est ainsi que quelques-unes sont appelées: "La région des grands lacs inférieurs," ce sont probablement les formes australes supérieures. "L'Ontario et le Québec-Sud" se rapporte à une espèce d'une zone de transition, tandis que "Au delà de la colonisation populeuse ou à la limite des champs cultivés" se rapporterait naturellement à des espèces de la zone canadienne.

Les espèces suivantes sont données pour indiquer quels oiseaux doivent se trouver dans chaque zone:

<i>Zone australe supérieure</i>	<i>Zone canadienne</i>	<i>Zone arctique</i>
Cardinal	Mésange de la baie d'Hudson	Lagopède
Oriole des vergers	Sittelle du Canada	Harfang
Roitelet de la Caroline	Grive de Swainson	Plectrophane de neige
Pinson des sauterelles	Pic d'Amérique	Faucon
Gobe-mouche gris bleuâtre	Grive solitaire	Plectrophane
Dickcissel	Pinson à gorge blanche	
	Geai du Canada	
	Grive d'Alice	
<i>Zone de transition.</i>	Pinson niverolle	
Goglu		
Grive des bois		
Vireo à front jaune	<i>Zone hudsonienne</i>	
Oriole de Baltimore	Buse pattue	
Pinson aux yeux rouges	Pinson fauve	
Coucou	Pic-grièche boréale	
Pinson des champs	Moineau à couronne blanche	
Rouge-gorge bleu	Gros-bec des pins	
Grive de la Caroline	Farlouse d'Amérique	

MIGRATION.

La migration des oiseaux, leur apparition et leur disparition périodiques et saisonnières constituent un des phénomènes les plus visibles de la nature. Le fait que beaucoup d'oiseaux disparaissent en hiver est chose universellement connue et qui attira de tout temps l'attention. Bien qu'on vit là autrefois un fait mystérieux et qu'il ne soit pas encore parfaitement compris dans tous ses détails, on commence à s'en étonner moins et à l'admirer davantage à mesure que des connaissances exactes prennent la place des vagues imaginations de jadis. Aujourd'hui on sait où nos espèces du Nord passent l'hiver et l'on connaît la plupart des routes qu'elles suivent quand elles viennent et s'en vont. On sait qu'à tout prendre elles sont guidées par des sens, par des influences ordinaires et quotidiennes assez connues, probablement très développées et non par les puissances et les instincts mystérieux qu'on leur supposait autrefois.

La cause fondamentale de la migration est évidemment la croissante ou décroissante masse de leurs subsistances. Les oiseaux quittent les pays du nord où ils sont nés parce que c'est là le seul moyen de ne pas mourir de faim. Plusieurs espèces peuvent résister au froid les plus rigoureux, mais aucune ne peut vivre longtemps sans nourriture, et quoique certaine nourriture d'oiseau persiste pendant l'hiver au Canada, la quantité en est petite et ne suffit qu'à une population peu nombreuse, et cette provision même diminue

rapidement, ou, dans le Nord, est ensevelie sous la neige. La raison qui, en automne, les fait émigrer vers le Sud, est assez évidente, mais pour quelle raison un oiseau quitterait-il un climat doux et une nourriture abondante, au midi, pour affronter un voyage dangereux et se trouver finalement dans une contrée où l'hiver finit à peine et où il court le danger de mourir de faim. Bien des explications ingénieuses ont été avancées pour expliquer la chose; le désir de retrouver la contrée où il est né, en deux mots, le mal du pays; les souvenirs héréditaires d'une ancienne patrie, se transmettant à travers des âges géologiques; la recherche d'une nourriture spéciale pour couvrir; et l'insuffisance de places favorables à la nidification dans les contrées méridionales, voilà les raisons qui ont été alléguées comme pouvant expliquer le fait en question. Toutefois il n'est pas nécessaire d'avancer une explication compliquée ou embrouillée, alors qu'il y en a une simple et claire. Si nous nous rappelons que, dans la saison de la couvaison, la population des oiseaux est considérablement accrue par la naissance des petits; que si, en hiver, il y a place pour un nombre considérable d'oiseaux dans les localités méridionales l'accroissement de cette population, au printemps, dépasse les capacités alimentaires du pays; que, vers la même époque critique la région tempérée, au nord, est toute entière ouverte aux nouveaux arrivants avec une grande abondance de nourriture, le sujet cesse d'être mystérieux. En fait, ce n'est que par la migration qu'il est possible de tirer parti des moyens de sustentation que possèdent les régions tempérées à moins que les oiseaux ne jeûnent ou ne soient hibernants pendant les hivers, deux états à chacun desquels la nature des oiseaux répugne tout à fait.

Bien que la quantité disponible des vivres soit la cause fondamentale ou première de la migration, il nous faut chercher ailleurs encore pour expliquer à quelles sollicitations immédiates ses méthodes obéissent. Forcés qu'ils étaient à l'origine, par la faim, dans un sens et dans l'autre, ces déplacements annuels maintenant sont devenus instinctifs et ont lieu avant que la situation ne soit à l'état aigu, que les angoisses de la faim ne se soient fait sentir, ou que l'organisme ne soit affaibli par la privation de nourriture.

Le champ des migrations varie selon les espèces. Il y a un très petit nombre d'espèces qui, au sens propre de ce mot, n'émigrent pas du tout. Pour d'autres espèces les individus vivant plus au nord sont les seuls à quitter leurs cantonnements, ceux qui vivent au sud demeurent, en fait, stationnaires, bien que pour la majorité des espèces canadiennes, la communauté entière se transporte au sud. L'oiseau dont le champ de migration est le plus étendu c'est sans conteste la sterne arctique, oiseau qui niche depuis le golfe du St-Laurent jusqu'aux régions polaires et qui hiverne, au sud, jusqu'au continent antarctique.

Les méthodes de migration sont presque aussi variées que le champ parcouru. Certaines espèces avancent le long du jour d'un sommet d'arbre à un autre, de bosquet en bosquet, trouvant leur route dans la direction voulue. D'autres font de longs vols, les uns très haut, les autres plus bas, dans l'air. Certains oiseaux ne volent que pendant le jour; d'autres voyagent de nuit, et nous ne sommes instruits de leur passage que par des circonstances accidentelles, soit que leur voix affaiblie nous arrive de plus haut dans l'obscurité, soit qu'ils se montrent soudain à nous vers le matin. Ils voyagent en troupes d'une seule ou de plusieurs espèces mélangées, en groupes épars, ou comme individus isolés.

Un be
moins défi
retourner;
Il arrive au
quelques es
de vastes é
modes sur
Chez quelq
d'autres les

Quant
encore vagi
leur habitat
ment perdu
est sûr que
jeunes oisea
aînés lesque
vent servir
suivre en vo
cours d'eau,
sens qui not
sans se tron
ment toujours
qui les aide

Pour ce
accommodar
poisson, tout
les régions or
une vie inten
la températu
énorme de for
continus exig
l'oiseau, en t
Bien qu'il y
ques auteurs,
sans eux le pa
faut cependa
réduit d'une
contrées. La
d'insectes do
de la société, c
sément sur la
cessaire.

Toutefois
n'est pas aussi
examen superi
l'on se propos
travaillent à l

Un bon nombre d'espèces, sinon toutes, suivent des routes plus ou moins définies tant pour partir de leurs stations de couvaïson que pour y retourner; d'autres vont et reviennent par des routes tout à fait différentes. Il arrive aussi que des nappes d'eau relativement petites suffisent à détourner quelques espèces de leur route; d'autres, au contraire, traversent sans hésiter de vastes étendues de mer, sans se soucier des passages rapprochés et commodes sur terre ferme, que choisissent des espèces très proches parentes. Chez quelques espèces ce sont les oiseaux plus âgés qui vont en avant; chez d'autres les mâles peuvent précéder les femelles.

Quant à la manière dont les oiseaux trouvent leur route c'est un point encore vaguement compris et les individus qui se sont éloignés beaucoup de leur habitat et de leur route habituelle laissent voir qu'ils sont aussi parfaitement perdus que le serait tout autre animal sur un terrain à lui inconnu. Il est sûr que l'expérience joue ici un grand rôle et il est hors de doute que les jeunes oiseaux sont en grande partie guidés par les mouvements de leurs aînés lesquels, grâce à une expérience acquise, connaissent la route et peuvent servir de guides. On peut comprendre comment les oiseaux savent suivre en voyage de vastes points de repère tels que de grands systèmes de cours d'eau, des chaînes de montagnes, des rivages maritimes, mais aucun sens qui nous soit familier n'explique comment certaines espèces retournent sans se tromper à des îles océaniques par dessus d'immenses étendues de mer toujours de même apparence. Il se peut qu'elles aient un sens spécial qui les aide à s'orienter.

PROTECTION.

Pour ce qui regarde leur nourriture accoutumée les oiseaux sont très accommodants; les graines, les plantes, les fruits, les insectes, la viande ou le poisson, tout est bon à différentes espèces, et par conséquent, presque toutes les régions ont leur quote-part d'oiseaux qui leur sont propres. L'oiseau a une vie intense; son cœur bat rapidement plus que celui d'autres animaux; la température de son sang est plus élevée, et il consomme une quantité énorme de force vitale lorsqu'il vole. La chaleur un peu fiévreuse et les efforts continus exigent une quantité correspondante de nourriture, conséquemment l'oiseau, en tant que facteur économique, demande à être pris au sérieux. Bien qu'il y ait peut-être quelque exagération à dire, comme ont fait quelques auteurs, que l'équilibre entier de la nature dépend des oiseaux et que sans eux le pays serait un stérile désert peuplé par des insectes seulement, il faut cependant reconnaître que le nombre des oiseaux ne pourrait être réduit d'une quantité sérieuse sans les plus graves conséquences pour les contrées. La destruction de tonnes de semences d'ivraie et de millions d'insectes doit inévitablement avoir une grande influence sur le bien-être de la société, et la négligence à tenir compte de ce fait doit réagir très sérieusement sur la population qui n'accorde pas à ses oiseaux la protection nécessaire.

Toutefois le problème du "status" des espèces individuelles d'oiseaux n'est pas aussi simple qu'il semble au premier abord. Il y faut plus qu'un examen superficiel et bien des choses doivent être prises en considération si l'on se propose de connaître la vérité des choses. Quelquefois les oiseaux travaillent à l'unisson du bien de l'homme, et quelquefois à l'encontre de ce

bien. Ils peuvent faire du bien dans une saison et du mal dans une autre; ou bien encore leur influence indirecte peut nuire à la somme de leurs effets immédiats d'une façon surprenante.

Il faut donc distinguer soigneusement entre les impressions générales qu'on retire quant au bien ou au mal que fait un oiseau. Une observation simplement accidentelle dans la vie n'est jamais suffisante pour déterminer même sa provision de nourriture. La façon de faire actuellement en usage fonde ses conclusions presque entièrement sur l'examen du contenu de l'estomac d'oiseaux sauvages pris pendant l'année, ce qui constitue la seule preuve non sujette à caution. Pour ce travail la Commission biologique des États-Unis a examiné et décidé les cas de plusieurs milliers d'estomacs d'oiseaux; les résultats de ses recherches sont à la disposition de ceux qui tiennent à les consulter et à s'en servir.

En tant que l'un des facteurs de ce délicat équilibre des phénomènes naturels les oiseaux doivent être respectés.

Il y a certains oiseaux qui, à cause de leur taille, de leurs habitudes et de leur chair sont regardés comme gibier légitime. La chasse de ces oiseaux est un exercice fortifiant et propre à donner une bonne santé à celui qui s'y livre, le dressant à la vie des bois, aux courageuses aventures, à la vie en plein air et à tirer avec adresse. Le véritable sportsman a un code de morale à lui, fondé sur des principes économiques, autant qu'humanitaires. Il ne tire jamais sans donner à sa victime une chance égale et tire peu si le gibier n'est pas bon à manger. Il a aussi soin de ne pas épuiser la quantité de gibier d'où dépend son sport à venir. Des mesures restrictives ont toujours suivi plutôt que précédé les résultats qui les ont rendues nécessaires; les mesures prises aujourd'hui auraient dû l'être hier, d'où il est résulté que dans une grande partie de ce pays, le gibier est déjà chose du passé.

MOYENS D'ATTIRER LES OISEAUX.

Quiconque s'intéresse aux oiseaux trouve un très grand plaisir à les avoir autour de sa maison et de son jardin où il peut les observer à loisir. Un petit bout de jardin peut être rendu attrayant à plusieurs espèces par des méthodes appropriées. Les effets d'une protection complète sont bien démontrés dans quelques-uns des plus grands parcs où les plus timides oiseaux d'étang trouvant qu'il n'y a là rien à craindre de la part des hommes deviennent presque aussi confiants que la volaille de basse-cour. C'est ce qui arrive aussi aux plus petites espèces de jardin. En même temps que l'absence du trouble causé par les gens, il faut encore aux oiseaux d'être protégés contre le chat de la maison.

Il est aussi important de procurer aux oiseaux de la nourriture en hiver. Les bosquets qui portent du fruit, de la graisse pendue aux arbres, du grain, des noix cassées; de petits morceaux de viande séchée à l'abri de la neige, ne manquent jamais d'attirer les oiseaux en hiver.

En été, quand les provisions données par la nature sont abondantes, il est rarement nécessaire de procurer de la nourriture aux oiseaux, bien qu'une rangée de tournesols mûrs, ou les fleurs de jardin montées en graines compensent bien la peine qu'elles donnent à entretenir. Une mare peu profonde d'eau claire ne manque jamais d'être une source de plaisir pour les oiseaux ordinaires de nos jardins. Ils s'y baignent et s'y désaltèrent; par une journée de grande chaleur il n'est pas rare de voir plusieurs oiseaux qui attendent

leur tour p
de baignoir
bonne dista
les villes où
espèces d'oi
rables pour
qui font leu
nent d'elles
leur intenti
en faire au
quelques-un
apprend aus
des boîtes à
vention et c
fréquentent

La littér
en même ten
puisse autai
soit pour les
trouve toujo
naissance du
vante des ou
répondent sp

Birds guides, par
the hawks at
Company, G.
Ce sont d
sur 4½, très c
tions colorie
descriptions.

*Colour key and gu
Reed; 8 vo.,
Semblabl*

*A guide to the birds
\$1.50*

Ouvrage é
prend la plup
saison basées
noir montrant

The birds of Ontario
Une liste s
époque, avec
Malheureusem
libraires de liv

*The handbook of the
Co., prix, \$3.50*

C'est un m
est inestimabl
des description
migration, en
une excellente
gant s'est famil

*Key to the birds of N
& Co., prix, \$1;
C'est ici, p
des oiseaux de
une masse de r
ornithologistes*

leur tour pour jouir de cette bienfaisante fraîcheur. La plus simple forme de baignoire pour oiseaux est une poêle peu profonde, placée au large et à bonne distance d'un abri afin que l'oiseau soit protégé contre les chats. Dans les villes où l'on prend soin des arbres, où le bois mort est vite enlevé, certaines espèces d'oiseaux ont toujours bien de la peine à trouver des places favorables pour la nidification. Il y a au moins une demi-douzaine d'espèces qui font leurs nids très naturellement dans des branches creuses; qui reviennent d'elles-mêmes se mettre dans des boîtes de diverses sortes préparées à leur intention; beaucoup d'autres oiseaux peuvent, à l'occasion, se décider à en faire autant. Des boîtes propres à cet ouvrage sont décrites dans quelques-uns des livres indiqués à la page 17. Dans nombre d'écoles, où l'on apprend aux garçons certains travaux manuels, on les encourage à fabriquer des boîtes à oiseaux. On donne ainsi de l'essor à leur faculté naturelle d'invention et en même temps ils apprennent à s'intéresser aux oiseaux qui fréquentent leurs maisons.

OUVRAGES D'ORNITHOLOGIE.

La littérature de l'ornithologie dans l'Amérique du nord est considérable en même temps que variée; il se peut même qu'aucune science naturelle ne puisse autant que celle des oiseaux s'étudier avec l'aide d'ouvrages soit pour les commençants soit pour les naturalistes plus avancés. Il se trouve toujours quelque ouvrage qui s'adapte à tous les degrés de la connaissance du sujet, en même temps qu'à toutes les bourses. La liste suivante des ouvrages sur ce sujet peut se recommander; les premiers cités répondent spécialement aux besoins des commençants.

Birds guides, par Chester K. Reed: Partie I, «Water and game birds east of the Rockies (including the hawks and owls)»; Partie 2, «Land birds east of the Rockies». Doubleday, Page and Company, Garden City, N.Y., prix \$1, relié en toile, \$1.25 relié en cuir.

Ce sont de petites éditions, presque de poche de gilets, avec reliures flexibles, de 3½ pouces sur 4½, très commodes à porter dans la poche sur le terrain. Elles renferment des illustrations colorées petites et faciles à reconnaître, de tous les oiseaux des deux sexes, et de courtes descriptions.

Colour key and guide to the birds of eastern North America, par Frank M. Chapman et Chester K. Reed: 8 vo., Doubleday, N.Y., prix, \$2.50

Semblable, quant au plan, à l'ouvrage précédent, mais plus détaillé et plus instructif.

A guide to the birds of eastern New York, par Ralph Hoffman: 8 vo., Houghton, Mifflin & Co., prix \$1.50

Ouvrage éminemment désirable; quoique ne traitant pas d'une région très limitée il comprend la plupart des oiseaux de l'est du Canada. Il donne les clés pour les oiseaux de chaque saison basées sur la couleur; des descriptions détaillées, et aussi beaucoup d'illustrations en noir montrant des détails spécifiques; il donne de copieux renseignements de diverses sortes.

The birds of Ontario, par Thomas McIlwraith: 2e édition, 1894, 8 vo., Wm. Briggs, Toronto.

Une liste annotée de tous les oiseaux dont l'auteur savait l'existence dans l'Ontario, à cette époque, avec des descriptions et beaucoup de renseignements touchant leurs habitudes, etc. Malheureusement l'ouvrage est épuisé et on ne peut se le procurer que par l'entremise des libraires de livres d'occasion et qui ont la spécialité des ouvrages d'ornithologie.

The handbook of the birds of eastern North America, par Frank M. Chapman: in-12, D. Appleton & Co., prix, \$3.50.

C'est un manuel presque complet sur les oiseaux de l'Amérique du Nord orientale, et qui est inestimable pour les naturalistes avancés autant que pour les commençants. Il renferme des descriptions détaillées et exactes de tous les plumages, des mesurages et des dates de migration, en même temps qu'une somme considérable de détails intéressants et utiles avec une excellente introduction sur les oiseaux et l'étude des oiseaux. Aussitôt qu'un commençant s'est familiarisé avec les rudiments de l'ornithologie, il devrait se procurer ce manuel.

Key to the birds of North America, par Elliott Coues: 5e édition, 1903, vols. 2, large 8 v., Dana Estes & Co., prix, \$12.50.

C'est ici, peut-être, l'ouvrage dont l'autorité est le plus généralement acceptée sur le sujet des oiseaux de l'Amérique. Il s'adresse avant tout au naturaliste avancé, mais il renferme une masse de renseignements qui ne peuvent se trouver nulle part ailleurs, et c'est pour nos ornithologistes l'autorité qui décide en dernier ressort sur les questions discutées.

Le catalogue des Oiseaux du Canada, par John et James M. Macoun: 8 vo., publié par le Ministère des Mines, Commission géologique, Ottawa, 1909.

C'est une liste complète de toutes les espèces et sous-espèces d'oiseaux qu'on rencontre au Canada, au Groënland et à Terre-Neuve avec leurs habitants soit de couvainson soit de migration, aussi rigoureusement exposés que le permettait l'état de cette science à l'époque de la publication du livre. Cette liste est basée en grande partie sur les explorations et les expériences des auteurs, complétées par des connaissances tirées de toutes les sources à leur disposition; elle donne beaucoup de renseignements touchant les habitudes de couvainson, mais pas grand-chose de plus qui intéresse le public. Les éditions anglaise et française sont actuellement épuisées.

The birds of North and middle America, par Robt. Ridgway: Bulletin n° 50, 8 vols, United States National Museum.

C'est un ouvrage monumental qui devait comprendre huit volumes, mais qu'on a étendu à dix et même davantage, dont sept sont en vente, les autres devant suivre aussi rapidement que le travail pourra se faire. C'est le plus récent, le plus détaillé et le plus savant ouvrage sur le sujet, mais ne contient rien comme faits vivants ni récits populaires ayant quelque rapport avec le sujet principal. On ne le trouve pas communément en vente, mais on peut se le procurer de rencontre ou par l'entremise du Département des Documents publics à Washington.

A part ces ouvrages généraux ceux qui suivent et qui traitent de sujets spéciaux d'ornithologie, sont recommandés :

The Warblers of North America, par Frank M. Chapman: D. Appleton & Company, prix, \$3.

The Water-fowl family, par Sanford, Bishop et Van Dyke: The McMillan Co., prix, \$2.

North American Land birds par Baird, Brewer et Ridgway: Little, Brown & Co., 3 vols. Réimprimé de l'original. La partie traitant des oiseaux aquatiques de la série fut publiée à l'origine dans les Mémoires du Museum of Comparative Zoology, Harvard College, 1884, mais est actuellement épuisée et très difficile à se procurer.

Comme ouvrages de lecture, les suivants sont à recommander :

How to Study birds, par Herbert K. Job: Outing Publishing Co., prix, \$1.50.

The sport of bird study, par Herbert K. Job: Outing Publishing Co., prix, \$2.

Wild wings, par Herbert K. Job: Outing Publishing Co., prix, \$3.

Ce sont tous des ouvrages extrêmement intéressants et qui renferment une admirable collection de photographies d'oiseaux d'après nature.

Bird craft, par Mable Osgood Wright: MacMillan Co., prix \$2.50

Nombreuses illustrations hors texte.

Rambles of a Canadian naturalist, par S. T. Wood: Illustrés, J. M. Dent & Sons, Ltd., London et Toronto, 1916, prix, \$1.50. C'est une série de courtes esquisses et d'observations sur les choses de la nature autour de Toronto. Elles sont bien écrites et avec sympathie, la plupart, mais non toutes, se rapportant aux oiseaux.

The bird, its form and function, par C. William Beebe: Henry Hold & Co.

Cette liste pourrait être étendue énormément, mais il est probable que nous en avons assez donné.

Touchant les sujets d'ornithologie qui intéressent le commerce, l'attention du lecteur est attirée sur l'immense quantité de renseignements utiles publiés par le Biological Survey des États-Unis dans ses nombreux bulletins, circulaires et rapports. Bien que cette littérature n'ait eu d'abord en vue que les États-Unis, elle s'applique tout aussi bien aux oiseaux du Canada. La liste complète de ces documents, avec les prix, peut s'obtenir chez le Surintendant des Documents publics, à Washington. Les prix ne sont que nominaux.

Parmi les publications canadiennes de cette nature, nous pouvons citer l'ouvrage suivant:—

"The birds of Ontario in relation to Agriculture", par Chas. W. Mash: ministère de l'Agriculture, Ontario, Bulletin 173.

Parmi les travaux pouvant s'appliquer au Canada on n'en citera que quelques-uns, car leur nombre est légion, et ils sont disséminés à travers beaucoup d'ouvrages périodiques, de comptes rendus et de rapports.

Ontario:—

The birds of Ontario, par Thomas McIlwraith, 2e édition, 1894, 8 vols. Wm., Briggs, Toronto.

The birds of Toronto, par J. H. Fleming: Auk, vol. XXIII, pp. 437-453; vol. XXIV, pp. 71-89.

The natural history of the Toronto region. Oiseaux dessinés par J. H. Fleming, publié par Canadian Institute, Toronto, 1913, prix, \$2 ou \$2.50.

Québec:

Les oiseaux
The birds
Nouvelle-Eco
Birds of
Inst.
Nouveau-Bru
A catalog
veau-Brunswi

L'orni
propres pu
Nord c'est
Ornithologi
publie des
pris les list
venant de t
seaux racoi
depuis 191
Bureau de

Le "W
ornithologi
nement \$1 j
Treasurer I
cation qui s
choses intér
des articles

"Bird
grand publi
l'organe offi
populaire et
son dix-huit
ment \$1 pa
Harrisburg (

Le "Can
est une revu
Field Natur
Ministère d
Adresse: C.
Cette public
intéressants,

A propo
des habitati
peut recom

How to attract anc
C'est un
qui donne un
Wild bird guests, p
Cet ouvra
par l'auteur et
village modèl
des oiseaux do
L'ouvrage
thodes et les 1

Québec:

Les oiseaux de la province de Québec, par C. E. Dionne: Dussault et Proulx, 1906.

The birds of Montreal, par E. D. Wintle: Drysdale & Co., Montréal, 1908.

Nouvelle-Ecosse:

Birds of Nova Scotia, par A. Brown, publié par Harry Piers: Proc. and Trans. Nova Scotia Inst., Sc., vol. VII, pp. 142-178.

Nouveau-Brunswick:

A catalogue of the birds of New Brunswick, par M. A. Chamberlain: Bill. Nat. Hist. Soc., Nouveau-Brunswick, No. 1 pp. 23-68.

L'ornithologie, comme toutes les autres branches de la science, a ses propres publications périodiques. La plus importante dans l'Amérique du Nord c'est l'*Auk*, revue trimestrielle qui est l'organe officiel de l'Union des Ornithologistes américains. En sus d'articles purement scientifiques, elle publie des centaines de monographies qui intéressent les Canadiens, y compris les listes locales copieusement annotées avec des remarques historiques venant de toutes les parties du Dominion et des descriptions de mœurs d'oiseaux racontées de façon populaire. Abonnement, \$3 par an. L'éditeur, depuis 1912, est Witmer Stone, Academy of Science, Philadelphie (Pa.), Bureau de publication, 30 Boylston Street, Cambridge (Mass.).

Le "*Wilson Bulletin*," revue bi-mensuelle, est l'organe officiel du club ornithologique Wilson; il est dévoué aux intérêts de l'Ouest central. Abonnement \$1 par année, publié par Lynds Jones, Oberlin, Ohio. Adresse, The Treasurer P. B. Coffin, 3232 Groveland Ave., Chicago, Ill. C'est une publication qui a moins de prétentions que l'*Auk*, mais qui contient beaucoup de choses intéressantes pour le commun des lecteurs et qui publie quelques-uns des articles les plus intéressants sur les oiseaux et leurs mœurs.

"*Bird lore*" est une revue mensuelle qui s'adresse expressément au grand public et qui se distingue par son luxe et ses illustrations. C'est l'organe officiel des Sociétés nationales Audubon et il est dévoué à une étude populaire et à la protection des oiseaux. Cette revue en est aujourd'hui à son dix-huitième volume; elle est publiée par Frank Chapman. Abonnement \$1 par an. Adresse: Bird Lore, Crescent and Mulberry streets Harrisburg (Pa.).

Le "*Canadian Field Naturalist*," qui continue "The Ottawa Naturalist" est une revue mensuelle (neuf numéros par année) publiée par le "Ottawa Field Naturalists Club", Editeur, Arthur Gibson, Division entomologique, Ministère de l'Agriculture, Ottawa, Ontario. Abonnement \$1 par an. Adresse: C. L. Patch, Sec., Commission géologique, Ottawa, Ontario. Cette publication contient une grande quantité de sujets de zoologie, tous intéressants, beaucoup de remarques et d'articles sur les oiseaux du Canada.

A propos de la protection des oiseaux et de la manière de les attirer près des habitations, dans la masse considérable d'ouvrages sur la matière, on peut recommander spécialement les suivants:—

How to attract and protect wild birds, par Martin Hiesmann: Witherby & Co., London, 1s. 6d.

C'est un récit étendu des méthodes employées par le Baron Berlepsch, en Allemagne, et qui donne une infinité de méthodes à employer sur les grandes et les petites propriétés.

Wild bird quests, par Harold Baynes: E. P. Dutton & Co., 1915, \$2.

Cet ouvrage raconte de façon très intéressante et de manière agréable la méthode employée par l'auteur et ses amis grâce à laquelle ils firent de Meriden (New Hampshire) un véritable village modèle pour les oiseaux, lesquels devinrent là si familiers et gentils qu'on en faisait des oiseaux domestiques, venant quand on les appelait et se posant sans crainte sur les personnes.

L'ouvrage est magnifiquement illustré, avec beaucoup de photographies montrant les méthodes et les résultats.

The domestic cat, par Edward H. Forbush, Ornithologiste, de l'Etat de Mass.; State Board of Agriculture, Bulletin n° 2, 1916.

Ouvrage qui traite à fond du chat domestique dans ses rapports avec la vie des oiseaux à l'état sauvage.

Bird houses and how to build them, par Ned Dearborn: United States Department of Agriculture, Farmer's Bulletin n° 609. Address: Department of Public Documents, Washington, D.C. Prix, environ dix cents.

Sur le sujet du moineau anglais, en tant que fléau, on peut recommander les ouvrages suivants:—

The English Sparrow in North America, par Walter B. Barrows: Bull. N° 1, U.S. Dept. of Agriculture, 1889, pp. 405.

How to destroy the English Sparrow par Ned Dearborn: Farmer's Bulletin N° 383, U. S. Dept. of Agriculture, 1910.

The English Sparrow as a pest, par Ned Dearborn: Farmer's Bulletin N° 493, U. S. Dept. of Agriculture, 1921.

Ces rapports font le procès au moineau anglais, très équitablement, et le condamnent très franchement; ils indiquent divers moyens de limiter le nombre de ces oiseaux.

CLEF POUR LES OISEAUX DE L'EST DU CANADA.

Explication.

Dans les descriptions zoologiques une "clef" est un dessin à l'aide duquel un spécimen peut servir à décrire successivement des groupes grands ou petits en en relevant les caractères saillants et l'identité spécifique.

La "clef" que nous donnons ici est la modification de celle établie par MM. Frank Chapman et Ernest Thompson Seton et qui fut publiée dans le "Hand book to the birds of Eastern North America" du premier. On espère qu'il sera d'un grand secours pour les commençants. Un des avantages de cette clef c'est d'être indépendante des caractères variables d'âge, de sexe ou de saison, et qu'elle servira, pour les spécimens jeunes et femelles aussi bien que pour les mâles et adultes.

La méthode pour s'en servir est comme suit: étant donné qu'on a dans la main un oiseau d'une espèce inconnue, en déterminer la nature. On le compare d'abord avec le premier titre en petites majuscules, numéroté en chiffres romains—I, PIEDS TOTI-PALMÉS. Si cette description ne s'applique pas à l'oiseau, on passe au titre suivant en chiffres romains—II, PIEDS-SEMI-PALMÉS, ou III, PIEDS SANS MEMBRANE PRONONCÉE. Admettant que cette dernière particularité s'applique bien à l'oiseau en question nous passons aux titres du rang inférieur qui suit, lesquels sont donnés en lettres majuscules alphabétiques, et nous avons les alternatives F, jambes longues, et G, jambes courtes. Quelquefois il est difficile de décider si une jambe doit être tenue pour longue ou courte, et alors les différents détails donnés dans le dessin peuvent aider à décider la question. En ce cas les jambes, dirons-nous, ne sont pas extrêmement longues, pas plus longues, par rapport à la taille de l'oiseau, que ne sont les jambes d'un poulet ou d'un moineau; c'est pourquoi, avec la lettre G, nous nous référons à un nombre d'alternatives subordonnées distinguées par des lettres initiales minuscules—k, pieds de poulet, forts et serrés pour gratter; l, pattes à fortes griffes pour tenir la proie; m, pattes petites et faibles; n, pattes petites ou de taille moyenne, faites solidement et jambes couvertes d'écailles ou de plaques de corne.

Un coup d'oeil constatatif dernier titre numérotés: ortheils en a que notre s: sidérable de dessins au t bec n'est pa touffe aux c verte de tot corbeau, ni dans le grou prouve que 1 (p. 259) et l. quoi nous pr avec les rem de près tout avec celui d opinion s'en son centre; prés, ni les p baies. Nou: d'autre conn oiseau du Ca.

Un coup d'œil donné à diverses pattes figurées sous chaque titre facilitera la constatation du sujet. Si nous admettons qu'on se soit décidé en faveur du dernier titre, nous comparerons notre spécimen aux alternatives suivantes, numérotées avec des chiffres arabes—19, deux orteils en avant, 20, trois orteils en avant. Il ne peut pas y avoir de confusion ici et nous admettons que notre spécimen ayant trois orteils en avant appartient au groupe considérable des oiseaux perecheurs. Nous le comparons, par conséquent, avec les dessins au trait qui suivent pour voir avec lesquels il s'accorde le mieux. Le bec n'est pas large et plat; donc ce n'est pas un moucherolle; il n'y a pas de touffe aux oreilles, ni de long orteil postérieur, et la narine n'est pas recouverte de touffes de plumes, ce ne peut donc être ni l'alouette ordinaire, ni un corbeau, ni un geai. Le dessin suivant, le bec du goglu arrête nos regards et dans le groupe suivant le bec du moineau. Un coup d'œil sur ce qui reste prouve que notre oiseau doit être un goglu ou l'un des moineaux. La gravure (p. 259) et la description du goglu n'y ressemblent pas du tout; c'est pourquoi nous passons aux moineaux et lisons la description générale du moineau avec les remarques (p. 169) et considérons les gravures. Après avoir regardé de près toutes les illustrations nous trouvons que notre spécimen s'accorde avec celui du pinson chanteur, et en relisant les caractères distinctifs, notre opinion s'en trouve confirmée. La poitrine fortement rayée est ramassée à son centre; il n'a ni la raie jaune au-dessus de l'œil comme le pinson des prés, ni les plumes extérieures de la queue blanches, comme le pinson à ailes baies. Nous avons donc l'assurance que, sans avoir pour commencer, d'autre connaissance ornithologique que celle-ci, que le spécimen était un oiseau du Canada de l'Est, nous avons pu le situer dans sa propre espèce.




Figure 1.

Régions plumaires d'un oiseau type.

I. Pieds toti-palmés.—Deux ou trois palmures complètes à chaque pied.

A, Quatre doigts,
a, Tarse aplati.




Figure 2.

Plongeurs..... p. 44.




Figure 3.



Figure 4.



Figure 5.

b, l'aile fermée est plus longue que la queue sauf chez certains labbes (figure 3) et certaines sternes (figure 5), auxquels cette règle ne s'applique que si l'on ne tient pas compte des plumes rectrices centrales très allongées de ceux-là ou des rectrices externes de celles-ci. Becs tels que représentés.

Palmipèdes aux longues ailes—Mouettes, sternes, labbes p. 50.

c, Me
(3 membra

Palmipèdes

6

6

6

d, bec d

Palmipèdes au

e, Narine

Palmipèdes au

c, Membranes entre tous les doigts
(3 membranes)



Figure 6.

Palmipèdes toti-palmés—Fous de Bassan, Cormorans, etc. p. 60.




Figure 7.




Figure 8.



Figure 9.




Figure 10.

d, bec denté ou aplati (comme les canards)

Palmipèdes au bec en crible—Harles, canards, oies et cygnes. p. 63.

e, Narines tubulaires au sommet du bec.



Figure 11.

Palmipèdes au nez tabulaire—Pétrels, etc. p. 57.

B, Trois doigts (sans gros orteil) excepté la mouette trydactyle (p. 51).



Figure 12.

Pingouins, guillemots, etc. p. 46.

II. **Pieds semi-palmés**--Les palmures se réduisent à des festons, des dentelures ou de petites membranes à la base des doigts. Quatre doigts, sauf dans les cas mentionnés.

C, Tarse très aplati, palmures telles que représentées.



Figure 13.

Grèbes p. 42.

D, Le bec s'étend sur le front formant une plaque frontale.



Figure 14.

La foulque p. 92.

E, Petits oiseaux: bec long et effilé; trois ou quatre doigts.

f, Bec dépourvu d'élargissement terminal dur; quatre doigts, excepté le sanderling (p. 100).



Figure 15.

Oiseaux de rivage--Phalaropes, bécassine, maubèches, pluvier p. 92.

g, Bec pourvu d'un élargissement terminal dur; trois doigts, excepté le pluvier à ventre noir (p. ??).



Figure 16.

Pluvier p. 106.

F, Patte la joi

h, Bec ; aut

1, Gr

Hérons.....

2, F.

Grues.....

i, Becs lor flexibles uniform effilés.

3, Be b la d

Phalaropes, béc

III. Pieds sans palmure prononcée.

F, Pattes longues pour marcher dans l'eau ou dans la boue; doigts longs, effilés et flexibles aux jointures.




Figure 17.

h, Bec gros et corné; plage nue autour des yeux.



Figure 18.

1, Gros orteil pourvu d'une crête.



Figure 19.

Hérons p. 81 et 82.

2, Front nu.



Figure 20.

Grues p. 87.

i, Bees longs, flexibles et uniformément effilés.



Figure 21.



Figure 22.

3, Bec plutôt frêle, pas beaucoup plus épais à la base qu'au sommet. Quatre doigts, excepté le sanderling (p. 100).

Phalaropes, bécassines, maubèches p. 92.

4, Bec manifestement plus épais à la base qu'au sommet.



Figure 23.

Râles—(râle élégant et râle de la Virginie)..... p. 89.

j, Becs courts.

5, Bec mou à la base, aboutit à un élargissement terminal dur. Trois doigts, excepté le pluvier à ventre noir (p. 106).



Figure 24.

Pluvier..... p. 106.

6, Bec très fort.




Figure 25.

Râles (râle de la Caroline et râle jaune)..... p. 90.

7, Bec fort avec plaque frontale remontant sur le front.



Figure 26.

Gallinules..... p. 91.

8, Bec corné à la base, affecte la forme d'un coin vu de profil, et semble légèrement tourné en haut.



Figure 27.

Tourne-pierre..... p. 108.

G, Les pattes sont courtes pour mieux se percher, marcher, grimper et vivre dans les arbres ou sur le sol.

k, Les pieds, comme ceux des poulets sont forts et compacts; les doigts moins flexibles; ongles forts et obtus pour gratter. Tarse emplumé ou nu. Les doigts avec ou sans appendices en forme de crêtes.



Figure 28.

9,

Tétraz et cai

10,
le

Vautours....

1, L
po
on
aig
tai

Oiseaux de pro

11, L
Le
la l
Les
(fig)

Faucons et aigle

9, Bec plutôt conique, le plumage s'étend jusqu'à la narine ou à peu près.




Figure 29.

Tétras et caille..... p. 109.


10, Bec crochu au bout; le cou et la tête sont nus.



Figure 30.

Vautours..... p. 119.

1, Le pied est puissant pour retenir la proie; ongles longs, forts, aigus et recourbés; tarse emplumé ou nu.



Figures 31 et 32.

Oiseaux de proie..... p. 117.

11, La cire est nue à la base du bec, Le tarse est toujours nu (excepté la buse pattue et l'aigle doré). Les doigts sont toujours nus (figure 33).



Figure 33.

Faucons et aigles..... p. 120.

12, La cire est cachée sous le plumage; l'œil est au centre d'un disque de plumes plus ou moins circulaire. Le tarse et les doigts sont emplumés (Figure 32).



Figure 34.

Hiboux p. 134.

m, Pieds petits et délicats.
13, Les narines s'ouvrent au milieu d'une base molle et gonflée.



Figure 35.

Pigeons p. 115.

14, Les deux doigts externes sont reliés ensemble sur la moitié de leur longueur.



Figure 36.

Martin-pêcheurs p. 140.

15, Deux doigts orientés en avant, et deux en arrière (voir aussi les pics).



Figure 37.

Coucous p. 141.

16, Bec très petit; bouche énorme, s'ouvrant jusqu'au-dessous des yeux.




Figure 38.

Engoulevents, Engoulevent criard, Engoulevents d'Amérique p. 149.

Martinet de

18,

Oiseau-moucl

n, Pieds pas
ques
reco
19, l
deux
bout.

Pics.....

20, T
aus
l'oi
lon;
dial

Percheurs.....

Bec légèrement
haut à la b
ment croch

Moucherolles....

A remarquer l
oreilles et le
pouce. Le p
le pipit sont
tres espèces
dernier trait.

Alouette ordinaire

17, Rectrices terminées par des épines pointues.



Figure 39.

Martinet des cheminées..... p. 151.

18, Bec très frêle et en forme d'alène.
Oiseaux extrêmement petits.



Figure 40.

Oiseau-mouche..... p. 152.

n, Pieds de taille moyenne ou petits, mais pas perceptiblement faibles ni flasques ni lâchement articulés. Pattes recouvertes d'écaillés ou de plaques.

19, Deux doigts en avant et un ou deux en arrière. Bec en ciseau au bout.



Figure 41.

Pics..... p. 143.

20, Trois doigts en avant; gros orteil aussi bien développé que le médian; l'ongle du pouce ordinairement aussi long ou plus long que celui du médian.



Figure 42.

Percheurs..... p. 153.

Pour reconnaître les détails des percheurs.

Bec légèrement plus large que haut à la base et légèrement crochu au bout.



Figure 43.

Moucherolles..... p. 154.

A remarquer le toupet aux oreilles et le grand ongle au pouce. Le plectrophane et le pipit sont les seules autres espèces possédant ce dernier trait.



Figure 44.

Alouette ordinaire..... p. 159.

Nez fort, narines recouvertes de touffes velues.



Figure 45.

Bec très p

Hirondelles

orbeaux, Geais, etc. p 160.

Crête du bec se continuant ordinairement plus ou moins sur le front.



Figures 46 et 47.

Crête et ba

Jaseurs....

L'étourneau et le goglu (figure 46) ont des becs comme celui du moineau, voir cette espèce.



Figures 48 et 49.

Une dent pi
supérior

Étourneaux..... p 163.

Vireos et Pie



Figures 50, 51 et 52.

Petits oiseau
Les couleu
sont peut-ê
mais les b
couleurs ne

Bec conique, fort pour croquer les graines. (Les becs du goglu et de l'étourneau ordinaire sont à peu près semblables, voir descriptions).

Moineaux..... p 168.

Fauvettes.....

Dent faible ou prononcée sur le côté tranchant de la mandibule supérieure.



Figure 53.

Bec fin et poi
au pouce.

Tangaras..... p. 190.

Pipit.....

Bec très petit, large et aplati à la base.



Figure 54.

Hirondelles p. 191.

Crête et bande noire des yeux très en évidence.



Figure 55.

Jaseurs p. 194.

Une dent près du bout de la mandibule supérieure.



Figure 56.

Vireos et Pie-grièches pp. 196, 198.

Petits oiseaux aux couleurs vives.
Les couleurs les plus communes
sont peut-être vert olive et jaune;
mais les bleus, rouges et autres
couleurs ne sont pas rares.



Figures 57, 58, et 59.

Fauvettes p. 200.

Bec fin et pointu, grand ongle
au pouce.



Figure 60.

Pipit p. 216.



Figures 61 et 62.

Bees tels que représentés. Le merle est un oiseau de forte taille brun rougeâtre et blanc; la grive de la Caroline est même d'un gris ardoise.

Merle et grive de la Caroline p. 216.

Petits oiseaux aux teintes brun cendré.



Figure 63.

Troglodytes p. 217.

Petits oiseaux aux couleurs brun cendré.
Queue longue et raide, pennes pointues
aux extrémités.



Figure 64.

Grimpereaux p. 222.

Bec légèrement tourné en haut.



Figure 65.

Sittelles p. 222.

Tout petits oiseaux aux couleurs gris, blanc et noir.



Figure 66.

Mésanges p. 224.

Tout petit
la cou

Roitclets...

Oiseaux de
dinaire
plus ou
gorge e

Grives.....

Les titr
consacrés; e
Les espèces

Classe...AVES,
Sous-classe...IIA
Sous-classe...
Ordre...
Sous-ordre...
Famille...
Famille...
Famille...

Famille.....

Famille.....

Tout petits oiseaux couleur vert olive. Les mâles ont la couronne tachetée de couleurs vives.




Figure 67.

Roitclets..... p. 215.

Oiseaux de taille moyenne aux couleurs ordinairement brun tendre avec poitrine plus ou moins mouchetée, sauf le rouge-gorge et la bergeronnette.



Figure 68

Grives..... p. 227.

TABLE SYSTÉMATIQUE.

Les titres en petites capitales ont des en-têtes spéciaux qui leur sont consacrés; ceux en italiques sont incidemment mentionnés dans le texte. Les espèces marquées d'un astérisque sont représentées en couleurs.

	PAGES.
<i>Classe</i>AVES, <i>oiseaux</i>	41
<i>Sous-classe</i>RATITIAE, <i>oiseaux dépourvus de bréchet</i>	41
<i>Sous-classe</i>CARINATAE, <i>oiseaux pourvus d'un bréchet</i>	41
<i>Ordre</i>PYGOPODES, <i>plongeurs</i>	41
<i>Sous-ordre</i> <i>Colymbi, Grèbes</i>	42
<i>Famille</i>COLYMBIDAE, <i>Grèbes</i>	42
	<i>Grèbe de l'Ouest</i> 42
	GRÈBE À COU ROUGE..... 42
	GRÈBE CORNU..... 43
	*GRÈBE À BEC BIGARRÉ..... 43
<i>Famille</i>GAVIIDAE, <i>plongeurs</i>	44
	*LE PLONGEON À COLLIER..... 44
	LE PLONGEON À GORGE ROUSSE..... 45
<i>Famille</i>ALCIDAE, <i>Pingouins, Guillemots et Macareux</i>	45
	MACAREUX ARCTIQUE..... 45
	GUILLEMOT NOIR..... 46
	<i>Guillemot de l'Atlantique</i> 46
	<i>Guillemot de Mandt</i> 46
	GUILLEMOT ORDINAIRE..... 46
	<i>Grand guillemot de l'Atlantique</i> 46
	GUILLEMOT À GROS BEC..... 47
	<i>Guillemot de Brünnich</i> 47
	PINGOUIN COMMUN..... 47
	GRAND PINGOUIN..... 47
	MERGULE NAIN..... 48

	PAGES.
Ordre.....	48
Famille.....	48
.....	49
.....	49
.....	49
Famille.....	50
Sous-famille.....	50
.....	51
.....	50
.....	51
.....	51
.....	51
.....	52
.....	53
.....	54
.....	53
.....	53
Sous-famille.....	54
.....	54
.....	55
.....	55
.....	56
.....	56
.....	56
.....	57
Ordre.....	57
Famille.....	57
.....	58
.....	58
Genre.....	58
.....	58
.....	58
.....	59
.....	59
.....	59
.....	59
Ordre.....	60
Famille.....	60
.....	60
Famille.....	61
.....	61
.....	61
.....	62
Famille.....	62
.....	62
.....	62
Ordre.....	63
Famille.....	64
Sous-famille.....	64
.....	64
.....	65
.....	65
Sous-famille.....	65
.....	66
.....	66
.....	67
.....	67
.....	67
.....	67
.....	67
.....	68
.....	68
.....	68
Sous-famille.....	69
.....	69
.....	70
.....	70
.....	71
.....	71
.....	71
.....	71
.....	72

Sous-famille

Genres

Sous-famille

Sous-famille

Ordre

Sous-ordre

Famille

Sous-ordre

Famille

Sous-famille

Sous-famille

Ordre

Sous-ordre

Famille

Sous-ordre

Famille

Sous-famille

Sous-famille

Sous-famille

Ordre

Famille

GES.	Sous-famille	FAMILLES—Suite.	PAGES.
48		PETIT BUCÉPHALE	72
48		CANARD À LONGUE QUEUE	72
49		CANARD HISTRION	73
49	Genres	SOMATERIA et OIDEA, <i>Eiders et Macreuses</i>	73
49		CANARD EIDER	74
50		<i>Eider du Nord</i>	74
50		EIDER D'AMÉRIQUE	74
51		EIDER REMARQUABLE	75
51		MACREUSE D'AMÉRIQUE	75
51		MACREUSE VELOUTÉE	75
51		MACREUSE À LARGE BEC	76
51		CANARD ROUX	76
52	Sous-famille	ANSERINAE, <i>Oies</i>	76
53		OIE BLANCHE	77
54		<i>Petite oie blanche</i>	77
53		<i>Grande oie blanche</i>	77
53		OIE BLEUE	77
54		OIE À FRONT BLANC	77
54		<i>Oie à front blanc d'Amérique</i>	77
55		*BERNACHE DU CANADA	77
55		<i>Bernache de Hutchin</i>	78
56		BERNACHE	78
56		<i>Bernache d'Amérique</i>	78
56		<i>Bernache commune noire</i>	78
57	Sous-famille	CYGNINAE, <i>Cygnés</i>	78
57		CYGNE D'AMÉRIQUE	78
58		CYGNE TROMPETTE	80
58	Ordre	HERODIONES, <i>Echassiers d'eau profonde</i>	80
58	Sous-ordre	IBIDES, <i>Ibis</i>	81
58	Famille	IBIDIDAE, <i>Ibis</i>	81
58		IBIS LUISANT	81
59	Sous-ordre	HERODII, <i>Echassiers du type Héron</i>	81
59	Famille	ARDEIDAE, <i>Hérons et Butors</i>	81
59	Sous-famille	BOTAURINAE, <i>Butors</i>	82
59		*BUTOR D'AMÉRIQUE	82
60		PETIT BUTOR	83
60		<i>Petit butor de Cory</i>	83
60	Sous-famille	ARDEINAE, <i>Hérons vrais et Aigrettes</i>	83
61		*GRAND HÉRON BLEU	83
61		<i>Grand Héron bleu de l'Est</i>	84
61		HÉRONS BLANCS	84
62		AIGRETTE BLANCHE D'AMÉRIQUE	85
62		PETIT HÉRON BLEU	85
62		<i>Héron de la Louisiane</i>	86
62		HÉRON VERT	86
63		<i>Héron vert du Nord</i>	86
64		HÉRON DE NUIT	86
64		<i>Héron de nuit couronné d'or</i>	87
64	Ordre	PALUDICOLAE, <i>Oiseaux de marais</i>	87
64	Sous-ordre	GRUES, <i>Grues et Courlans</i>	87
65	Famille	GRUIDAE, <i>Grues</i>	87
65		GRUE DU MEXIQUE	87
66		<i>Grue du Canada</i>	88
66		<i>Grue d'Amérique</i>	88
66	Sous-ordre	HALLI, <i>Petits oiseaux de marais</i>	88
67	Famille	RALLIDAE, <i>Oiseaux du type râle</i>	88
67	Sous-famille	RALLUS, <i>Râles vrais</i>	88
67		RÂLE ÉLÉGAN	89
67		<i>Râle d'eau salée</i>	89
67		RÂLE DE VIRGINIE	89
68		<i>Râle de la Jamaïque</i>	89
68		*RÂLE DE LA CAROLINE	90
68		RÂLE JAUNE	90
68	Sous-famille	GALINULINAE, <i>Gallinales et poules d'eau</i>	91
68		GALLINULE DE LA MARTINIQUE	91
68		GALLINULE DE LA FLORIDE	91
68	Sous-famille	FULICINAE, <i>Foules</i>	92
68		<i>Foule d'Amérique</i>	92
68	Ordre	LMICOLAE, <i>Oiseaux de rivages</i>	92
68	Famille	PHALAROPIDAE, <i>Phalaropes</i>	93
68		PHALAROPE ROUX	94
68		PHALAROPE HYPERBORÉEN	94
68		PHALAROPE DE WILSON	94

	PAGES	
Famille.....	RECURVIROSTRIDAE, <i>Arcoctes et échasses</i>	94
	AVOCETTE D'AMÉRIQUE.....	94
Famille.....	SCOLOPACTIDAE, <i>Oiseaux du type bécassine</i>	95
	*BÉCASSE D'AMÉRIQUE.....	95
	*BÉCASSINE DE WILSON.....	96
	BÉCASSINE ROUSSE.....	96
	<i>Bécassine à long bec</i>	96
	MAUBÈCHE À LONGS PIEDS.....	97
	MAUBÈCHE À POITRINE ROUSSE.....	97
	MAUBÈCHE POURPRÉE.....	97
	<i>Maubèche pourprée de l'Est</i>	97
	MAUBÈCHE À POITRINE CENDRÉE.....	98
	MAUBÈCHE À CROUPION BLANC.....	98
	MAUBÈCHE DE BAIRD.....	98
	MAUBÈCHE DE WILSON.....	99
	CHEVALIER.....	99
	<i>Maubèche à dos roux</i>	99
	MAUBÈCHE COURLIS.....	99
	MAUBÈCHE SEMI-PALMÉE.....	100
	<i>Maubèche de l'Ouest</i>	100
	SANDERLING.....	100
	BARGE MARBRÉE.....	100
	BARGE DE LA BAIE D'HUDSON.....	101
	GRAND CHEVALIER À PIEDS JAUNES.....	101
	PEIT CHEVALIER À PIEDS JAUNES.....	102
	CHEVALIER SOLITAIRE.....	102
	<i>Chevalier solitaire de l'Est</i>	102
	CHEVALIER SEMI-PALMÉE.....	102
	<i>Chevalier de l'Est</i>	102
	<i>Chevalier de l'Ouest</i>	102
	MAUBÈCHE À LONGUE QUEUE.....	103
	MAUBÈCHE À POITRINE JAUNÂTRE.....	103
Genre.....	*MAUBÈCHE TACHETÉE.....	104
	NUMENTUS, <i>Courlis</i>	104
	COURLIS À LONG BEC.....	105
	COURLIS DE LA BAIE D'HUDSON.....	105
	COURLIS DU NORD.....	105
Famille.....	CHARADRIIDAE, <i>Pluvier</i>	106
	PLUVIER À VENTRE NOIR.....	106
	PLUVIER DORÉ D'AMÉRIQUE.....	506
	<i>Pluvier doré de l'Est</i>	107
	*PLUVIER KILDIR.....	107
	PLUVIER SEMI-PALMÉ.....	107
	<i>Pluvier rayé d'Europe</i>	108
	PLUVIER CRIARD.....	108
	<i>Pluvier blanc</i>	108
Famille.....	APHRIZIDAE, <i>Tourne-pierre</i>	108
	TOURNE-PIERRE.....	108
	<i>Tourne-pierre rouge</i>	108
Famille.....	HAEMATOPODIDAE, <i>Hutriers</i>	109
	HUTRIERS D'AMÉRIQUE.....	109
Ordre.....	GALLINAE, <i>Oiseaux gallinacés</i>	109
Sous-ordre.....	PHASIANI, <i>Poules vraies</i>	109
Famille.....	ODONTOPHORIDAE, <i>Caille d'Amérique</i>	110
	*CAILLE.....	110
	<i>Caille de la Virginie</i>	110
Famille.....	TETRAONIDAE, <i>Gelinottes, Tétràs</i>	111
	*TÉTRAS DU CANADA.....	112
	<i>Gelinotte noire d'Amérique</i>	112
	<i>Tétràs du Canada</i>	112
	*GÉLINOTE À FRAISE.....	112
	<i>Gelinotte du Canada</i>	112
Genre.....	LAGOPUS, <i>Lagopède</i>	113
	GÉLINOTE DES SAULES.....	113
	<i>Lagopède des saules</i>	113
	<i>Lagopède d'Allen</i>	114
	LAGOPÈDE DES ROCHERS.....	114
	<i>Lagopède arctique</i>	114
	<i>Lagopède de Welsh</i>	114
	POULE DES PRAIRIES.....	114
	<i>Poule des prairies du Nord</i>	114

PAGES		PAGES
94	Genre.....	LAGOPUS—Suite.
94		GELINOTTE A QUEUE AIGÜE.....
95		<i>Gelinotte à queue aigüe du Nord</i>
95		<i>Gelinotte des prairies à queue aigüe</i>
96	Famille.....	MELEAGRIDAE, <i>Dindons</i>
96		DINDON SAUVAGE.....
97		<i>Dindon sauvage du Nord</i>
97	Ordre.....	COLUMBAE, <i>Pigeons et colombes</i>
97	Famille.....	COLUMBIDAE, <i>Pigeons vrais et colombes</i>
98		*PIGEON VOYAGEUR.....
98		*TOURTERELLE.....
98		<i>Tourterelle de la Caroline</i>
98	Ordre.....	RAPTORES, <i>Oiseaux de proie</i>
99	Sous-ordre.....	SARCORAMPHI, <i>Vautours d'Amérique</i>
99	Famille.....	CATHARTIDAE, <i>Busards</i>
99		VAUTOUR AURA.....
99		<i>Busard du Nord</i>
100		VAUTOUR NOIR.....
100	Sous-ordre.....	FALCONES, <i>Oiseaux de proie diurnes</i>
100	Famille.....	BUTEONIADAE, <i>Busards et aigles</i>
100	Genres.....	ELANOIDES et CIRCUS, <i>Milans et busards</i>
101		MILAN À QUEUE D'ARONDE.....
101		*BUSARD DES MARAIS.....
102	Genres.....	ACCIPITER et ASTUR, <i>Accipitres, Eperviers aux courtes ailes</i>
102		*ÉPERVIER BRUN.....
102		ÉPERVIER DE COOPER.....
102		*AUTOUR À TÊTE NOIRE.....
102		<i>Autour de l'Est</i>
103	Genres.....	BUTEO et ARCHIBUTEO, <i>Buses vraies</i>
103		*BUSE À QUEUE ROUSSE.....
104		<i>Buse de l'Est à queue rousse</i>
104		*BUSE À MANTEAU ROUX.....
105		<i>Buse de l'Ouest à manteau roux</i>
105		BUSE DE SWAINSON.....
105		BUSE DE PENNSYLVANIE.....
106		BUSE PAITUE.....
106		<i>Buse pattue d'Amérique</i>
106	Genres.....	AQUILA et HALIAEETUS, <i>Aigles</i>
107		AIGLE DORÉ.....
107		AIGLE À TÊTE BLANCHE.....
107		<i>Aigle à tête blanche du Nord</i>
108	Famille.....	FALCONIDAE, <i>Faucons et Caracaras</i>
108	Sous-famille.....	FALCONINAE, <i>Faucons vrais</i>
108		FAUCONS.....
108		FAUCON BLANC.....
108		FAUCON.....
08		<i>Faucon gris</i>
09		<i>Faucon noir</i>
09		FAUCON PÉLERIN.....
09		<i>Faucon ordinaire</i>
09		FAUCON DES PIGEONS.....
10		<i>Faucon des pigeons de l'Est</i>
10		*FAUCON ÉPERVIER.....
10		<i>Faucon épervier à l'Est</i>
11	Famille.....	PANDIONIDAE, <i>Pygarques et Orfraies</i>
12		ORFRAIE D'AMÉRIQUE.....
2		<i>Bulbuzard d'Amérique</i>
2	Sous-ordre.....	STRIGES, <i>Oiseaux de proie nocturnes</i>
2	Famille.....	ALUCONIDAE, <i>Effraies communes</i>
2		EFFRAIE COMMUNE D'AMÉRIQUE.....
3	Famille.....	STRIGIDAE, <i>Hibou à aigrettes ou à cornes</i>
3		HIBOU À OREILLES LONGUES.....
3		HIBOU À OREILLES COURTES.....
4		*CHOUETTE DU CANADA.....
4		<i>Chouette du Canada de l'Est</i>
4		HIBOU CENDRÉ.....
4		<i>Chouette cendrée</i>
1		NYCTALE D'ACADIE DE L'ARCTIQUE.....
1		<i>Nyctale de Richardson</i>
1		NYCTALE D'ACADIE.....

Famille.....	STRIGIDAE—Suite	PAGES	
	*HIBOU MACULÉ.....	138	Famille.....
	<i>Hibou maculé de l'Est</i>	138	Sous-famille.....
	*DUC DE VIRGINIE.....	139	
	<i>Duc de Virginie de l'Est</i>	139	
	<i>Duc de Virginie de l'Ouest</i>	139	
	<i>Duc de l'Arctique</i>	139	
	<i>Duc du Labrador</i>	149	
	HARFANG.....	139	
	CHOUETTE ÉPÉRIÈRE.....	140	Sous-famille.....
	<i>Chouette épérière d'Amérique</i>	140	
Ordre.....	COCCYGES, <i>Coucoucs et Martins-pêcheurs</i>	140	
Sous-ordre.....	CUCULI, <i>Coucoucs</i>	140	
Famille.....	CUCULIDAE, <i>Coucoucs d'Amérique</i>	140	
Sous-famille.....	COCCYZINAE, <i>Coucoucs d'Amérique des bois</i>	141	Famille.....
	*COUCOU À BEC JAUNE.....	141	
	*COUCOU À BEC NOIR.....	142	
Sous-ordre.....	ALCYONES, <i>Martins-pêcheurs</i>	142	
Famille.....	ALCEDINIDAE, <i>Martins-pêcheurs</i>	142	
	MARTIN-PÊCHEUR.....	142	
Ordre.....	PICI, <i>pics</i>	143	
Famille.....	PICIDAE, <i>Pics</i>	143	
	PIC CHEVELU.....	144	
	<i>Pic chevelu de l'Est</i>	144	
	<i>Pic chevelu du Nord</i>	144	
	*PIC MINULE.....	144	
	<i>Pic minule du Nord</i>	145	
	*PIC ARCTIQUE.....	145	
	PIC D'AMÉRIQUE.....	145	Famille.....
	<i>Pic de l'Est</i>	145	
	*PIC MACULÉ.....	146	
	<i>Pic de l'Est</i>	146	
	*PIC À HUPPE ÉCARLATE.....	146	
	<i>Pic du Nord à huppe écarlate</i>	147	
	*PIC À TÊTE ROUGE.....	147	
	PIC DE LA CAROLINE.....	147	
	*PIC DORÉ.....	148	
	<i>Pic doré du Nord</i>	148	
Ordre.....	MACROCHIRES, <i>Engoulevants, Martinets et Oiseaux-mouches</i>	149	
Sous-ordre.....	CAPRIMULGI, <i>Engoulevants</i>	149	
Famille.....	CAPRIMULGIDAE, <i>Engoulevants</i>	149	Genre.....
	ENGOULEVANT DE LA CAROLINE.....	149	
	ENGOULEVANT CRIARD.....	149	
	<i>Engoulevant criard de l'Est</i>	150	
	*ENGOULEVANT D'AMÉRIQUE.....	150	
	<i>Engoulevant de l'Est</i>	150	
Sous-ordre.....	CYPSELI, <i>Martinets et congénères</i>	151	
Famille.....	MICROPODIDAE, <i>Martinets</i>	151	
Sous-famille.....	CHETURINAE, <i>Martinets à queue épineuse, Chatures</i>	151	
	*MARTINET DES CHEMINÉES.....	151	
Sous-ordre.....	TROCHILI, <i>Oiseaux-mouches</i>	152	
Famille.....	TROCHILIDAE, <i>Oiseaux-mouches</i>	153	
	*COLIBRIS À GORGE RUBIS.....	153	
Ordre.....	PASSERES, <i>Passereaux, Oiseaux-percheurs</i>	153	
Sous-ordre.....	CLAMATORES, <i>Oiseaux-criards</i>	154	
Famille.....	TYRANNIDAE, <i>Moucheroles</i>	154	
	MOUCHEROLLE À QUEUE EN CISEAUX.....	154	
	*MOUCHEROLLE DE LA CAROLINE.....	155	
	MOUCHEROLLE À HUPPE.....	155	
	*MOUCHEROLLE BRUN.....	156	
	MOUCHEROLLE AUX CÔTÉS OLIVES.....	156	
	MOUCHEROLLE VENDÂTRE.....	157	
	MOUCHEROLLE À VENTRE JAUNE.....	157	
	MOUCHEROLLE D'ACADIE.....	158	
	MOUCHEROLLE DE TRAILL.....	158	
	<i>Moucheroles des aulnes</i>	158	
	<i>Moucheroles des aulnes de l'Ouest</i>	158	
	PETIT MOUCHEROLLE.....	158	
Sous-ordre.....	OSCINES, <i>Oiseaux chanteurs</i>	159	
Famille.....	ALAUDIDAE, <i>Alouette</i>	159	
	*ALOUETTE ORDINAIRE.....	159	
	<i>Alouette de l'Est</i>	160	
	<i>Alouette des prairies</i>	150	
	<i>Alouette de Hoyt</i>	160	

PAGES

138	Famille.....	CORVIDAE, Geais et Corbeaux.....	160	PAGES
138			160	
139	Sous-famille.....	GARULINAE, Pies et Geais.....	160	
139		PIE.....	160	
139		<i>Pie d'Amérique</i>	160	
139		*GEAI HUPPÉ.....	161	
149		*GEAI DU CANADA.....	161	
139		<i>Geai du Canada de l'Est</i>	161	
140		<i>Geai du Labrador</i>	161	
140	Sous-famille.....	CORVINAE, Corneilles.....	162	
140		CORBEAU.....	162	
140		<i>Corbeau du Nord</i>	162	
140		*CORNEILLE D'AMÉRIQUE.....	163	
141		<i>Corneille de l'Est</i>	163	
141	Famille.....	ICTERIDAE, Etourneaux d'Amérique.....	164	
142		*GOGLU.....	164	
142		*ÉTOURNEAU ORDINAIRE.....	165	
142		ÉTOURNEAU À TÊTE JAUNE.....	166	
142		*ÉTOURNEAU À AILES ROUGES.....	166	
143		<i>Étourneau à ailes rouges de l'Est</i>	166	
143		<i>Étourneau à ailes rouges du Nord</i>	166	
144		*ÉTOURNEAU DES PRÉS.....	167	
144		ORIOLE DES VERGERS.....	167	
144		*ORIOLE DE BALTIMORE.....	167	
144		MAINATE COULEUR DE ROUILLE.....	168	
145		*MAINATE BRONZÉ.....	168	
145		<i>Mainate bronzé</i>	168	
145		<i>Mainate pourpré</i>	168	
145	Famille.....	FRINGILLIDAE, Moineaux, Linottes, Pinsons ou Bruants.....	169	
145		GROS-BEC À COURONNE NOIRE.....	170	
146		<i>Gros-bec à couronne noire de l'Est</i>	170	
146		*GROS-BEC DES PINS.....	170	
147		<i>Gros-bec des pins du Canada</i>	170	
147		*PINSON POURPRÉ.....	171	
147		<i>Pinson pourpré de l'Est</i>	171	
148		*MOINEAU DOMESTIQUE.....	172	
148		BEC CROISÉ.....	174	
149		<i>Bec croisé d'Amérique</i>	174	
149		BEC CROISÉ À AILES BLANCHES.....	174	
149	Genre.....	ACANTHIS, Sizerins.....	174	
149		SIZERIN DE HORNEMANN.....	175	
149		<i>Sizerin de Groënland</i>	175	
150		<i>Sizerin blanc</i>	175	
150		LINOTTE D'AMÉRIQUE.....	175	
150		<i>Sizerin ordinaire</i>	175	
151		<i>Sizerin de Holboll</i>	175	
151		<i>Grand sizerin</i>	175	
151		*CHARDONNERET JAUNE.....	176	
151		<i>Chardonneret de l'Est</i>	176	
152		CHARDONNERET DES PINS.....	177	
153		*PLECTROPHANE DES NEIGES.....	177	
153		<i>Plectrophane de neige commun</i>	177	
154		PLECTROPHANE DE LAPONIE.....	178	
154		<i>Pétrophane de l'Est</i>	178	
154		*PINSON À AILES BAIES.....	178	
155		<i>Pinson à ailes baies de l'Est</i>	178	
155		PINSON D'IPSWICH.....	178	
156		PINSON DES PRÉS.....	178	
156		<i>Pinson des prés de l'Est</i>	179	
157		PINSON DES SAUTERELLES.....	179	
157		<i>Pinson des sauterelles de l'Est</i>	179	
158		PINSON DE HENSLow.....	180	
158		<i>Pinson de Henslow de l'Est</i>	180	
58		PINSON DE LECONTE.....	180	
58		PINSON DE NELSON.....	180	
58		<i>Pinson des Prairies</i>	180	
58		<i>Pinson d'Acadie</i>	180	
59		PINSON ORDINAIRE.....	180	
59		<i>Pinson ordinaire de l'Est</i>	181	
59		PINSON DE HARRIS.....	181	
60		*MOINEAU À COURONNE BLANCHE.....	181	
50		<i>Moineau à couronne blanche de l'Est</i>	181	
90		*PINSON A GORGE BLANCHE.....	182	

Genre.....	ACANTHIS—Suite,	PAGES	Genre.....
	*PINSON DE MONTAGNE.....	182	
	<i>Pinson de montagne de l'Est</i>	183	
	*PETIT PINSON À COURONNE ROUSSE.....	183	
	<i>Petit pinson à couronne rousse de l'Est</i>	183	
	PINSON COULEUR D'ARGILE.....	183	
	PINSON DES CHAMPS.....	184	
	<i>Pinson des champs de l'Est</i>	184	
	PINSON NIVEROLLE.....	184	
	PINSON CHANTEUR.....	185	
	<i>Pinson chanteur de l'Est</i>	185	
	PINSON DE LINCOLN.....	185	
	<i>Pinson de Lincoln de l'Est</i>	186	
	PINSON DES MARAIS.....	186	
	PINSON FAUVE.....	186	
	<i>Pinson fauve de l'Est</i>	186	
	PINSON AUX YEUX ROUGES.....	187	
	<i>Pinson aux yeux rouges de l'Est</i>	187	
	GROS-BEC OU CARDINAL.....	187	
	<i>Gros-bec de l'Est</i>	188	
	*GROS-BEC À POITRINE ROSE.....	189	
	GROS-BEC BLEU.....	189	
	<i>Gros-bec bleu de l'Est</i>	189	
	PINSON INDIGO.....	189	
	DICKCISSEL.....	190	
Famille.....	TANGARIDAE, <i>Tangaras</i>	190	
	*TANGARA ÉCARLATE.....	190	
	TANGARA VERMILLON.....	191	
Famille.....	HIRUNIDINAE, <i>Hirondelles</i>	191	
	*HIRONDELLE POURPRÉE.....	192	
	<i>Martinet de l'Est</i>	192	
	HIRONDELLE À FRONT BLANC.....	192	
	<i>Hirondelle à front blanc de l'Est</i>	193	
	*HIRONDELLE DES GRANGES.....	193	
	*HIRONDELLE BICOLEURE.....	193	
	*HIRONDELLE DE RIVAGE.....	194	
	HIRONDELLE A AILES HÉRISSEES.....	194	
Famille.....	BOMBYCILLIDAE, <i>Jaseurs</i>	194	
	JASEUR DE BOHÈME.....	194	
	*JASEUR DU CÈDRE.....	195	
Famille.....	LANIIDAE, <i>Pies-grièches, Laniers</i>	196	
	PIE-GRIÈCHE BORÉALE.....	196	
	*PIE-GRIÈCHE À CROUPION BLANC.....	197	
	<i>Pie-grièche migratrice</i>	197	
Famille.....	VIREONIDAE, <i>Vireos</i>	198	
	*VIREO AUX YEUX ROUGES.....	198	
	VIREO DE PHILADELPHIE.....	198	
	*VIREO GRIS OLIVE.....	199	
	<i>Vireo gris olive de l'Est</i>	199	
	VIREO À FRONT JAUNE.....	199	
	VIREO SOLITAIRE.....	200	
	<i>Vireo à tête bleue</i>	200	
	VIREO AUX YEUX BLANCS.....	200	
	<i>Vireo aux yeux blancs d'Amérique</i>	200	
Famille.....	MNIOTILTIDAE, <i>Fauvettes</i>	201	
	*FAUVETTE NOIRE ET BLANCHE.....	201	
	FAUVETTE PROTONOTAIRE.....	202	
Genre.....	VERMIVORA, <i>Fauvettes vermivores</i>	202	
	FAUVETTE VERMIVORE.....	202	
	FAUVETTE AUX AILES BLEUES.....	203	
	FAUVETTE À AILES DORÉES.....	203	
	FAUVETTE DE NASHVILLE.....	203	
	<i>Fauvette de Nashville de l'Est</i>	203	
	FAUVETTE À COURONNE ORANGÉE.....	204	
	<i>Fauvette à couronne orangée de l'intérieur</i>	204	
	FAUVETTE DU TENNESSEE.....	204	
	FAUVETTE D'AMÉRIQUE.....	204	
	<i>Fauvette d'Amérique du Nord</i>	204	
Genre.....	DENDROICA, <i>Fauvettes des bois</i>	205	
	FAUVETTE DU CAP MAY.....	205	
	*FAUVETTE JAUNE.....	205	
	<i>Fauvette jaune de l'Est</i>	205	
			Famille.....
			Sous-famille.....

	DENDROICA—Suite.	PAGES.
182	Genre.....	*FAUVETTE BLEUE À GORGE NOIRE..... 206
183		<i>Fauvette bleue à gorge noire du Nord</i> 206
183		*FAUVETTE À CROUPION JAUNE..... 206
183		*FAUVETTE À TÊTE CENDRÉE..... 206
184		FAUVETTE AZUR..... 207
184		FAUVETTE DE PENNSYLVANIE..... 207
184		FAUVETTE À POITRINE BAIE..... 207
185		FAUVETTE RAYÉE..... 208
185		*FAUVETTE DE BLACKBURN..... 208
185		*FAUVETTE GRISE À GORGE NOIRE..... 209
186		FAUVETTE DE KIRILAND..... 209
186		FAUVETTES DES PINS..... 209
186		FAUVETTE DES PALMIERS..... 210
186		<i>Fauvette des palmiers de l'intérieur</i> 210
187		<i>Fauvette à couronne rousse</i> 210
187		FAUVETTE DES PRAIRIES..... 210
187	Genre.....	SEURUS, <i>Fauvettes hochequeues</i> 211
188		*GRIVE COURONNÉE..... 211
189		GRIVE DES RUISSEAUX..... 211
189		<i>Grive des ruisseaux de l'Est</i> 211
189		<i>Grive des ruisseaux de Grinnell</i> 211
189	Genres.....	GRIVE DE LA LOUISIANE..... 212
190		OPORORNIS et GEOTHLYPIS, <i>Fauvettes terrestres</i> 212
190		FAUVETTE DU KENTUCKY..... 212
190		FAUVETTE DU CONNECTICUT..... 213
191		FAUVETTE DE PHILADELPHIE..... 213
191		FAUVETTE TRICHAS DU MARYLAND..... 213
191		* <i>Fauvette trichas du Nord</i> 214
192		FAUVETTE BABILLARDE..... 214
192	Genre.....	WILSONIA, <i>Fauvettes muscivores</i> 214
192		FAUVETTE À CAPUCHON..... 214
193		FAUVETTE À CALOTTE NOIRE..... 215
193		<i>Fauvette de Wilson</i> 215
194		FAUVETTE À CALOTTE NOIRE..... 215
194		FAUVETTE DU CANADA..... 215
194	Famille.....	*FAUVETTE À QUEUL ROUSSE..... 216
194		MOTACILLIDAE, <i>Hochequeues ou Farlons</i> 216
195	Famille.....	FARLOUSE D'AMÉRIQUE..... 216
196		MIMIDAE, <i>Moqueurs et Merles</i> 217
196		GRIVE POLYGLOTTE..... 217
197		<i>Grive polyglotte de l'Est</i> 217
197		*GRIVE DE LA CAROLINE..... 217
197		*GRIVE ROUSSE..... 218
198	Famille.....	TROGLODYTAE, <i>Troglodytes</i> 219
198		ROITELET DE LA CAROLINE..... 219
198		<i>Roitelet de la Caroline du Nord</i> 219
199		ROITELET DE BEWICK..... 219
199		<i>Roitelet de Bewick de l'Est</i> 219
199		*TROGLODYTE AÉDON..... 220
199		<i>Troglodyte aédon de l'Est</i> 220
200		TROGLODYTE DES MARAIS À BEC COURT..... 221
200		TROGLODYTE DES MARAIS À LONG BEC..... 221
200		<i>Roitelet des marais de l'Est</i> 221
200	Famille.....	CERTHIDAE, <i>Grimpereaux</i> 221
201		GRIMPEREAU D'AMÉRIQUE..... 222
202		<i>Grimpereau d'Amérique de l'Est</i> 222
202	Famille.....	SITTIDAE, <i>Sittelles</i> 222
203		*SITTELLE DE LA CAROLINE..... 223
203		<i>Sittelle à poitrine blanche</i> 223
203		SITTELLE DU CANADA..... 223
203	Famille.....	PARIDAE, <i>Mésanges</i> 223
203		MÉSANGE HUPPÉE..... 224
204		*MÉSANGE À TÊTE NOIRE..... 224
204		<i>Mésange à tête noire de l'Est</i> 224
204		<i>Mésange de la Caroline</i> 224
204		MÉSANGE À TÊTE BRUNE..... 224
204		<i>Mésange de la baie d'Hudson</i> 224
205		<i>Mésange du Canada</i> 225
205	Famille.....	SYLVIIDAE, <i>Fauvettes et roitelets de l'ancien monde</i> 225
205	Sous-famille.....	REGULINIDAE, <i>Roitelets</i> 226
205		*ROITELET HUPPÉ..... 226
205		<i>Roitelet huppé de l'Est</i> 227

	PAGES.
Sous-famille.....REGULINIDAE—Suite	
*ROITELET À COURONNE RUBIS.....	227
Roitelet à couronne rubis de l'Est.....	227
Sous-famille.....FOLIOPTILINAE, Gobe-mouches.....	227
GOBE-MOUCHE GRIS BLEU.....	227
Gobe-mouche de l'Est.....	227
Famille.....*TURDIDAE, Grives et congénères.....	227
Sous-famille.....TURDINAE, Grives traies.....	228
*GRIVE DES BOIS.....	228
*GRIVE DE WILSON.....	228
Grive d'Amérique.....	228
Grive des saules.....	228
*GRIVE D'ALICE.....	229
Grive aux côtés de la tête grisâtres.....	229
Grive de Bicknell.....	229
*GRIVE DE SWAINSON.....	229
Grive au dos olivâtre.....	229
*GRIVE SOLITAIRE.....	230
Grive solitaire de l'Est.....	230
*MERLE D'AMÉRIQUE.....	230
Le Merle de l'Est.....	230
TRAQUET MOTTEUX.....	230
Traquet du Groënland.....	230
*ROUGE-GORGE BLEU.....	231
Rouge-gorge bleu de l'Est.....	231

Les oise
oiseaux avec
classe éteint
comme fossil
Quelques esq
bec corné, le
(figure, p?) n

SOUS-

Les oise:
Ratitæ, ou oi
Ratitæ, com
bréchet au st
Il ne s'en trou
question ici,
mince, sembl
laquelle s'att:
Les oises
ordres qui se
thologistes an

Description g
pour des intention
sur le corps et le
visible de la jam
complètement (fi
corps. Le bec e
profond, comme
spécialisation att

Traits distinct
queue peu marqu

Indications su
canard. Les plor
draient leur vol le

Nid. Dans le
rocheuses, ou enc

Comme
corps est oblig
alors avec dif
sur le sol et ne
terrain escarp
plongent avec
la taille du coi
battements d'
courbes sans é

ORNITHOLOGIE DESCRIPTIVE.

CLASSE—AVES, OISEAUX.

Les oiseaux, en tant que formant une classe, peuvent être divisés en oiseaux avec dents et oiseaux sans dents, bien que les premiers soient une classe éteinte et connue seulement par des restes fragmentaires conservés comme fossiles. Tous les oiseaux aujourd'hui sont dépourvus de dents. Quelques espèces, comme les harles, sont pourvues de dentelures, dans le bec corné, lesquelles ont une ressemblance superficielle avec les dents (figure, p?) mais à l'examen on reconnaît que ce ne sont pas de vraies dents.

SOUS-CLASSE—CARINATÆ. OISEAUX À BRÉCHET

Les oiseaux modernes sans dents sont divisés en deux sous-classes: les *Ratitæ*, ou oiseaux sans bréchet, et les *Carinatæ* ou oiseaux à bréchet. Les *Ratitæ*, comprennent les autruches et les émeus qui sont dépourvus de bréchet au sternum où s'attachent les muscles des ailes, et qui ne volent pas. Il ne s'en trouve pas dans l'Amérique du Nord; c'est pourquoi il n'en est pas question ici, le terme sternum à bréchet se rapporte à la protection élevée, mince, semblable à la quille d'un bateau qui part du milieu du sternum, et à laquelle s'attachent les muscles puissants de la poitrine et des ailes.

Les oiseaux à bréchet (sous-classe des *Carinatæ*) se divisent en plusieurs ordres qui sont traités suivant la succession adoptée par l'Union des Ornithologistes américains.

Ordre—Pygopodes. Oiseaux Plongeurs.

Description générale.—Les plongeurs, ainsi que le nom l'implique sont des oiseaux organisés pour des intentions qui les appellent sous l'eau. L'articulation de la hanche est située très en arrière sur le corps et le mécanisme de la jambe est plus propre à nager qu'à marcher. Le tarse, la partie visible de la jambe est très aplati (figure 2 p. 20) et les orteils sont ou partiellement (fig. 13 p. 22) ou complètement (fig. 2 et 6 p. 20, 21) palmés. Les ailes sont petites en comparaison de la taille du corps. Le bec est droit et généralement effilé, modérément long, mais quelquefois, aplati et profond, comme dans les cas des pingouins et des macareux; dans cette dernière espèce cette spécialisation atteint son plus haut développement dans l'ordre.

Traits distinctifs: Orteils, trois ou quatre, entièrement ou partiellement palmés; tarse aplati, queue peu marquée ou petite.

Indications sur le terrain. Ailes et queue petites; becs droits, étroits, différents du bec de canard. Les plongeurs ressemblent superficiellement aux canards, mais là où les canards prendraient leur vol les plongeurs plongent.

Nid. Dans le voisinage immédiat de l'eau, sur les rives couvertes de roseaux ou les arêtes rocheuses, ou encore dans les crevasses et les trous du sol.

Comme conséquence de la construction particulière de la jambe, le corps est obligé de se tenir très droit quand l'oiseau est sur terre, il marche alors avec difficulté. Bien plus, certaines espèces sont presque sans force sur le sol et ne peuvent s'élever dans l'air à moins d'être sur l'eau, ou sur un terrain escarpé, ou encore contre un vent contraire très fort. Ils nagent et plongent avec facilité, et, bien que les ailes soient petites en comparaison de la taille du corps, une fois qu'ils ont pris leur essor ils volent avec de rapides battements d'ailes, avec vitesse et vigueur, en ligne droite ou par de longues courbes sans évolution ni manoeuvres,

Valeur économique. Les oiseaux plongeurs se nourrissent presque exclusivement d'animaux aquatiques qu'ils prennent et poursuivent sous l'eau. Comme marchandises ces oiseaux ont peu d'importance. Les oiseaux qui représentent cet ordre au Canada se divisent en trois familles: les Grèbes, *Colymbidae*; les Plongeurs, *Gaviidae*; les Pingouins, Guillemots, etc., *Alcidae*.

FAMILLE—COLYMBIDAE. GRÈBES.

Description générale. Les grèbes et les plongeurs ont des pattes lobées et non tout à fait palmées, et sont sans queue très visible. Au lieu des membranes allant d'un orteil à l'autre, comme dans la plupart des oiseaux nageurs, les doigts sont pourvus d'un rebord dentelé de bouts plats semblables à des lobes, ou d'appendices attachées à l'orteil. Ces doigts constituent d'excellentes palettes pendant la nage, et en se repliant ils offrent un minimum de résistance à l'eau, au retour. Leur extraordinaire habileté à plonger a fait donner à ces oiseaux les sobriquets communs de «diable plongeur», «sorciers de l'eau» etc.

Traits distinctifs. Membranes des orteils dentelées, (figure 13 p. 22) queue courte, bec pointu, et l'éclat argenté très singulier des plumes des parties de dessous.

Indications sur le terrain. Bec pointu et queue peu visible. Pattes rejetées droites derrière en volant.

Nid. Dans les roseaux et les joncs qui bordent les mares ou les étangs, sur les tas de végétaux ou flottants ou stationnaires.

Habitation. Les grèbes sont répandus sur tout le Canada et plus au nord jusqu'à la zone arctique. À l'époque de la couvaison on les trouve plutôt sur l'eau douce que sur l'eau salée. Il y a trois espèces de cette famille qui se présentent régulièrement dans l'est du Canada, une quatrième espèce, le grèbe occidental, mentionné incidemment ici, a été signalé plusieurs fois par erreur, car on ne peut certifier qu'un seul cas où on l'ait vu.

Les grèbes sont les habitants par excellence des étangs d'eau douce et des lacs, bien qu'en certaines occasions ils fréquentent la mer en nombre. La couleur de ceux d'âge adulte se présente en larges taches; les plus jeunes font voir des raies bien tranchées, surtout autour de la tête, indiquant par là que la famille descend d'un ancêtre commun rayé. Les sternum du grèbe, si utilisés comme garnitures pour les modistes, proviennent d'oiseaux de cette famille. La grande quantité de ces oiseaux qu'on sacrifie pour cet usage, et la façon dont on les enlève de leurs endroits préférés de couvaison en réduisent naturellement le nombre.

Valeur économique. Comme ces oiseaux se nourrissent presque exclusivement de chair aquatique, ils n'ont presque aucune valeur marchande immédiate. On trouve souvent de grandes quantités de plumes dans l'estomac des grèbes, mais on n'a jamais donné de ce fait une explication satisfaisante. Rien ne prouve que ce soient les restes d'oiseaux saisis comme proie.

2. **Le Grèbe à cou rouge.** (HOLBELL'S GREBE. RED-NECKED GREBE.) *Colymbus holballi*. L. 19. C'est le plus grand de nos grèbes. Les grèbes devenus adultes en été ont un cou d'un rouge châtaigne fort riche.

Traits distinctifs. La taille suffit d'habitude à reconnaître le grèbe. Les oiseaux encore jeunes n'ont généralement qu'un semblant de cou brun rougeâtre.

Indications sur le terrain. Sur le terrain la taille servira aussi à distinguer ce grèbe-là de tous les autres; et la présence d'une plaque blanche sur l'aile, ainsi qu'un dos non tacheté, le distinguera du plongeur avec lequel on risquerait de le confondre.

Nid. Sur des composts de matières végétales, flottantes ou stationnaires, ou sur des flots marécageux près des rives de lacs d'eau douce.

Habitation. A travers le continent; couvaison à l'est, au nord de la Colombie actuelle. Dans les provinces de prairies et à l'ouest ils nichent au sud et au delà de la limite des États-Unis.

Cet oiseau, sauf dans l'Ouest, dans la saison de la couvaison, est plus communément vu sur de grandes étendues d'eau que sur de plus petites. Il est relativement rare dans l'Est du Canada.

3. **Le C**
cornu est à
ci-après, mai
rouge (tout
brunâtre et p
la tête jusqu'
constraste ave

Traits distin
avec le jeune g
brillant, son be

Indications :

Nid. Com

Habitat. À
actuelle, et au

Le grèb
et se rencon
rencontre fr

6. **Le Gi**
13-50. Plancl

Traits distin
diens à cause de
arqué; on le dis
moins brillante
blanche de l'aile

Indications si
sur l'aile, et plaç

Nid. Le lo
flottants.

Habitat. À
il est probable c
appartiendra à ce

Nous av
dans la saison
étang ou bou
claires et dég
connue et for
coup de feu,
plomb meurt
se chargeant
dre bien que
supériorité.
l'eau. En ex
dans les cavit
et s'enfoncer p
la surface, po
déliera les ye

Valeur éc
au sujet de la
bigarré, toutel
ajoutant plus
l'habitat de l'
bourbeuses et
mange le grèb
d'eau qui, par

3. **Le Grèbe cornu.** (HORNED GREBE). *Colymbus auritus*. L. 13-50. Le grèbe cornu est à peu près de la même taille que le grèbe à bec bigarré mentionné ci-après, mais avec un bec plus aiguë et plus effilé. L'adulte de l'été a un cou rouge (tout à fait comme celui à cou rouge), des touffes à l'oreille d'un jaune brunâtre et proéminentes, et un jabot en forte saillie sur les joues depuis le derrière de la tête jusqu'au cou. En automne et en hiver une tête d'un noir blanc brillant forme contraste avec la coloration plus mate du grèbe à bec bigarré.

Traits distinctifs. Le jeune sujet, oiseau ordinaire d'un noir grisâtre et blanc peut être confondu avec le jeune grèbe à bec bigarré, mais peut être distingué par son front et sa poitrine d'un blanc brillant, son bec effilé et la tache blanche sur l'aile.

Indications sur le terrain. Bec mince, aiguë, avant-cou blanc et plaque blanche sur l'aile.

Nid. Comme le précédent.

Habitat. À travers le continent, couvant par endroits en dedans des limites de la colonisation actuelle, et au nord, mais plus ordinairement à l'ouest qu'à l'est.

Le grèbe cornu qui est migrateur habite les plus larges étendues d'eau et se rencontre moins souvent dans les borbiers où le grèbe à bec bigarré se rencontre fréquemment.

6. **Le Grèbe à bec bigarré.** (PIED-BILLED GREBE). *Podilymbus podiceps*. L. 13-50. Planche IA.

Traits distinctifs. Le grèbe à bec bigarré peut être mis à part de tous les autres grèbes canadiens à cause de son bec relativement plus lourd et gros avec sa tache et son culmen plus fortement arqué; on le distingue aussi, du jeune grèbe cornu, de tout plumage, à cause de la couleur foncée, moins brillante de son avant-cou, de sa poitrine et de ses dessous, et aussi de l'absence de la plaque blanche de l'aile.

Indications sur le terrain. Taille et forme du bec, moucheture sur le bec, pas de plaque blanche sur l'aile, et plaque noire sur le cou au printemps.

Nid. Le long des bords marécageux d'étangs et de lacs sur des supports ou stationnaires ou flottants.

Habitat. À travers le continent, la couvaison se faisant depuis nos frontières sud vers le nord; il est probable qu'un grèbe trouvé couvant au sud d'une ligne tirée d'Ottawa à Sault-Ste-Marie appartiendra à cette espèce.

Nous avons ici le grèbe commun de l'est du Canada où on le trouve dans la saison de la couvaison, ou pendant la migration, sur presque chaque étang ou borbier. Il fréquente moins que les espèces parentes les eaux claires et dégagées. La virtuosité des grèbes comme plongeurs est bien connue et fort développée dans la présente espèce. Plongeant à l'éclair du coup de feu, le grèbe est souvent en sûreté sous l'eau au moment où le plomb meurtrier touche l'endroit qu'il venait d'occuper. Même les fusils se chargeant par la culasse n'ont pas toujours assez de rapidité pour l'atteindre bien que la poudre sans fumée ait enlevé au grèbe presque toute sa supériorité. Les grèbes ont la faculté de nager ou très bas ou très haut dans l'eau. En expulsant l'air du plumage épais et doux et en le comprimant dans les cavités de son corps le grèbe peut augmenter son poids spécifique, et s'enfoncer peu à peu dans l'eau jusqu'à ce que le bec seul soit au-dessus de la surface, position dans laquelle il se cachera, et, sauf quelque accident, défilera les yeux les plus perçants.

Valeur économique. Nous n'avons que peu de renseignements précis au sujet de la composition exacte des aliments des grèbes. Le grèbe à bec bigarré, toutefois, se nourrit de petits poissons et d'insectes aquatiques, en y ajoutant plus ou moins de matières végétales. Le poisson, eu égard à l'habitat de l'oiseau, appartient principalement à l'espèce qui hante les eaux bourbeuses et sans importance économique. Quant aux insectes que mange le grèbe, ce sont surtout les espèces de proie telles que les escargots d'eau qui, parfois, causent quelque dommage au frai de poisson. La matière

végétale est sans importance. En somme, nous pouvons considérer le grêbe à bec bigarré comme tout à fait inoffensif sauf dans les cas rares où il fait une visite passagère aux mares et aux étangs où s'élèvent des truites ou d'autres poissons de prix.

FAMILLE—GRAVIDÆ. PLONGEONS.

Description générale. Les plongeurs sont de grands plongeurs avec un bec droit, très pointu et avec des pattes très palmées, (figure 2, p. 20). À l'état adulte ils ont des couleurs dont les dessins forment des contrastes frappants, généralement noirs et blancs.

Traits distinctifs. Plus grands que des canards et le cou plus court que celui des oies. Ces traits-là et le bec si effilé et pointu sont distinctifs. La queue plus en évidence que chez les grêbes.

Indications sur le terrain. Taille, longueur du cou et bec. Pendant le vol les pattes sont entraînées derrière la queue.

Nid. Sur les rivages bas, dans le voisinage immédiat de l'eau où ils peuvent plonger directement dans l'eau depuis leur nid.

Les plongeurs sont peut-être des plongeurs supérieurs encore aux grêbes mais ils s'enlèvent moins facilement sur l'eau et, sauf par une bonne brise, qu'ils peuvent affronter; ils doivent battre longtemps l'eau de leurs ailes avant de s'envoler.

Valeur économique. Leur nourriture se compose presque entièrement de poisson, mais, vu le petit nombre de plongeurs dans une localité donnée, leur importance économique est insignifiante.

7. **Le Plongeur à collier.** LE HUARD. (COMMON LOON). *Gavia immer.* L., 32. Planche IB.

Traits distinctifs.—Le plongeur à l'état adulte est facile à distinguer des autres plongeurs par sa coloration bien marquée, mais les jeunes sont un peu plus difficiles à différencier. La taille et l'absence de tache sur le dos le distingueront du plongeur à cou rouge avec lequel on le confond très facilement.

Indications sur le terrain. Taille et dos non taché des jeunes, comme ci-dessus. La plupart des plongeurs qu'on voit dans nos lacs intérieurs appartiennent à cette espèce.

Nid. Tout près de l'eau sur les rives marécageuses ou rocheuses de lacs intérieurs, là où, à la moindre alarme, les plongeurs peuvent filer droit sous l'eau. Le nid, plutôt massif, est bâti avec des matières végétales en décomposition.

Habitat. À travers tout le Canada, couvant partout où les conditions s'y prêtent, y séjournant souvent pendant l'hiver jusqu'au moment où la glace ferme les eaux.

La plupart de ceux qui fréquentent nos rivières et nos lacs connaissent bien le rire strident du plongeur. Le plongeur a un autre cri qui commence bas, s'élève haut et tombe subitement. L'oiseau est souvent bruyant la nuit ou au moment d'un orage, et les oiseaux s'appellent souvent et se répondent d'une rive à l'autre.

À cause de l'envahissement continu de la colonisation et du dérangement qui s'en suit pour les nids, le plongeur est devenu plus rare en ces dernières années et, dans plus d'une de ses anciennes retraites, on ne le voit plus guère aujourd'hui que dans le temps de la migration. Il reste, toutefois, un grand nombre de lacs solitaires dans le nord inhabité où les plongeurs peuvent vivre et nicher sans être dérangés et il n'est pas à prévoir que cette espèce si pittoresque disparaisse prochainement. Des mesures protectrices encouragées par une opinion publique plus éveillée viendraient sans doute regarnir nos lacs et nos étangs de ces hôtes d'été et augmenter le nombre des hôtes de simple passage.

Valeur économique. Bien que le plongeur soit un gros oiseau, la largeur de son gosier n'admet que des poissons de relativement petite taille. Ce fait mis en rapport avec le petit nombre d'oiseaux des lacs peu étén-

du et la m
que peuv
que. L'esp

11. Le 1
25. C'est un
de la colorati
été ont au co

Traits disti
et la coloration,
qui se distingue

Indications s
Nid. Habi

Habitat. R
dans l'est depuis

Valeur é
importante p

FAMIL

Description
se rencontrent qu
sur l'eau elle se t
ou le plongeur.
du bec droit, effi

Traits distinc
l'absence de pou

Indications su
leur bec pointu, c

Nid. Couve
sur des falaises bi
œufs sont extraoi
fait qu'ils roulent
nus et rocheux qu

Habitat. Le
Ils ne sont qu'occ
migrations anorm

Cette fa
nicher. Ces
d'habitude de
Labrador leur

Valeur éc
poissons et les
ces oiseaux ne

13. Le Ma
13. Le macareu
et avec une face
aplatis, presque ai

Traits distinctif
Indications sur
cevoir.

Nid. Couve d
déserts. Le long d
grand nombre de
font les pêcheurs o
trices en leur faveu

lus et la masse immense de poissons des très grands lacs, rend les ravages que peuvent commettre les plongeurs sans importance économique quelconque. L'espèce ne devrait donc pas être condamnée à sa destruction.

11. **Le Plongeur à gorge rousse.** (RED THROATED LOON). *Gavia stellata*. L., 25. C'est un plongeur plus petit que le huard, et qui ne présente pas le contraste intense de la coloration noire et blanche du dos. Sa tête et son cou sont gris, et les adultes en été ont au cou une plaque d'un rouge sombre.

Traits distinctifs. Les sujets adultes peuvent se distinguer du plongeur commun par la taille et la coloration, comme ci-dessus. Les jeunes peuvent se reconnaître à leurs dos finement tachetés qui se distinguent des lignes légèrement grises du plongeur à collier.

Indications sur le terrain. Taille et coloration du dos.

Nid. Habitudes de couvain semblables à celles de l'espèce précédente.

Habitat. Répandu sur tout le Canada; rare dans l'intérieur, plus commun sur les côtes. Niche dans l'est depuis le nord de l'Ontario, le Québec central et le Nouveau-Brunswick vers le nord.

Valeur économique. La même que pour le plongeur à collier mais moins importante parce qu'il est moins répandu.

FAMILLE—ALCIDAE. PINGOUINS, GUILLEMOTS ET MACAREUX.

Description générale. Cette famille se compose d'espèces exclusivement maritimes, qui ne se rencontrent que rarement ou par occasion sur les eaux douces. Bien qu'elle soit dans son élément sur l'eau elle se tient droit sur terre ferme et marche avec beaucoup plus d'aisance que le grèbe ou le plongeur. Le bec est sujet à plus de variations que celui des familles précitées, puisqu'il va du bec droit, effilé des guillemots jusqu'au bec très comprimé des macareux.

Traits distinctifs. La forme caractéristique du plongeur combiné avec les pattes palmées et l'absence de pouce (figure 12 p. 22).

Indications sur le terrain. Ressemblance générale avec les canards, mais leur cou court et leur bec pointu, quelquefois profond et étroit, sont caractéristiques.

Nid. Couvent en nombreuses compagnies, souvent d'espèces mixtes, sur des flots rocheux ou sur des falaises battues par la mer. Ne font pas de nid mais déposent leurs œufs sur le sol. Leurs œufs sont extraordinairement gros, vu la taille de l'oiseau, et tout à fait en forme de poire, ce qui fait qu'ils roulent en cercles plutôt qu'en droite ligne et ainsi risquent moins de tomber des rebords nus et rocheux qui leur servent de nids.

Habitat. Le long de nos rivages maritimes, des limites méridionales jusqu'au pôle arctique. Ils ne sont qu'occasionnellement sur les eaux douces, bien qu'une espèce ait fait quelque fois des migrations anormales et soudaines vers les grands lacs inférieurs.

Cette famille fréquente la pleine mer, ne venant au rivage que pour nicher. Ces oiseaux diffèrent des autres plongeurs en ce qu'ils se servent d'habitude de leurs ailes sous l'eau tout comme pour voler. Sur la côte du Labrador leurs œufs servent beaucoup aux pêcheurs comme nourriture.

Valeur économique. Ne mangeant pas autre chose que les plus petits poissons et les crustacés pris en mer, où les quantités en sont considérables, ces oiseaux ne peuvent faire aucun dommage.

13. **Le Macareux arctique.** LE PERROQUET. (PUFFIN.) *Fratercula arctica*. L., 13. Le macareux est un petit plongeur assez grotesque, noir en-dessus, blanc en-dessous et avec une face grise. Il est remarquable par son bec qui est ridiculement profond et aplati, presque aussi haut que long et fort en couleurs de rouge et de jaune.

Traits distinctifs. Le bec est toujours caractéristique.

Indications sur le terrain. Le bec peut être distingué d'aussi loin que l'oiseau vivant peut s'apercevoir.

Nid. Couve dans les crevasses et les fentes des falaises rocheuses, ou se terre dans le sol d'flots déserts. Le long de la côte du Labrador il y a plusieurs îles dites «Aux Perroquets» à cause du grand nombre de ces oiseaux qui couvent dans ces parages. Malheureusement les dégâts qu'y font les pêcheurs ont lamentablement réduit le nombre de ces oiseaux, et à moins de mesures protectrices en leur faveur ils disparaîtront bientôt.

Habitat. Les macareux sont répandus le long des rivages maritimes des deux côtés de l'Atlantique depuis le Canada et l'Angleterre jusqu'à la zone arctique.

La vue seule de cet oiseau suffit à reconnaître la justesse du surnom de perroquet qu'on lui donne. À l'inverse d'autres plongeurs il se tient debout sur ses doigts et montre une grande agilité à courir.

27. **Le Guillemot noir.** (BLACK GUILLEMOT). *Cephus grylle*. L. 13. En été le guillemot noir est un petit plongeur, noir comme du charbon, avec de longues plaques blanches aux ailes et des pieds rouges. En hiver, les parties de dessous sont blanches et les plumes de dessus sont noires mais avec des taches blanches. Les ailes ne changent pas en été.

Traits distinctifs. En été l'espèce ne peut pas se confondre avec une autre. En hiver, la taille et la coloration des ailes sont presque tout aussi caractéristiques.

Indications sur le terrain. Les traits susdits sont des indications sur le terrain, facilement reconnaissables.

Nids. Dans les cavités de rochers ou dans quelques ouvertures de talus raboteux au pied des falaises.

Habitat. Le guillemot de l'Atlantique est commun le long de notre côté de l'Atlantique, mais n'est vu que rarement ou même jamais dans l'intérieur des terres.

SOUS-ESPÈCES. Il y a deux sous-espèces du guillemot noir au Canada. Le guillemot de l'Atlantique qui est l'oiseau type, et le guillemot Mandt *Cephus grylle mandti*, race du nord habitant les régions polaires et qui se distingue par les couvertures entièrement blanches de l'aile, jusqu'à la base, au lieu d'y avoir une barre noire dissimulée. L'Union américaine des Ornithologistes donne dans son catalogue cet oiseau comme formant une espèce propre, mais il conviendrait de n'y voir qu'une sous-espèce.

Le guillemot noir est un des habitants les plus communs de notre rivage maritime où il est reconnu de tous ceux qui le fréquentent. Il vit moins en troupes que les autres membres de la famille et niche d'habitude tout seul et non en colonies, quoique parfois ces oiseaux se réunissent dans certaines localités, attirés par une communauté d'intérêts.

30. **Le Guillemot ordinaire.** MORMETTE. (COMMON MURRE). *Uria troile*. L. 16. Ce guillemot est blanc en-dessous pendant l'été, avec la tête et le cou foncés, couleur fumée, brun de phoque. Le dos et les ailes sont noirs. En hiver la gorge est de couleur claire voilée de plus ou moins de gris, et le brun est remplacé, sur la tête et le cou par du noir estompé de gris surtout sur la gorge.

Traits distinctifs. Le guillemot ordinaire ressemble beaucoup au guillemot de Brännich et au pingouin commun. Il peut être différencié, en été, d'avec le premier par la coloration brun pâle de la tête et du cou, et par le fait que le derrière du cou n'est pas plus foncé que le devant. En toute saison il a un bec un peu plus court et manifestement plus faible. On peut le distinguer du pingouin par le bec qui n'est pas sensiblement aplati ni profond.

Indications sur le terrain. Taille du bec et coloration du cou, telles sont les seules indications sur le terrain qu'on puisse donner pour distinguer les deux guillemots, et à l'état vivant, ces indications ne peuvent être remarquées que grâce aux plus favorables circonstances. Ces oiseaux nagent, dit-on, avec la queue non droite comme fait le pingouin commun mais au niveau de l'eau. La différence entre le bec de ce pingouin et celui du guillemot est très facile à constater en temps ordinaire.

Nid. Ils couvent en nombreuses colonies dans les roches, ne font pas de nids et ne pondent qu'un œuf.

Habitat. Abondent le long de la côte maritime de l'est, ne sont jamais, ou très rarement, trouvés dans l'intérieur des terres sur l'eau douce.

SOUS-ESPÈCES. Le guillemot ordinaire habite les parages du nord des deux océans, le Pacifique et l'Atlantique, étant représenté dans chacun d'eux par différentes sous-espèces. Le guillemot de l'Atlantique offre le spécimen type et c'est naturellement celui qu'on rencontre sur nos rivages de l'est.

Le nombre de guillemots qui occupent une falaise à nids est quelquefois extraordinaire. Sur le bord des crêtes rocheuses ils se pressent les uns contre les autres comme des lignes de soldats, et ressemblent à ces files de pingouins dont les images nous sont familières.

31. **Le G**
16-50. Ce G

Traits distinctifs
du guillemot or
et sensiblement

Indications
la vue en est ex
tranchant et ell
servira à le disti

Nid. Com

Habitat. U

SOUS-ESP

tique mais com
la guillemot de

Le guill
trouve sur le
les lacs Ont
l'automne e'
aucun ne ser
tires. Leu

32. **Le Pi**
pingouin comm

Traits distinctifs
arctique); il est
l'œil et la base d
du jeune oiseau c
des guillemots.

Indications si
est un admirable

Nid. Sembl
groupes.

Habitat. Fré

33. **Le G**
pingouin était
tellement dimin
ment fort inut
aujourd'hui éte

Cet oise
plus nécessai
nageoires par
était plus po
qu'un poisson
nécessaire qu
ainsi, s'il avai
aurait pu sur
iles britanniq
nichait, et il
hardis pêcheu
nos rivages.
habitant les f
bles de se prof
et des gourdir
lurent de ces c
métier, ces ge
poussaient ce

31. **Le Guillemot de Brunnich.** (THICK-BILLED GUILLEMOT) *Uria lomvia*. L. 16-50. Ce guillemot est presque exactement semblable à l'espèce précédente.

Traits distinctifs. La tête et le cou sont plus foncés et d'un brun plus riche, sans la teinte fumée du guillemot ordinaire, et le cou est un plus foncé derrière que devant. Le bec est un peu plus gros et sensiblement plus massif.

Indications sur le terrain. Bec plus long, plus gros; la coloration de la tête et du cou aidera, si la vue en est exceptionnellement claire, à distinguer cet oiseau vivant du guillemot ordinaire. Bec tranchant et effilé au lieu d'être émoussé et profond; queue non redressée en nageant; tout cela servira à le distinguer du pingouin commun.

Nid. Comme dans l'espèce précédente.

Habitat. Un peu plus au nord que celui du guillemot ordinaire.

SOUS-ESPÈCES. Le guillemot de Brännick se rencontre sur les océans Pacifique et Atlantique mais comme des espèces distinctes. Notre spécimen de l'est est l'oiseau type et s'appelle le guillemot de Brunnich.

Le guillemot de Brännick est le seul membre de cette famille qu'on trouve sur les grands lacs. Ces oiseaux sont parfois venus par centaines sur les lacs Ontario, Érié, et sur les eaux tributaires de ces lacs à la fin de l'automne et au commencement de l'hiver; ils étaient tous faméliques et aucun ne semblait devoir survivre ou retourner vers leurs demeures maritimes. Leur présence ici en est encore inexplicable.

32. **Le Pingouin commun.** (RAZOR-BILLED AUK). *Alca torda*. L. 16-50. Le pingouin commun a la même apparence générale que les deux dernières espèces.

Traits distinctifs. Le bec est très profond et aplati (quoique pas autant que celui du macareux arctique); il est donc facile à distinguer du guillemot, surtout en été lorsqu'une ligne blanche réunit l'œil et la base du culmen et que le bec est traversé par une bande blanche près du bout. Le bec du jeune oiseau d'hiver est moins caractéristique, mais peut tout de même se distinguer de celui des guillemots.

Indications sur le terrain. Bec plus profond et, quand il nage, sa queue redressée en éventail est un admirable point de mire.

Nid. Semblable à celui des deux espèces précédentes, mais ceux-ci se réunissent moins par groupes.

Habitat. Fréquente nos rivages de l'Atlantique jusqu'au pôle.

33. **Le Grand Pingouin.** (GREAT AUK). *Plautus impennis*. L. 30. Le grand pingouin était le plus grand des plongeurs américains. Les ailes étaient de dimensions tellement diminuées que tout en pouvant servir de parfaites nageoires, elles étaient autrement fort inutiles, et laissaient l'oiseau incapable de voler. Comme cette espèce est aujourd'hui éteinte il est inutile de la décrire plus au long.

Cet oiseau s'était si bien fait à la vie aquatique que le vol ne lui était plus nécessaire, et c'est ainsi que ses ailes avaient fini par se réduire à des nageoires pareilles à celles des pingouins du pôle antarctique et qu'il ne lui était plus possible de voler. Bien qu'il pût vivre dans la mer aussi bien qu'un poisson ou un animal marin quelconque, la terre lui était tout aussi nécessaire qu'à tout autre oiseau en vue de sa reproduction. Mais même ainsi, s'il avait habité l'extrémité du pôle pour le temps de la couvaison, il aurait pu survivre; mais des rochers solitaires et écartés, des flots le long des îles britanniques et du côté américain de l'Atlantique, étaient les lieux où il nichait, et il se trouvait être en même temps sur la route des bateaux de hardis pêcheurs qui dès les premiers temps de notre histoire se pressaient sur nos rivages. Pour ces pêcheurs les innombrables milliers de grands oiseaux habitant les flots dans le voisinage immédiat de ces pêcheries et si incapables de se protéger sur terre qu'on pouvait les tuer en masse avec des bâtons et des gourdins, constituaient un irrésistible butin. Les pêcheurs se prévalurent de ces occasions et l'on raconte que pour s'épargner la fatigue de leur métier, ces gens jetaient des planches entre leurs bateaux et le rivage, qu'ils y poussaient ces oiseaux sans défense et les assommaient sur le pont. Il est

clair que nulle quantité ne pouvait résister à de semblables massacres, et aujourd'hui le grand pingouin n'est plus qu'un intéressant souvenir et n'a pour le représenter que des spécimens et des restes dans quelques museums particulièrement favorisés.

34. **Le Mergule nain.** (DOVEKIE). *Alle alle.* L, 8. C'est un très petit plongeur, le plus petit de sa famille dans l'est du Canada. Quand on le trouve sur nos eaux il est généralement noir en dessus et blanc à la gorge, aux joues et en dessous.

Traits distinctifs. Sa taille suffit à le distinguer de tout autre plongeur dans l'est du Canada.

Indications sur le terrain. Sa taille et ses battements d'ailes très rapides constituent les meilleures indications sur le terrain.

Nid. Sur les bords des falaises dans l'extrême nord.

Habitat. En été dans l'extrême nord de la région polaire orientale; en hiver le long des rivages maritimes.

Sur les rivages de notre côte et dans nos ports ce petit oiseau ne doit se chercher qu'en hiver. Il vole avec un très rapide mouvement de l'aile.

Ordre—Longipennes. Palmipèdes aux longues ailes

Description générale. Les palmipèdes à longues ailes sont des oiseaux de mer, avec quatre doigts et deux membranes, avec les ailes plus longues que la queue, si l'on excepte la plume de la queue médiane extrêmement allongée chez quelques labbes et les queues d'aronde extérieures, également allongées chez quelques sternes.

Traits distinctifs. On peut les considérer comme un ordre en raison de leurs longues ailes et de leur bec (figures 3, 4, 5, p. 20) et ils se distinguent des nageurs à narines tubulaires par la place des narines qui sont sur les côtés du bec et non dans un tube au sommet (voir figure 11, p. 21) comme comparaison.

Indications sur le terrain. On n'en peut donner aucune pour l'ordre entier, sauf la longueur de l'aile et la façon de voler.

Nid. Couvent d'habitude sur le sol ou sur le bord des falaises, mais il y a peu d'uniformité quant à leurs habitudes à cet égard.

Habitat. Quelques espèces sont plus ou moins communes le long des cours d'eau du Canada.

Les palmipèdes à longues ailes sont d'admirables voiliers, ne se fatigant jamais et déployant une agilité extrême dans l'air. Par habitude ils sont pêcheurs, mangeurs de débris ou pirates. Il n'y a que deux familles de cet ordre au Canada: les Labbes et les Mouettes, ces dernières comprenant leurs proches parents les Sternes ou Hirondelles de mer.

Valeur économique. Etant des oiseaux de mer, le dommage qu'ils font est peu de chose, et quelques-uns sont même utiles à l'homme.

FAMILLE—STERCORARIDÆ. LABBES ET STERCORAIRES

Description générale. Les labbes sont des oiseaux de proie sur mer. Comme couleur ils sont brun foncé, et blancs. La famille fait voir un singulier dichroïsme et toutes les espèces du Canada apparaissent avec l'une ou l'autre coloration, soit un brun également foncé, soit un brun foncé ou ardoisé avec la tête, le cou et les dessous blancs ou clairs et un bonnet presque noir.

Traits distinctifs. Les becs des labbes (voir figure 3, p. 20) sont caractéristiques, car il y a un angle bien indiqué à la pointe qui forme un crochet très marqué, clairement séparable du reste de la cire à la base du bec. Ce caractère les distingue facilement des mouettes, tandis que la présence des narines et de deux au lieu de trois membranes aux doigts (figure 6, p. 21) les distingue des cormorans dont les becs sont semblables quant au profil. Le fait que les narines ne sont pas tubulaires (figure 11, p. 21) les différencie d'avec les pétrels auxquels ils ressemblent par ailleurs.

Indications sur le terrain. Les labbes ont une coloration noire sur le dessus, une bande claire très visible à travers le dessous de l'aile près de la pointe, et ressemblent au faucon quand ils volent. Des trois espèces, deux, à l'état adulte, montrent des plumes de la queue si allongées qu'elles les font bien reconnaître.

Nid. Sur le sol, dans l'herbe.

Le fait des deux phases de coloration et celui des plumages intermédiaires si nombreux rendent l'identification de quelques-uns des labbes assez

difficile.
pêcheurs (c
les oeufs (c
Trois
raire— ce
extérieure

Valeu
les localité
tance loca

36. **L**
rinus. L, 2
4-25). C'e
par la color
L'espèce se

Traits di
et tordues à

Indicatio
les meilleure

Nid. Su
Habitat.
nent. Se ren

37. **L**
(Queue, 8-2
se présente:
la couleur g
phase claire
noir. Des 1

Traits di
tous les plum
de 3 pouces a
comme dans
pas les longu
se bien disti
tuyaux des tr
se succèdent
subitement p

Indicatio
haut, et n'éta

Nid.—Su

Habitat.
ses migratio
comme un oi

Ce la
rier sur l
men, sauf
faussemen

38. **L**
L, 21. (Qu
semblable au
queue dépass

Traits di
pomarin, par
que l'une ou
Les jeunes in
indiqués pour

Indicatio
longues plum

Nid. Se

difficile. Les labbes sont les pirates de l'air; ils font la chasse aux oiseaux pêcheurs qui tiennent une proie et les forcent à rendre gorge s'ils l'ont avalée; les oeufs et les oisillons dans le nid ne sont jamais en sûreté.

Trois labbes se rencontrent dans l'est du Canada, ainsi qu'un stercoraire— ce dernier trop rarement et accidentellement, sauf au large de la côte extérieure de Terre-Neuve, pour qu'il en soit fait mention autrement.

Valeur économique. Les labbes ne sont pas très nombreux, et sauf dans les localités très éloignées et sauvages, où leur nombre leur donne une importance locale, leur influence économique est peu de chose.

36. **Le Labbe pomarin.** (POMARINE JAEGER, BOATSWAIN). *Stercorarius pomarinus*. L., 22. (Queue, 9-25, les plumes du centre se projetant au delà des extérieures de 4-25). C'est là le plus grand des labbes. Il ressemble tellement aux deux autres espèces par la coloration qu'il est difficile de les en distinguer excepté par la taille et à l'état adulte. L'espèce se présente en deux phases de coloration et dans tous les états intermédiaires.

Traits distinctifs. Les plumes allongées du milieu de la queue de l'oiseau adulte sont larges et tordues à la pointe de façon à se trouver dans un plan verticale au lieu d'horizontal.

Indications sur le terrain. Les plumes larges, allongées et tordues de la queue sont probablement les meilleures de ces indications.

Nid. Sur le sol, dans l'herbe.

Habitat. Couve dans les îles et dans l'intérieur des terres au pôle arctique à travers le continent. Se rencontre sur les côtes maritimes plus au sud, seulement en qualité d'émigrant.

37. **Le Labbe parasite.** (PARASITIC JAEGER). *Stercorarius parasiticus*. L., 17, (Queue, 8-25, les plumes médianes dépassent les plumes extérieures de 3-25). Cette espèce se présente avec deux phases de coloration, une claire et une foncée. Dans la phase foncée, la couleur générale est brun foncé un peu plus claire au-dessous avec bonnet noir. Dans la phase claire les parties de dessous, la poitrine, le cou et la face sont blancs, avec bonnet noir. Des phases intermédiaires de coloration se rencontrent également.

Traits distinctifs. La taille plus petite de cet oiseau devrait le distinguer du précédent dans tous les plumages. A l'état adulte les plumes médianes de la queue dépassent seulement les autres de 3 pouces au lieu de 7 comme dans l'espèce suivante et sont minces au lieu de larges et tordues comme dans la dernière espèce. Les oiseaux non développés de l'espèce à longue-queue, n'ayant pas les longues plumes de la queue sont presque tout à fait semblables à cette espèce-ci et peuvent se bien distinguer par la couleur des tuyaux des plumes primaires. Dans le labbe parasite les tuyaux des trois premières plumes sont blancs et les autres de plus en plus foncés à mesure qu'ils se succèdent l'un à l'autre dans l'aile. Dans le labbe à longue queue la couleur des tuyaux devient subitement plus foncée après la troisième primaire.

Indications sur le terrain. Faible projection des plumes médianes de la queue, comme plus haut, et n'étant pas tordues elles offrent une indication très sûre pour les oiseaux adultes.

Nid.—Sur le sol, dans les bruyères et les marécages du nord.

Habitat. Couve vers le pôle à travers le continent; est beaucoup plus commun sur la côte, dans ses migrations, que dans l'intérieur des terres où on le trouve très rarement quoique peut-être comme un oiseau vagabond.

Ce labbe est le seul de son espèce qu'on puisse rencontrer dans l'intérieur sur les grands lacs. D'autres espèces ont été signalées, mais à l'examen, sauf dans un seul cas, il s'est trouvé que c'étaient de jeunes oiseaux faussement identifiés, généralement à cause de l'absence de la queue allongée.

38. **Le Labbe à longue queue.** (LONG-TAILED JAEGER). *Stercorarius longicaudus* L., 21. (Queue 13-25, la plume du centre dépasse les plumes extérieures de 8). Très semblable au précédent par la coloration, mais les plumes longues et fines du milieu de la queue dépassent les autres de 7 à 8 pouces au lieu de 3.

Traits distinctifs. Le labbe à longue queue quoique, ayant presque les dimensions du labbe pomarin, parce que la très longue queue y est comprise, est cependant un bien plus petit oiseau que l'une ou l'autre des deux autres espèces. C'est sa taille qui devrait le faire reconnaître. Les jeunes individus sont souvent confondus avec le labbe parasite, mais les caractères de l'aile indiqués pour cette espèce servent à les faire reconnaître.

Indications sur le terrain. On ne peut bien reconnaître que le labbe adulte, à l'état vif, les longues plumes du milieu de la queue étant le meilleur guide.

Nid. Semblable à celui des autres labbes.

Habitat. Couve dans les régions polaires de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Ne se voit que rarement sur la côte de l'Est.

Bien que le labbe à longue queue ait été signalé sur les grands lacs, dans la plupart des cas on a pris pour des labbes les jeunes individus de l'espèce précédente.

FAMILLE—LARIDÆ. GOÉLANDS ET STERNES.

Description générale.—Les goélands et les sternes sont des palmipèdes à longues ailes, faciles à distinguer des labbes par la forme et la construction du bec qui montre une seule surface continue sans parties distinctes ni jointures (figures 4, 5, p. 20). Les couleurs de l'adulte sont ordinairement un blanc pur, avec livrées blanches, gris-perle ou noires, souvent avec des bouts d'ailes noirs et des taches au collet ou à la joue.

Traits distinctifs. Le bec à surface continue avec un angle aigu projeté sur la mandibule inférieure suffit à reconnaître cette famille sous tous les plumages. Les couleurs sont très caractéristiques, quoique certaines espèces pendant leur jeunesse sont complètement foncées, se rapprochant ainsi des phases foncées des labbes.

Indications sur le terrain. La coloration et le vol très caractéristiques sont les meilleures indications.

Nid. Les mouettes nichent généralement sur le sol, sur les bords rocheux ou les rivages plats, dans des lieux sablonneux, herbeux ou marécageux; rarement sur les arbres.

Habitat. Les mouettes et les sternes sont répandues partout, ordinairement près de vastes étendues d'eau, mais quelquefois au loin dans l'intérieur des terres, comme par exemple dans nos régions des prairies.

Sous-famille—*Larinae.* Goélands et Mouettes.

Description générale. Muni de cette description de leur famille on ne pourra confondre les mouettes qu'avec les sternes qui suivent ici (voir p. 54).

Traits distinctifs. Elles peuvent être distinguées, soit des labbes par les caractères du bec et de la coloration; (voir la description de la famille à la page précédente) soit des sternes par leur charpente plus robuste et leur façon de voler. Les becs sont plus gros et plus forts (comparez figures 4 et 5, p. 20). Règle générale, les queues sont carrées sans être fourchues visiblement. Quoique aussi bons voiliers que les sternes, ils ont moins d'agilité et accomplissent moins d'évolutions aériennes. Les jeunes mouettes sont souvent tout à fait brunes et de couleurs foncées, en contraste frappant avec l'individu adulte. Les jeunes sternes sont ordinairement de coloration claire.

Indications sur le terrain. Ce sont de gros oiseaux d'un vol plus lourd que celui des sternes. Queue carrée; ont l'habitude de prendre leur nourriture à la surface de l'eau; ne plongent pas avec les ailes, et portent leur bec horizontalement quand elles volent (voir sternes, p. 54). Ce sont là des indications qui serviront à distinguer les mouettes des sternes leurs proches parents.

Nid. Sur les bords rocheux ou les falaises près de l'eau en diverses localités; cela dépend de l'espèce et de l'habitat.

Habitat. Elles sont presque cosmopolites et il y a peu de contrées sans des individus de cette sous-famille. Au Canada on rencontre environ vingt-cinq espèces, mais quelques-unes ne viennent que par hasard en dedans des limites des régions colonisées, et il n'en est pas question ici.

Quoique les mouettes soient essentiellement des oiseaux de mer on les trouve quelquefois à de grandes distances des vastes étendues d'eau, et des compagnies entières suivent fréquemment le laboureur pour chercher des insectes, dans les sillons fraîchement ouverts. Elles trouvent leur nourriture à la surface de l'eau, ne plongent jamais, ou glanent sur les plages, dans les baies ou dans les champs.

Valeur économique. Les mouettes mangent de tout en fait de matières animales, du poisson, des crustacés, des mollusques, des insectes, des déchets, et, quand l'occasion s'en présente, des petits oiseaux et des souris.

La quantité de poissons qu'elles consomment est relativement peu importante, car d'habitude c'est seulement les petites espèces très abondantes se rencontrant en grandes compagnies, qui attirent leur attention; elles ne sont pas de patients pêcheurs comme les hérons. Elles recherchent les plages de marée basse pour les mollusques, faisant preuve de beaucoup de savoir-faire pour casser les dures coquilles et en extraire le contenu. La nourriture que fournissent ces ressources n'a presque aucune valeur mar-

chande. La quantité de elle fréquen espèces ont : mammifères être protégé jeunes oiseau

40. La M C'est une mou genté.

Traits distin une façon de recu

Indications s qu'on ne peut l'e tères et cela dan de Delaware, et

Elle diffère au lieu de coulet les extrémités ne rouge du goélan individus ressen même modèle de d'un blanc très tr les goélands arge semblable.

Nid. Elles l pic.

Habitat. Un que par hasard s tique; niche, en . On ne les signale

SOUS-ESPI deux océans Atla tique, est le type

Valeur é semblable à c qu'on lui est l

42. Le G L. 28. Ce goél n'est que légèr blanches. C'est le sur le pointe d cendré ou brunâ

Traits distinct il ressemble quan

Indications sur noire de l'aile con

Nid. Sur le s

Habitat. Cou Visite notre côte d lac Ontario.

Valeur éc maritimes et l importance éc

43. Le Go

Ce goéland c eau gris très cla goéland à mante

Traits distinct

Indications sur

Nid. Sur le sc

chande. Les mouettes débarrassent la contrée chaque année d'une immense quantité de déchets et d'immondices jetées dans les ports et les cours d'eau; elle fréquentent les terres cultivées pour attraper les insectes et quelques espèces ont servi à arrêter le fléau d'une invasion de souris ou d'autres petits mammifères. Les mouettes, par conséquent ont leur utilité et doivent être protégées, lors même que quelquefois elles détruisent des oeufs et de jeunes oiseaux.

40. **La Mouette à trois doigts.** (KITTIWAKE TICKLER). *Rissa tridactyla*. L, 16. C'est une mouette petite ou de taille moyenne, de la même coloration que le goéland argenté.

Traits distinctifs. La condition rudimentaire ou l'absence presque totale du pouce est toujours une façon de reconnaître cet oiseau.

Indications sur le terrain. Elle ressemble à tant d'autres mouettes par la coloration générale qu'on ne peut l'en distinguer à l'état vivant que par une observation attentive des plus petits caractères et cela dans les conditions les plus favorables. La taille est plus petite que celle du goéland de Delaware, et plus grande que celle du goéland Bonaparte.

Elle diffère du goéland argenté et du goéland de Delaware en ce qu'elle a des pattes noires, au lieu de couleur chair ou jaunâtres, et qu'elle manque de petites taches terminales blanches sur les extrémités noires des primaires. Le bec est d'un jaune toujours égal chez l'adulte, sans la tache rouge du goéland argenté ou la bande noire transversale du goéland de Delaware. Les jeunes individus ressemblent beaucoup au goéland de Bonaparte par le fait qu'ils ont un bec noir et le même modèle de coloration, mais le bord de devant de l'aile étendue est surtout noir au lieu d'être d'un blanc très marqué. Les jeunes de cette espèce ne passent pas par une phase brune, comme font les goélands argentés, mais ils ressemblent à l'individu adulte par une coloration modifiée quoique semblable.

Nid. Elles font un nid solide et bien construit d'algues marines sur les saillies des falaises à pic.

Habitat. Une espèce marine qui est la mouette à trois doigts de l'Atlantique, ne se rencontre que par hasard sur les eaux douces ou à l'intérieur des terres. Elle habite les deux côtés de l'Atlantique; niche, en Amérique, depuis le golfe St-Laurent jusqu'au nord, dans les régions polaires. On ne les signalera sur les grands lacs que sur des preuves absolument indéniables.

SOUS-ESPÈCES. Cette mouette se rencontre sous forme de sous-espèce dans le nord des deux océans Atlantique et Pacifique. Notre spécimen de l'est, la mouette à trois doigts de l'Atlantique, est le type et se rencontre en Europe et en Amérique.

Valeur économique. La nourriture de cette mouette est probablement semblable à celle des autres mouettes marines, mais sa taille moindre fait qu'on lui est moins hostile qu'à quelques autres membres de sa famille.

42. **Le Goéland à manteau glauque.** (GLAUQUE GULL). *Larus hyperboreus*. L, 28. Ce goéland est une des plus grosses mouettes. Chez l'individu adulte, la livrée n'est que légèrement teintée de gris; les plus jeunes spécimens sont presque absolument blancs. C'est le plus grand des goélands aux ailes blanches (ceux qui n'ont pas de noir sur le pointe des ailes). Les oiseaux de l'année n'ont que de légères barres d'un gris cendré ou brunâtre.

Traits distinctifs. Sa coloration presque blanche le distingue du goéland à manteau noir auquel il ressemble quant à la taille.

Indications sur le terrain. La taille, la coloration presque blanche, et l'absence de la pointe noire de l'aile constituent les meilleurs signes pour les reconnaître à l'état vivant.

Nid. Sur le sol, dans l'extrême nord.

Habitat. Couve dans les régions polaires de l'Amérique orientale et de l'Europe occidentale. Visite notre côte de l'Atlantique en hiver seulement, s'aventure rarement dans l'intérieur jusqu'au lac Ontario.

Valeur économique. Comme il n'est qu'un hôte d'hiver sur nos côtes maritimes et un hôte d'occasion sur les grands lacs, cet oiseau n'a aucune importance économique.

43. **Le Goéland à ailes blanches.** (ICELAND GULL). *Larus leucopterus*. L, 24.

Ce goéland est environ de la même taille que le goéland argenté, mais avec un manteau gris très clair ou blanc, et les extrémités de l'aile blanches—forme plus petite du goéland à manteau glauque.

Traits distinctifs. La taille et les extrémités des ailes blanches au lieu de noires.

Indications sur le terrain. Taille; extrémités des ailes; coloration blanche en général.

Nid. Sur le sol.

Habitat. Il couve dans les régions polaires de l'Amérique orientale et de l'Europe occidentale. Visite notre côte de l'Atlantique en hiver seulement; s'égaré rarement à l'intérieur jusqu'au lac Ontario.

Valeur économique. Comme ce n'est qu'un hôte de l'hiver sur nos rivages maritimes et qui ne paraît que par occasion sur les grands lacs, il n'a que peu ou peut-être même point du tout d'importance économique.

47. **Le Goéland à manteau noir.** LE GROS GOÉLAND. (GREAT BLACK-BACKED GULL). *Larus marinus*. L., 29. Un très gros goéland, l'individu adulte avec une livrée tout à fait noire.

Traits distinctifs. Forte taille et dos noir sont les traits caractéristiques de l'individu adulte. Les jeunes sont bruns au lieu de cendrés ou blancs, comme dans le cas du goéland à manteau glauque, avec plus de raies sur le dos et coloration moins égale que celle du goéland argenté.

Indications sur le terrain. Une forte taille et un dos noir sont de bonnes indications dans le cas de l'adulte. La taille est la seule indication qu'on puisse signaler pour les jeunes à l'état vivant.

Nid. Sur le sol, nid fait d'algues marines ou de fragments végétaux.

Habitat. Couve sur la côte de l'Atlantique depuis la Nouvelle-Ecosse jusqu'au pôle nord. Par suite des progrès de la colonisation, les endroits favorables à la couvaison sont restreints aux localités plus isolées. C'est un hôte d'hiver plus ou moins régulier quoique plutôt rare, du lac Ontario, mais qui ne s'avance que rarement dans l'intérieur le long des grands lacs.

Valeur économique. Avec les mêmes habitudes dans son régime alimentaire que les autres goélands, la plus grande taille, la force et le nombre des goélands à manteau noir, augmentent sa puissance à faire du bien ou du mal. On ne peut certes pas se fier à cette espèce dans le voisinage des nids sans défenses d'autres espèces ou de jeunes oiseaux, car les oeufs et les oisillons sont avidement dévorés quand l'occasion s'en présente. Par contre, l'occasion pour ce goéland de devenir un fléau important n'est pas grande, sauf dans quelques localités, car sur cette côte du Labrador où le goéland à manteau noir couve, il se trouve une grande quantité d'eiders et d'autres oiseaux de mer. Le dommage qu'il cause sur la côte du Labrador est petit comparé aux dégâts occasionnés par le gaspillage considérable des pêcheurs.

51. **Le Goéland argenté.** (HERRING GULL). *Larus argentatus*. L., 24. Planche IIIA.

Traits distinctifs. Sa taille et sa coloration générale suffisent en général à distinguer le goéland argenté de toutes les autres espèces canadiennes, mais comme la taille seule n'est que rarement un critère assez digne de foi quand les espèces que l'on contraste ne s'offrent pas ensemble pour être comparées, les points suivants aideront à une détermination précise.

Le goéland argenté tout jeune est le plus foncé de la famille car il se rapproche de très près des labbes de phase sombre à cet égard, mais la forme du bec et les habitudes du goéland préviendront toute confusion avec le labbe. Chez l'individu adulte les pointes noires de l'aile servent à le distinguer de l'un quelconque des goélands à ailes blanches, et les petites taches blanches terminales le distinguent de la mouette à trois doigts. Mais l'absence d'une raie transversale sur le bec le distingue du goéland de Delaware. A l'état adulte, toutefois, le jeune goéland argenté, à un de ses stades de développement, quand la couleur du bec tourne du noir au jaune de la maturité, fait voir une marque très semblable et la comparaison des tailles est la seule qui les fasse distinguer l'un de l'autre.

Indications sur le terrain. La taille et les marques de coloration susdites sont les meilleurs guides sur le terrain. Il est souvent très difficile, parfois impossible, de distinguer le goéland argenté du goéland de Delaware, à l'état vivant, quand des oiseaux encore jeunes de l'une ou l'autre espèce sont vus séparément.

Nid. Sur le sol, ou sur les saillies rocheuses, ou encore sur le sommet plat de grands rochers isolés, dans les nids faits d'algues marines ou de matières végétales de rebut.

Habitat. Se rencontre à peu près partout au Canada; il est surtout commun dans le voisinage immédiat des grandes étendues d'eaux douces ou salées. Couve soit en tous lieux soit dans certaines localités, sauf dans les régions plus méridionales du Canada.

Le goéland argenté est le plus commun de nos goélands. C'est un oiseau migrateur qu'on voit souvent sur le plus petit de nos lacs, même à de longues distances de son lieu de couvaison. Les goélands qui séjournent pendant l'été sur les grands lacs inférieurs sont des oiseaux non reproduc-

teurs. En qu'elles soient l'hiver, voir les goélands fr en grand r vaisseaux ont beauco multitude Sur la plag la marée b carapace d redescende ceaux. Pa autour des y saisir la ils suivent diquement sion.

Valeur les habitud ont leur imj

54. **Le G warensis.** L., adulte a le be

Traits distib le meilleur guid cette espèce peu présence de taci de Delaware. coloration plus c de la queue si c noires. L'absei et la grande dif parte dans le pl

Indications s seules indicatio

Nid. Sur le *Habitat.* Se fréquente au Ca lérieure des Gra

Valeur ware est le mais il a mo

60. **Le G 14.** C'est le p celle du goélan noir sur la tête à l'oreille une t

Traits distin l'est dans leur pl C'est un oiseau té le bec noir, des noires au lieu de à leur tache noir bleut un peu, par terminale foncée terne commune la moindre appa La mouette

teurs. En hiver l'espèce demeure sur les eaux plus étendues jusqu'à ce qu'elles soient gelées d'un bout à l'autre et quelquefois, y séjourne tout l'hiver, volant sur les eaux libres ou perchés sur la glace flottante. Les goélands fréquentent les ports pour recueillir les déchets et se réunissent en grand nombre vers l'entrée des égouts. Ils ont aussi appris que les vaisseaux fournissent des résidus de bon goût. Les stations de pêche ont beaucoup d'attraits pour eux et on est presque sûr de voir une grande multitude de ces oiseaux autour des tables qu'on nettoie sur le rivage. Sur la plage les mollusques et les écrevisses sont avidement recherchés à la marée basse et les goélands ont appris le truc de porter leur proie à carapace dans l'air pour la laisser retomber sur les rochers, après quoi ils redescendent et retirent la savoureuse matière de sa boîte brisée en morceaux. Par le très mauvais temps ils se réunissent en grand nombre autour des vagues écumeuses qui se brisent aux places tempétueuses pour y saisir la nourriture qui est rejetée à la surface de l'eau. Quelquefois ils suivent les immenses compagnies de petits poissons qui visitent périodiquement nos rivages et prélèvent un impôt sur cette inépuisable provision.

Valeur économique.—On verra d'après le résumé qui précède touchant les habitudes des goélands argentés, que comme mangeurs de déchets ils ont leur importance et veulent être protégés.

54. Le Goéland de Delaware. LA MAUVE. (RING-BILLED GULL). *Larus delawarensis*. L, 18-50 Comme le goéland argenté (voir p. 52) mais plus petit; l'individu adulte a le bec traversé près de la pointe d'une barre ou d'un cercle.

Traits distinctifs. Sauf quand il est adulte et que le cercle sur le bec est visible, la taille est le meilleur guide pour distinguer cette espèce de celle du goéland argenté. Sur le bord de la mer cette espèce peut être confondue avec la mouette à trois doigts ordinaire qui est plus petite. La présence de taches blanches terminales sur les pointes noires de l'aile sert à distinguer le goéland de Delaware. Dans la jeunesse, la coloration brune du goéland de Delaware contraste avec la coloration plus claire de la jeune mouette à trois doigts. Ce goéland manque de la bande terminale de la queue si caractéristique de ces oiseaux et a les pattes et les jambes couleur chair au lieu de noires. L'absence de la bande effilée, étroite et noire de la queue, de la tache foncée de la joue, et la grande différence dans la taille devraient suffire à distinguer cet oiseau du goéland de Bonaparte dans le plumage jeune ou d'hiver.

Indications sur le terrain. Une étude attentive des caractères susmentionnés fera connaître les seules indications connues de l'auteur.

Nid. Sur le sol, dans un nid fait d'herbes ou de matières végétales.

Habitat. Se trouve presque partout au Canada. Couve par endroits dans les régions qu'il fréquente au Canada, sauf dans les parties les plus méridionales du Dominion, dans la région inférieure des Grands Lacs.

Valeur économique.—Le régime d'alimentation du goéland de Delaware est le même, d'une façon générale, que celui du goéland argenté, mais il a moins d'influence à cause de sa plus petite taille.

60. Le Goéland de Bonaparte. (BONAPARTE'S GULL). *Larus philadelphia*. L, 14. C'est le plus petit de nos goélands de l'Est. Sa coloration générale ressemble à celle du goéland argenté ou du goéland de Delaware, mais l'individu adulte a un capuchon noir sur la tête et le cou. Les oiseaux jeunes et d'hiver n'ont pas le capuchon, mais ont à l'oreille une tache foncée ou voilée ou peu distincte.

Traits distinctifs. Le capuchon noir sert à distinguer ce goéland-là de toutes les espèces de l'est dans leur plumage d'été. Dans l'ouest de l'Ontario on rencontre parfois le goéland de Franklin. C'est un oiseau légèrement plus grand avec un bec rouge et ses pattes presque noires au lieu d'avoir le bec noir, des pattes d'un rouge corail, et les pointes des primaires en vue sont presque toutes noires au lieu de blanches avec de petites pointes noires. Les jeunes oiseaux peuvent se reconnaître à leur tache noire à l'oreille. Ils se distinguent de la mouette à trois doigts, à laquelle ils ressemblent un peu, par la quantité frappante de blanc sur le bord antérieur de l'aile étendue et par la bande terminale foncée de la queue. Le goéland de Bonaparte peut quelquefois être confondu avec la sterne commune ou d'autres sternes, mais sa charpente et son action plus lourdes, et l'absence de la moindre apparence d'une queue fourchue devraient rendre la différenciation relativement facile.

La mouette rieuse qui se rencontre parfois sur nos côtes maritimes du sud ressemble beaucoup

à cette espèce, mais les plumes extérieures des ailes sont noires au lieu d'être principalement blanches, et elle élève des petits et n'émigre pas en hiver. Mais elle est si rare qu'il faut beaucoup de précautions avant de garantir son identité.

Indications sur le terrain. La taille, le capuchon noir chez les adultes d'été, le blanc sur le bord antérieur des ailes, la couleur du bec et des pattes constituent les meilleurs caractères pour reconnaître cet oiseau à l'état vivant.

Nid. Sur des troncs d'arbre, des buissons ou des arbres, quelque fois à 20 pieds au-dessus du sol.

Habitat. Couve dans l'Alaska et le Nord-Ouest, mais se rencontre en hiver ou pendant leur migration partout au Canada.

Ce petit goéland est plus souvent aperçu comme troupe de passage ou de visite que les autres espèces. Il fréquente aussi plus que ces espèces, les marécages et les terrains inondés, et se voit rarement comme un oiseau solitaire. Il manifeste des goûts de sociabilité et les troupes semblent être maintenues ensemble plus par leurs dispositions sociables que par cette communauté d'intérêts qui prédomine chez les autres espèces de goéland.

Sous-famille—*Sterninae*. Les Sternes.

Description générale. Les sternes ou hirondelles de mer, comme on les appelle quelquefois, sont de petits goélands de charpente et de tenue plus légères et plus gracieuses (voir le bec, fig. 5, p. 20).

Traits distinctifs. Le bec plus léger et plus effilé que celui des goélands, et la queue fourchue sont caractéristiques des sternes et les distingueront habituellement sans difficulté. Toutes les espèces canadiennes ont une queue plus ou moins fourchue et toutes, à une exception près, ont dans leur plumage adulte d'été, un capuchon noir très nettement défini. La forme fourchue de la queue chez les jeunes oiseaux, bien que commençant à se montrer de bonne heure dans leur développement, n'atteint son maximum qu'au moment du départ pour la saison d'hiver; de là vient que pendant l'été et l'automne beaucoup d'individus auront des fourches beaucoup plus petites que ne l'indiquent les mesurages.

Indications sur le terrain. La plus grande légèreté dans l'action de l'aile et évolution aérienne constante et rapide; le fait que les sternes plongent du haut de l'air, et l'habitude de tourner le bec droit en bas du côté de l'eau au lieu de le tenir parallèlement au corps sont des faits caractéristiques. Les queues fourchues et les capuchons noirs sont aussi de bons signes pour reconnaître les individus adultes.

Nid. Tandis que les goélands semblent préférer les rivages rocheux pour y nicher, les sternes, sauf celle de Forster et la sterne noire, préfèrent les plages sablonneuses, déposant leurs oeufs dans un cercle de cailloux sans autre préparation quelconque.

Habitat. Comme formant une sous-famille, les sternes fréquentent le sud plus que ne font les goélands, bien qu'une espèce, au moins, la sterne arctique, ait été trouvée aussi loin, au nord, que se soit aventuré l'homme. Toutes nos espèces émigrent, aucune ne restant dans l'est du Canada pendant l'hiver.

Il suffit d'observer une troupe de sternes en train de se nourrir pour reconnaître la justesse du surnom que le populaire leur a donné d'hirondelles de mer. La grâce de leurs mouvements, leurs couleurs délicates comme celles des perles, font la joie de qui aime la nature. Les sternes ont à tout prendre moins d'habitudes marines que les goélands et ne s'éloignent pas autant qu'eux de la terre. Elles fréquentent les ports, les rivages, les plages et se nourrissent surtout du fretin qu'elles attrapent près de la surface, par des plongements rapides et subits du haut de l'air, mais elles ne ramassent pas les déchets. Dans ces plongements les oiseaux piquent une tête et font jaillir une écume blanche dans laquelle ils disparaissent un instant, mais ils ne vont jamais loin sous l'eau comme font les fous de Bassan et les cormorans.

64. **La Sterne caspienne.** LE GRAND ESTERLETTE. (CASPIAN TERN). *Sterna caspia*. L. 21. (Fourchure de la queue, 1·50).¹ La plus grande de nos sternes canadiennes. Très semblable, quant à la couleur, à la sterne commune (voir p. 55).

¹ Ce mesurage montre la différence de longueur entre les plumes médianes et extérieures de la queue. Une grande partie de la longueur totale de ces oiseaux consiste en ce que les plumes extérieures de la queue sont extrêmement allongées, et ces plumes-là n'atteignent pas leur maximum chez les jeunes oiseaux. De là vient que nous donnons ce chiffre pour corriger le mesurage ordinaire qui est très souvent extrêmement trompeur.

Traits distinctifs
de même taille
La sterne caspienne
La sterne caspienne

Indication
les meilleures

Nid. Sur

Habitat.

veau monde.
couve sont rares
au golfe du St

L'habitation
sterne fait
un fait très
oiseaux de
lités où co
à orner no

Valeur
surtout du
de causer u

69. La
chambre de la c
taille et sa co

Traits distinctifs
et les parties d
ont les barbes

Indications
les plus sûres s
tifier à l'état v

Nid. Sur
végétation de

Habitat. U
il semble avoir

Ces st
rassemblement
chercher co

Valeur
leur habit

70. La
chambre de la q

Traits distinctifs
et longues de h
aussi les parties
poitrine et des
pieds sont cert
pointe, tandis q
teinte brune en
est remplacé p
cou. Avec ce l

Indications
contient, il est
couleur gris-fer
distinguer de la
côte extrême de

Nid. Dans

Habitat. U
Plus ou moins c
habitat canadi

¹ Voir la n

Traits distinctifs. La forte taille de cette sterne est caractéristique. Il y a deux autres espèces de même taille, mais elles sont trop rares pour qu'on fasse plus que de les mentionner en passant. La sterne caspienne est aussi grande que quelques-uns des plus petits goélands; mais son bec quoique relativement gros pour une sterne est trop gracieux et pointu pour ressembler à celui du goéland.

Indications sur le terrain. Coloration caractéristique de la sterne, sa tenue et sa taille sont les meilleures indications de ce genre.

Nid. Sur les plages sablonneuses, sur les îles rocheuses ou à gravier.

Habitat. C'est une espèce presque cosmopolite. Trouvée dans l'ancien comme dans le nouveau monde. Se rencontre assez irrégulièrement dans tout le Canada, mais les localités où elle couve sont rares et disséminées à travers le continent depuis le lac Huron jusqu'au Labrador et au golfe du St-Laurent.

L'habitat singulièrement disséminé et irrégulier de cette magnifique sterne fait croire que c'est une espèce qui disparaît peu à peu. C'est là un fait tout à fait regrettable puisque c'est un des plus beaux de nos oiseaux de mer, et il faut espérer qu'une surveillance attentive des localités où couve cette sterne sera entreprise de façon que l'oiseau continue à orner nos cours d'eau pendant plusieurs générations.

Valeur économique.—Bien qu'elle se nourrisse surtout de poisson c'est surtout du fretin qu'elle fait sa proie. La rareté de cette espèce l'empêche de causer un dommage de quelque valeur.

69. **La Sterne de Forster.** (FORSTER'S TERN). *Sterna forsteri*. L. 15. (Fourchure de la queue 4)¹. Cette sterne ressemble de très près à la sterne commune par sa taille et sa coloration.

Traits distinctifs. La sterne de Forster n'a pas de ces teintes grises si délicates sur les flancs et les parties de dessous, qui caractérisent la sterne commune et les plumes extérieures de la queue ont les barbes foncées à l'intérieur et non à l'extérieur du tuyau.

Indications sur le terrain. Les parties de dessous, d'une blancheur parfaite, sont les indications les plus sûres sur le terrain. Mais l'espèce est si rare à l'est du lac Huron qu'il ne faudrait l'identifier à l'état vivant qu'avec des oiseaux qu'on aurait dans la main.

Nid. Sur de petits monticules, dans les marécages herbeux; le nid est fait de fragments de végétation de rebut.

Habitat. Oiseau de l'ouest ou de l'intérieur. Autrefois il nichait sur la rivière Détroit, mais il semble avoir déserté cette station, et aujourd'hui il couve plus loin à l'ouest.

Ces sternes fréquentent les marécages plutôt que les plages et ne se rassemblent pas en troupes comme la sterne commune. Il faudra les chercher comme individus à part dans des troupes d'oiseaux d'autres espèces.

Valeur économique.—Bien que mangeurs de poissons, leur taille et leur habitat les empêchent de faire du mal.

70. **La Sterne commune.** (COMMON TERN). *Sterna hirundo*. L. 15. (Fourchure de la queue, 3-0)¹. Plaque II B.

Traits distinctifs. Les barbes foncées extérieures au lieu d'intérieures sur les plumes externes et longues de la queue et la poitrine d'un gris délicat au lieu d'un blanc très pur, ainsi que le sont aussi les parties de dessous, distinguent la sterne commune de la sterne de Forster. Le gris de la poitrine et des dessous est plutôt moins prononcé que dans la sterne arctique; les pattes et les pieds sont certainement plus forts et plus lourds. Le bec est d'habitude de couleur foncée vers la pointe, tandis que celui de la sterne arctique est uniformément rouge. Les jeunes ont une demi-teinte brune en-dessus et un bec noirâtre. Chez les individus adultes en hiver le capuchon noir est remplacé par un collet plus ou moins rompu sur le derrière de la tête et la partie supérieure du cou. Avec ce plumage la sterne de Forster a une large raie noire en travers de l'œil.

Indications sur le terrain. Sauf en quelques localités où l'on sait que d'autres sternes se rencontrent, il est toujours bon d'en conclure que c'est là l'espèce qu'on a vue. Les parties de dessous, couleur gris-perle, la distingueront ordinairement de la sterne de Forster, mais il est difficile de la distinguer de la sterne arctique laquelle, d'ailleurs, ne doit pas être cherchée ailleurs que sur la côte extrême de notre mer de l'Est.

Nid. Dans les creux des plages sablonneuses.

Habitat. Une espèce circonfolaire qui voyage jusque dans l'Amérique du Sud et l'Afrique. Plus ou moins commune dans tout le Canada, et niche dans les localités favorables dans tout son habitat canadien.

¹Voir la note, page 54.

C'est cette sterne qui abonde le plus dans tout l'est du Canada. Commune autour des rivages sablonneux, moins abondante sur les rivages rocheux, on peut la voir sur n'importe laquelle des grandes étendues d'eau salée ou douce, pendant l'été. La merveilleuse légèreté des ailes, les cercles gracieux qu'elle trace, un moment planant de ses ailes qui battent rapidement, et stationnaire dans l'air en fixant ses yeux sur la proie qu'elle convoite tout au-dessous d'elle, le moment d'après, fondant comme un poids lourd dans une eau écumante, tout cela charme constamment le spectateur qui recherche le beau. Son cri perçant, un peu dur, s'harmonise admirablement avec la houle des vagues et avec tout l'encadrement des effets maritimes.

Valeur économique.—Quoique assez nombreuse dans les localités favorables, cette espèce est trop peu nombreuse pour être sérieusement destructrice.

71. **La Sterne arctique.** (ARCTIC TERN). *Sterna paradisaea*. L., 15-50. (Fourchure de la queue 4-50).¹ Ressemble de très près à la sterne commune (voir plus haut) par la taille et la couleur.

Traits distinctifs. La sterne arctique a, plus que la sterne commune, la couleur grise un peu plus foncée répandue sur la poitrine et les parties de dessous. Le bec est rouge à la pointe, les pieds et les pattes sont très petits et faibles. L'étendue de son domaine la distingue de la sterne de Forster, et il n'y a que la sterne commune et la sterne rosée avec lesquelles on puisse la confondre, mais cette dernière est trop rare dans les eaux canadiennes pour qu'il en soit question.

Indications sur le terrain. A l'exception de la couleur uniformément rouge du bec, qui n'est pas un signe absolument sûr, il n'y a pas d'indication sur le terrain qu'on puisse donner au moyen de laquelle cette espèce puisse être reconnue avec certitude. Comme dans l'est du Canada c'est une espèce de la côte maritime, il ne faudrait la mentionner comme vue réellement que là où l'on sait qu'elle se rencontre habituellement.

Nid. Dans les creux des plages sablonneuses.

Habitat. Presque cosmopolite, mais plutôt dans l'Est et les régions polaires du Canada; rarement, peut-être jamais dans la région des grands lacs. Elle est remarquable en ce qu'elle dispose d'un champ de migration de la plus grande étendue parmi toutes les espèces d'oiseaux. Bien qu'on la trouve, en été, tout près du pôle, elle hiverne au sud jusqu'au continent antarctique.

Les remarques faites à propos de la sterne commune s'appliqueront très bien ici, si l'on se rappelle que l'habitat de cette espèce n'est exactement que dans l'Est et au pôle.

Valeur économique.—La petite taille du fretin dont elle se nourrit, et l'abondance de ce poisson dans la mer fait de cette sterne, une espèce aussi inoffensive que toute autre sterne.

77. **La Sterne noire.** (BLACK TERN). *Hydrochelidon nigra*. L., 10. (Fourchure de la queue 0-8)¹. C'est la plus petite de nos sternes communes, le gris ardoisé foncé devenant un noir mat sur la tête, le cou et les parties de dessous.

Traits distinctifs. La description qui précède suffit à distinguer les adultes d'été. Les oiseaux d'hiver et ceux non développés ont une face d'un blanc sale, comme la gorge, le tour du cou et les parties de dessous, et le gris au-dessus est teinté plus ou moins de brun. Cet oiseau est cependant toujours beaucoup plus foncé que les plumages correspondants d'autres espèces. Ce fait et la petite taille suffiraient à le différencier toujours des autres espèces.

Indications sur le terrain. La taille et la coloration font que cette espèce est facile à reconnaître à l'état vivant.

Nid. Sur de petits monticules tels que de vieux nids de rats musqués, ou les débris flottants dans les marécages; le nid est fait de matières végétales.

Habitat. La sterne noire américaine est un oiseau de l'intérieur qui niche depuis les grands lacs jusque vers les régions de l'ouest.

SOUS-ESPÈCES. La sterne noire se rencontre à la fois en Europe et en Amérique sous des formes sous-spécifiques alliées desquelles celle d'Europe est le type. La sterne noire d'Amérique *Hydrochelidon nigra surinamensis* est la seule sous-espèce qui nous intéresse ici.

¹Voir la note au bas de la page 5

C'est t
sur les gran
naire aucun
tudes génér

Valeur
riture de c
sternes. D
cotonnier e
d'insectivor
cette sterne
quand cela

Ordr

Description
le grand albatr

Traits distin
(Figure 10, p. 21

Indications
saire de se fam
ordre.

Nid. Sur b
dans la mer ver

Habitat. C
gnent leur plus
quelques-uns ha

Les *pa*
marins, ne
leur habitat
sauf ceux d
comme class
ment que pr
voyageurs ti
Diomedidae
sont appelés
à cause de l
sur notre cô

Valeur
que peu ou

FAMILLE—PI

Description

Traits distin
sont les seuls me

Indications
depuis le corps, l
ou de petits cou
servant de rame

Habitat. Ce
plusieurs espèces
et la liste de ceu
beaucoup d'espèc
plusieurs d'entre
sous la main d'ur
nos côtes ou mèn
qu'avec beaucoup

Valeur

C'est un oiseau des marécages de l'intérieur. On le voit rarement sur les grandes étendues d'eau, mais dans l'intérieur de son domaine ordinaire aucune étendue d'eau marécageuse n'est sans cet oiseau. Ses habitudes générales ressemblent beaucoup à celles des autres sternes.

Valeur économique.—La quantité d'insectes qui entrent dans la nourriture de cet oiseau est probablement plus grande que celle des autres sternes. Dans le Sud on sait qu'il mange les larves des charançons du cotonnier et il est probable qu'il garde chez nous quelques habitudes d'insectivores. C'est pourquoi nous pouvons aventurer l'opinion que cette sterne est réellement utile. En tout cas le poisson qu'elle prend, quand cela arrive, vit dans la fange et a peu d'importance économique.

Ordre.—Tubinaires. Palmipèdes à narines tubulaires.

Description générale. Infatigables voiliers sur les mers profondes, de tailles diverses depuis le grand albatros jusqu'au petit pétrel. Coloration ordinairement terne et uniforme.

Traits distinctifs. Les narines sont encaissées dans des tubes placés au sommet du bec même (Figure 10, p. 21).

Indications sur le terrain. Habitues volantes générales et coloration uniforme. Il est nécessaire de se familiariser avec les diverses espèces afin de pouvoir reconnaître les membres de cet ordre.

Nid. Sur le sol ou dans les terriers de localités isolées; souvent sur des flots rocheux au loin dans la mer vers lesquels ils trouvent leur route de quelque façon mystérieuse et inexplicable.

Habitat. Comme famille, ce sont des oiseaux de l'hémisphère sud, car c'est là qu'ils atteignent leur plus complet développement comme quantités d'individus et d'espèces. Toutefois quelques-uns habitent le nord jusqu'aux confins du pôle.

Les *palmipèdes* à narines tubulaires sont essentiellement des oiseaux marins, ne touchant la terre ferme que pour la couvaison. L'océan est leur habitation et les déchets qu'il ballote suffisent à tous leurs besoins sauf ceux de l'élève des petits. Ces oiseaux, par conséquent, considérés comme classe ne fréquentent pas les eaux basses et ne sont vus communément que par les marins des eaux profondes, les pêcheurs du large et les voyageurs transatlantiques. Il y a deux familles de cet ordre: les albatros, *Diomedéidae*, et les fulmars, les puffins et les pétrels, *Procellariidae*, qui sont appelés ici, pour la commodité, les Petits nageurs à narines tubulaires à cause de leur moindre taille. Comme il n'y a pas d'ailleurs d'albatros sur notre côte de l'Est nous n'avons affaire ici qu'aux *Procellariidae*.

Valeur économique.—Eu égard à leur habitat pélagique ils n'offrent que peu ou point du tout d'intérêt économique.

FAMILLE—PROCELLARIIDÆ. PETITS PALMIPÈDES À NARINES TUBULAIRES, FULMARS, PUFFINS ET PÉTRELS.

Description générale. Voir la description qui précède.

Traits distinctifs. Les petits nageurs à narines tubulaires sont plus petits que les albatros et sont les seuls membres de cet ordre qu'on trouve sur notre côte de l'est.

Indications sur le terrain. Coloration générale et façons de voler. Ailes étendues avec roideur depuis le corps, puis de longs glissements tranquilles sur des ailes immobiles (Fulmars et Puffins) ou de petits coups d'ailes à leur surface d'un côté de la vague à l'autre côté, les pieds quelquefois servant de rames comme si l'oiseau courait sur la surface (Pétrels).

Habitat. Cette famille est distribuée sur les océans du globe d'un pôle à l'autre. Bien que plusieurs espèces soient régulièrement limitées à l'hémisphère sud ce sont de grands voyageurs et la liste de ceux qui vagabondent sur nos côtes septentrionales est relativement grande. Il y a beaucoup d'espèces sur le compte desquelles on sait peu de chose et nos connaissances touchant plusieurs d'entre elles se bornent à des spécimens ou uniques ou très peu nombreux qui sont tombés sous la main d'un collectionneur. D'autres espèces que celles indiquées ici peuvent se rencontrer sur nos côtes ou même par occasion sur les grands lacs de l'intérieur, mais on ne peut les identifier qu'avec beaucoup de précaution.

Valeur économique.—Bien que se nourrissant presque exclusivement

de poisson et de déchets leur habitat sur les mers profondes leur enlève toute importance économique.

86. **Le Fulmar.** (FULMAR). *Fulmarus glacialis*. L., 19. Grand oiseau de la coloration du goéland (phase claire) ou uniformément foncée, gris ardoisé (phase noire) et narines tubulaires.

Traits distinctifs. C'est l'un des plus grands parmi les petits à narines tubulaires, uniformément gris ou blancs et coloration grise comme celle des goélands.

Indications sur le terrain. Façons de voler, ailes étendues avec roideur, longs glissements, en outre la coloration claire ou grise au lieu de brun foncé comme chez les puffins qui se rapprochent des fulmars par la taille, devraient rendre ordinairement cette espèce reconnaissable à l'état vivant.

Le fulmar se rencontre sous la forme sous-spécifique apparentée sur les deux océans Atlantique et Pacifique. Le fulmar de l'Atlantique présente la forme type.

Nid. Niche en nombreuses troupes sur les bords des falaises rocheuses.

Habitat. Le fulmar est un oiseau du nord de l'Atlantique nichant sous les hautes latitudes et qui voyage vers nos côtes méridionales.

Plus fréquemment aperçu par les chasseurs de phoques et de baleines, dont le métier abandonne des déchets qui attirent beaucoup de fulmars. Ils sont aussi aperçus par les voyageurs transatlantiques en plein océan ou près des côtes.

Valeur économique.—Sans importance économique.

GENRE—PUFFINUS. PUFFINS.

Description générale. Nageurs à narines tubulaires longs de 17 à 20 pouces. Les tubes des narines sont apparents, mais bien moins prononcés que chez le fulmar ou le pétrel.

Traits distinctifs. Les deux seules espèces de l'Est canadien que l'observateur ordinaire rencontrera probablement sont ou très foncées ou paraissent de loin presque d'un noir de corbeau.

Indications sur le terrain. Les ailes longues et étroites tenues très raides et normalement au corps; les longs glissements d'un demi-mille ou d'avantage sur des ailes immobiles, sont des indications caractéristiques. Leur couleur dans les tons bruns devraient distinguer du fulmar qui est gris mais qui a passablement les mêmes façons de voler.

Nid. On sait très peu de choses des habitudes de couvainon des puffins. Il y en a beaucoup qui nichent dans l'hémisphère sud et qui émigrent vers le nord en été.

Les puffins sont d'admirables voiliers, affrontant les tempêtes et les bourrasques avec l'aisance, et la grâce des hirondelles. L'observateur ordinaire ne les voit que rarement, à moins que ce ne soit du pont d'un transatlantique.

Valeur économique.—Glanant à la surface de la haute mer, prenant le menu fretin ou les déchets que jettent les bateaux pêcheurs, les baleiniers surtout, l'influence économique de ces oiseaux est trop minime pour s'apprécier.

89. **Le Grand Puffin.** (GREATER SHEARWATER). *Puffinus gravis*. L., 20. Le plus grand de nos puffins ordinaires, plus clair en dessous, avec les plumes sous la queue gris cendré.

Traits distinctifs. La couleur claire des dessous devrait distinguer cet oiseau-ci du puffin fuligineux et sa couleur brune du dos au lieu de la couleur grise, sa coloration panachée le différencie du fulmar.

Indications sur le terrain. Ses façons de voler, ainsi qu'elles ont été décrites plus haut, en même temps que sa coloration brune et les dessous blancs le distingueraient, à l'état vivant, soit du fulmar soit de l'espèce suivante.

Nid. On sait très peu, peut-être même rien, des habitudes de couvainon de cette espèce. Elle niche probablement dans l'hémisphère sud sur des îlots déserts qui ne sont pas connus au point de vue ornithologique.

Valeur économique.—Sans importance économique.

95. **Le Puffin fuligineux.** (SOOTY SHEARWATER). *Puffinus griseus*. L., 17. Le plus petit de nos deux puffins les plus communs. Brun très foncé, presque noir, un peu plus clair en dessous.

Traits distinctifs. La taille, quand il est possible de l'estimer ou de la mesurer, et coloration générale foncée.

Indications
son aspect à l'é
meilleures indic
Nid. Dan
Habitat. S
été.

Les det
canadiens d'
de leur char
oiseaux mig

Valeur

Description
aussi gros que l
Traits distin
Indications
en bas des vagu

L'origin
de la mer de
geurs sous l
présage de t
rencontre tr
débardeur s:

Valeur
sont très pet
l'homme po

106. **Le**
Petit oiseau d'
Queue fourchu

Traits distin
tingueront du pé

Indications si
cifique le plus sô

Nid. Dans
Habitat. Il

est du continent

C'est là
dant par enc
ses trous sa
dans son tra
tournoyant d
étrange, sou

Valeur é

109. **Le F**
Oiseau un peu
une queue un
tousjours jaunes

Traits distinc
fourche, et les
pélagique se renc
être décrit ici.
plumes blanches

Indications sur le terrain. Les habitudes de son vol comme elles sont décrites au mot puffin et son aspect à l'état vivant, noir très foncé, presque noir de corbeau—telles sont probablement les meilleures indications.

Nid. Dans des creux du sol.

Habitat. Sur les océans de l'hémisphère sud, ne voyage que rarement vers nos rivages en été.

Les deux puffins et le pétrel de Wilson sont les seules espèces d'oiseaux canadiens dont on sait qu'elles nichent à l'extrémité australe et non boréale de leur champ de migration. Les spécimens qu'on voit ici en été sont des oiseaux migrateurs non de couvage.

Valeur économique.—Sans importance économique.

GENRES—OCÉANODROMA. OCÉANITES, PÉTRELS.

Description générale. L'espèce canadienne de pétrels comprend de petits oiseaux, à peine aussi gros que les rouges-gorges et d'une coloration uniforme d'un brun foncé.

Traits distinctifs. Petite taille; coloration généralement d'un brun fuligineux, le croupion blanc.

Indications sur le terrain. Taille, couleur comme ci-dessous et l'habitude de courir de haut en bas des vagues comme s'il marchait sur l'eau sont les indicateurs du pétrel.

L'origine du nom de pétrel vient de Pierre qui marcha sur les eaux de la mer de Galilée. Ces oiseaux sont aussi connus des marins et des voyageurs sous le nom de «Poulets de la mère Carey» et leur présence est un présage de tempête, à ce qu'on dit. Malgré leur taille très petite on les rencontre très loin sur la mer et ils ne sont aperçus que rarement par le débardeur sauf dans le voisinage de leurs nids.

Valeur économique.—Les pétrels, quoique se nourrissant de poisson, sont très petits et leur habitat est trop éloigné du théâtre des travaux de l'homme pour avoir une importance économique appréciable.

106. **Le Pétrel de Leach.** (LEACH'S PETREL). *Oceanodroma leucorhoa*. L., 8. Petit oiseau d'un brun fuligineux, un peu plus clair en dessous, avec un croupion blanc. Queue fourchue d'un demi-pouce de profondeur.

Traits distinctifs. Sa queue fourchue, sa coloration un peu plus claire, et ses pieds noirs le distingueront du pétrel de Wilson, le seul qu'on pourrait confondre avec lui.

Indications sur le terrain. La petite dimension de la fourche caudale est peut-être le signe spécifique le plus sûr à l'état vivant.

Nid. Dans les creux du sol ou sous les pierres.

Habitat. Il habite les deux océans, le Pacifique et l'Atlantique du Nord, couvant sur le côté est du continent depuis le Groenland jusqu'à l'état du Maine.

C'est là le seul pétrel qui couve sur nos côtes. Il peut être très abondant par endroits dans la saison de couvaison et le sol peut être criblé de ses trous sans que l'on puisse même soupçonner sa présence. Il reste dans son trou pendant le jour, mais de nuit il en sort en grande quantité tournoyant dans le voisinage désert, faisant entendre un petit chant sourd, étrange, souvent répété et d'un effet surnaturel.

Valeur économique.—Sans importance.

109. **Le Pétrel de Wilson.** (WILSON'S PETREL). *Oceanites oceanicus*. L., 7. Oiseau un peu plus petit que le pétrel de Leach, de la même couleur générale, mais avec une queue un peu plus foncée, moins fourchue, et avec les palmures des doigts presque toujours jaunes au lieu de tout à fait noires.

Traits distinctifs. De plus petite taille; coloration un peu plus foncée; queue carrée au lieu de fourchue, et les palmures jaunes des doigts distingueront ce pétrel de celui de Leach. Le pétrel pélagique se rencontre aussi, dit-on, au large de la côte de l'Atlantique, mais il est trop rare pour être décrit ici. Il faudrait une preuve irrécusable de sa présence. On le reconnaît parce que les plumes blanches du croupion ont les bouts noirs.

Indications sur le terrain. La queue carrée au lieu de légèrement fourchue est le signe probablement le plus digne de confiance, pour identifier ce pétrel à l'état vivant; mais encore faut-il un examen très exact pour faire la distinction.

Nid. Dans des trous du sol ou des crevasses de rochers.

Habitat. Du pôle antarctique au Labrador, et jusqu'aux îles britanniques à travers l'Atlantique.

Le pétrel de Wilson est remarquable parce que c'est une des très rares espèces de l'Amérique du Nord qui nichent à l'extrémité sud de leur champ de migration. Aussi les individus que nous voyons ici en été sont migrateurs et ne nichent pas.

Ordre—Steganopodes. Palmipèdes totipalmés..

Description générale. Oiseaux avec membranes entre les quatre doigts, faisant trois membranes au lieu des deux ordinaires comme dans d'autres (fig. 6, p. 21).

Traits distinctifs. Les caractères des pieds sont toujours des éléments servant à distinguer ces oiseaux.

Les totipalmés canadiens se divisent en trois familles: *Sulidae*, les fous de Bassan; *Phalacrocoracidae*, les cormorans; et *Pelecanidae*, les pélicans. Il y a d'autres familles qu'on a rencontrées ou qu'on peut rencontrer par occasion au Canada, mais qui sont trop rares pour être mentionnées ici.

Valeur économique.—Cet ordre, composé de gros oiseaux tous se nourrissant de poissons et plusieurs fréquentant en grand nombre des eaux soit près des côtes soit à l'intérieur des terres, n'est pas à l'abri de quelque soupçon quant à ses effets économiques. Toutefois il ne faudrait prendre aucune mesure contre aucune espèce avant d'avoir trouvé, par une recherche soigneuse, que la chose fût nécessaire.

FAMILLE—SULIDÆ. FOUS OU FOUS DE BASSAN.

Description générale. Gros oiseaux, la plupart blancs à l'âge adulte; bec aigu et droit sans crochet ni poche prononcée de la gorge ou du gosier.

Traits distinctifs. Les caractères du bec dans cette famille servent à la distinguer de tous les oiseaux sauf de ceux des tropiques, dont une espèce a été importée de Terre-Neuve. Mais comme les oiseaux des tropiques ont les plumes médianes de la queue énormément allongées il y a peu de chances de confusion, alors même qu'ils ne seraient pas trop rares dans nos eaux pour mériter une description détaillée.

Les fous de Bassan sont essentiellement des oiseaux de mer qu'on ne voit jamais loin de la mer sauf comme vagabonds. La famille, à tout prendre, est tropicale, et il n'y en a qu'une seule espèce au Canada.

117. **Le Fou de Bassan.** (VIEUX FRANÇAIS—J. CARTIER-MORGAUD) MARGOT. (GANNET). *Sula bassana*. L., 35. C'est un palmipède à membranes complètes avec un bec droit sans crochet prononcé ni poche remarquable de la gorge ou du gosier.

Traits distinctifs. Les caractères du bec sont distinctifs. L'individu adulte est tout à fait blanc à l'exception des primaires noires et d'une riche couleur crème répandue sur la couronne et le derrière du cou. Le jeune oiseau de l'année est brun grisâtre, plus clair en dessous, et chaque plume a un petit V blanc à la pointe qui répand une bigarrure sur le tout. Diverses phases intermédiaires tachetées se présentent parmi ces plumages.

Indications sur le terrain. Un corps d'un blanc éblouissant et des bouts d'ailes toutes noires chez l'adulte sont des indications sûres. L'habitude de plonger au vol et de tomber dans l'eau la tête la première comme une flèche pour rester sous l'eau pendant un certain temps est également caractéristique. Les sternes plongent aussi au vol mais elles s'élèvent de l'eau presque immédiatement et rarement elles disparaissent de la vue comme les fous de bassan. Il en serait même autrement que la grande différence de taille serait un témoignage suffisant.

Nid. Niche en bandes nombreuses sur les étages rocheux des falaises maritimes; nids faits d'algues marines.

Habitat. 1
Rock au large
endroits situés

Le fou
et plus ordi
des deux riv
aliment ou
d'une statio
il ne reste
bientôt pri

Valeur
de faire bea
La majeure
ou tout près
faire que pu
poissons qu

Description
minant par un

Traits distin

Indications
de leurs ailes
vole le cormo
derrière comm
coloration unif

C'est u
dans l'est d

119. **Le**
36. Voir la d

Traits distin
ment être disti
a un jet de blanc
sa taille plus gra
L'absence d'aig
détermination d

Indications
il est à peine po

Nid. Semb
Habitat. Di
à la côte de l'Es

Lors mé
des cormora
européenne
autour des il

Valeur é
économique :

120. **Le**
auritus. L., 30.

Traits distinc
Dans le plumage
les côtes est un

Habitat. Les deux côtés du nord de l'Atlantique nichant au Canada seulement sur le Bird Rock au large des îles de la Madeleine et sur l'île Bonaventure, comté de Gaspé (Québec), deux endroits situés dans le golfe du St-Laurent.

Le fou de Bassan avait autrefois un habitat beaucoup plus étendu et plus ordinaire qu'aujourd'hui; il nichait sur plusieurs flots rocheux des deux rives du nord de l'Atlantique. N'ayant que peu de valeur comme aliment ou autrement, sauf dans les plus pauvres populations, il a été refoulé d'une station de couvaion à l'autre, si bien que dans le nouveau monde il ne reste que deux de ces stations et, à moins que des mesures ne soient bientôt prises, celles-là aussi auront le sort des autres.

Valeur économique.—Bien que les fous de Bassan aient été accusés de faire beaucoup de tort aux pêcheries, leurs dégâts ont été fort exagérés. La majeure partie de la vie des fous de Bassan se passe sur la haute mer ou tout près. Quand ils viennent sur le rivage pour nicher, ils ne peuvent faire que peu d'impression sur les immenses bancs de harengs et d'autres poissons qu'ils poursuivent.

FAMILLE—PHALACROCORACIDÉ. CORMORANS.

Description générale. Grands oiseaux de coloration noire ou très foncée, avec un bec se terminant par un véritable crochet, et avec une petite poche à la gorge ou au gosier.

Traits distinctifs. Bec et petite poche au gosier.

Indications sur le terrain. En vie les cormorans ressemblent un peu aux plongeurs mais l'action de leurs ailes est assez caractéristique et peut être plus facilement reconnue que décrite. Quand il vole le cormoran porte son cou tendu et ses pieds cachés sous la longue queue, au lieu de les traîner derrière comme fait le plongeur. Sur l'eau on le reconnaît facilement à sa queue très visible et de coloration uniforme.

C'est une famille cosmopolite dont deux espèces seules se trouvent dans l'est du Canada.

119. **Le Cormoran ordinaire.** (COMMON CORMORANT). *Phalacrocorax carbo*. L, 36. Voir la description de la famille, précédemment donnée.

Traits distinctifs. Si la description de la famille est présente à l'esprit, cette espèce peut facilement être distinguée de toutes les autres sauf de la suivante. L'individu adulte de cette espèce a un jet de blanc à la base de la poche du gosier et un autre sur le côté. Quant au reste du plumage sa taille plus grande et quatorze au lieu de douze plumes de la queue sont une indication très claire. L'absence d'aigrette même chez l'adulte n'est pas un témoignage auquel on puisse se fier pour la détermination de l'espèce (voir l'espèce suivante).

Indications sur le terrain. À moins que la taille ou les marques blanches ne soient très visibles il est à peine possible de distinguer les deux cormorans à l'état vivant.

Nid. Semblable à celui de l'espèce suivante.

Habitat. Dans l'hémisphère nord des trois continents. Au Canada, il est étroitement limité à la côte de l'Est et n'est aperçu que rarement à l'intérieur.

Lors même qu'on l'appelle «ordinaire» ce cormoran est le plus rare des cormorans dans l'est du Canada. L'espèce se rencontre sur la côte européenne et y fut appelé ordinaire à cause de la quantité qu'il y en a autour des îles britanniques.

Valeur économique.—À cause de sa rareté il est de peu d'importance économique au Canada.

120. **Le Cormoran à aigrettes.** (DOUBLE-CRESTED CORMORANT). *Phalacrocorax auritus*. L, 30. (Voir la description de cette famille à la page précédente.)

Traits distinctifs. Cette espèce peut facilement se confondre avec la précédente seulement. Dans le plumage de l'adulte l'absence d'un blanc quelconque à la base de la poche du gosier et sur les côtes est un signe indicateur. Pour les autres plumages, la taille et la présence de douze au

lieu de quatorze plumes à la queue est un trait distinctif sûr. Au commencement du printemps les aigrettes filamenteuses sur les côtés de la tête, au lieu d'une fraise déformée comme dans les espèces précédentes, sont caractéristiques; mais ces traits se perdent de bonne heure dans la saison, avant la couvaison, et par conséquent, sont d'un médiocre secours pour déterminer l'espèce.

Indications sur le terrain. Bien que les cormorans se reconnaissent aisément aux caractères donnés dans le titre de la famille, la taille et la présence ou l'absence des taches blanches sont à peu près les seuls traits qui servent à distinguer les deux espèces à l'état vivant.

Nid. Sur le sol dans les rochers ou sur le bord des falaises; quelquefois dans les buissons ou dans les arbres plutôt bas; dans les assemblages massifs de branches ou de plantes.

Habitat. Le cormoran à aigrettes se rencontre dans le golfe du Saint-Laurent et sur les lacs des provinces de la prairie. Il est plutôt rare quoique peut-être migrateur régulier sur les grands lacs.

SOUS-ESPÈCES. Ceux de l'Amérique du Nord se divisent en quatre sous-espèces dont une seule appartient au champ que couvre cet ouvrage, le cormoran à aigrette de l'Est, le type de cette race.

C'est le cormoran le plus ordinaire dans l'est du Canada. Contrairement aux espèces précédentes il n'est pas strictement marin et se rencontre sur les eaux douces aussi bien que sur les eaux salées. Il s'empare de sa proie en plongeant et en la poursuivant sous l'eau. Contrairement au fou de Bassan il ne plonge pas en volant mais se pose sur la surface et puis pénètre sous l'eau d'un mouvement serpentin, en glissant comme le pigeon. Il ne reste pas sous l'eau plus de quarante secondes en règle générale.

Valeur économique.—Le danger qu'il y a à généraliser hâtivement sur la foi d'observations superficielles a été bien illustré par une étude des aliments que prennent ces oiseaux dans le voisinage des rivières à saumon de la Gaspésie.¹

Quoique communément accusés de faire tort aux pêcheries de saumon en dévorant les petits poissons, le menu fretin, un examen très soigneux d'environ trente spécimens a démontré que les centaines d'oiseaux présents mangeaient un poisson qui n'avait aucune valeur économique, et aucun reste de salmonidés ne fut trouvé dans leurs corps. Il est probable que les anguilles, les chabots et autres poissons que prend le cormoran rendent cette espèce plutôt utile que nuisible au saumon et compensent pleinement les quelques saumons qu'il peut prendre à l'occasion. C'est là un bon exemple de la prudence qui est nécessaire avant de condamner aucune espèce d'oiseaux.

FAMILLE—PELECANIDAE. PÉLICANS

Description générale. Gros oiseau avec un bec très long, aplati, une énorme poche de gorge ou de gosier.

Traits distinctifs. Cette énorme poche de la gorge, qui tient un gallon et davantage, et le long bec aplati sont des traits éminemment distinctifs.

Ces oiseaux extraordinaires sont trop rares dans l'est du Canada pour qu'il en soit parlé spécialement. Il y a deux espèces qui ont été prises quelquefois, le pélican blanc, *Pelecanus erythrorhynchos*, forme qui se rencontre dans l'Ouest, qu'on peut trouver vers la frontière du Manitoba puis dans l'Ouest, mais dans l'Est seulement comme vagabonds; le pélican brun, *Pelecanus occidentalis*, un oiseau méridional de présence purement fortuite au Canada. Les noms descriptifs sont suffisamment explicatifs

1. Le cormoran à aigrette, *Thalacrocorax auritus*, et ses rapports avec les industries du saumon dans le golfe St-Laurent. Min. des Mines, Com. géol., Canada, Bull. n° 13, Série biologique n° 5, 1915.

pour les di-
une pointe
prononcée

Ordre.—

Description
plus large vers
(figures 7, 8, 9,

Traits disti

Indications
des canards et
superficielle av
à fait comme
dérange, facilit

Nid. Hab
nids abandonn
sont capables d
à savoir comm
c'est là un suje

Habitat. I
partie de l'espè
regardés comm
longtemps que
des Carolines,

L'ordre
des harles,
masse des
Une des pl
ces diverses
trairement
plusieurs d
et ne peuv
période de
particulier
rapproche
oiseaux se
façon à n'ê
de la chass
mais le pet
cependant
reconnaître

Valeur
nominique, u
d'autres ois
n'ont qu'un
d'autres rai
ces oiseaux
leur lutte p
tués par les
alimentaires

¹Une autre se
qui se montre so
d'andéridés. Ce
doit pas être reg

pour les différencier. Le pélican blanc est de fait absolument blanc avec une pointe noire à l'aile dans tous les plumages; toute autre couleur prononcée est l'indice d'une autre espèce.

Ordre.—Anseres. Palmipèdes avec bec en crible. Palmipèdes lamellirostres.

Description générale. Oiseaux nageurs avec quatre doigts et deux membranes, ayant un bec plus large vers l'extrémité et bordé de petites projections pareilles à des dents ou à de fines lamelles (figures 7, 8, 9, 10, p. 21) au moyen desquelles ils filtrent l'eau de leurs aliments.

Traits distinctifs. Tels que ci-dessus.

Indications sur le terrain. Le cou tendu, la queue en évidence, les rapides battements d'ailes des canards et des oies nous sont bien connus. Dans l'eau quelques espèces ont une ressemblance superficielle avec les plongeurs, mais le bec droit, étroit diffère de celui du canard, la queue tout à fait comme celle des canards, et leur disposition à s'envoler plutôt qu'à plonger quand on les dérange, facilite la différenciation.

Nid. Habituellement sur le sol, quelquefois dans des arbres creux, et quelquefois dans les nids abandonnés de corbeaux ou d'autres grands nids; mais rarement loin de l'eau. Les petits sont capables de courir çà et là et de se lancer à l'eau aussitôt après être sortis de l'œuf; mais quant à savoir comment ils sont portés à terre de la hauteur d'un arbre de 20 à 30 pieds, où est le nid, c'est là un sujet sur lequel il y a des opinions divergentes.

Habitat. Les anséridés ont un habitat répandu sur toute la terre. En Amérique la majeure partie de l'espèce couve au nord de la frontière internationale. Ils peuvent, par conséquent, être regardés comme des oiseaux d'habitat boréal. En hiver quelques-uns restent au Canada aussi longtemps que les cours d'eau sont ouverts, les autres gagnent le sud, même les eaux plus chaudes des Carolines, le golfe du Mexique et au delà.

L'ordre des anséridés ne renferme qu'une famille—les anatidés composés des harles, canards, oies et cygnes, et comprend, par conséquent, la grande masse des gros volatiles sauvages auxquels les chasseurs font la guerre. Une des plus grandes sources de confusion, quand il s'agit de distinguer ces diverses espèces c'est le cas qu'on appelle l'éclipse du plumage. Contrairement à la règle qui gouverne les changements dans le plumage, plusieurs de ces espèces jettent à la fois toutes les plumes de leurs ailes, et ne peuvent donc pas voler avant de s'être remplumées. Pendant cette période de relative impuissance beaucoup de mâles revêtent un plumage particulier d'un caractère moins voyant que le plumage normal, et qui se rapproche ordinairement de celui de la femelle. Dans l'entre-temps les oiseaux se retirent dans les parties les plus reculées de leur habitat de façon à n'être vus que rarement par le passant. Lorsque s'ouvre le temps de la chasse la plupart de ces oiseaux sont sortis du plumage de l'éclipse, mais le petit nombre de ceux qui en gardent encore les traces est cependant assez grand pour augmenter le chiffre des plumages qu'on peut reconnaître et pour en compliquer la différenciation.¹

Valeur économique.—L'ordre des anséridés est, au point de vue économique, un des plus importants parmi les oiseaux; non pas comme pour d'autres oiseaux, à cause de leurs habitudes alimentaires, car celles-ci n'ont qu'une influence négative dans les affaires humaines, mais pour d'autres raisons. En effet, aux premiers temps de la colonisation du pays ces oiseaux fournirent des aliments très importants aux habitants dans leur lutte pour la vie; et même aujourd'hui le nombre annuel des oiseaux tués par les chasseurs, constitue un appoint considérable à nos ressources alimentaires.

¹Une autre source assez commune de confusion, c'est l'existence trop fréquente d'une coloration rouge rouillé qui se montre souvent sur diverses parties de la tête ou du corps et qui est commune à beaucoup d'espèces d'anséridés. Cette couleur est due à un dépôt ferrugineux dans l'eau où habitent les oiseaux en question, et ne doit pas être regardée comme la coloration normale du plumage.

FAMILLE.—ANATIDÆ. CANARDS OIES ET CYGNES.

Description générale. Comme cette famille est la seule comprise dans l'ordre des ansérinés la description sous le titre antérieur s'applique ici également et ne demande pas à être répétée.

La famille est divisée en cinq sous-espèces: les merginés ou harles; les anatidés ou canards de rivière; les fuligulinés ou canards de mer; les ansérinés ou oies; et les cyninés ou cygnes. Pour les caractères de ces oiseaux, voir sous les titres qui les concernent et qui suivent.

Sous-famille—Merginæ. Harles, Canards pêcheurs, Becs-scie.

Description générale. Des canards mangeurs de poissons, avec un bec plus cylindrique, en pointe, spatulé ou aplati, moins spatulé ou aplati que chez les autres canards (fig. 7, p. 21). Les bords tranchants des mandibules ont une série de dentelures d'où est venu le nom populaire de «bec-scie». L'ongle à la pointe du bec forme un crochet petit mais bien visible. Le doigt postérieur est développé pareil à celui des canards de mer, mais très différent du doigt postérieur des canards de rivière dont il va être question. Les mâles ont des couleurs brillantes et frappantes, presque toujours blanches et noires. Les femelles ont des couleurs sombres avec la tête et le cou rouges. La plupart des plumages ont des aigrettes. Chez les femelles et les jeunes oiseaux les aigrettes sont ébréchées et sans formes bien distinctes.

Traits distinctifs. Le bec est toujours un signe caractéristique qui distingue facilement les harles des canards de mer qui leur ressemblent par la forme du doigt postérieur.

Indications sur le terrain. Forme de canard très évidente combinée avec le bec long, mince, cylindrique, et légèrement crochu.

Nid. Les harles sont pour la plupart des hôtes de rivières à l'époque de la couvaison, nichant soit sur le sol soit dans les arbres creux.

Habitat. C'est une petite famille dont les membres habitent l'hémisphère nord.

Les harles se nourrissent de poissons et de mollusques saisis sous l'eau et en plongeant; pour cette méthode de s'alimenter leur bec crochu et dentelé est merveilleusement fait et utile. Ces oiseaux fréquentent pendant la période de la couvaison, surtout les eaux douces, bien qu'ils se voient en grand nombre près de la mer. Leur chair n'est pas recherchée quoique de jeunes oiseaux d'automne bien accommodés ne soient pas à dédaigner.

Valeur économique.—Les harles mangent le poisson et, dans certaines eaux, comme vers la source des saumons de rivières, ils font des dégâts appréciables. Les cours d'eau à truites sont trop petits pour ces espèces, et comme on n'a point examiné avec soin le contenu des estomacs il ne faudrait pas condamner ces harles sans une connaissance plus exacte du sujet.

129. **Le Harle d'Amérique.** (AMERICAN MERGANSER, SAW-BILL, GOOSANDER,) *Mergus americanus.* L., 25. De la même apparence générale que l'espèce suivante (planche IIIA) mais les mâles sans aigrettes ni la bande rouge de la poitrine.

Traits distinctifs. Voir l'espèce suivante.

Indications sur le terrain. La coloration générale et l'absence des aigrettes ou de la bandepectorale chez le mâle sont distinctives. Quand ils volent, la tête longue, tendue avec le cou, et le dos généralement gris distingueront les femelles de ces deux merginés, d'avec les autres canards qui ont des plaques blanches aux ailes.

Nid. Dans les arbres creux ou dans les cavités des rochers près de l'eau; le nid est fait avec des herbes.

Habitat. Il se trouve partout sur le continent; il niche dans tout l'est du Canada sauf dans les parties méridionales.

Le harle d'Amérique est un oiseau des étendues d'eau plutôt petites que grandes, de là vient qu'il est moins commun sur les plus grands lacs ou sur la mer que son semblable à poitrine rousse. À cela près les remarques faites sur cette dernière espèce s'appliquent au harle d'Amérique car leurs habitudes sont pareilles.

130. **L**
gus serrator.

Traits dis-
col blanc très
espèce et de l
légère et les
tête n'est pas
même couleur

Indication:
de la gorge su
du harle d'An
feront connaît
blanches aux

Nid. Sur
Habitat.
sauf dans les

C'est un
aperçu sur

Valeur é

131. **L**
C'est le plus
frappantes av
est une aigre
sur la couron
ment très pu
sans éclat av
un peu rouge

Traits dist
ricains. La b

Indication:

Nid. Da

Habitat.

en des endroit

Le pet
cours d'eau
ajouté à la
chasse du g

Valeur
accusations

Description
plat, avec de
projections en
modifié en ur

Traits dist
comme c'est d

Indications
tinés des harle
et plutôt incer
de la sous-fam
une classe.

Nid. Sur
Habitat. (

Ainsi
quentent n

130. **Le Harle à poitrine rousse.** BEC-SCIE. (RED-BREADED MERGANSER). *Mergus serrator*. L, 22. (Planche IIIA).

Traits distinctifs. L'aigrette hérissée et la bande pectorale rougeâtre séparée de la tête par un col blanc très en vue, sont suffisantes pour reconnaître le mâle. La femelle et les jeunes de cette espèce et de la dernière sont très semblables. Le bec est cependant de charpente beaucoup plus légère et les narines sont un peu plus rapprochées de la base que chez le harle d'Amérique. La tête n'est pas d'un brun aussi riche et la gorge supérieure est d'une teinte un peu plus claire de la même couleur et non pas blanche comme dans cette dernière espèce.

Indications sur le terrain. L'aigrette et la bande pectorale du mâle adulte et l'absence du blanc de la gorge supérieure chez les femelles et les jeunes oiseaux distingueront le harle à poitrine rousse, du harle d'Amérique. L'apparence grise du dos et la longueur de la tête et du cou tendus en avant feront connaître l'espèce comme étant un mergin différent d'autres canards qui ont des plaques blanches aux ailes.

Nid. Sur le sol près de l'eau, quelquefois sur les arbres.

Habitat. Se rencontre plus ou moins dans tout le Canada, nichant partout où on le trouve sauf dans les parties méridionales.

C'est un oiseau des eaux libres de glace, aussi est-il plus souvent aperçu sur les lacs ouverts et sur mer, que ne l'est l'espèce précédente.

Valeur économique.—Voir au titre de la sous-famille.

131. **Le Petit Harle.** (HOODED MERGANSER). *Lopholytes cucullatus*. L, 17-50. C'est le plus petit de nos harles. Le mâle est un oiseau de couleurs blanche et noire très frappantes avec des côtés d'un beau brun châtaigne. Son ornement distinctif, le capuchon, est une aigrette plate, pareille à un disque, partant de la base du bec, en forme d'arche sur la couronne, rencontrant le cou à la base de la tête et d'une coloration blanche généralement très pure avec un rebord noir étroit. La femelle est un oiseau de couleur presque sans éclat avec un corps brun sombre, plus clair en dessous, et avec une aigrette hérissée un peu rougeâtre, de forme semblable à celle représentée (Planche IIIA).

Traits distinctifs. Le capuchon du mâle ne ressemble à rien de ce que portent les oiseaux américains. La femelle peut toujours être distinguée des autres harles par sa petite taille.

Indications sur le terrain. Le capuchon du mâle, l'aigrette rougeâtre et la taille de la femelle.

Nid. Dans les arbres creux.

Habitat. À travers tout le continent, mais plus rare dans l'Est que dans l'intérieur. Niche en des endroits choisis partout où on le trouve au Canada.

Le petit harle est un oiseau de l'intérieur, des étangs paisibles et des cours d'eau en pays boisés. C'est le plus comestible des harles; ce fait, ajouté à la déforestation continue et au peu d'empêchements mis à la chasse du gibier, expliquent que cet oiseau disparaît de plus en plus.

Valeur économique.—Il est douteux qu'on puisse porter de sérieuses accusations contre le petit harle, comme se repaissant d'animaux utiles.

Sous-famille—Anatinæ. Canards de rivières et d'étangs.

Description générale. Canards typiques avec le bec aplati et en spatule, terminé par un ongle plat, avec des lamelles filtres le long des rebords intérieurs (fig. 8, p. 21). au lieu de petites projections en forme de dents. Les pieds avec un doigt postérieur petit quoique bien formé, non modifié en un lobe plat ou appendice semblable à une nageoire.

Traits distinctifs. Le bec distinguera les canards de rivière des harles et le doigt postérieur comme c'est dit plus haut, des canards de mer.

Indications sur le terrain. Quand la vue sera des plus favorables, le bec fera distinguer les anatinés des harles. La plus grande longueur du cou et le corps plus mince sont des indications faibles et plutôt incertaines pour distinguer ces canards-là des canards de mer ou de baie. Les membres de la sous-famille sont plus facilement reconnaissables à l'état vivant comme espèce que comme une classe.

Nid. Sur le sol, à l'exception du canard huppé.

Habitat. Comme formant une classe les canards d'étang et de rivière, sont plus abondants dans l'intérieur que sur l'un ou l'autre littoral.

Ainsi que leur nom l'implique les canards de rivière et d'étang fréquentent nos petites étendues d'eau de préférence aux plus grandes. Ils

prennent leur nourriture à la surface en enfonçant la moitié antérieure de leur corps et l'atteignant sous l'eau. L'aliment est massé dans le bec et l'eau en est sortie par pression, les lamelles du bec retenant les parties solides.

Valeur économique.—Ce sont absolument des oiseaux vivant sur l'eau, de végétaux et d'insectes, par conséquent leurs habitudes alimentaires ne constituent aucune menace. On a démontré récemment que les canards se nourrissent beaucoup de larves de moustiques et que le bien qu'ils font ainsi est de surprenante importance. Grâce à une expérience concluante on a vu qu'une paire de canards dans un petit étang a fait plus pour diminuer ce fléau qu'une grande bande de dorades. Comme gibier ils sont très importants, voir p. 13.

132. **Le Canard ordinaire.** (MALLARD, GREEN-HEAD). *Anas platyrhynchos* L., 23. (Planche IIIB).

Traits distinctifs. Le mâle ne peut être confondu avec aucun autre canard sauvage quoique plusieurs espèces domestiques s'en rapprochent de très près. La femelle est souvent regardée comme appartenant à une autre espèce et est quelquefois appelée Canard gris (Grey duck). Il y a plusieurs autres canards qui s'en rapprochent par la coloration mais le miroir violet avec la raie blanche devant et derrière le miroir servira toujours à la distinguer.

Indications sur le terrain. Tête verte et anneau blanc autour du cou sont des marques très visibles pour le mâle. Le miroir avec ses raies blanches fera reconnaître la femelle à l'état vivant. Sa queue a aussi une blancheur générale au vol, laquelle est tout à fait caractéristique.

Nid. Sur le sol, habituellement, sous les hautes herbes ou roseaux, non loin de l'eau, quoique parfois à une grande distance dans l'intérieur.

Habitat. Il est de fait répandu d'un bout à l'autre du Canada, mais moins commun dans l'extrémité orientale. Niche partout au Canada, sauf là où il est dérangé par la colonisation.

C'est le «canard sauvage» par excellence, et il est connu sous ce nom du chasseur de l'ancien monde aussi bien que du nouveau. Il est l'ancêtre duquel sont issues nos variétés domestiques, et presque toute bande un peu mélangée montrera les têtes vert-noir, le col blanc, ou les couvertures supérieures et recourbées de la queue, indiquant le retour à la forme primitive. Tout en étant un des meilleurs oiseaux pour la table c'est un des canards les plus sauvages, fait qui explique que cet oiseau ne se reproduise qu'en petit nombre dans les localités qui confinent à la civilisation.

133. **Le Canard noir.** (BLACK DUCK, DUSKY DUCK, BLACK MALLARD). *Anas rubripes* L., 22. Planche IVA.

Traits distinctifs. La coloration généralement sombre ajoutée à la taille rend cette espèce absolument reconnaissable parmi les canards de rivière.

Indications sur le terrain. La taille, la coloration sombre, et l'éclat argenté des ailes de dessous qu'on voit quand il vole. L'absence de la raie blanche qui délimite le miroir en arrière le fera distinguer du canard ordinaire.

Nid. Sur le sol, dans l'herbe près de l'eau.

Habitat. Le canard noir est une espèce plus propre aux régions de l'Est que le canard ordinaire et n'est pas trouvé communément à l'ouest des grands lacs. Il niche dans l'est du Canada où qu'on le rencontre.

Aujourd'hui que le canard huppé devient de plus en plus rare, le canard noir est celui qui niche le plus ordinairement dans les parties méridionales du Canada, et le seul qui puisse actuellement être appelé un canard nicheur ordinaire dans le voisinage des grands lacs inférieurs. Autrefois presque chaque petit lac ou étang avait sa nichée de canards noirs, mais, par suite du dessèchement des marais et des obstacles apportés par l'homme à la couvaison, celle-ci est désormais restreinte aux plus grands marais ou aux endroits les moins accessibles.

C'est formes du nombre de sous-espèce

Valeur surtout dans il glane la r de mal. E alors, comm aussi ne pe

135. **Le** 19.50. C'est femelle du can

Traits disti être facilement

Indications

Nid. Sur l

Habitat. I presque absent

137. **Le** cana. L., 19. blanches, une r légère teinte r

Traits disti pour la femelle blanc très pur.

Indications chez le mâle; l distinguant la f

Nid. Sur l

Habitat. P

Etroite fois sur nos

139. **La** 14.50. C'est derrière l'œil e blanc en dedso Elle a le miroi

Traits disti l'espèce suivant de ce dernier et

Indications bleu crayeux su

Nid. Sur l

Habitat. I du Canada nich des grands lacs.

C'est u de voler en chasseurs. Canada, ma

140. **La** 16. Planche I

Traits disti la sarcelle à aile cas. Le canard ailes bleues et l'

C'est un point discuté que celui de savoir s'il y a une ou deux formes du canard noir. Vers la fin de l'automne on prend un bon nombre de très gros oiseaux à pattes rouges. Quant à savoir si c'est une sous-espèce distincte, cela n'est pas décidé de façon concluante.

Valeur économique.—Quoique le canard noir fréquente souvent, surtout dans la saison de la couvaison, la lisière des champs cultivés où il glane la nourriture qu'il y peut trouver, il ne fait que peu ou même point de mal. En cette saison il n'y a pas de grandes récoltes à endommager et, alors, comme en tout temps, il fait plus attention à ce qui vit dans l'eau, aussi ne peut-on imputer aucun dégât à cette espèce.

135. Le Canard chipeau. (GADWALL, GREY DUCK.) *Chauleasmus streperus*. L, 19-50. C'est un canard gris finement moucheté ou vermiculé des mêmes tons que la femelle du canard ordinaire, mais avec les épaules d'un rouge marron et un miroir blanc.

Traits distinctifs. Le miroir blanc est toujours indicatif. Les femelles peuvent, à cela près, être facilement prises pour de petits canards ordinaires ou des canards d'Amérique.

Indications sur le terrain. Miroir blanc et apparence générale grisâtre.

Nid. Sur le sol, dans l'herbe ou sous les buissons.

Habitat. Presque cosmopolite. C'est un des plus rares canards sur les grands lacs inférieurs; presque absent sur la côte de l'Est, plus commun à l'Ouest où il couve.

137. Le Canard d'Amérique. (BALDFATE, AMERICAN WIDGEON.) *Mareca americana*. L, 19. Canard grisâtre de taille moyenne. Le mâle a les épaules et le bonnet blancs, une raie verte large en travers de l'œil, un miroir noir avec reflets verts, et une légère teinte rose sur la poitrine et le dos.

Traits distinctifs. Le mâle se distingue facilement; la femelle pourrait aisément se prendre pour la femelle du canard ordinaire ou du canard chipeau, n'était-ce le dessous d'un blanc très pur.

Indications sur le terrain. La couronne blanche et la raie verte de l'œil sont caractéristiques chez le mâle; les dessous blancs et la terminaison brusque de la poitrine brune contre les dessous distinguent la femelle à l'état vivant.

Nid. Sur le sol, dans l'herbe ou sous les buissons.

Habitat. Presque tout le Canada; rare sur la côte de l'Atlantique; plus commun à l'ouest.

Etroitement apparenté au canard siffleur d'Europe qu'on a quelquefois sur nos côtes et auquel il ressemble beaucoup.

139. La Sarcelle à ailes vertes. (GREEN-WINGED TEAL.) *Nettion carolinense*. L, 14-50. C'est le plus petit de nos canards. Le mâle a une tête couleur marron, une raie derrière l'œil et le miroir vert irisé; dos finement vermiculeux, poitrine mouchetée; presque blanc en dessous. La femelle est un oiseau d'un brun terne beaucoup plus clair en dessous. Elle a le miroir vert caractéristique de l'espèce.

Traits distinctifs. La taille différenciera toujours ce petit canard de tous les autres, sauf de l'espèce suivante et du petit bucéphale, mais la présence du miroir vert et brillant le distinguera de ce dernier et la complète absence d'un bleu crayeux sur les épaules le distinguera du premier.

Indications sur le terrain. La petite taille en même temps que le miroir vert et l'absence de bleu crayeux sur les épaules sont des signes pour reconnaître un plumage quelconque.

Nid. Sur le sol près de l'eau.

Habitat. D'un bout à l'autre du continent, mais rare dans l'extrême Est. La race dans l'est du Canada nichait parfois et probablement à l'origine, communément dans la région inférieure des grands lacs.

C'est un des canards de la qualité la plus recherchée. Son habitude de voler en grandes bandes et à toute vitesse le fait bien connaître des chasseurs. La sarcelle d'Europe vient quelquefois se fourvoyer jusqu'au Canada, mais c'est très rare.

140. La Sarcelle à ailes bleues. (BLUE-WINGED TEAL.) *Querquedula discors*. L, 16. Planche IVB.

Traits distinctifs. La taille distinguera la sarcelle à ailes bleues de tout autre canard sauf de la sarcelle à ailes vertes et du petit bucéphale, et le bleu clair sur les ailes servira dans ces derniers cas. Le canard souchet a aussi un bleu identique sur l'aile, mais la petite taille de la sarcelle à ailes bleues et l'absence du large bec à spatule différencient ces deux espèces.

Indications sur le terrain. Petite taille en même temps que la marque blanche sur la face, les dessous sombres et le bleu crayeux sur les ailes.

Nid. Sur le sol, au milieu des herbes.

Habitat. D'un bout à l'autre du continent; aujourd'hui plutôt rare dans l'extrême Est. C'est une des rares espèces qui couvent encore régulièrement, quoique de façon éparse dans la région inférieure des grands lacs.

Une sarcelle de l'Ouest, la sarcelle Cannelle, est quelquefois signalée dans l'est du Canada, mais la plupart du temps il s'agit de la sarcelle à ailes bleues fortement imprégnée en dessous du fer¹ qui provient de l'eau.

142. **Le Canard souchet.** (SHOVELLER, SPOONBILL). *Spatula clypeata*. L, 20. La mâle a des marques frappantes; la tête d'un noir vert, poitrine blanche et ligne blanche sur les ailes, dessus d'un riche marron ressortant en une ligne effilée contre la poitrine. Les épaules sont d'un bleu crayeux et le miroir vert. Le bec s'élargit à la pointe en une spatule large en forme de cuillère. La femelle ressemble beaucoup à la femelle du canard ordinaire quoique sensiblement plus petite.

Traits distinctifs. Le bec spatulé distingue cette espèce de toutes les autres de quelque plumage que ce soit.

Indications sur le terrain. Poitrine blanche, ventre d'un riche marron, du bleu sur les ailes, et la taille; c'est tout cela qui distingue le mâle. Le bec fera distinguer quelque plumage que ce soit, et quand on peut le voir, il constitue peut-être le meilleur moyen de distinguer la femelle de celle plus grande du canard ordinaire à laquelle elle ressemble.

Nid. Sur le sol, dans l'herbe, pas toujours dans le voisinage immédiat de l'eau.

Habitat. C'est un oiseau de l'Ouest. Il ne se rencontre que rarement sur les Grands Lacs inférieurs, et ne se voit plus dans l'Est que comme un vagabond.

143. **Le Canard pilet.** (PINTAIL, SPRINGTAIL). *Dafila acuta*. L, 28. C'est un canard très long et de forme amincie. La tête d'un brun de phoque, l'avant-cou blanc et les parties de dessus de même, le dos finement vermiculeux de ton gris, miroir vert bronze terminé par une ligne d'un marron clair en avant et par une ligne blanche derrière. La queue est graduée par deux plumes médianes très allongées. La femelle ressemble beaucoup à celle du canard ordinaire.

Traits distinctifs. La longue queue fait reconnaître le mâle, le canard à longue queue étant le seul canard américain ayant un ornement pareil, à part cela le canard à longue queue est tout à fait différent, étant un canard de mer, non de rivière. Le miroir vert bronze et ses lignes limitées d'un brun rougeâtre et blanches sont caractéristiques d'un plumage, quelconque. Les jeunes sarcelles à ailes vertes ont presque les mêmes caractères du miroir, mais la différence de taille fera éviter toute confusion.

Indications sur le terrain. Tête et cou longs et minces; queue à longue pointe, ce sont de bons signes sur le terrain. La tête sombre et l'avant-cou et les dessous blancs font reconnaître le mâle.

Nid. Sur le sol, quelquefois très loin de l'eau.

Habitat. Rare sur la côte de l'Atlantique; devient plus commun vers l'Est. Il niche à partir des provinces des prairies au nord vers le pôle, et jadis à l'est du lac Erié.

144. **Le Canard huppé.** (WOOD DUCK, SUMMER DUCK.) *Aix sponsa*. L, 18-50
Planche VA.

Traits distinctifs. En se guidant sur les illustrations, il ne devrait y avoir aucune difficulté à reconnaître cette espèce. Le mâle, même dans son plumage sans éclat, conserve toujours une indication des marques de la joue.

Indications sur le terrain. C'est le seul canard d'été commun dans nos contrées méridionales qui ait les parties de dessous absolument blanches. L'anneau oculaire tout blanc de la femelle est très visible.

Nid. Dans les creux des arbres ou des branches près des eaux tranquilles.

Habitat. C'est la partie tempérée de l'Amérique du Nord jusqu'au Canada méridional, et d'un océan à l'autre sur ce continent; plus commun dans la région inférieure des Grands Lacs que sur l'un ou l'autre de nos rivages ou dans les provinces de la Prairie.

Nous avons là le canard d'Amérique le plus riche de couleur et le plus beau d'Amérique, peut-être bien du monde. La seule espèce qui s'en rapproche c'est le canard mandarin de Chine qu'on trouve souvent enfermé avec lui. Le canard huppé était originairement le "canard d'été" de nos fronti-

Voir la note, page 64.

ères méridi
sédiaient au
dière du fil
en vue et la
ou moins b
novice, et l
se pose sur
et cependa
arbre creux
tournants c
résolu la qu
circule à ce
vieux porte
parents pou
rudimentaü
bonne heur
dormantes,
de danger.
jusqu'à la fi
devenue fro
Le fait
prépare pou
multiplier p

Sous-fa

Description
aplatis ou en for
9, p. 21) mais l
neur est chang

Traits disti
les différenciers

Indications
soient plus facil

Nid. Ordi

Habitat. L
sur tous les cou
la côte que dan

Les can
grandes éte
profondes p
parfois à de
matières vé
pour la tabl
Valeu
régime alime

146. Le
un canard ju
poitrine noire;
de la femelle e
toile remplacé
vermiculure.

Traits distin
plus sombre et l
de ces deux espè

ères méridionales, presque tous les cours d'eau et les étangs endigués en possédaient au moins une paire; mais, depuis qu'on a déboisé le pays, la canardière du fils de fermier en a fait façon. Ses brillantes couleurs, son nid trop en vue et la facilité avec laquelle on peut le surprendre dans ses retraites plus ou moins boisées en ont fait une proie facile même pour le chasseur encore novice, et le canard court le risque d'être bientôt exterminé. Un canard qui se pose sur des arbres paraît paradoxal à la plupart des chasseurs européens, et cependant c'est l'habitude de cette espèce. Ce canard fait son nid sur un arbre creux, à quelque hauteur au-dessus du sol, et du haut duquel il voit les tournants de la mare ou quelque autre eau stagnante. On n'a pas encore résolu la question de savoir comment les petits sont descendus à terre, et il circule à cet égard beaucoup d'opinions divergentes: celle qui veut que les vieux portent les jeunes sur leur dos ou dans leur bec, celle qui pense que les parents poussent leur progéniture hors du nid pour qu'elle arrive de ses ailes rudimentaires jusqu'à terre; toujours est-il que les petits touchent terre de bonne heure et suivent leur mère vers les approches de la rivière ou des eaux dormantes, le mâle restant tout près pour porter secours à sa famille, en cas de danger. Plus tard, ils rechercheront les marécages où ils séjourneront jusqu'à la fin de l'automne, et d'où ils partiront pour le sud quand l'eau sera devenue froide comme le temps.

Le fait que le canard huppé se rend volontiers dans les boîtes qu'on lui prépare pour nicher, porte à croire que de cette façon on pourrait l'aider à se multiplier passablement.

Sous-famille—Fuliginæ. Canards de baie, de mer, ou plongeurs.

Description générale. Ce sont des canards d'une charpente lourde ou compacte avec un bec aplati ou en forme de spatule, comme celui du canard, quelquefois enflé ou plus haut à la base (fig. 9, p. 21) mais toujours avec un angle aplati à la pointe (figures 8 et 9, p. 21). Le doigt postérieur est changé en une palette plate ou un lobe finement découpé.

Traits distinctifs. Le bec fera distinguer les canards de mer des harles, et le doigt postérieur les différenciera des canards de rivière et d'étang.

Indications sur le terrain. Le bec bien observé, distinguera ces canards des harles, bien qu'ils soient plus facilement reconnus à l'état vivant comme espèce que comme une sous-famille.

Nid. Ordinairement sur le sol, quoique quelquefois sur des arbres.

Habitat. Lors même que certains individus de cette sous-famille se trouvent communément sur tous les cours d'eau navigable du Canada, les espèces et les individus sont plus nombreux sur la côte que dans l'intérieur.

Les canards de baie et de mer, quoique se sentant plus chez eux sur les grandes étendues d'eau, fréquentent souvent les marécages et les eaux peu profondes pour y trouver leur nourriture. Ce sont de bons plongeurs, allant parfois à de surprenantes profondeurs pour y saisir les mollusques ou des matières végétales. Ils comprennent des individus d'une chair exquise pour la table.

Valeur économique. L'importance économique immédiate de leur régime alimentaire se réduit à moins encore que pour les autres canards.

146. **Le Milouin à tête rousse.** (REDHEAD). *Marila americana*. L, 19. C'est un canard plutôt gros avec la tête et le haut du cou de couleur uniforme, rouge brique; poitrine noire; le dos gris finement vermiculé avec du noir; blanc en dessous. La tête de la femelle est de couleur plus sombre, même d'un gris brun foncé, et le dos couleur de toile remplacé par une teinte uniformément brune, quelquefois sans même un soupçon de vermiculure.

Traits distinctifs. Le mâle ressemble au milouin aux yeux rouges, mais le dos est beaucoup plus sombre et le rouge de la tête ne descend pas aux épaules comme dans cette espèce. Les femelles de ces deux espèces sont même plus semblables, mais la forme du bec est toujours un trait distinctif

(voir milouin aux yeux rouges). La femelle est aussi un peu comme celle du morillon à tête noire et du bucéphale d'Amérique, mais elle se distingue par un miroir gris au lieu de noir, ou par la tache à l'aile et par l'absence d'une marque blanche quelconque sur la face. Le morillon à collier a un miroir semblable, mais c'est un oiseau beaucoup plus petit et qui a la marque blanche de la face.

Indications sur le terrain. Couleur de la tête et profil de la tête et du bec.

Nid. Ordinairement sur le sol ou élevé au-dessus de l'eau, nid de roseaux avec plus ou moins de duvet.

Habitat. N'est ordinairement que de passage à l'est des provinces des prairies, bien que dans le passé quelques-uns aient niché par endroits dans la région des Grands Lacs; rare sur la côte de l'Est.

C'est un de nos plus beaux canards, et lorsqu'on l'a nourri de céleri sauvage sa chair a un goût aussi délicat que celle du milouin aux yeux rouges. Il est moins l'oiseau des vastes étendues d'eau que beaucoup de canards de mer, car on le trouve souvent dans les marais et les étangs.

147. Le Milouin aux yeux rouges. (CANVAS-BACK). *Marila valisineria*. L. 21. C'est un gros canard; le mâle a la tête et le cou d'un rouge brique sombre; poitrine noire; les dessous sont blancs, le dos est blanc avec de très fines vermiculures foncées qui ressemblent beaucoup à de la toile et auxquelles l'espèce doit son nom anglais. Chez la femelle le rouge de la tête et du cou devient du gris brunâtre, et le dos est brunâtre.

Traits distinctifs. Les couleurs sont très semblables à celles des plumages du milouin à tête rousse qu'on peut lui comparer; il se distingue du milouin à tête rousse par la forme du bec lequel chez le milouin aux yeux rouges est plus long et plus lourd, naissant au sommet du front et offrant la ligne du culmen presque droite plutôt que concave comme dans le milouin aux yeux rouges. Le mâle est beaucoup plus blanc sur le dos, et le rouge descend jusqu'aux épaules au lieu de s'arrêter à mi-chemin le long du cou. Les jeunes et les femelles peuvent quelquefois être confondus avec les morillons à tête noire, ou à collier, ou avec le bucéphale d'Amérique, mais en être distingués par la taille plus grande ou par l'absence de blanc ou de gris sur l'aile ou de blanc sur la face.

Indications sur le terrain. Tête rouge ou rougeâtre ou gris-rougeâtre, absence de blanc sur la face ou sur l'aile; en outre forme et profil de la tête et du bec.

Nid. Bâti au-dessus de l'eau, nid fait de roseaux, garni de duvet.

Habitat. Se rencontre régulièrement quoique peu fréquemment sur la partie inférieure des grands lacs à l'est du lac Érié, rare sur la côte de l'Atlantique, mais plus commun dans l'ouest du Canada où il niche.

C'est un des canards les mieux connus et les plus appréciés. Ce milouin évoque dans l'imagination populaire l'idée de la tortue d'eau douce et de la bonne chère. Cette réputation gastronomique est surtout due au céleri sauvage *Valisineria spiralis* dont il se nourrit fréquemment et d'où lui est venu son nom spécifique. Toutefois, bien d'autres canards mangent de ce céleri et sont tout aussi bons au goût. Sur les grands lacs l'introduction de la carpe allemande a occasionné de grands ravages dans les vastes champs de céleri sauvage, et de riz sauvage, deux plantes extrêmement appréciées pour allécher les canards de toute espèce. Une des premières mesures à prendre pour attirer les canards dans les enclos et les étangs réservés devrait être de supprimer toutes les carpes et de planter du céleri sauvage et du riz sauvage *Zizania aquatica*.

148. Le Morillon à tête noire. (GREATER SCAUP DUCK, AMERICAN SCAUP, BROAD-BILL, GREATER OR LAKE BLUEBILL). *Marila marila*. L. 18-50. C'est un canard de taille moyenne, le mâle, blanc en dessous; la tête, le cou, et la poitrine supérieure sont noirs; le dos blanc et noir, vermiculé et pareil à de la toile. Les femelles n'ont pas ce dos pareil à la toile; les tons noirs sont changés en des bruns rougeâtres de diverses teintes; la marque blanche de la face se trouve à la naissance du bec.

Traits distinctifs. Le morillon à tête noire et le morillon à collier ont presque tout à fait la même coloration, mais ils peuvent en général être distingués par la taille ou par la forme et la dimension de l'ongle terminal sur le bec. Cet ongle est, toute proportion gardée, plus large et assez près d'être circulaire chez le morillon à tête noire. La tête de ce dernier, à l'état adulte, a un lustre verdâtre au lieu de passer au violet clair sur la couronne. Une teinte rougeâtre sur la tête des jeunes et des femelles est quelquefois très distincte, et on peut les prendre pour un milouin aux yeux rouges, ou pour un milouin à tête rousse, ou quelquefois pour un bucéphale d'Amérique, mais

une tache bleu
tousjours caract
un miroir gris

Indications
rillons à l'état
corps, et blanc
Une marque bl
la femelle.

Nid. Sur l

Habitat. I
grands lacs; ni

Le mor
ouvertes, ai
arrive souv
céleri sauv

149. Le
MARSH BLUEBILL
mais un peu
dâtre de mên

Traits disti

Indications
distinguent l'ou

Nid. Sur l

Habitat. I
du Canada et,

Ce can
maritime; e
dents.

150. Le l
laris. L. 16-
sans le dos ce
collier d'un b

Traits disti
morillons à têt
louins aux yeux
de blanc; la fei
des marques b

Indications
melle par son r
de l'adulte, par

Nid. Sur l

Habitat. C
grands lacs; ni

151. Le
WHISTLER, G
charpente lou
le reste du pl
plaque sur l'a
clair et blanc
le haut du co
blancs ou gri

Traits disti
le bucéphale d'
les morillons.
aux côtés de la
du milouin à t

Voir la no

une tache blanche à la base du bec et en travers du front, ou des plaques blanches aux ailes sont toujours caractéristiques chez les morillons. Le morillon à collier, qui leur ressemble aussi, a un miroir gris au lieu d'un blanc.

Indications sur le terrain. Il est presque impossible de voir une différence entre les deux morillons à l'état vivant. Les mâles des deux espèces paraissent noirs sur le tiers antérieur de leur corps, et blancs sur tout le reste excepté la queue, mais y compris les plumes secondaires de l'aile. Une marque blanche sur la face à la base du bec, comme ci-dessus, est la meilleure indication pour la femelle.

Nid. Sur le sol, dans l'herbe près des étangs herbeux.

Habitat. Rarement de passage ou pour nicher sur la côte de l'Atlantique; commun sur les grands lacs; niche avec beaucoup d'autres dans le nord-ouest.

Le morillon à tête noire est plus que le petit morillon un oiseau des eaux ouvertes, ainsi que cela est indiqué par l'un de ses noms vulgaires, mais il arrive souvent avec d'autres espèces dans les marécages pour y trouver du céleri sauvage et du riz sauvage.

149. Le Petit Morillon. (LESSER SCAUP DUCK, RIVER BROAD-BILL, LITTLE OR MARSH BLUEBILL). *Marila affinis*. L, 16-50. Presque tout à fait semblable au précédent, mais un peu plus petit. La couronne du mâle adulte a un lustre violacé au lieu de verdâtre de même que sur d'autres parties de la tête.

Traits distinctifs. Voir les espèces précédentes.

Indications sur le terrain. Voir les espèces précédentes. Les morillons à l'état vivant ne se distinguent l'un de l'autre que par la taille.

Nid. Sur le sol, près des étangs herbeux.

Habitat. Un peu moins commun que le précédent dans l'est du Canada. Il niche dans l'ouest du Canada et, à l'occasion, plus à l'est vers les grands lacs.

Ce canard est l'un des plus communs qu'on rencontre loin de la côte maritime; c'est plus un oiseau de marais et de petits étangs que les précédents.

150. Le Morillon à collier. (RING-NECKED DUCK, RING-BILLED DUCK). *Marila collaris*. L, 16-50. Très semblable par la coloration aux deux espèces précédentes, mais sans le dos couleur de toile; avec un petit collier autour de son bec près du bout et un collier d'un brun pâle ou couleur de cuivre autour du cou.

Traits distinctifs. Les jeunes morillons à collier et les femelles peuvent être pris soit pour des morillons à tête noire, des bucéphales d'Amérique, soit pour des milouins à tête rousse ou des milouins aux yeux rouges¹, mais ils peuvent être distingués des morillons par le miroir gris au lieu de blanc; la femelle, par le délicat anneau blanc autour de l'œil, et de tous les autres canards par des marques blanches sur la face, généralement reliées en travers du menton.

Indications sur le terrain. Le mâle peut être distingué des morillons par son dos noir et la femelle par son menton blanc et le délicat anneau blanc autour de l'œil; tous deux, dans le plumage de l'adulte, par un petit anneau sur le bec.

Nid. Sur le sol, près des étangs herbeux.

Habitat. Oiseau rarement de passage dans l'Est où il nichait autrefois à l'occasion; rare sur les grands lacs; niche régulièrement dans l'Ouest.

151. Le Bucéphale d'Amérique. LE PLONGEUR. (GOLDEN-EYE, WHISTLE WING, WHISTLER, GREAT HEAD). *Clangula clangula*. L, 20. C'est un canard plutôt gros, charpente lourde, coloration frappante de blanc et de noir. Le dos et la tête sont noirs; le reste du plumage, y compris une tache circulaire très en vue entre l'œil et le bec, et la plaque sur l'aile sont blancs. La femelle et le jeune mâle sont marqués de taches gris clair et blanches sur le dos, de larges plaques blanches aux ailes, et une tête brun de poque, le haut du cou est ordinairement en fort contraste avec le cou et la poitrine qui sont ou blancs ou gris.

Traits distinctifs. Dans les plumages des jeunes et des femelles on peut quelquefois confondre le bucéphale d'Amérique avec le milouin à tête rousse ou avec le milouin aux yeux rouges ou avec les morillons. Dans ces plumages l'absence de la marque blanche sur la face ou sa présence limitée aux côtés de la face, la distinction des morillons; les plaques blanches aux ailes la différencieront du milouin à tête rousse et du milouin aux yeux rouges.

¹Voir la note à la page 64.

Indications sur le terrain. La coloration frappante en blanc et noir du mâle; la tête brune et l'absence de marques faciales chez la plupart des jeunes et des femelles. La grosse tête, le cou fort court, le sifflement des ailes pendant le vol sont caractéristiques.

Nid. Sur des branches ou dans le creux des arbres.

Habitat. Les bucéphales habitent la plupart des régions du nord de l'hémisphère boréal. Le bucéphale d'Amérique, qui seul représente cette espèce dans le Nouveau Monde, est généralement répandu dans presque tout le Canada. C'est ordinairement un oiseau de passage, qui s'établit en hiver dans l'est du Canada, nichant peu dans les provinces de l'Est, mais plus communément dans le Nord-Ouest.

SOUS-ESPÈCES. Le bucéphale est divisé en deux sous-espèces; celle de l'Ancien monde et celle du Nouveau monde. Cette dernière, dite bucéphale d'Amérique, *Clangula clangula americana* est la seule qui se rencontre en Amérique.

C'est un des canards les mieux connus, un oiseau très hardi qui reste sur nos eaux, en hiver, jusqu'à ce que la glace les ferme.

152. **Le Bucéphale d'Islande.** (BURROW'S GOLDEN EYE). *Clangula islandica*. L., 20. Ressemble au bucéphale d'Amérique, mais le mâle a une tache faciale en forme de croissant au lieu d'être circulaire. La tête a un lustre violet au lieu de vert et le bec est relativement plus élevé à la base.

Traits distinctifs. Les mâles sont facilement distingués des bucéphales d'Amérique, comme c'est dit plus haut, mais les jeunes oiseaux et les femelles des deux espèces sont plus difficiles à reconnaître, et la forme du bec est peut-être le seul trait distinctif auquel on puisse se fier. Les jeunes mâles peuvent être reconnus à une légère excroissance au front, à la base même du bec, qu'on ne peut voir à cause du plumage, mais qu'on sent très bien avec le doigt.

Indications sur le terrain. Des circonstances exceptionnelles peuvent permettre à quelques-uns des faits susdits d'être constatés chez l'oiseau à l'état vivant.

Nid. Sur des branches ou des arbres creux, quand c'est possible, sinon, probablement dans des cavités rocheuses ou sur le sol.

Habitat. Très inégal; l'oiseau est commun près des côtes de l'Est et de l'Ouest, mais absent de presque tout le vaste intérieur; les oiseaux de l'Est nichent probablement dans le nord de l'Ungava.

C'est une espèce qui est du nord plus que la précédente à laquelle elle ressemble par ses moeurs autant que par son apparence.

153. **Le petit Bucéphale.** (BUFFLE HEAD, SPIRIT DUCK, BUTTERBALL). *Charitonetta albeola*. L., 14.75. C'est un très petit canard, presque aussi petit que la sarcelle mais dont la coloration présente des contrastes frappants entre le noir et le blanc. Le mâle est blanc en dessous et autour de la base du cou, noir en dessus avec une tête noire irisée rompue par une large tache blanche triangulaire dont le sommet au-dessous de l'œil rencontre l'autre partie blanche le long de la nuque. Les plumes des joues sont allongées faisant des houppes sur les côtés de la face, d'où son nom. La femelle: blanc en dessous et un gris brunâtre foncé ailleurs à part une tache blanche indécise sur chaque joue.

Traits distinctifs. Le mâle ne peut être confondu avec aucun autre oiseau; la femelle ressemble plutôt au morillon, mais peut en être distinguée par sa petite taille et un trait de couleur claire qui s'étend de derrière l'œil vers l'arrière de la couronne au lieu de la plaque blanche à la base du bec. Une tache faciale au lieu de deux et les dessous uniformément clairs le feront distinguer de la femelle du canard histrion auquel il ressemble aussi.

Indication sur le terrain. Taille petite et tache blanche à la tête chez le mâle; la taille, la tache à la joue et la plaque blanche à l'aile chez la femelle.

Nid. Sur une branche ou dans le creux d'un arbre.

Habitat. Il est de passage ordinairement depuis la côte de l'Atlantique jusque vers l'ouest; niche au nord et au nord-ouest.

Le nom de "Spirit Duck" fait allusion à sa force comme plongeur et à l'extraordinaire facilité qu'il a de disparaître quand il est blessé.

154. **Le Canard à longue queue.** (OLD SQUAW, SOUTH-SOUTHERLY.) *Harelda hyemalis*. L., 21. (Projection de la plume médiane de la queue au delà des autres, 4.50-5.) Un canard de taille moyenne dont le plumage change remarquablement avec les saisons. Le mâle, au printemps, a la poitrine d'un brun de phoque, comme le cou, la tête et le dos; un masque facial presque blanc; des raies couleur d'ocre sur les ailes et à la base postérieure du cou. Le plumage d'hiver est blanc, avec la poitrine et le dos noirs ou brun foncé, une ligne en travers des épaules. Dans l'une et l'autre saison le mâle a deux plumes

médianes cau
4 à 5 pouces l
les deux plun
couleur foncé

Traits disti
qu'avec celles
presque entière

Indications
une marque fo

Nid. Sur

Habitat. l
côte ou les gra

Ce can
trouve souv
il reste auss
ver. C'est
valeur com
sa nourritu
terre et à d
pieds.

155. **Le**
trionicus. L.
colore. La c
fond il y a u
et un collier d
le contraste f
et borde les
avec taches bl
est médiane.
caractérisée a

Traits disti
femelle ressem
ou moins tach
d'une et point

Indications
naitre à sa tail
de la plaque à

Nid. Sur

Habitat. l
les montagnes

C'est u
pour la bes
l'Ouest du e
Dans l'est c
nourrit sur l
les eaux sal

GEI

Quoiqu
ces deux gr
suffisants p

Description
mâles ont de l
très tranchée;
d'un blanc très
lantes colorati

médianes caudales, très allongées, d'environ 8 pouces de la base à la pointe et dépassant de 4 à 5 pouces les autres plumes caudales. Le plumage de la femelle est intermédiaire entre les deux plumages susdits, montrant surtout du blanc sans ligne bien tranchée entre la couleur foncée de la poitrine et les dessous blancs comme chez les mâles.

Traits distinctifs. Les mâles sont caractéristiques; les femelles ne peuvent être confondues qu'avec celles de l'espèce suivante, mais elles sont beaucoup plus claires en dessous et la tête est presque entièrement blanche au lieu d'être noire.

Indications sur le terrain. La longue queue du mâle, la tête presque entièrement blanche avec une marque foncée aux joues dans le plumage des jeunes et des femelles.

Nid. Sur le sol, près de l'eau et caché sous les buissons ou dans l'herbe.

Habitat. Niche d'un bout à l'autre du continent dans l'extrême nord. Plus commun sur la côte ou les grands lacs que sur de plus petites étendues d'eau.

Ce canard est chez nous un oiseau d'hiver. Il fréquente nos ports et se trouve souvent avec beaucoup d'autres de son espèce à la bouche des égouts; il reste aussi longtemps que les eaux sont libres, et même durant tout l'hiver. C'est un fort plongeur et mangeur de poissons, mais n'a que très peu de valeur comme chère pour la table. Il plonge à de grandes profondeurs pour sa nourriture et se trouve parfois pris dans les filets de pêcheurs loin de la terre et à des profondeurs étonnantes; on cite un cas où il fut trouvé à 90 pieds.

155. **Le Canard histrion.** (HARLEQUIN DUCK, ROCK DUCK). *Histrionicus histrionicus*. L., 17. C'est un petit canard bien nommé d'après Arlequin au costume multicolore. La coloration générale du mâle va d'un bleu ardoise à un bleu noir, mais sur ce fond il y a une série frappante de croissants, de raies, de taches circulaires, de triangles, et un collier du blanc le plus pur, chacun de ces dessins étant bordé de noir ce qui en relève le contraste frappant; une moucheture brillante d'un riche brun marron décore les flancs et borde les côtés de la couronne. La femelle est très sombre et terne, toute brunâtre avec taches blanches sur le ventre, réunies dans une place qui ne se continue pas, qui même est médiane. Une tache blanche peu visible devant l'œil et au-dessous et une autre plus caractérisée au-dessus de l'oreille.

Traits distinctifs. Le mâle ne peut pas être confondu avec celui d'aucune autre espèce. La femelle ressemble à celle du petit bucéphale par la taille et la coloration, mais son ventre est plus ou moins tacheté au lieu d'avoir une teinte claire uniforme et elle a deux taches faciales au lieu d'une et point de plaque à l'aile.

Indications sur le terrain. Impossible de se tromper quant au mâle. La femelle peut se reconnaître à sa taille et à sa coloration généralement sombre, à peine plus claire en dessous; absence de la plaque à l'aile; deux plaques claires à la face.

Nid. Sur le sol, sous les roches ou des amas de bois ou dans des trous creux.

Habitat. Il n'est que de passage dans l'Est, très rare dans l'intérieur quoique commun dans les montagnes de l'Ouest, où il niche.

C'est un des plus jolis de nos canards; il ne le cède qu'au canard huppé pour la beauté. Sa véritable demeure est sur les bruyants cours d'eau de l'Ouest du et Nord-Ouest où il est bien connu des prospecteurs et des mineurs. Dans l'est du Canada, il fréquente les baies rocheuses et les rivages où il se nourrit surtout des insectes du sable et des petites crevettes qui remplissent les eaux salées du bord de la mer.

GENRES—SOMATERIA ET OIDEMIA. EIDERS ET MACREUSES.

Quoique ne formant pas une division systématique reconnue des canards ces deux genres sont singuliers et font voir des caractères communs très suffisants pour qu'il en soit fait mention ici.

Description générale. Gros oiseaux de forte charpente, les plus gros de nos canards. Les eiders mâles ont de larges masses de couleurs et de teintes délicates qui contrastent entre elles de façon très tranchée; les macreuses sont presque toutes noires, quelques-unes avec de petites insertions d'un blanc très pur. Les deux espèces ont des becs enflés avec d'étranges excroissances et de brillantes colorations (figure 9, p. 21).

Traits distinctifs. Coloration en général foncée non relevée par les nombreux dessins des macreuses; la brillante coloration en larges masses des eiders mâles, les tons fins et uniformément rayés de divers bruns chez les femelles; la taille, la forme, les enflures et les protubérances du bec dans les deux sexes sont les caractères les plus marqués de la plupart des espèces.

Indications sur le terrain. La coloration générale et le bec.

Nid. Sur le sol près de l'eau, quelquefois à l'abri de rochers ou de buissons qui surplombent; le nid est garni d'un duvet que donne la mère. L'édredon qui est dans le commerce provient des nids des eiders.

Habitat. Répandu d'un bout à l'autre du Canada, niche dans le nord; très commun sur les côtes et sur les étendues d'eau pendant la migration.

Ce sont des "canards de mer" dans la plus pure acception du mot, bâtis pour affronter les plus gros temps et ne venant presque jamais sur les étangs et les marais d'eau peu profonde. Ils se nourrissent de mollusques et de crustacés et de ce qu'ils trouvent en plongeant.

Valeur économique. Leur régime alimentaire a peu d'intérêt pour l'homme, mais dans certains parages, comme au Labrador, ils offrent par leur chair et leurs oeufs la principale nourriture animale qui se présente là. Comme leur duvet est un article de commerce de grand prix, les eiders ont une valeur facilement appréciable. Leur nombre va diminuant sans cesse (voir les détails à propos de l'eider d'Amérique) et des mesures énergiques devraient être prises pour conserver l'espèce.

160. **L'Eider du Nord.** (EIDER DUCK). *Somateria mollissima*. L., 23. Le mâle: noir en dessous, tranchant fortement sur la blancheur de la poitrine qui est délicatement teintée d'un rose vineux; blanc en dessus; tête blanche avec une teinte eau-du-nil depuis les joues jusqu'à la nuque; large raie noire de l'œil au derrière de la tête. La femelle: coloration uniforme dans un dessin délicat de différents bruns, noirs et d'ocres pâles disposés en raies brisées autour du corps. Protubérances du bec s'étendant des deux côtés du front en longues langues charnues.

Traits distinctifs. Pas d'erreur possible pour le mâle; la femelle peut se distinguer de celle de l'"eider remarquable" par le fait que les plumes de la couronne ne s'étendent pas en avant aussi loin que l'extrémité d'arrière de la narine. Cette espèce ressemble beaucoup à l'eider d'Amérique dont on ne peut la distinguer que par la taille et la forme de ces protubérances du bec sur le front—chez l'eider du Nord ils se terminent en pointe et la pointe n'est pas arrondie—et par la distance entre le point où commencent les plumes sur le côté du bec et la pointe de la protubérance, distance qui est moindre que chez l'eider de l'Amérique.

Indications sur le terrain. Taille et coloration générale.

Nid. Sur le sol, fait entièrement de duvet.

Habitat. L'eider du nord habite les régions du nord de l'Europe et de l'est de l'Amérique. L'eider du nord est le plus septentrional de nos deux eiders semblables (voir l'espèce suivante).

C'est un oiseau strictement de l'Atlantique, qui niche dans les régions polaires de l'est du Canada et dans le Groënland.

SOUS-ESPÈCES.—L'Eider du Nord est représenté en Amérique par une sous-espèce, l'Eider du Nord, *Somateria mollissima borealis*. L'Eider européen, le type de la race, n'a jamais été signalé en Amérique.

161. **L'Eider d'Amérique.** (MOYAK, AMERICAN EIDER). *Somateria dresseri*. L., 23. Presque tout à fait semblable à l'espèce précédente.

Traits distinctifs. La femelle peut être prise pour celle de "l'eider remarquable," mais peut en être distinguée par les plumes de la couronne qui ne s'avancent pas plus loin que derrière la narine. Elle peut n'être pas spécifiquement distincte de l'espèce précédente et l'un et l'autre sexe peuvent en être distingués seulement par les bouts arrondis de la protubérance du bec sur le front et par le fait que la distance du plumage sur le côté du bec jusqu'à la pointe des rudiments est plus grande.

Indications sur le terrain. La taille et la coloration générale; il ne peut pas être distingué de l'eider du Nord, à l'état vivant.

Nid. Sur le sol, quelquefois sous des roches ou des buissons qui surplombent; le nid est bâti de duvet arraché de la poitrine de la mère.

Habitat. C. Laurent.

En Sea l'édredon ti dans le Lab ces oiseaux, chair; mais tueries qu'il ces rivages être épargn sures intelli donneraient oeufs, et pro bien plus qu

162. **L'E**
23. Le mâle sont eau-du-ni sur la gorge; brillant et se ment une bos rances au bec fines que l'on

Traits disti
espèce. Les fe précédentes esp

Indications :
Les femelles ne

Nid. Sur l
Habitat. C le long de la cô de la Nouvelle trées basses de

163. **La**
19. Les mâle brillant. La l avec un capuc jones plus cla

Traits disti
de couleur. Le

Indications :
blanches ou de

Nid. Sur l
Habitat. Il sur nos rivages

165. **La**
Brun foncé, pi l'œil; bec enfl dans la figure brillants. La

Traits disti
Indications s
à l'aile.

Nid. Sur l
Habitat. N le passage, et c

Habitat. C'est un oiseau de nos rivages de l'Est, nichant sur le rivage nord du golfe du St-Laurent.

En Scandinavie et en Islande les eiders sont à moitié domestiques et l'édredon tiré de leurs nids est une importante source de revenus. Bien que dans le Labrador et sur le golfe du St-Laurent il y ait d'immenses bandes de ces oiseaux, aucune tentative n'a été faite pour en tirer parti, sauf pour la chair; mais cette quantité a été si rapidement diminuée par de stupides tueries qu'il n'en reste plus qu'une petite fraction du nombre primitif. Sur ces rivages froids et désolés où la viande fraîche est rare les eiders devraient être épargnés pour servir d'aliments, sinon pour d'autres usages. Des mesures intelligentes et prévisionnelles protégeraient les eiders pour toujours, donneraient une ample quantité de nourriture, soit comme chair soit comme oeufs, et produiraient une riche moisson de duvet qui vaudrait sur le marché bien plus que les carcasses d'oiseaux morts.

162. **L'Eider remarquable.** (KING EIDER, KING DUCK). *Somateria spectabilis*. L, 23. Le mâle très semblable au précédent, mais le dos est presque tout noir, les joues sont eau-du-nil, le sommet de la tête et le derrière du cou d'un gris-bleu clair, et un V noir sur la gorge; le bec est caractéristique; les rudiments de chair sur le front sont d'un jaune brillant et se rencontrent sur le front où ils deviennent larges de presque un pouce et forment une bosse relativement énorme sur le front. La femelle n'a pas les fortes protubérances au bec et sa coloration présente les mêmes bruns et noirs selon un dessin de raies fines que l'on remarque chez les autres eiders.

Traits distinctifs. Le mâle avec ses protubérances au bec ne peut être pris pour aucune autre espèce. Les femelles ressemblent à celles des autres eiders mais peuvent se distinguer des deux précédentes espèces par le plumage de la couronne qui s'avance jusqu'à derrière les narines.

Indications sur le terrain. Moins de blanc sur le dos et sur les protubérances du bec du mâle. Les femelles ne peuvent pas être distinguées avec certitude des autres eiders à l'état vivant.

Nid. Sur le sol, nid garni de duvet.

Habitat. C'est le plus septentrional de nos eiders. Il niche d'un bout à l'autre du continent le long de la côte et des fles du pôle. Il hiverne le long du golfe du Saint-Laurent et des rivages de la Nouvelle Angleterre. C'est le seul eider qui vagabonde assez régulièrement jusqu'aux contrées basses des grands lacs.

163. **La Macreuse d'Amérique.** (AMERICAN SCOTER.) *Oidemia americana*. L, 19. Les mâles sont tous noirs; la base du bec est très enflée près du front et d'un jaune brillant. La femelle n'a pas le bec enflé; elle est foncée partout, plus claire en dessous et avec un capuchon visiblement plus sombre qui contraste sur une ligne tranchée avec des joues plus claires.

Traits distinctifs. Le mâle est le seul canard canadien tout noir et que ne relève aucune tache de couleur. Le capuchon foncé de la femelle la distingue d'autres espèces qui lui sont comparables.

Indications sur le terrain. Couleur noire en évidence, bec jaune du mâle; l'absence de taches blanches ou de marques faciales et le capuchon foncé sur la femelle.

Nid. Sur le sol, près de l'eau.

Habitat. Il niche dans l'extrême nord à travers tout le continent; il est commun en hiver sur nos rivages de l'Est et n'est pas inconnu dans les régions basses des grands lacs.

165. **La Macreuse veloutée.** (WHITE WINGED SCOTER.) *Oidemia deglandi*. L, 22. Brun foncé, presque noir, avec plaques blanches aux ailes et un petit croissant blanc sous l'œil; bec enflé à la base et s'élevant plus brusquement en avant que cela n'est montré dans la figure 9, p. 21, et la mandibule supérieure est colorée d'un rouge et d'un blanc brillants. La femelle est d'un brun sombre uniforme.

Traits distinctifs. La plaque blanche à l'aile distingue tous les plumages de cette espèce.

Indications sur le terrain. Grande taille, couleur sombre générale et uniforme, plaques blanches à l'aile.

Nid. Sur le sol, parmi les buissons ou dessous.

Habitat. Niche dans les hautes latitudes à travers le continent; il abonde sur les côtes pendant le passage, et c'est la plus commune macreuse sur les grands lacs et dans l'intérieur.

166. **La Macreuse à large bec.** (SURF SCOTER.) *Oidemia perspicillata*. L, 20. Le mâle est tout noir avec une plaque blanche en travers du front et un triangle de même couleur à la base de la tête; bec très enflé (figure 9, p. 21) et d'une coloration frappante de rouge, de jaune et de noir. La femelle est d'un brun foncé, plus clair en dessous et très semblable à cet égard à la macreuse d'Amérique.

Traits distinctifs. Les plaques blanches de la tête sont propres au mâle. La femelle peut être distinguée de celle de la macreuse veloutée par l'absence des plaques à l'aile, et de la macreuse américaine par l'absence du capuchon et la présence de deux taches claires un peu vagues sur le côté de la face, une à la base du bec et l'autre au-dessus de l'oreille.

Indications sur le terrain. Du blanc sur la tête du mâle et les deux taches imprécises sur la face de la femelle.

Nid. Dans l'herbe, près de l'eau.

Habitat. C'est à peu près le même que pour la précédente espèce, mais peut-être que cette macreuse est plus commune sur la côte et qu'elle l'est moins sur les grands lacs.

167. **Le Canard roux.** (RUDDY DUCK.) *Erismatura jamaicensis*. L, 15. C'est un petit canard. Le mâle a une coloration frappante d'un riche brun rougeâtre marron sur le cou, les épaules, le dos et les flancs; la couronne et le derrière de la tête presque noirs, les joues et le bas de la face blancs. La femelle est petite, d'un brun grisâtre sombre, plus clair dans les dessous et aux joues, avec une calotte foncée.

Traits distinctifs. Le mâle est le seul canard presque entièrement roux. La femelle peut se reconnaître à l'éclat argenté, pareil à celui du grèbe, des parties de dessous et, dans tout plumage, aux plumes raides et pointues de la queue.

Indications sur le terrain. La taille, la forme courte et trapue, cou épais. Son habitude de porter quelquefois la queue droite et se dépliant en éventail est aussi un bon guide, quoique certaines macreuses passent pour en faire autant à l'occasion.

Nid. Dans les roseaux au-dessus de l'eau.

Habitat. Il niche dans les provinces de la prairie vers le nord, il est plus commun dans ses voyages sur les grands lacs que sur la côte.

Sous-famille—Anserinae. Oies.

Description générale. Les oies ressemblent aux canards, mais sont plus grandes, avec un corps moins aplati et des pattes relativement plus longues; bec (figure 10, p. 21), plus haut et un peu plus comprimé à sa base, plus épais et moins aplati à la pointe, pouvant difficilement être comparé à une spatule, mais ayant l'ongle large à sa pointe, caractéristique de l'ordre.

Indications sur le terrain. Le puissant vol des oies est bien connu. La taille, la coloration et les façons de son vol sont les meilleurs signes pour se guider sur le terrain. Leurs cris rauques et stridents si souvent entendus pendant leur migration sont aussi caractéristiques.

Nid. Sur le sol.

Habitat. Les oies sont de tous les pays. Les espèces américaines nichent plutôt dans les contrées du nord, voyageant pour s'y rendre à travers l'intérieur aussi bien que le long des côtes.

Les oies sont plus que les canards des oiseaux de terre ferme et herbivores sans être pour cela moins habituées à l'eau. Elles n'ont pas l'habitude de plonger, mais se procurent leur nourriture dans le fond en la picotant et l'attrapant grâce à leur long cou. Les sexes se ressemblent et leur plumage change peu avec les saisons. L'oie est une chair excellente sur la table et c'est pour cela, aussi bien que pour sa taille, qu'elle est très recherchée des chasseurs. Les oies sont très circonspectes et, bien que leur nombre ait beaucoup diminué, elles ont réussi à se protéger mieux que ne l'ont fait bien d'autres oiseaux recherchés comme gibier.

Valeur économique. Se nourrissant surtout d'herbes et fréquentant dans leurs migrations les régions cultivées plus que ne font d'autres membres de leur espèce, les oies peuvent causer plus de dégâts que les canards, mais on ne le leur a jamais beaucoup reproché. Leur valeur, à d'autres égards, est si évidente qu'on s'est bien moins plaint des oies que d'autres espèces également dignes d'être protégées, mais dont l'utilité, quoique réelle, est moins manifeste.

169. L'Oie
une oie plutôt
ou moins de g

Traits distinctifs.
l'un de l'autre,
l'apparence qui

Indications :

Nid. Sur l

Habitat. L.
Coronation. E
tique.

SOUS-ESPECE

Grande, qui ne
à autre ce n'est
formes et les ta
arer. Bien qu
très rare. C'es
le long de la côt

Le nom
signifie oie s

169. 1. L.
apparence on
à autre ce n'est
la tête est bla
grisâtre. Le
blanche.

Traits distinctifs.
se voit chez auc

Indications :
les plus sûres.

Nid. Sur l

Habitat. P
seau est rareme
en revienne.

Pendan
un plumage

171a. L'Oie
D'un brun gri
autour de la b
de noir qui se
apparence d'in

Traits distinctifs.

Indications :

Nid. Sur l

Habitat. L.
niche sur le cont
nent et ne se re

SOUS-ESPECE
une sous-espèce
plus grande.

172. La
canadensis. L.

Traits distinctifs.

Indications :
qu'on voit très
plus gros canard

Nid. Sur l

169. **L'Oie blanche.** (SNOW GOOSE. WAVEY). *Chen hyperboreus*. L, 23. C'est une oie plutôt petite, d'un blanc parfait avec des primaires noires. Les jeunes ont plus ou moins de gris ou de brun grisâtre répandu par places ou sur tout le corps.

Traits distinctifs. Les bords tranchants des mandibules sont plus ou moins inclinés, écartés l'un de l'autre, montrant des projections serratifformes, pareilles à des dents et donnant à la face l'apparence qui lui a fait donner le nom d'oie rieuse.

Indications sur le terrain. La couleur, le vol et le profil absolument propres aux oies.

Nid. Sur le sol.

Habitat. La petite oie blanche niche sur la côte arctique et dans les îles à l'ouest du golfe de Coronation. Elle voyage vers l'intérieur du continent; la grande, le long de la côte de l'Atlantique.

SOUS-ESPÈCES. Il y a deux sous-espèces de l'oie blanche au Canada, la Petite Oie et la Grande, qui ne diffèrent que par leur taille, mais comme les deux espèces cohabitent de temps à autre ce n'est pas une distinction à laquelle on puisse se fier. Il y a une différence fondée sur les formes et les tailles relatives des becs, mais il faut, pour s'en rendre compte, des spécimens à comparer. Bien qu'on l'ait souvent signalée inexactement l'oie blanche, la plus grande est un oiseau très rare. C'est la forme de l'espèce qu'on trouve dans l'extrême Est et qu'il ne faut chercher que le long de la côte de l'Atlantique.

Le nom de "Wavey" est une corruption du mot indien "Wa-Wa" qui signifie oie sauvage.

169. 1. **L'Oie bleue.** (BLUE GOOSE). *Chen caerulescens*. L, 26. Corps gris ardoisé, apparence ondulante des plumes les plus claires sur le dos et plus ou moins la même chose en dessous; la couleur d'ardoise est surtout forte sur les ailes et le croupion; la tête est blanche. Les jeunes sont semblables mais la tête et le cou sont d'un brun grisâtre. Le bec fait voir à un degré un peu réduit les dents serratifformes de l'oie blanche.

Traits distinctifs. La combinaison de la tête blanche en contraste avec les ailes gris bleu ne se voit chez aucune autre oie américaine de l'Est.

Indications sur le terrain. Tête blanche et corps plus foncé sont probablement les indications les plus sûres.

Nid. Sur le sol.

Habitat. Paraît être restreint dans la saison de la couvaison à l'est de la baie d'Hudson; l'oiseau est rarement de passage sur les grands lacs soit qu'il aille vers la vallée du Mississipi où qu'il en revienne.

Pendant longtemps l'oie bleue a passé pour n'être que l'oie blanche avec un plumage d'oisin; aujourd'hui on reconnaît que c'est une espèce à part.

171a. **L'Oie à front blanc.** (WHITE FRONTED GOOSE) *Anser albifrons*. L, 27. D'un brun grisâtre, plus foncé sur la tête et le cou, plus clair en dessous, plaque blanche autour de la base du bec; couleur claire des parties de dessous mouchetées irrégulièrement de noir qui se réunissent à la période de maturité en bandes imprécises et donnent une apparence d'imparfait développement même à des oiseaux d'âge adulte.

Traits distinctifs. Tête brune et face blanche.

Indications sur le terrain. Couleur brune sur tout le corps et face blanche.

Nid. Sur le sol.

Habitat. L'oie à front blanc est une espèce presque circonfolaire. La sous-espèce américaine niche sur le continent et dans les îles à l'ouest du pôle. Elle voyage à travers l'intérieur du continent et ne se rencontre que rarement à l'est aussi loin que les grands lacs.

SOUS-ESPÈCES. L'oie de notre pays, l'oie américaine à front blanc, *A. a. gambeli*, est une sous-espèce de l'Oie européenne à front blanc dont elle se distingue par sa taille légèrement plus grande.

172. **La Bernache du Canada. Outarde.** (CANADA GOOSE, WILD GOOSE). *Branta canadensis*. L, 35. Planche V B.

Traits distinctifs. Grande taille, tête et cou noirs, gorge blanche, plaque sur la joue.

Indications sur le terrain. Tête et cou noirs, plaque blanche à la gorge. Un V blanc sur la queue qu'on voit très bien quand l'oiseau vole, fera distinguer les membres de cette espèce de tous les plus gros canards.

Nid. Sur le sol, parfois dans de grands nids abandonnés sur des arbres.

Habitat. Niche d'un bout à l'autre du continent depuis la limite nord des arbres jusqu'aux limites de la colonisation.

SOUS-ESPÈCES. L'oie du Canada comprend plusieurs races géographiquement distinctes. Dans l'Ouest il y a une petite sous-espèce appelée oie de Hutchin, *B. c. hutchins*. Elle passe pour avoir une note différente dans son cri et pour être facilement reconnaissable à l'état vivant par des chasseurs qui ont quelque expérience. Sa taille plus petite est un critérium incertain, mais c'est la seule différence qu'on puisse indiquer ici. Sa longueur moyenne n'a pas tout à fait 25 pouces. On ne peut s'attendre à la voir que jusqu'au Manitoba, à l'ouest, et avant de l'identifier ailleurs il faut user d'une grande prudence.

L'oie est un oiseau très circonspect et toujours sur l'éveil; elle passe ordinairement la journée en plein air et se rend, le soir ou pendant la nuit, dans les marécages et les champs cultivés pour y chercher sa nourriture; à moins d'être dérangée elle y reste jusqu'au lendemain. Pendant qu'elle est ainsi occupée il y en a toujours une, au moins, qui, son long cou tendu, surveille les environs et guette l'apparence de quelque danger. Il est impossible aux piétons même les plus avisés d'approcher sans être aperçu. C'est pour cette raison que l'oie du Canada a peut-être moins souffert des chasseurs que d'autres membres de son ordre, et avant que les parages où elle niche ne soient envahis, elle court peu le danger d'être exterminée. A l'origine, cette oie nichait dans les limites de nos régions actuellement peuplées, mais la colonisation l'a chassée de la région la plus méridionale où elle couvait. Néanmoins, elle occupe encore de vastes espaces dans tout le nord du Canada aussi loin que va la limite nord des arbres et, aussi longtemps que tout ce territoire demeurera inhabité, l'oie y trouvera des parages où elle nichera en sécurité et à l'abri du danger d'être exterminée. Toutefois, à moins que des méthodes intelligentes de conservation ne finissent par être adoptées à l'avenir, l'oie du Canada disparaîtra à mesure que les terrains où elle couvait seront envahis par l'homme.

173a. **La Bernache commune.** (BRANT). *Branta bernicla*. L, 26. Très semblable à l'oie du Canada mais plus petite; la tête, le cou et le haut de la poitrine noirs; un collier de blanc étroit et brisé sur le cou.

Traits distinctifs. Une petite oie canadienne foncée sans marque à la face.

Indications sur le terrain. Taille petite, poitrine foncée, absence de marque à la face. Le V blanc sur la queue, visible quand l'oiseau vole bas, distinguera aussi la bernache commune des canards plus gros et noirs, mais non de la bernache du Canada.

Nid. Sur le sol, nid fait d'herbes et garni de duvet.

Habitat. Circonpolaire, pour l'espèce. La bernache américaine niche dans l'est de la région polaire, descend dans ses voyages vers les côtes de l'Atlantique, mais rarement dans l'intérieur du continent.

SOUS-ESPÈCES. La bernache est une espèce circonpolaire. L'individu du nouveau monde, la bernache américaine, *B. b. glaucogastra* est, comme sous-espèce, distinct de celui de l'ancien monde, lequel n'a jamais été signalé en Amérique. La bernache noire, *B. nigricans* de l'Ouest est caractérisée par le fait que le noir de la poitrine est répandu comme teinte sur les parties de dessous; mais elle ne se rencontre dans l'est du Canada que comme un vagabond d'occasion.

La bernache commune est une petite oie. Elle se rencontre sur le bas Saint-Laurent et sur les côtes maritimes par bandes de plusieurs centaines, mais se présente rarement ou seulement comme vagabonde dans l'intérieur sur les grands lacs.

Sous-famille.—*Cygninae*. Cygnes.

Description générale. Très gros anatidés; blancs; à l'exception peut-être de la grue d'Amérique ou du dindon sauvage, c'est le plus gros des oiseaux d'Amérique.

Traits distinctifs. La taille ajoutée à la couleur suffit à distinguer les deux cygnes. Les lores (espace entre l'œil et le bec) sont dénués de plumes. Le bec commence vers le haut du front, à sa base il est presque rectangulaire en section transversale, la pointe est pourvue d'un ongle plat.

Indications
Nid. Sur
Habitat.
goureusement
bien que le cy
dans l'un des

De tes
récrets pop
enfants, où
grand sujet
jours, les c
oies sont sa
plus circon
eaux trou p
une eau pr
à l'improvi
et où le cha

Les é
des ressour
que nous av
Europe on
res et com
certains rec
la voix, et l
telle que l'
n'a aucune
rencontre c

180. Le
gros oiseau, t

Traits dist
Superficiellem
les cygnes n'ai
n'être pas touj
mais elle est t
dans le sternu
fait une seule
petite a une co
trompette a ét
les cygnes d'A

Indication
facilement être
d'elles est fam

Nid. Sur
Habitat. Sur
d'Hudson; il e
mais commun

Par le
loin dans le
réduit dans
celle des cy
compris da
point d'être

1 Les autre

Indications sur le terrain. Taille et couleur, ce sont nos seuls gros oiseaux tout blancs.¹

Nid. Sur le sol, nid fait avec des herbes et garni d'un duvet pris à la mère.

Habitat. La plupart des cygnes se trouvent dans l'hémisphère boréal, mais n'y sont pas rigoureusement confinés. En Amérique ils nichent actuellement dans les très hautes latitudes, bien que le cygne-trompette, espèce presque éteinte, nichât dans l'origine aussi loin vers le Sud que dans l'un des Etats du nord des Etats-Unis.

De temps immémorial les cygnes ont joué un rôle important dans les récits populaires de l'ancien monde ainsi que dans les contes de fée pour enfants, où il est si fréquemment question de ces oiseaux, toutefois c'est un grand sujet de surprise pour bien des gens que d'apprendre que, même de nos jours, les cygnes sauvages sont parfaitement communs au Canada. Les oies sont sauvages et sur leur garde, mais le cygne est encore plus sauvage et plus circonspect. Son cou très long lui permet de pêcher sa nourriture dans des eaux trop profondes pour des oiseaux non plongeurs, et il peut séjourner sur une eau profonde pendant tout le jour, là où il est impossible de l'approcher à l'improviste. Il se rend rarement dans ces marais où l'eau est très basse et où le chasseur peut se cacher, ce qui fait que l'oiseau est rarement pris.

Les épithètes données aux cygnes de l'hémisphère boréal témoignent des ressources extraordinaires de leur organe vocal; c'est ainsi qu'en Amérique nous avons le cygne d'Amérique (siffleur) et le cygne trompette; et qu'en Europe on a le cygne criard et le cygne muet. Des modifications singulières et compliquées de la trachée sous forme de circonvolutions variées dans certains recoins osseux du sternum sont certainement en relation étroite avec la voix, et leur complexité augmente en raison directe de la qualité de la voix telle que l'expriment les qualificatifs susdits; c'est ainsi que le cygne muet n'a aucune circonvolution trachéenne et que la plus haute complexité se rencontre chez le cygne trompette et le cygne criard.

180. **Le Cygne d'Amérique.** (WHISTLING SWAN) *Olor columbianus*. L., 55. Très gros oiseau, tout blanc.

Traits distinctifs. Le cygne d'Amérique peut être pris seulement pour le cygne trompette. Superficiellement on peut facilement le distinguer par sa plus petite taille seulement. Comme les cygnes n'arrivent à leur complet développement qu'au bout de plusieurs années, la taille peut n'être pas toujours en soi une preuve convaincante. Il y a une différence dans la forme du bec, mais elle est trop difficile à caractériser pour être bien décrite ici. L'enroulement de la trachée dans le sternum fournit le meilleur critère de différenciation. Chez le cygne d'Amérique la trachée fait une seule courbe horizontale sur la surface du sternum, tandis que la trachée du cygne trompette a une courbe perpendiculaire en plus. L'absence d'une tache jaune sur les lores du cygne trompette a été donnée comme une indication, mais cette tache est si souvent absente même chez les cygnes d'Amérique adultes qu'elle est sans utilité comme trait distinctif.

Indication sur le terrain. La taille et l'absolue blancheur. Les deux espèces ne peuvent pas facilement être distinguées l'une de l'autre à l'état vivant, sauf par ceux à qui la voix de chacune d'elles est familière.

Nid. Sur le sol, dans un nid d'herbes, de mousse et garni de duvet.

Habitat. Il niche dans l'extrême Nord après avoir traversé le continent à l'ouest de la baie d'Hudson; il est de passage dans l'intérieur; rare ou absent sur la côte canadienne de l'Atlantique, mais commun par endroits sur les grandes routes fluviales de la région des grands lacs.

Par le fait de son excessive prudence et parce que le couvaison se fait au loin dans le Nord, le cygne d'Amérique n'a pas vu son nombre sérieusement réduit dans les dernières trente années. La plus grande espèce congénère, celle des cygnes trompettes dont les parages recherchés pour la couvaison et compris dans la région colonisée furent dérangés de bonne heure, est sur le point d'être détruite entièrement.

¹ Les autres gros oiseaux du Canada ont tous plus ou moins de noir sur les plumes des ailes.

Les cygnes viennent rarement dans les marécages où l'eau est basse et où le chasseur peut se cacher. Ils sont extrêmement circonspects et sont rarement vus sauf en bandes blanches, serrées, comme des plaques de glace au loin sur l'eau libre ou en l'air volant très haut et hors de la portée des fusils. Leur passage régulier a lieu de nuit, ordinairement dans un grand silence, quelquefois cependant très bruyamment. C'est à de telles mœurs qu'il faut probablement attribuer le fait que peu de nos chasseurs même les plus experts connaissent le cygne à l'état vivant, et qu'un plus petit nombre encore peuvent se vanter de l'avoir pris. Bien que des bandes de plusieurs centaines apparaissent chaque année sur le lac St-Clair, on n'en prend pas plus de deux ou trois par année.

L'espèce se rencontre aussi en grand nombre sur la rivière Niagara où, par des nuits obscures ou de brouillard, au printemps, les cygnes sont entraînés avec le courant dans les eaux tumultueuses des rapides et sont emportés par dessus les chutes sans possibilité d'en réchapper. Pareille catastrophe est arrivée plusieurs fois dans les dernières dix années et des centaines de cygnes ont perdu la vie de cette façon. Chez quelques-uns, tous leurs os sont brisés dans leur corps, d'autres ne sont que faiblement blessés. Les oiseaux morts qui ne sont pas entraînés sous la glace et emportés par le courant sont ramassés. Ceux à moitié morts sont achevés à coup de bâtons et ceux dont les blessures sont seulement légères sont tués d'un coup de fusil. Comme les oiseaux ne sont pas de force, dans les endroits resserrés, à s'élever au-dessus des fentes de la gorge, et répugnent à s'engager sous les ponts jetés par-dessus le bas de la rivière, tous se trouvent confinés dans les eaux étroites au-dessous des chutes, d'où ils ne peuvent s'échapper. La chair du cygne n'est guère bonne à manger et les oiseaux ont peu de valeur pour ceux qui les attrapent à moins que ce ne soit comme une curiosité.

181. **Le Cygne trompette.** (TRUMPETER SWAN) *Olor buccinator*. L, 65 Très gros oiseau, tout blanc.

Traits distinctifs. Ne peut se confondre qu'avec le précédent auquel on vous renvoie.

Indications sur le terrain. Taille et blancheur absolue; les deux cygnes ne peuvent pas se distinguer l'un de l'autre avec une entière certitude à l'état vivant.

Nid. Sur le sol, dans un nid d'herbes et de duvet.

Habitat. C'est un oiseau de l'intérieur des terres, qui niche à partir du centre de la rangée nord des États jusque vers le nord.

Tout cygne de plus de 56 pouces de long ou pesant plus de 20 livres appartient probablement à cette espèce. C'était autrefois un oiseau passablement commun sur les grands lacs, mais aujourd'hui il est si rare qu'on peut le regarder comme une espèce presque ou complètement éteinte. Son territoire de nidification est très au sud de celui du cygne d'Amérique et, au milieu de terres cultivées et très peuplées, voilà pourquoi cet oiseau est rapidement détruit.

Ordre—Hérodiones. Échassiers d'eau profonde.

Description générale. Ce sont d'habitude de grands oiseaux à longues jambes, long cou et long bec, bien bâtis pour marcher dans l'eau et pour y trouver leur nourriture sous la surface dans une eau plus profonde que celle où la trouveraient la plupart des oiseaux aquatiques. Les becs peuvent être ou droits et aiguisés (figure 18, p. 23) ou modérément recourbés et émoussés comme chez les ibis. Les jambes sont dénudées sur une grande distance au-dessus de l'articulation du talon, et les quatre doigts sont parfaits, bien formés et propres à percher aussi bien qu'à marcher sur un sol mou, avec ou sans membranes rudimentaires (figure 17, p. 23).

Traits d
l'un des cour
bois possède
au Canada.
l'œil et la ba

Les ii
Ibides, qu
dias qui c

Ce so
pas au C
rarement.

Descript
mandibule si

Traits d
griffe du do
tinée ou pour
héron du sou

Il n'y
Canada, c

186. L
un oiseau t
avec les pl
ailleurs.

Traits d
que noire, ou
la descriptio

Nid. D

Habitat.

L'ibi
Egypte et
L'ibis lui
uns de ses
Canada, l

Vale
économiq

Com
ardéidés, i

Descript
pointu. L'e
de très petit
une poudre
et cachées se
d'une rangée
ne sont pas

Traits d
garni de plu

Traits distinctifs. Les oiseaux de cet ordre peuvent être confondus ou avec les grues ou avec l'un des courlis. Ils peuvent se distinguer des grues par leur front couvert de plumes. L'ibis des bois possède à la fois le front dénudé et le bec recourbé, mais il n'est que possible qu'il se trouve au Canada. Ils peuvent se distinguer de l'un quelconque des courlis par l'espace dénudé entre l'œil et la base du bec.

Les individus canadiens de cet ordre se divisent en deux sous-ordres: les *Ibides*, qui comprennent les spatules et les ibis proprement dits; et les *Herodias* qui comprennent les hérons, les aigrettes et les butors.

SOUS-ORDRE—IBIDES. LES IBIS.

Ce sous-ordre comprend deux familles: les spatules qui ne se rencontrent pas au Canada et les ibididés, dont un seul se voit dans le dominion mais rarement.

FAMILLE—IBIDIDÆ. LES IBIS.

Description générale. Oiseau avec un bec long, recourbé, tout à fait émoussé à la pointe et la mandibule supérieure cannelée d'un bout à l'autre.

Traits distinctifs. Bec recourbé, émoussé et fortement cannelé, ce sont là ses caractères. La griffe du doigt du milieu peut être élargie et endurcie sur le bord, mais n'est pas parfaitement pectinée ou pourvue de dents bien formées et en forme de peigne comme chez les échassiers pareils au héron du sous-ordre des herodias. (Comparez à la figure 19, p. 23).

Il n'y a qu'un seul de ces oiseaux, l'ibis luisant, qu'on puisse trouver au Canada, et cela seulement comme un vagabond par aventure.

186. **L'ibis luisant.** (BLACK CURLEW) *Plegadis autumnalis*. L., 24. C'est, en fait, un oiseau tout noir avec des reflets brun marron, verts et violets. Le jeune est brun avec les plumes de la tête légèrement bordées de couleurs claires, avec reflets verdâtres ailleurs.

Traits distinctifs. L'ibis luisant ressemble beaucoup à un gros courlis, mais sa coloration presque noire, ou très sombre, le fera distinguer facilement du courlis. Son bec cannelé (voir plus haut la description de cette famille) le différencie d'autre part.

Nid. Dans des marais à roseaux ou des buissons très bas.

Habitat. Les régions tropicales et sous-tropicales.

L'ibis est assez connu de nom comme l'un des oiseaux sacrés de l'ancienne Egypte et, à ce titre, son nom est familier à quiconque a un peu de lecture. L'ibis luisant est apparenté à l'ibis sacré des bords du Nil et fait voir quelques-uns de ses caractères généraux. Il ne se rencontre qu'occasionnellement au Canada, le long de la frontière méridionale.

Valeur économique. Trop rare au Canada pour avoir aucune influence économique.

SOUS-ORDRE—HERODII. ÉCHASSIERS HÉRODIENS.

Comme ce sous-ordre est représenté au Canada par une seule famille, les *ardéidés*, il suffit de les décrire sous ce titre.

FAMILLE—ARDEIDÆ. HÉRONS ET BUTORS.

Description générale. Ce sont des oiseaux qui ressemblent au héron, avec le bec droit et très pointu. L'espace devant les yeux est dénudé. Un trait particulier à ce sous-ordre ce sont les plumes de très petites plumes, c'est-à-dire des assemblages de plumes bizarrement formées et qui donnent une poudre sèche dont l'usage est inconnu. Ces plumes se trouvent sur diverses parties du corps et cachées sous le plumage apparent. La griffe du doigt du milieu est pectinée, c'est-à-dire pourvue d'une rangée de dents bien caractérisées et ressemblant à celles d'un peigne (figure 19, p. 23) et qui ne sont pas seulement des points rugueux, comme chez les ibis.

Traits distinctifs. Les oiseaux de ce sous-ordre pourraient être pris pour des grues, mais le front garni de plumes est distinctif. La partie de derrière du cou est dénudée, les plumes des côtés se

continuant tout autour cachant la dénudation aux yeux de l'observateur distrait. Le doigt postérieur est très long et au niveau des autres doigts au lieu d'être simplement un peu élevé comme chez les autres échassiers.

Indications sur le terrain. Profil visiblement pareil à celui du héron, avec un cou long et gracieux; bec long et effilé (figure 18, p. 23) et pattes plus longues (figure 17, p. 23). Le cou se replie quand l'oiseau vole, mettant la tête tout près des épaules, les pattes pendant derrière. Les grues, avec lesquelles on peut confondre les ardéidés à l'état vivant, portent le cou étendu.

Il n'y a peut-être pas d'oiseaux aussi bien connus du grand public que ceux-là par leur renommée et par l'observation, cependant nous ne les entendons jamais appelés de leur vrai nom. Les termes de héron, cigogne et grue sont employés à tort et à travers. Il n'y a pas de cigogne au Canada. Les grues ont leur habitat à l'ouest et sont rarement aperçues dans l'est du Canada. Les oiseaux que nous entendons appeler de ce nom sont de vrais hérons. La famille est divisée en deux familles: *Botaurinae*, butors, et *Ardeinæ*, les hérons vrais et les aigrettes.

Sous-famille—*Botaurinæ*. Butors.

Description générale. Habitent les marais, ressemblent aux hérons, d'une charpente plus lourde, d'un corps moins gracieux que les véritables hérons.

Traits distinctifs. Bien que formant une sous-famille bien définie ces oiseaux sont difficiles à caractériser dans une description courte et non technique. Dans les espèces canadiennes la couleur est le meilleur guide et le plus reconnaissable. Si l'on en excepte le petit butor de Cory, qui est très rare (voir à l'article Petit Butor, n° 191), les espèces canadiennes ont de fortes quantités de jaune d'ocre sur leur plumage, couleur qui, en quelque grosse quantité, est absente du corps des véritables hérons.

Les butors fréquentent les marais et les marécages. On ne les voit pas dans les lieux ouverts qui mènent à ces marais; mais ils se laissent choir dans le milieu ou sur les bords parmi les herbages ou les roseaux, s'approchant de leur proie sans bruit et à l'abri de cette végétation.

190. Le Butor d'Amérique. (AMERICAN BITTERN, MARSH HEN) *Botaurus lentiginosus*. L, 28. Planche VI A.

Traits distinctifs. Avec sa coloration jaune répandue sur tout son corps, la même dans les deux sexes et à tout âge, le butor ne peut se confondre avec aucune autre espèce canadienne. Le petit butor est le seul autre oiseau de même conformation qui montre surtout du jaune, mais sa taille est si petite qu'il n'y a aucun risque de les confondre. Il peut y avoir des lignes noires depuis les côtés de la face, ou ne pas y en avoir, quels que soient le sexe, l'âge et la saison.

Indications sur le terrain. Quand l'oiseau s'élève au-dessus des roseaux ou des herbages, son long cou, ses pattes pendantes et sa coloration jaunâtre sont faciles à reconnaître. Vu d'une certaine distance, sa forme, sa tête rentrée dans le corps, et ses jambes tendues en arrière, ressemblent tellement à celles du héron que, si la lumière ne vient faire distinguer la coloration, la taille seule les fera distinguer l'un de l'autre.

Nid. Sur le sol dans l'herbe, dans les champs de foin ou dans les marais à roseaux, un nid fait avec des herbes ou des roseaux.

Habitat. Cet oiseau est commun dans toutes les parties habitées du Canada, nichant partout où on le trouve.

Des allusions au mugissement solitaire du butor sont fréquentes dans la littérature anglaise. On ne peut guère prétendre que notre butor américain "mugisse", mais son cri est très singulier et unique en son genre parmi les oiseaux américains. Les termes ordinaires de "pompe à tonnerre", "enfonceur de bâton", se rapportent aux bruits étranges qu'émet cet oiseau. Près d'un marécage on peut entendre un bruit pareil à celui que ferait quelqu'un qui enfoncerait à coups de maillet en bois un pieu dans la boue liquide. C'est comme le bruit sourd d'un coup dont le liquide produit par succion l'écho, suivi immédiatement d'un autre coup. D'autres fois on entend des sons comme si quelqu'un manœuvrait une pompe aspirante qui tirerait de

l'eau à
Ce son
sible de

Vo
les, de
même,
même j
tant qu

191
petit él
amas de
selon le

Trait
avec auc
Petit Bu
par un br
la colorat

Indic
de se méj
et la tail

Nid.
dans un r

Habit
méridion

Le
sette e
ceux qu
aperçu
cage hé
qui n'a

Desc
de plus g
n'est ausi

Trait
cés, mais
prononcé
le dos, et
plus ou n
automne.

Indic
la tête r
et aux hi
tout oise

Nid.
humides

Le
chant l
vre leu

194
che VI l

Trait
est le seu
distincti

l'eau à une certaine hauteur, mais sans pouvoir la faire monter plus haut. Ce sont là des variantes du chant d'un héron, en amour, mais où il est impossible de distinguer des propriétés vocales.

Valeur économique. Le héron fréquente les marais, mange des grenouilles, des écrevisses, des serpents, du fretin, des crustacés, des insectes, et même, probablement, des petits oiseaux et des souris. Il ne mange que peu, même point du tout, de matières végétales. Les hérons sont inoffensifs en tant que classe, et peuvent être utiles.

191. Le Petit Butor. (LEAST BITTERN) *Ixobrychus exilis*. L, 13. C'est le plus petit échassier, ressemblant au héron, qu'on trouve au Canada. Sa coloration offre des amas de tons crème, d'ocre, de rouges indiens, avec un dos et une calotte noir ou brun, selon le sexe.

Traits distinctifs. À cause de sa petite taille et de sa coloration frappante, on ne peut le confondre avec aucun autre oiseau du Canada sauf-être avec son parent très rapproché et très rare le Petit Butor de Cory, *I. neozena*. Chez ce dernier oiseau les tons crème et ocre sont remplacés par un brun phoque ou rougeâtre, et on ne sait encore de façon certaine si c'est ou non une phase de la coloration de l'individu ordinaire.

Indications sur le terrain. Sa petite taille, et ses couleurs frappantes font qu'il est impossible de se méprendre au sujet de cette espèce. Elle est rarement vue, sauf de très près quand la couleur et la taille sont évidentes.

Nid. Généralement au-dessus de l'eau dans un nid placé sur une plate-forme de joncs morts, dans un marais ou un bouquet de roseaux.

Habitat. C'est un oiseau commun mais plutôt confiné dans certaines localités des parties méridionales de l'Ontario et du Québec. Il couve partout où il se rencontre au Canada.

Le petit butor fréquente les marais où l'eau séjourne, où croît la massette et qui, en outre, sont de quelque étendue; il n'est guère vu là que par ceux qui visitent son tranquille territoire. Le butor américain est souvent aperçu volant de marais en marais, mais le petit butor s'en tient à son marécage habituel et ne s'aventure guère plus loin. C'est un oiseau silencieux et qui n'a pas ou très peu de talents vocaux.

Sous-famille Ardeinæ. Hérons vrais et Aigrettes.

Description générale. Ce sont des oiseaux plus sveltes et gracieux que les butors et, en général, de plus grande taille. Les plus petits sont très peu plus petits que les butors d'Amérique et aucun n'est aussi petit que le petit butor. La couleur constitue la plus simple manière de les distinguer.

Traits distinctifs. La couleur des hérons est habituellement le bleu d'ardoise ou les verts foncés, mais quelquefois les hérons sont tout blancs. Les butors, d'autre part, ont une couleur jaune prononcée. Bien des hérons ont de belles longues plumes sur la couronne, le bas de la gorge, ou sur le dos, et toutes les espèces canadiennes, dans les plumages de la couvaison, font voir ces plumes plus ou moins longues sur l'un ou l'autre de ces points, mais elles sont habituellement absentes en automne.

Indications sur le terrain. C'est le profil caractéristique pendant le vol, avec le bec très pointu, la tête rentrée dans les épaules, les jambes pendantes derrière, attitudes communes aux butors et aux hérons, lesquels sont reconnus plutôt comme espèce que comme sous-famille. Toutefois, tout oiseau de ce genre qui n'est pas manifestement un butor est probablement un héron.

Nid. Les hérons bâtissent habituellement leurs nids en société au sommet des arbres de forêts humides, mais quelquefois dans les buissons ou sur le sol.

Les hérons sont pêcheurs, dans des eaux de marais bien ouverts, recherchant les parages herbeux moins que ne font les butors. Au lieu de poursuivre leur proie, ils demeurent immobiles et attendent qu'elle soit à portée.

194. Le Grand Héron bleu. (GREAT BLUE HERON) *Ardea herodias*. L, 42. Planche VI B.

Traits distinctifs. C'est le plus grand héron trouvé au Canada; la grue de l'ouest du Canada est le seul oiseau avec lequel on puisse le confondre. Le front très garni de plumes est un trait bien distinctif. (Comparez les figures 18 et 20, p. 23.)

Indications sur le terrain. Le profil comme celui du héron, la taille et la coloration générale sont les meilleures indications. Bien différent de la grue qui vole le cou tendu, le grand héron bleu, comme les autres hérons, voyage le cou replié et la tête rentrée dans les épaules.

Nid. Il le bâtit généralement en société d'autres hérons dans les forêts humides, comme dans les marécages de tamarack, de frêne et d'orme; c'est un nid de grandes proportions fait de buchettes au sommet des arbres.

Habitat. Le Canada presque en entier; le héron niche partout où on le trouve.

SOUS-ESPÈCE. Le grand héron bleu comprend plusieurs sous-espèces dont l'individu type, le grand héron bleu de l'Est, *Ardea herodias herodias* est le seul qui se rencontre dans l'est du Canada.

Le grand héron bleu recherche les eaux ouvertes et basses. Il fréquente rarement les marais roseliers très épais, bien qu'on le trouve souvent sur leurs confins ou sur le bord des étangs qui s'y trouvent. Il préfère les abords découverts et peu profonds des rivières, ou ceux un peu plats des marais ou des rivages que recouvre la marée. C'est un chasseur solitaire, qui tantôt avance avec prudence et des mouvements à peu près imperceptibles, tantôt aussi immobile qu'une statue, regarde l'eau jusqu'à ce que sa proie soit à sa portée, alors, avec la rapidité de l'éclair, il la saisit de son bec acéré. Les hérons, qui nichent en nombreuses compagnies sur des arbres humides se sont trouvés spécialement exposés à cette persécution insensée qui paraît s'attaquer à tous nos plus grands oiseaux. Circonspects et soupçonneux d'ordinaire ils perdent dans le voisinage de leurs nids beaucoup de leur prudence habituelle, et dans leurs héronnières haut perchées les hérons peuvent être tués en grand nombre. Les héronnières sont habituellement bien connues de toute la contrée environnante et, dans la saison de la couvaison, souvent visitées par le chasseur rural qui tue les parents et laisse les petits mourir de faim, lors même qu'un propriétaire de campagne a souvent assez à coeur l'intérêt général pour protéger les héronnières sur ces terres à lui. Il résulte de là que cet oiseau si pittoresque se fait rare. Les héronnières une fois détruites de cette façon sont rarement, peut-être même jamais repeuplées et de nouvelles s'établissent difficilement. Les oiseaux qui nichent en société sont rarement poussés vers de nouveaux parages pour leurs amours. Ils demeurent où ils sont jusqu'à ce que les individus qui composent leur bande soient exterminés. Le héron est un oiseau inoffensif qui mériterait d'être protégé de toute façon.

Valeur économique. La nourriture du grand héron bleu est presque entièrement animale, de sa nature, puisqu'elle se compose surtout de grenouilles, de serpents, de fretin, le tout de nulle importance économique. Les grues visitent les champs pour leur nourriture, les hérons jamais. D'aventure le héron peut suivre un cours d'eau que parcourent les truites et dont les méandres sillonnent les prairies, mais ces cas sont rares et ne suffisent pas à condamner l'espèce. Il arrive souvent que les hérons recherchent les rets posés dans les étangs par les pêcheurs, mais la petitesse de leur gosier, les empêche de prendre quoi que ce soit de valeur et la suspicion des propriétaires de ces rets est bien gratuite.

LES HÉRONS BLANCS.

Bien que ne formant pas une classe systématiquement reconnue des hérons, il y a plusieurs espèces pourvues d'un plumage absolument blanc et qui sont assez distinctes pour justifier qu'on en discute.

Parmi quelques-unes de ces espèces, les aigrettes, le plumage de l'adulte est blanc, en d'autres c'est une apparence dichromatique, c'est-à-dire que

l'espèce
ne pou
sexe, à
à un p
ment
pour l
mis à
un hal

194
Presque
saison c
comme
Tra
Indi
Nid.
Hab
vagabon

L
espèce
à-dire
plume
imméc
vent é
ornem
disant
mâles.
les ba
décour
L'argu
les ma
où la
métho
et ave
que la
corps
tion et
tuer ce
Florid
donna
peu pr
ces ois
aux E
modis
lonies.
sterne
ces ins

200
un peti
le reste
et sur l
d'ardois

l'espèce se présente sous deux phases de couleurs, l'une et l'autre normale, et ne pouvant se rapporter ni à l'albinisme ni au mélanisme, pas plus qu'au sexe, à l'âge ou à la saison. En d'autres espèces encore le blanc appartient à un plumage de jeunesse ou d'âge avancé, et arrive régulièrement au moment voulu. Ces plumages blancs étaient une source de grande confusion pour l'identification des espèces aussi longtemps qu'on ne les avait pas soumis à une investigation complète. Tous les hérons blancs appartiennent à un habitat méridional et sont rares au Canada.

196. **L'Aigrette blanche d'Amérique.** (AMERICAN EGRET) *Herodias egretta*. L, 41. Presque aussi grande que le grand héron bleu, mais toujours d'un blanc très pur. Dans la saison des amours, une manière de cascade de quelque cinquante plumes fines et droites commence au milieu du dos et tombe en festons sur le bas du dos et la queue.

Traits distinctifs. Taille, couleur et profil, manifestement de héron.

Indications sur le terrain. Comme ci-dessus.

Nid. En société, nids faits de branches sur les arbres ou dans des buissons au-dessus de l'eau.

Habitat. Dans les Etats du Sud et du golfe du Mexique; ne se montre au Canada que comme vagabond de hasard.

L'aigrette américaine, avec le héron blanc comme neige et une autre espèce de même nature, constituent l'origine de l'aigrette bien connue, c'est-à-dire de cette huppe de plumes que vendent les modistes. Comme ces plumes ne poussent que dans la saison des amours, et comme le voisinage immédiat des héronnières est le seul endroit où ces prudents oiseaux peuvent être facilement approchés, il est évident que la récolte de ce magnifique ornement doit s'accompagner de beaucoup de cruauté. On se défend en disant que ces plumes sont ramassées quand elles sont tombées du dos des mâles. C'est un argument contestable, car si quelqu'un veut chercher dans les basses-cours pour y trouver les belles plumes que la volaille a jetées il découvrira vite que les plumes d'aigrette seront rares et de pauvre qualité. L'argument est d'autant plus douteux que les héronnières sont situées dans les marais compacts des régions tropicales où le sol n'est que boue et eau et où la végétation est de nature à empêcher toute recherche minutieuse et méthodique. Le chasseur de plumes se cache d'habitude dans la héronnière et avec un fusil de petit calibre, tire les oiseaux l'un après l'autre jusqu'à ce que la troupe soit toute exterminée. Les plumes sont alors arrachées des corps qu'on laisse pourrir par terre. Les petits qui restent, meurent d'inanition en haut dans les nids. Des lois locales ont été édictées interdisant de tuer ces oiseaux, mais sans résultat. Il y a quelques années les étangs de la Floride et des États du golfe avaient encore tout l'embellissement que leur donnait la présence de ces oiseaux immaculés; aujourd'hui ces lieux ont à peu près perdu un de leurs plus grand attrait par l'imminente destruction de ces oiseaux. Comme dernière ressource une loi fédérale a été promulguée aux Etats-Unis qui défend d'importer les plumes d'oiseaux à l'usage des modistes. Une loi semblable a été votée en Grande Bretagne et dans les colonies. Les aigrettes ne sont pas la seule espèce qui ait tant souffert; les sternes et d'autres oiseaux de mer, les oiseaux de Paradis et beaucoup d'espèces insectivores ont été victimes de la vanité et de la cupidité humaines.

200. **Le Petit Héron bleu.** (LITTLE BLUE HERON) *Florida coerulea*. L, 22. C'est un petit héron très beau et gracieux. L'individu adulte a la tête et le cou brun marron, le reste du corps d'un bleu d'ardoise foncé. Des plumes finement pointues sur les épaules et sur le devant du bas cou. Le jeune est presque du blanc le plus pur teinté de bleu d'ardoise.

Traits distinctifs. La couleur qui distingue l'oiseau adulte est décrite plus haut. Le jeune oiseau, tout blanc, ressemble beaucoup au petit héron de la Louisiane, mais peut s'en distinguer par les pattes jaunes verdâtre et par les pointes bleu d'ardoise des primaires.

Nid. Niche par groupes, nids faits de buchettes dans les buissons ou sur les arbres au-dessus de l'eau.

Habitat. L'Amérique tropicale. Couve dans les Etats du Sud et du Golfe. Sa présence au Canada est purement accidentelle. On voit rarement au Canada des oiseaux ayant le plumage de l'âge adulte. Les jeunes oiseaux sont les seuls qui soient susceptibles de s'égarer dans l'intérieur de nos frontières.

Valeur économique. Trop rares au Canada pour avoir aucune importance économique.

201. Le Héron vert. (GREEN HERON) *Butorides virescens*. L, 17. C'est le plus petit des hérons ordinaires. Le dos est d'un vert grisâtre brillant avec de courtes plumes, pareilles aux plumes, et recouvrent les ailes. La face, les côtés du cou, et la gorge, aussi bien que les dessous, sont d'un riche marron. La tête a une calotte noire qui s'allonge en une petite huppe.

Traits distinctifs. La description qui précède peut ressembler à celles de la dernière espèce, mais le vert brillant si visible du dos, l'absence des plumes du cou, la taille plus petite et la charpente plus lourde empêchent de les confondre sérieusement. C'est ici, d'ailleurs, une espèce commune dans son territoire propre, et celle qu'on est assez sûr de rencontrer dans la région des grands lacs. Toute autre espèce qui pourrait lui être comparable est très rare.

Indications sur le terrain. Taille et coloration générale.

Nid. Solitaire et non par groupes; léger et ouvert fait de branches dans des buissons ou sur des arbres d'habitude au-dessus de l'eau.

Habitat. Pas très commun dans le sud de l'Ontario, mais rare à l'est. Couve partout où on le rencontre au Canada.

SOUS-ESPÈCE. Le héron vert forme des sous-espèces, mais le type, c'est-à-dire le héron vert du nord, est la seule espèce qu'on rencontre au Canada.

Le héron vert n'est pas aussi porté à s'aventurer en pleine eau que l'est le grand héron bleu, ni dans les marécages herbeux, comme le butor. Les halliers d'aune en terrains inondés, les bords buissonneux de paisibles ruisselets, les mares où s'attardent des courants endormis, les prairies où séjournent les castors, sont l'habitat préféré de ces hérons. Ils aiment la solitude plus que ne font les autres hérons au temps de la couvaison et, bien que plusieurs couples puissent occuper une localité particulièrement favorisée, c'est la communauté d'intérêts et non l'instinct de la sociabilité qui les fait se réunir.

Valeur économique. La nourriture du héron vert se compose d'écrevisses, d'insectes, de grenouilles et de fretin. On l'a accusé d'être nuisible à certains poissons, mais comme l'oiseau est petit et relativement rare, et comme les parages d'eaux dormantes qu'il fréquente d'habitude ne le mettent pas en contact avec beaucoup d'espèces importantes, on ne peut pas le considérer comme une menace bien sérieuse.

202. Le Héron de nuit. (BLACK-CROWNED NIGHT HERON) *Nycticorax nycticorax*. L, 24. Plus petit que les grands bleus et plus grand que les hérons verts, plus semblable au butor comme taille. Le plumage de l'oiseau adulte est reconnaissable à première vue. Le corps est blanc, à ombres légères avec des teintes de gris clair. Le dos et la couronne sont noirs; de celle-ci tombent une ou deux plumes longues, fines, en forme de pinceau. Le jeune oiseau a une apparence tout à fait différente, il a des raies brun grisâtre sur un fond blanchâtre.

Traits distinctifs. L'individu adulte est caractéristique. Le jeune peut, à un coup d'oeil hâtif paraître ressembler au butor, mais il manque absolument de toute nuance bien jaune et le dessin très simple de la coloration est très différente du schéma de couleur très compliqué et finement vermiculé de cet oiseau.

Nid. Souvent en société avec le grand héron bleu, nid fait ordinairement avec des buchettes sur des arbres, quelquefois sur le sol.

Hab
dans l'es
l'Ontario
il est pe

SOI
L'oiseau
distincte

C
beauté
hérons
combin

Le
Canada
adulte
sur le c
héron
sa tête
des prin
de nuit
signalé

Vi
son im

Desc
familles
famille d
et à l'aut
avec des
sous-fami
outre les
Du sous-

Co
Canada
c'est-à-
peut s'
se justi

Desc
avec tein
uniforme

Trait
autour de
veux, et c
le bec est
comme n

Indic
épaules c
dans les c

206.
semblabl
uniforme
de la jeu

Habitat. Le héron de nuit est un oiseau dont l'habitat est irrégulier et local; on le rencontre dans l'est de l'Ontario, l'ouest de Québec et du Manitoba, en colonies occasionnelles. Dans l'Ontario, depuis Kingston vers l'ouest, il est très rare; même dans la péninsule ouest de l'Ontario il est peu fréquent.

SOUS-ESPÈCE. Le héron de nuit se rencontre dans les deux hémisphères (est et ouest). L'oiseau du nouveau monde, appelé le héron de nuit d'Amérique, *N. n. noveius*, est une sous-espèce distincte de celle de l'ancien monde.

C'est un héron d'une charpente plutôt lourde et qui, quoique non sans beauté ni sans grâce, n'a pas les lignes fines et élancées de la plupart des hérons et ressemble aux butors par sa charpente. Ses habitudes sont une combinaison de celle du grand héron et de celle du héron vert.

Le héron de nuit jaune *Nyctanassa violacea*, se rencontre aussi au Canada, mais trop rarement pour qu'il en soit dit davantage. L'individu adulte est en général un oiseau couleur gris d'ardoise, finement rayé de noir sur le dos, et dont la tête est très distinctement noire et blanche. Le jeune héron est si semblable au héron noir qu'on l'en distingue difficilement, mais sa tête est plus foncée que le dos, et il n'y a pas trace de brun rougeâtre sur les primaires, ce qu'une minutieuse inspection fait voir sur le jeune héron de nuit qui est noir. Les jeunes hérons de nuit jaunes ne devraient être signalés au Canada qu'avec précaution.

Valeur économique. Sa nourriture est semblable à celle du héron vert et son importance économique à peu près identique.

Ordre—Paludicolæ. Oiseaux de marais.

Description générale. C'est un ordre assez mal délimité: il comprend un certain nombre de familles d'oiseaux qui marchent habituellement dans l'eau et qui ne peuvent être assignés ni à la famille des hérons ni à celle des oiseaux de rivage, quoique ressemblant superficiellement à l'une et à l'autre. Ce sont des oiseaux qui ont quatre longs doigts bien développés, sans membranes, et avec des pattes bien faites pour marcher dans l'eau. On les ne définit que par la description des sous-familles. L'espèce canadienne se divise en deux sous-ordres: les grues, qui comprennent en outre les courlans, etc., et les *Ralli* (râles) qui comprennent en outre les gallinules et les foulques. Du sous-ordre des grues il n'y a au Canada que les gruidés, les grues proprement dites.

SOUS-ORDRE—GRUES ET COURLANS.

Comme le courlan, de la famille des Aramidés, ne se rencontre pas au Canada, nous ne pouvons nous intéresser qu'à la seule famille des Gruidés, c'est-à-dire aux grues. En ce qui concerne le Canada, ce sous-ordre peut s'appeler les "Grands Oiseaux de marais", expression, toutefois, qui ne se justifie que parcequ'elle est d'un usage commode.

FAMILLE—GRUIDÆ. GRUES.

Description générale. Grands oiseaux ressemblant au héron couleur bleu d'ardoise, terne, avec teinte de rouille, ou blanc pur, avec primaires noires. Toutes les couleurs sont des teintes uniformes, sur tout le corps, et les oiseaux n'ont ni panache ni huppe.

Traits distinctifs. Les grues se distinguent des hérons en ce qu'elles ont le front et l'espace autour de l'œil dénudé ou avec une très petite quantité de plumes bizarrement pareilles à des cheveux, et en ce qu'il leur manque la structure pectinée sur la griffe du milieu (voir figure 19, p. 23); le bec est plus petit, toute proportion gardée, que celui du héron, mais de forme plus lourde, soit comme matière soit comme forme (comparez figure 18 et 20, p. 23).

Indications sur le terrain. Les grues volent le cou tendu au lieu d'avoir la tête rentrée dans les épaules comme les hérons et, contrairement aux habitudes des hérons, elles paissent en troupes dans les champs des régions cultivées.

206. **La Grue du Mexique.** (SANDHILL CRANE) *Grus mexicana*. L.40. Très semblable au grand héron bleu, mais sans plumes en aucune saison. Une couleur bleu uniforme par tout le corps lavée de rouge rouille ou de brun, surtout forte dans les phases de la jeunesse.

Traits distinctifs. Elle se distingue du grand héron bleu par son front dénudé, etc., comme cela est décrit sous le titre précédent (comparez figures 18 et 20, p. 23). Autrement elle ne peut être confondue qu'avec la petite grue brune *Grus canadensis*, grue du Canada, dont elle se distingue uniquement par la taille—la longueur de cette dernière étant d'environ 36 pouces et la grue du Mexique de 40 pouces. Les spécimens intermédiaires, comme taille, n'étant pas rares, la différenciation n'est pas toujours facile à constater, et les deux variétés peuvent se rencontrer dans l'est du Canada. Une autre grue, la grue huante, grue d'Amérique,—qu'on trouve dans l'Ouest s'est rencontrée quelquefois dans l'Est, mais sa couleur d'un blanc très pur, ou lavée de couleur rouille, ses primaires noires, et sa très grande taille—50 pouces—la font facilement reconnaître.

Indications sur le terrain. Le front dénudé de coloration rouge terne; elle vole le cou tendu au lieu de replié, et a plutôt les habitudes des localités élevées.

Nid. Dans des endroits humides, marécageux, fait de matières végétales de rebut.

Habitat. L'ouest du Canada, nichant à l'intérieur des régions cultivées et vers le nord.

La grue du Mexique paraît avoir été un hôte plus commun de l'est du Canada, de la région des grands lacs tout au moins, dans les premiers temps plus qu'aujourd'hui. Elle n'est actuellement qu'un rare vagabond à l'est des provinces des prairies, bien que quelques individus continuent à nicher dans le sud du Michigan; il n'est pas impossible qu'il y en ait encore quelques-unes dans les parties adjacentes de l'Ontario.

Valeur économique. Cette grue est trop rare dans l'est du Canada pour y avoir aucune importance économique, quoiqu'elle se nourrisse de graminées plus que ne font les hérons, et qu'elle visite, souvent en nombre, les terrains cultivés dans le temps des migrations; elle fait peu de dégâts, car au printemps elle arrive de bonne heure et en automne elle ne prend que du grain qu'on laisse perdre. La quantité d'insectes dont elle s'alimente est considérable.

SOUS-ORDRE—RALLI. PETITS OISEAUX DE MARAIS.

En ce qui concerne le Canada, ce sous-ordre—comprenant les râles, les gallinules et les foulques—peut-être appelé celui des petits oiseaux de marais, par comparaison avec celui des grandes grues. Ces oiseaux n'ont pas la forme du héron et ne peuvent pas être confondus avec les grues par rapport soit à la forme soit au port et à la taille. De ce sous-ordre il n'y a qu'une seule famille, celle des rallidés, qui se rencontre dans l'est du Canada.

FAMILLE—RALLIDÆ. OISEAUX DU TYPE RÂLE.

Description générale. Doigts longs et effilés, dans le but de couvrir un grand espace de terre molle où le pied se fixe avec peine. Les caractères du pied sont un peu comme ceux des oiseaux de rivage, mais le doigt de derrière est aussi long et bien développé que les autres, et son insertion est au même niveau qu'eux au lieu d'être légèrement plus élevé. A cet égard, ils ressemblent aux hérons, mais peuvent s'en distinguer par leur forme qui n'a rien du héron et par leurs lores emplumés.

Ce sont des oiseaux de marais typiques, qui se cachent dans les hautes herbes et les roseaux qui courent rapidement sur des masses peu résistantes de végétation à moitié flottante, qui préfèrent se cacher plutôt que de voler à l'approche du danger. Ils nagent tous, quelques-uns toujours, les autres par occasion. La famille est divisée en trois sous-familles: *Rallus*, le râle vrai; *Gallinulinae*, gallinules ou poules d'eau; et les *Fulicinæ*, ou foulques.

Sous-famille—*Rallus*. Les Râles vrais.

Description générale. Oiseaux à corps très plat, comprimés latéralement, bien faits pour se glisser parmi des roseaux et des herbes qui croissent très serrés; ailes petites, arrondies et relativement faibles; la charpente totale de l'oiseau est lâche, lui donnant la flexibilité requise par sa tenue et son habitat, mais ne se prêtant pas à un effort considérable et continu.

Trait
semblable
plaque fr

Indica
vol lent e
et précipi
subitemer

Les
étroites
vitesse
leurs ai
la main
saisi de
raremer
que peu
savent
distant
qu'ils tr

Les
bruit so
ques et
canadie
bec cou
élégant
semblab
n'ont qu
bec trap

208.

le cou et l
bordure d
noir. Les

Traits
coloration,

Indicat
la taille, la

Nid.

Habitat
gions inféri

Le 1
(figure 2
plus gr
entre plu
différent
de Virgii
salants d

212. 1
petit que l

Traits d
de la Caroli
ment lavés
petit que le
sur un témo
grands lacs,
de sa prése

Traits distinctifs. Très facilement reconnaissable aux caractéristiques négatives: oiseaux semblables au râle, comme décrit plus haut, qui ne sont ni gallinules ni foulques; sans avoir la plaque frontale sur le front comme ces oiseaux (figures 25 et 26, p. 24).

Indications sur le terrain. Les râles se dressent dans l'herbe droit sous vos pieds et partent d'un vol lent et incertain; les jambes pendantes, et le cou tendu. Ils s'envolent visiblement avec peine et précipitation, volent sans force à une petite distance au-dessus du marais et puis y retombent subitement.

Les râles sont très habiles à se cacher dans l'herbe. Ils filent le long des étroites pistes entre les bouquets de hautes herbes avec l'adresse et la vitesse des souris. Ils se fient à leur adresse à se cacher bien plus qu'à leurs ailes pour échapper au danger, souvent ils se laisseront prendre dans la main plutôt que de s'envoler. Un râle s'enfuira une fois comme s'il était saisi de panique, puis se laissera choir tranquillement; on ne le forcera que rarement alors à reprendre son vol, et caché dans un petit bouquet il ne sera que peu souvent découvert, sauf par le flair subtil d'un chien. Les râles savent nager, mais ne s'y décident que rarement et seulement à une petite distance comme lorsqu'ils passent d'un bouquet d'herbages à un autre et qu'ils trouvent l'eau trop profonde pour s'y aventurer à pied.

Les râles font beaucoup de bruit, surtout de nuit et même de jour, un bruit soudain et inattendu fera naître dans le marais un concert de cris rauques et saccadés, lors même qu'aucun oiseau ne se fait voir. Nos râles canadiens peuvent se partager en deux divisions: un type à long bec et un à bec court (figures 23 et 25, p. 24). La première division comprend le râle élégant et le râle de la Virginie, deux espèces qui ont une coloration semblable; la seconde comprend le râle de la Caroline et le râle jaune, qui n'ont qu'une ressemblance générale quant à la couleur, mais tous deux un bec trapu très semblable.

208. **Le Râle élégant.** (KING RAIL). *Rallus elegans*. L, 15. Bec long; les joues, le cou et la poitrine d'un brun canelle; le dos noir brunâtre, chaque plume ayant une large bordure d'une teinte d'ocre de la couleur de la poitrine; les flancs rayés de blanc et de noir. Les jeunes ont même couleur, mais voilée de noir.

Traits distinctifs. Au Canada, ce râle ne peut être confondu qu'avec celui de Virginie, de même coloration, mais le râle élégant est beaucoup plus grand.

Indications sur le terrain. Le vol sans force, qui est bien d'un râle comme il s'échappe de l'herbe, la taille, la coloration générale et le long bec brun rouge.

Nid. Dans les marécages humides, dans un nid fait d'herbe.

Habitat. Plutôt méridional, vient régulièrement en dedans de nos frontières le long des rivières inférieures des grands lacs, couve partout où on le trouve au Canada.

Le râle élégant peut être regardé comme le type des râles à long bec (figure 23, p. 24). Ce type a un cou plus long, une tenue et une conformation plus gracieuses que le type du bec court. Cette série est l'une entre plusieurs séries américaines d'oiseaux où des espèces distinctes ne diffèrent l'une de l'autre que par la taille. Avec le râle élégant et le râle de Virginie cette série renferme le râle claquet, oiseau exotique des marais salants des côtes plus méridionales et qu'on ne rencontre jamais au Canada.

212. **Le Râle de la Virginie.** (VIRGINIA RAIL). *Rallus virginianus*. L, 9-50. Plus petit que le râle élégant, mais autrement, tout semblable à lui.

Traits distinctifs. Il est facile à distinguer du râle élégant par sa plus petite taille, et du râle de la Caroline par son long bec rougâtre et sa coloration générale. Les jeunes oiseaux sont fortement lavés de noir et ont souvent été pris à tort pour des râles noirs. Le râle noir même plus petit que le râle jaune (5-0) et a un bec court; la présence d'aucun râle noir n'a été signalée au Canada sur un témoignage qui ne laissât aucun doute. On peut cependant le chercher dans la région des grands lacs, surtout dans le voisinage des terres basses de St-Clair, où il y a d'assez fortes preuves de sa présence, quoique aucun spécimen n'en ait encore été pris.

Indications sur le terrain. La taille, la coloration, le long bec rougeâtre (figure 23, p. 24) et ce vol incertain bien typique du râle qui veut se sortir du marais.

Nid. Dans les marécages humides, dans un nid d'herbe.

Habitat. Le sud du Canada à travers le continent, et au nord des limites actuelles des terres cultivées. Il couve partout où on le rencontre au Canada.

C'est un râle beaucoup plus commun que le râle élégant et qu'on peut s'attendre à trouver dans tout marais ou dans toute prairie mouillée de son territoire. Ses habitudes ne diffèrent pas essentiellement de celles des autres râles.

Valeur économique. Son habitat situé dans les terres où rien ne se récolte exclut l'idée que cet oiseau s'alimente de choses de quelque valeur. Sa nourriture consiste largement en insectes, graines de marais et matières végétales.

214. **Le Râle de la Caroline.** (SORA RAIL). *Porzana carolina.* L, 8-50. Planche VII A.

Traits distinctifs. Se distingue du râle de Virginie par son bec court et conique (figure 25, p. 24), sa coloration générale; et du râle jaune par une plus grande taille et par sa coloration.

Indications sur le terrain. À son vol incertain et balancé, quand l'oiseau s'élève au-dessus des herbes, on reconnaît le râle; le bec court, la coloration générale et l'absence de blanc sur les ailes sont caractéristiques de l'espèce.

Nid. Sur le sol dans le marécage mouillé, nid fait d'herbages.

Habitat. Situé beaucoup plus au nord que celui du râle de Virginie, mais s'étendant à travers le continent, couve partout où il se rencontre au Canada.

Dans les premiers temps de la colonisation, le râle de la Caroline constituait un gibier commun; mais l'assèchement des marais, et la facilité qu'avaient les chasseurs à en remplir parfois leur carnassière en ont bien diminué le nombre. Dans les marécages à marée, dans quelques-uns des Etats dits Atlantiques, on chasse régulièrement ce râle à la fin de l'automne. C'est donc le mieux connu de nos râles, et bien que le nombre en soit réduit comparé à celui que donnent les récits de nos anciens voyageurs, c'est encore un oiseau assez commun. Il ne lui faut pas, comme aux râles élégants et à ceux de Virginie, un habitat très étendu, il suffit parfois du plus petit borbier au couple et à ses petits pour y passer la saison.

Valeur économique. Pas très différente de celle du râle de Virginie.

215. **Le Râle jaune.** (YELLOW RAIL). *Coturnicops noveboracensis.* L, 7. C'est un râle plus petit, au bec court, un peu comme le râle de la Caroline. La coloration est aussi la même, comme effet général, mais les dessous sont lavés de lignes couleur d'ocre, les plumes de derrière ont quelques lignes blanches très fines transversales au lieu de marginales. L'oiseau a aussi des plaques blanches aux ailes, ce qui est caractéristique de l'espèce.

Traits distinctifs. Se distingue du râle de la Caroline par la taille et la coloration.

Indications sur le terrain. La taille et les plaques blanches des ailes.

Nid. Sur le sol, à la lisière humide des marécages; nid fait avec des herbes.

Habitat. Plus septentrional que celui des autres râles et s'étendant bien au delà des terres actuellement cultivées; niche partout où il se rencontre.

C'est de tous les râles le plus adroit à se dérober aux regards et à se tenir caché. Comme il est presque impossible de lever un râle, il se peut qu'il soit beaucoup plus commun qu'on n'est fondé à le croire. Selon les rapports actuels c'est un des oiseaux les plus rares au Canada. Ses habitudes ne semblent pas différer beaucoup de celles des autres râles, sauf qu'il ne lui faut pas autant d'eau dans son habitat et qu'il se rencontre plus souvent sur les bords roseaux du marécage que dans les endroits mouillés et pleins de roseaux.

Descri
longs doigts
ou écu fron
Traits
bec; et de
mément.

Indicat
il nage; co
ou jaunes c

Si l'
il arrive
tenant
mouvem
Cela suf
frontale
par un t
fois c'est
long des
tout à la
Les galli
que rare;
à de peti
gés qui l

218. I
L, 13. R
irisés avec
bleu de p
sont semb

Traits c
tères susdit

Indicati
pattes jaun

Habitat

Ne s
que dans

219. I
13-50. C'
clair plus
sur les flar
frontale d'
droit au-d

Traits d
tères sus-m
de blanc et
et les doigts

Indicati
et toutes les

Nid. C
humides; le

Habitat.
ralement co

Cett
dional. S

Sous-famille—Gallinulinae. Gallinules ou poules d'eau.

Description générale. Ce sont des oiseaux assez grands et ressemblant au canard, mais avec de longs doigts sans membrane ni partielle ni entière; bec conique qui s'étend sur le front en une plaque ou écu frontal (figure 26, p. 24).

Traits distinctifs. Se distingue des canards par l'absence des membranes et par la forme du bec; et de la foulque par l'absence des lobes digitaux; mais, par ailleurs, leur ressemblant énormément.

Indications sur le terrain. Corps rond, de même forme que celui du canard; sa tenue quand il nage; coloration générale bleue ou gris bleu; bec et plaque frontale rouges; pattes et doigts longs, ou jaunes ou verts.

Si l'on surveille tranquillement les voies libres qui traversent un marais, il arrive parfois qu'on aperçoive un oiseau nageur, au profil de canard, se tenant droit dans l'eau, la queue en l'air, et avançant avec une succession de mouvements gracieux saccadés, la tête tantôt en avant tantôt en arrière. Cela suffit presque à faire reconnaître les gallinules; mais le bec et la plaque frontale aux couleurs brillantes, visibles à une grande distance, et éclairés par un beau soleil, ne permettront plus aucun doute à cet égard. Quelquefois c'est l'observateur qui les fait partir lorsqu'il avironne tranquillement le long des détours d'un étroit chenal; tout à coup elles partent éclaboussant tout à la surface et créant beaucoup d'agitation avant de prendre leur vol. Les gallinules nagent ordinairement et avec facilité, mais elles ne s'aventurent que rarement dans des eaux ouvertes comme les foulques, elles s'en tiennent à de petites mares dans les marécages, ou à des voies ou passages bien dégagés qui les dirigent.

218. La Gallinule de la Martinique. (PURPLE GALLINULE). *Ionornis martinicus*. L. 13. Ressemble à la gallinule de la Floride, mais le cou et les parties de dessous sont irisés avec un bleu violacé très prononcé; la plaque frontale (figure 26, p. 24) est d'un bleu de plomb au lieu de rouge; les pattes sont jaunes au lieu de vertes. Les jeunes sont semblables, mais avec des tons réduits et seulement des traces d'irisation.

Traits distinctifs. On ne peut la confondre qu'avec la gallinule de la Floride, mais les caractères susdits et l'absence des raies blanches évidentes sur les flancs constituent des différences.

Indications sur le terrain. Un profil de gallinule ou de poule d'eau, une irisation bleue prononcée, pattes jaunes, et plumes sous la queue toutes blanches.

Habitat. Amérique tropicale et sous-tropicale, toujours au nord des Carolines.

Ne se rencontre qu'occasionnellement au Canada. Ne doit se cacher que dans les parties les plus méridionales.

219. La Gallinule de la Floride. (FLORIDA GALLINULE). *Gallinula galeata*. L. 13-50. C'est un oiseau uniformément bleu d'ardoise plus foncé sur la tête; un peu plus clair plus bas, teinte d'un brun rougeâtre légèrement irisé; raies blanches très visibles sur les flancs et une petite bordure des mêmes raies sous la queue; le bec et la plaque frontale d'un rouge brillant (figure 26, p. 24); les pattes vertes avec jarretières rouges droit au-dessous des plumes.

Traits distinctifs. Cette gallinule se distingue de la gallinule de la Martinique par les caractères sus-mentionnés; de la foulque, à laquelle elle ressemble tout à fait, par le bec rouge au lieu de blanc et la plaque frontale également rouge, avec les lignes blanches des flancs, le dos brunâtre et les doigts sans trace de membrane.

Indications sur le terrain. Bec et plaque frontale rouges; raies blanches aux flancs, dos brunâtre, et toutes les pointes des secondaires foncées quand l'oiseau vole.

Nid. Ordinairement sur un petit tertre qu'est un vieux nid de rat musqué dans les marais humides; le nid est fait de fragments de végétation de rebut.

Habitat. Plus au nord que celui de la gallinule de la Martinique; celle de la Floride est généralement commune au Canada seulement le long des grands lacs des régions basses.

Cette gallinule est la poule d'eau la mieux connue du Canada méridional. Sa taille assez grande et le bon goût de sa chair qu'il faut attribuer au

riz dont elle est friande et à d'autres graines de marais, en font un gibier que les chasseurs recherchent. Elle demande plus que les râles des étendues d'eau bien libres mais elle ressemble aux râles en général par des habitudes communes. C'est un oiseau plutôt bruyant, surtout la nuit, et qui, pendant le jour, fait sa partie dans le concert de cris qu'une agitation inaccoutumée et inattendue a fait éclater. Parfois un oiseau fera entendre tout d'un coup une volée de caquets que répéteront successivement tous ses pareils et pendant quelques instants ce marécage désert en apparence deviendra le théâtre d'un véritable petit sabbat de bruits d'oiseaux.

Valeur économique. Sauf comme gibier, la gallinule n'a pas d'importance économique.

Sous-famille—Fulicinæ. Foulques.

Description générale. Ce sont des oiseaux plutôt grands et semblables au canard, mais avec de longs doigts pourvus de lobes membraneux; le bec s'étend jusqu'au front en une plaque blanche frontale, espèce d'écu (figure 14, p. 22).

Traits distinctifs. Très pareils à ceux des gallinules; ces traits sont donnés à propos de la description des espèces dans la section suivante.

221. **La Foulque d'Amérique.** (AMERICAN COOT). *Fulica americana*. L, 15. C'est un oiseau dont la couleur est uniforme, gris d'ardoise, plus foncée sur la tête, plus claire au-dessous; le bec et la plaque frontale (figure 14, p. 22) sont blancs avec des taches isolées d'un brun rougeâtre au sommet de la plaque et au bout des mandibules. Les pattes sont d'un vert terne et les doigts bordés d'une dentelure de petits bouts de membrane (il y a de un à trois lobes à chaque doigt).

Traits distinctifs. Elle se distingue de la gallinule par un bec blanc et par les membranes digitales.

Indications sur le terrain. La taille, la couleur gris d'ardoise, le bec et la plaque frontale de couleur blanche et, quand l'oiseau vole, la bordure blanche aux extrémités des plumes secondaires sur les ailes.

Nid. Très semblable à celui de la gallinule de Floride.

Habitat. Plus au nord que celui des gallinules; on rencontre la foulque partout au Canada bien avant dans les terres cultivées; couve partout où elle se rencontre au Canada.

À la différence des gallinules, qui quittent tranquillement nos marécages quand commence l'automne, les foulques s'y attardent jusqu'à assez avant dans la saison, et leur nombre, augmenté de celui des oiseaux de passage venant du nord, se rencontre en larges troupes sur les petits lacs et les étangs où ils sont souvent tués par les chasseurs qui, un peu plus tard, trouvent peu de goût à leur chair.

Valeur économique. La foulque se nourrit de matières végétales même plus que la gallinule, mais, à cause de son habitat, elle ne peut avoir d'autre importance économique que comme un but de chasse de deuxième ordre.

Ordre—Limicolæ. Oiseaux de rivage, Bécasses, Maubèches, Pluviers, etc.

Description générale. Les oiseaux de rivage forment un ordre relativement facile à reconnaître mais difficile à décrire succinctement. Tous les oiseaux qui ressemblent à la bécasse ou au pluvier sont compris dans cet ordre. Ils ont des pattes qui varient de longueur depuis les peu longues jusqu'aux très longues, et qui ont des formes très fines, bien faites pour marcher dans des eaux peu profondes, et le long des bords des étangs; le cou et le bec sont à l'avenant (figures 15, 21, 23, p. 22-24). Les doigts peuvent être au nombre de trois ou de quatre, et ne sont guère faits pour percher. Ils peuvent n'avoir pas de membranes ou que des membranes partielles, soit situées à la base des doigts soit formant des dentelures ou des bordures complètes aux doigts (voir Phalaropes). Le doigt postérieur, quand il existe, est petit, faible et légèrement élevé au-dessus des autres. Les ailes sont longues et pointues et les secondaires tout près du corps sont allongées.

Traits
râles, tant
ibis ou de
absent, et

Indica
caractérist

Nid.

Habitu
monde qu
de l'ancie
plusieurs
pierres, se
quelques-t
de nicher

Les
étaient
considér
ne les tu
bécasse
représen
Phalaro
ne se re
bécassin
Charadr
les huîtr
de l'Est.

Val
terrains
quentent
leurs noi
fensif ou

Descrip
mais au plu
bordés de l
connaître.

Traits
être confon

Indicati
et de se nou

Nid. S

Habitat.
les moins él
oiseaux mig
vallée du M

Les p
rivage, d
compris 1
pleine eau
cune espé
Origi
tout auta
représent

Traits distinctifs. Certains oiseaux de rivage montrent une ressemblance superficielle avec les râles, tandis que d'autres par certains traits caractéristiques (courlis) peuvent être pris pour des ibis ou des hérons, mais peuvent s'en distinguer par le doigt postérieur ou petit et surélevé, ou absent, et par l'absence de peau dénudée entre l'œil et le bec.

Indications sur le terrain. Le profil général, le port, l'habitat et le vol sont des indications caractéristiques faciles à reconnaître.

Nid. Sur le sol; une espèce fait exception à la règle.

Habitat. Cet ordre, celui des oiseaux de rivage, est cosmopolite, et il y a peu de régions du monde que les membres de cet ordre n'occupent pas. Les formes particulières à l'hémisphère nord de l'ancien et du nouveau monde sont étroitement congénères; quelques-unes sont identiques, plusieurs sont apparentées comme sous-espèce, et d'autres, en petit nombre, comme le tourne-pierres, se rencontrent partout. La plupart de nos espèces boréales nichent dans l'extrême nord, quelques-unes même aussi loin que ces régions ont été explorées, quoiqu'il arrive à un petit nombre de nicher sur nos frontières méridionales et au delà.

Les oiseaux de rivage, dans les premiers temps où ils étaient abondants, étaient un gibier de l'air très apprécié; aujourd'hui que le nombre en est si considérablement réduit on a perdu l'habitude de leur faire la chasse et on ne les tue que par occasion. Parmi les oiseaux de rivage de l'est du Canada, la bécasse et la grande bécassine sont les plus intéressants comme gibier. Les représentants de l'ordre dans le Canada oriental se divisent en six familles: *Phalaropodidæ*, phalaropes; les *Recurvirotridæ*, les échasses et avocettes qui ne se rencontrent que par hasard dans l'est du Canada; *Scolopacidæ*, les bécassines et les bécasses d'Europe constituent le gros de nos espèces; *Charadriidæ*, le pluvier; *Aphrizidæ*, les tourne-pierres; *Hamatopodidæ*, les huîtriers, jadis rares, aujourd'hui probablement disparus de nos confins de l'Est.

Valeur économique. La plupart des oiseaux de cet ordre habitent les terrains déserts et n'ont que peu d'influence économique; d'autres, qui fréquentent les champs cultivés, sont plus importants et seront traités sous leurs noms d'espèces. De façon générale, cependant, cet ordre est ou inoffensif ou très utile à l'homme.

FAMILLE—PHALAROPODIDÆ. PHALAROPES.

Description générale. Petits oiseaux, de 7-75 pouces à 8-75 de long, échassiers d'apparence mais au plumage serré et semblable à celui du canard. Ce fait, ajouté à celui de leurs doigts bordés de lobes membraneux, de bordures et de tarsi aplatis, les rend relativement faciles à reconnaître.

Traits distinctifs. Ce sont de petits échassiers caractérisés comme ci-dessus. Ne peuvent être confondus avec aucun autre oiseau.

Indications sur le terrain. La taille et le bec sont caractéristiques, ainsi que la façon de nager et de se nourrir en eau profonde. Ce sont les seuls oiseaux de rivage qui nagent habituellement.

Nid. Sur le sol; nid garni d'un peu de mousse ou d'herbe.

Habitat. Dans le nord et dans l'ouest. Une espèce couve dans les provinces de la prairie les moins élevées, les deux autres le long des côtes arctiques et des îles avoisinantes. Ce sont des oiseaux migrateurs ordinaires le long des côtes atlantiques de l'est du Canada et plus bas, dans la vallée du Mississippi, mais de purs vagabonds dans la région des grands lacs.

Les phalaropes constituent une petite famille très originale d'oiseaux de rivage, dont les véritables rapports avec d'autres familles sont à peine bien compris ni bien établis. Ils nagent avec facilité et on les voit souvent en pleine eau, même en pleine mer, où ils sont autant dans leur élément qu'aucune espèce maritime.

Originaux quant à leur structure et à leurs affinités ordinaires, ils le sont tout autant dans leurs habitudes. C'est la femelle, et non le mâle, qui représente par ses belles couleurs le cercle familial, qui prend l'initiative des

avances dans le temps des amours, qui fait toutes les démarches auprès du futur conjoint, personnage timide et au modeste plumage, auquel, après qu'elle a rempli ses devoirs de pondeuse, cette femelle laisse les soucis de la couvaison et de l'éducation des petits.

Valeur économique. Ces oiseaux fréquentent l'eau ou les rivages stériles et n'ont aucune importance économique.

222. Le Phalarope roux. (GERY PHALAROPE). *Phalaropus fulicarius*. L, 8-12. La femelle adulte est facilement reconnaissable par la couleur uniforme, brun rougeâtre terne de l'avant-cou et des parties de dessous. Le dos est de couleur ocre et noire en raies. Le mâle est tout semblable, mais les couleurs sont voilées, brisées et moins distinctes. En hiver cette espèce est d'un gris d'ardoise dessus et blanc dessous.

Traits distinctifs. Le phalarope roux peut se distinguer facilement de l'un ou de l'autre des deux membres de la famille par son bec et ses pieds, celui-là étant relativement large et plat. Les doigts sont palmés à la base et avec des dentelures des deux côtés. Voir l'espèce suivante.

Indications sur le terrain. Ses manières d'être en général et son habitat. Dans la saison de la couvaison la couleur est la meilleure indication pour le reconnaître. Sur mer cette espèce laisse voir, paraît-il, plus de noir au sommet de la tête et aux ailes que les autres phalaropes. Dans le cas du plumage incomplet le bec relativement court et aplati est peut-être le meilleur moyen d'identification.

Habitat. Cet oiseau niche tout le long de la côte arctique de l'Amérique; il voyage et descend sur les deux côtés de ce continent; il est rare à l'intérieur des terres dans la région des grands lacs.

223. Le Phalarope hyperboréen. (NORTHERN PHALAROPE). *Lobipes lobatus*. L, 7-75. Femelle adulte: les parties supérieures, celle de derrière le cou, et la tête, sont couleur d'ardoise foncée; la gorge et le dessous sont blancs; les côtés du cou, qui se rejoignent devant le bas du cou, sont d'un roux ardent, avec des lignes de la même couleur le long du dos sur les ailes refermées. Le mâle est tout semblable, mais voilé et de couleur atténuée. Les oiseaux d'hiver sont gris clair en dessus, blanc dessous, avec un simple soupçon de coloration en dessus.

Traits distinctifs. Bec très mince en forme d'aiguille; ressemble plutôt au phalarope de Wilson mais plus court; les pieds ont de petites membranes et des bords dentelés, comme le phalarope roux.

Indications sur le terrain. Couleur générale et bec fin en forme d'aiguille. Le plus petit des phalaropes de l'est du Canada.

Habitat. Le même que le précédent.

224. Le Phalarope de Wilson. (WILSON'S PHALAROPE). *Steganopus tricolor*. L, 8-75. Oiseau d'un plumage magnifique. La femelle adulte a des raies de couleur d'un contraste accusé sur la tête et le cou. Une couronne gris perle passant au blanc sur le derrière du cou, et au gris sur les épaules. Ligne noire passant par l'œil jusque sur le côté du cou et devenant d'un rouge châtain ardent et qui continue latéralement le long du dos. La gorge d'un blanc passant à une délicate couleur vineuse au cou et à la poitrine, et qui revient au blanc dans les parties de dessous. Le mâle est brun grisâtre en dessus, et blanc en dessous, avec une apparence légère de la coloration plus brillante des femelles.

Traits distinctifs. Bec très long, 1-25 pouces, mince, forme d'aiguille, c'est l'espèce précédente exagérée. Les pieds ne sont pas palmés, mais sont pourvus de rebords membraneux étroits, et unifiés.

Indications sur le terrain. Couleur, taille, bec très long et mince.

Habitat. C'est une espèce du milieu de l'Ouest, et plus méridionale que la précédente, couvant dans les provinces de la Prairie et qui n'apparaît que par hasard dans l'Est sur la partie inférieure des grands lacs.

FAMILLE—RECURVIROSTRIDÉ. AVOCETTES ET ÉCHASSES.

Description générale. Ces oiseaux sont parmi les plus grands de ceux de rivage et sont reconnaissables à leurs couleurs, qui contrastent entre elles de façon frappante, et à la longueur singulière de leurs pattes et de leur bec. Ces caractères sont poussés à l'extrême chez les échasses qui, toutefois, ne rentrent pas dans nos limites. L'avocette s'est rencontrée accidentellement dans nos contrées à l'est de la Prairie.

225. L'Avocette d'Amérique. (AMERICAN AVOCET). *Recurvirostra americana*. L, 16-50. Oiseau de rivage grand et très frappant, avec une tête et un cou de couleur vineuse

très chau
sur le dos

Traits
Ce trait es
Nid.

Habita
provinces e

Cet
contre q

Descri
la plus gra
ou de mar
ce qui a fa
le Sanderl
(fig. 21, et
(p. 10) ils se
et très sen

Traits
noms popu
familles pr

Nid.
garnis mai

Habitat
contrent at
l'intérieur
suivent des

Par
et des m
bèches q
des haut
gnies d'
nichaien
l'occupa
qu'une t
seurs ign
serrées il
quatre-v
rien d'ét

Val
utiles sel

228. 1
Planche V

Traits à
feuille mort

Indicati
ou d'un bru

Nid. 8
s'harmonis

Habitat
des individ

Les
mouillés

très chaude passant au blanc dans les parties de dessous; le noir et le blanc se rencontrent sur le dos en contraste violent.

Traits distinctifs. Bec très long, mince, en pointe, et qui se recourbe dans sa moitié extrême. Ce trait est toujours distinctif.

Nid. Dans un petit creux près de l'eau.

Habitat. C'est un oiseau qu'on rencontre à l'intérieur de l'Ouest central, qui niche dans les provinces de la Prairie et qu'on ne voit qu'accidentellement à l'est du Manitoba.

Cette espèce n'est comprise parmi nos oiseaux que parce qu'on en rencontre quelques spécimens à l'est des provinces de la Prairie.

FAMILLE—SCOLOPACIDÆ. OISEAUX DU TYPE BÉCASSINE,
"TIP-UPS," MAUBÈCHES, ETC.

Description générale. Ce sont des oiseaux de taille petite à moyenne, le courlis étant l'espèce la plus grande. Les pieds ne sont jamais entièrement palmés ni les doigts pourvus de bordures ou de marges membranées. Quelques espèces ont de petites membranes entre la base des doigts, ce qui a fait appeler ces oiseaux semi-palmés ou à demi-membranes. Toutes les espèces, sauf une, le Sanderling, ont quatre doigts. Les becs sont longs, minces et pointus; ordinairement droits (fig. 21, et 22, p. 23); mais quelquefois recourbés en dedans; à l'occasion, comme chez les barges (p. 10) ils sont très légèrement recourbés en dehors; plutôt flexibles et ordinairement un peu agrandis et très sensibles à la pointe.

Traits distinctifs. Ce sont manifestement des oiseaux de rivage, généralement connus sous les noms populaires ci-dessus. Le bec ne finit pas en une pointe finement acérée, comme celui des familles précédentes, et n'a pas la base tendre et la pointe cornée des tourne-pierres et des hultriers.

Nid. Tous, sauf une seule espèce, le chevalier solitaire, nichent sur le sol dans de petits creux garnis maigrement des matières végétales environnantes.

Habitat. Le plus grand nombre niche dans l'extrême nord, quoique certaines espèces se rencontrent au sud de la frontière des États-Unis. Ils émigrent le long de nos rivages ou à travers l'intérieur selon qu'ils appartiennent à telle espèce ou à tel habitat. Quelques-uns de ces oiseaux suivent des routes intéressantes dans leurs migrations.

Parmi ces oiseaux citons les bécasses et les bécassines des forêts humides et des marécages; les maubèches tachetées, à branle-queue et les autres maubèches que nous voyons le long de nos rivages et de nos rivières, et les courlis des hauts plateaux. Ces espèces formaient le gros des admirables compagnies d'oiseaux de rivage qui autrefois peuplaient nos rivages. Comme ils nichaient généralement bien loin par delà les limites des terres cultivées, l'occupation par les immigrants des terrains où ils avaient leurs nids n'a eu qu'une très minime influence sur leur nombre; mais c'est le fusil des chasseurs ignorants et stupides qui les a décimés. Comme ils volent en troupes serrées ils présentent une manière de cible facile à viser et on en a vu tomber quatre-vingts et davantage abattus par un seul coup de fusil; il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ces oiseaux soient devenus relativement rares.

Valeur économique. Ils sont tout à fait inoffensifs ou même réellement utiles selon l'habitat.

228. La Bécasse d'Amérique. (AMERICAN WOODCOCK). *Philohela minor*. L, 11
Planche VII B.

Traits distinctifs. Long bec (figure 21, p. 23) et les yeux situés très hauts dans la tête, couleur feuille morte des parties de dessous, les bruns très riches du dos sont distinctifs.

Indications sur le terrain. L'habitat de cet oiseau, ajouté à son bec, à sa taille, à sa coloration ou d'un brun riche ou feuille morte la font aisément reconnaître à l'état vivant.

Nid. Sur le sol parmi les feuilles mortes de l'année précédente avec lesquelles son plumage s'harmonise si bien.

Habitat. Toujours dans le sud de l'Ontario, dans la partie basse des grands lacs, quoique des individus vagabondent accidentellement sur un espace bien plus étendu.

Les bécasses fréquentent les plantations d'arbrisseaux simplement mouillés ou inondés, les bocages d'aunes ou de noisetiers, ou la lisière touffue

des forêts humides. Si on les dérange, elles s'enlèvent soudain de terre, volent au hasard avec un singulier sifflement d'ailes et, passant par-dessus les broussailles, se laissent tout à coup tomber pour se cacher à quelques mètres de là. La génération présente se rappelle certainement que dans les clairières du sud de l'Ontario les bécassines pullulaient autrefois; tandis qu'aujourd'hui, les chasseurs pouvant donner carrière à leur passion, les terrains jadis délaissés ayant été déboisés et drainés, le chat domestique aidant peut-être aussi, la bécasse est devenue rare, presque introuvable. À l'inverse de la gelinotte huppée ou de la perdrix qui demandent des étendues considérables de terres vierges, il n'y a aucune raison essentielle qui empêcherait la bécasse d'être encore abondante et de procurer bien longtemps encore beaucoup d'exercice cynégétique aux amateurs. Il suffira aux besoins de cet oiseau de trouver le plus petit abri écarté parmi les arbrisseaux humides. La bécasse part pour le sud peu après le commencement de la saison et ne reste pas longtemps exposée aux entreprises des chasseurs permissionnaires. Après l'homme, c'est le chat qui semble être le principal ennemi de la bécasse, et comme celle-ci vit et niche sur le sol, se fiant à la couleur de son plumage et à sa cachette pour la protéger, elle est singulièrement exposée aux attaques des félinés.

230. La Bécassine de Wilson. (WILSON'S SNIPE). *Gallinago delicata*. L, 11-25. Planche VIII A.

Traits distinctifs. Il est très peu probable qu'elle puisse être prise pour une autre espèce au Canada, mais la queue d'un brun rougeâtre, qui devient blanche sur les plumes extérieures, et barrée de noir, la distinguera bien assez, au besoin.

Indications sur le terrain. L'habitat (prés herbeux bien découverts), long bec, vol curieux en spirale quand elle s'élève de terre, en sus de la taille, de la coloration générale de la queue d'un brun rougeâtre et blanchâtre. La bécasse et la bécassine rousse sont les seuls autres oiseaux semblables.

Habitat. Couve partout sur le continent, tout juste en dedans des limites des terres cultivées, et irrégulièrement sur les confins méridionaux. Elle est commune d'un bout à l'autre du Dominion.

231. La Bécassine rousse. (DOWITCHER, RED-BREASTED SNIPE). *Macrorhamphus griseus*. L, 10-50. Adulte au printemps: la gorge, le devant du cou, la poitrine et toutes les parties de dessous sont très rougeâtres. Le dos et les parties de dessus sont nuancés de teintes analogues et d'un brun foncé. Plumage d'automne: brun grisâtre terne sur la tête, le cou, le haut de la poitrine, les flancs et le dos, nuancé d'un brun plus accusé sur ces dernières parties; blanc en dessous. Le bas du dos est toujours blanc. Des teintes intermédiaires se présentent dans tout le plumage.

Traits distinctifs. La même apparence générale que chez la bécassine, mais le devant est rouge, ainsi que les dessous, au printemps; en automne, les tons bruns si riches de cette espèce disparaissent. Le bec est plus long, comparé à la taille, que chez aucun autre oiseau, la bécassine de Wilson exceptée. Une poitrine rouge très semblable se voit chez la maubèche à poitrine rousse, mais le plus long bec de la bécassine rousse (L, 2-10—2-50 contre L, 1-30) est un moyen d'identification concluant.

Indications sur le terrain. C'est à peu près la taille et le profil général de la bécassine de Wilson mais avec du blanc très en vue sur le bas du dos, et plus blanc sur la queue. L'habitat est aussi différent.

Habitat. Il couve dans l'extrême nord, dans l'ouest, et probablement plus à l'est de la baie d'Hudson. Il est rare sur les grands lacs, plus commun sur la côte. Nos bécassines rousses de l'Est sont supposées être des oiseaux nicheurs de l'Ungava, mais on n'a pas là-dessus des renseignements exacts.

SOUS-ESPÈCE. Une sous-espèce qui se différencie un peu: la bécassine rousse à long bec, *M. g. scolopaceus*, se rencontre dans l'Ouest. Elle se distingue par sa taille légèrement plus grande, son plus long bec, une poitrine plus fortement tachetée, et le rouge plus étendu en dessous. Il est difficile de différencier des plumages brillants; les oiseaux et les tout jeunes ne peuvent que rarement se distinguer les uns des autres. La bécassine rousse à long bec ne peut être cherchée dans l'est du Canada que dans la région des grands lacs et sa présence ne devrait pas être signalée à moins que le spécimen n'ait été dûment comparé avec un exemplaire authentique.

C'est un oiseau qui recherche les terrains boueux plutôt que les prairies herbeuses.

233. I
L, 8-25. I
qui sont fu
sur le dev
aucune tra
dessin acc
de teintes
vaguement

Traits d
telles qu'or
longueur du
rivage de t
mais il est)

Indicati
tures sus-ca
temps et bl

Habitat
grations ell
mais rare et

C'es
quelquef
pieds jau

234. I
canutus.
brunes et
plus pâles
poitrine et

Traits c
avec la béc
constitue u
espèces de
maubèche)
à peine mai
et qu'on ne

Indicati
elle ressem
meilleur si

Habitat
rable. Ell
australe, et
des grands

C'es
que dan

235.
D'un blar
cou, de la
au-dessou
et légèren
plumage)
Les patte

Traits
Indicat
En autom
arrive très

Habita
elle émigr
SOUS
et l'Ancier
prée de l'I

C'e
tous les

233. **La Maubèche à longs pieds.** (STILT SANDPIPER). *Micropalama himantopus*. L, 8-25. Taches brunes sur un fond de blanc mat; parties de dessous plus claires, celles qui sont foncées sont disposées en barres uniformes qui se changent en raies obscures sur le devant du cou et en taches fines sur la gorge. Le plumage d'automne ne montre aucune trace de ces barres caractéristiques; le dos a des teintes variées de brun en un dessin accusé; les parties de dessous sont presque tout à fait blanches, légèrement voilées de teintes ocreuses sur la poitrine et le devant du cou, où le brun présente des taches vaguement foncées.

Traits distinctifs. Les parties de dessous du plumage de printemps, uniformément barrées, sont telles qu'on ne peut pas s'y tromper. L'oiseau d'automne ressemble à plusieurs espèces. La longueur du bec, 1-50 et celle du tarse, 1-60, sont plus grandes que celles d'aucun autre oiseau de rivage de taille d'ailleurs égale. La maubèche à dos roux a un bec d'à peu près égale longueur, mais il est plus massif et son bout extrême n'a pas le même élargissement abrupt en spatule.

Indications sur le terrain. Le contraste entre sa petite taille et son très long bec. Les couvertures sus-caudales, au lieu des sous-caudales comme chez la bécassine rousse, sont claires au printemps et blanches en automne.

Habitat. Elle couve sur la côte arctique au nord-ouest de la baie d'Hudson. Dans ses migrations elle est probablement plus commune dans l'intérieur que sur la côte. Elle est régulière, mais rare en automne sur le lac Ontario.

C'est un des oiseaux de rivage dans l'Est, et des plus rares, qui se trouve quelquefois en compagnie de la bécassine rousse et des grands chevaliers à pieds jaunes dans les marais boueux.

234. **La Maubèche à poitrine rousse.** (KNOT, RED BREASTED PLOVER). *Tringa canutus*. L, 10-50. Au printemps, les parties de dessus marbrées de différentes teintes brunes et ocreuses, la gorge, le devant du cou, et au-dessous des teintes brun rougeâtre, plus pâles vers la queue. En automne, un gris clair fumeux, blanc pur en dessous, la poitrine et le devant du cou un peu plus foncés avec des taches fines, un peu obscurcies.

Traits distinctifs. Ces oiseaux au printemps peuvent, quant à la taille, être confondus seulement avec la bécassine rousse. Le bec court, L, 1-30, en contraste avec L, 2-10-2-50, de la bécassine, constitue une différenciation concluante. Les oiseaux, en automne, sont très semblables à plusieurs espèces de même coloration. La coloration gris clair du dos est tout à fait pareille à celle de la maubèche à dos roux, mais chez la maubèche à poitrine rousse chaque plume a, en marge, une ligne à peine marquée de couleur plus claire qui donne l'impression d'une succession de demi-cercles, et qu'on ne voit chez aucun autre oiseau de rivage.

Indications sur le terrain. Au printemps, bec plus court que celui de la bécassine rousse à laquelle elle ressemble par ailleurs, avec une teinte grisâtre mais non très blanche sur la queue; c'est le meilleur signe indicateur.

Habitat. C'est une espèce circumpolaire qui voyage dans une étendue d'un rayon considérable. Elle couve dans les îles du cercle arctique et dans ses voyages d'hiver va dans l'Afrique australe, en Patagonie, en Nouvelle-Zélande, etc. Elle paraît être moins commune dans la région des grands lacs que sur la côte de l'Atlantique.

C'est un oiseau qu'on rencontre sur les plages sableuses aussi bien que dans les marécages boueux.

235. **La Maubèche pourprée.** (PURPLE SANDPIPER). *Arquatella maritima*. L, 9. D'un blanc grisâtre sur le dos, la tête comprise, et qui s'étend en travers du devant du cou, de la gorge, et le long des flancs. Plus pâle sur la gorge et très foncé sur le dos, blanc au-dessous. Sur les parties plus foncées on voit une couleur pourprée vaguement étendue et légèrement irisée, plus ou moins marbrée de teintes claires sur le bord des plumes. Le plumage d'automne est semblable, mais les bords clairs des plumes sont plus étendus. Les pattes et les pieds sont orange au printemps.

Traits distinctifs. C'est le seul oiseau de rivage avec un dos si uniformément noir.

Indications sur le terrain. Au printemps, couleur sombre générale et pattes courtes orange. En automne, la saison même de leur arrivée est en elle-même presque un signe indicateur, car elle arrive très tard, même presque en hiver alors que tous les autres oiseaux de rivage sont partis.

Habitat. La maubèche pourprée de l'Est couve probablement dans les îles arctiques. Quand elle émigre, elle est plus commune sur la côte maritime que sur les grands lacs où elle est très rare.

Sous-Espèce. La maubèche pourprée se rencontre dans les deux mondes, le Nouveau et l'Ancien. La sous-espèce qui se rencontre sur la côte est du Canada c'est la maubèche pourprée de l'Est, le type de la race.

C'est un oiseau migrateur très tardif, qui arrive longtemps après que tous les autres oiseaux de rivage nous ont laissés. Les mois de novembre et

de décembre sont les mois de leur arrivée. Leur apparente rareté peut être surtout attribuée à ce qu'elle arrive quand les rivages sont désertés par les chasseurs. Ils préfèrent les rivages rocheux au sable ou à la boue.

239. La Maubèche à poitrine cendrée. (PECTORAL SANDPIPER). *Pisobia maculata*. L. 9. Les parties de dessus sont bien foncées, chaque plume étant bordée d'une teinte d'ocre pâle; les dessous et la gorge sont blancs; le bas du cou et la poitrine sont étendus d'un brun chamois pâle avec des raies serrées d'un brun foncé.

Traits distinctifs. La taille et le devant qui est assez fortement rayé de brun chamois, sont bien distinctifs. La maubèche à croupion blanc et la maubèche de Baird peuvent lui ressembler à cet égard, mais le croupion de la première et la petite taille des deux sont en évidence.

Indications sur le terrain. Son habitat ordinaire dans les marécages herbeux fera de la bécassine de Wilson celle avec laquelle on pourra le plus facilement la confondre, mais la petitesse du bec de la maubèche à poitrine cendrée est manifeste. Celle-ci se présente comme un oiseau d'un brun uniforme sans couleur claire au croupion ou ailleurs, assez semblable à une grosse maubèche de Wilson.

Habitat. Elle couve sur la côte arctique, au nord-ouest de la baie d'Hudson. C'est un voyageur ordinaire dans tout l'est du Canada.

La maubèche à poitrine cendrée, comme la bécassine de Wilson, se rencontre dans les prés humides et herbeux, ou dans les terrains boueux, rarement sur les plages sablonneuses. Dans l'herbe un chien la tient facilement en arrêt, et la chasse en est parfois excitante. Sur le terrain de la couvaison le sac qu'elle a au cou peut s'enfler de façon extraordinaire, et l'oiseau produit quand il vole, un chant qui est fort inaccoutumé chez les oiseaux de rivage qui sont généralement non chanteurs.

240. La Maubèche à croupion blanc. (WHITE RUMPED SANDPIPER). *Pisobia fuscicollis*. L. 7-50. Le dos et les parties de dessus sont brun foncé avec large bordure grisâtre et brun ocreux, le grisâtre prédominant. Le croupion et toutes les parties de dessous sont blancs, le devant du cou et le haut de la poitrine sont fortement et finement rayés de brun foncé. En automne la coloration est semblable, mais il y a plus de rouge ocreux au dos et les raies du devant sont plus fondues.

Traits distinctifs. La taille et le croupion blanc la distinguent d'espèces analogues. La barge de la baie d'Hudson et la maubèche à longs pieds ont les couvertures sus-caudales blanches, mais le premier de ces deux oiseaux est beaucoup trop grand pour se prêter à une erreur, et le bec plus long et plus mince et la poitrine rayée du second sont bien distinctifs.

Indications sur le terrain. Taille et couleurs générales; gros croupion blanc bien visible.

Habitat. Cette maubèche couve sur la côte arctique à l'ouest jusqu'à la frontière prochaine de l'Alaska. Pendant la migration elle est commune sur la côte de l'Atlantique, plutôt rare dans la région des grands lacs.

Cette espèce fréquente les terrains boueux et les rivages rocheux plutôt que les plages sablonneuses. Elle accompagne souvent les compagnies de maubèches de Wilson et des maubèches semi-palmées.

241. La Maubèche de Baird. (BAIRD'S SANDPIPER). *Pisobia bairdi*. L. 7-40. Le dos jusqu'au sommet de la tête est brun foncé bordé d'une teinte ocreuse légère; au-dessous et à la gorge, du blanc, une bande d'un chamois pâle en travers de la poitrine; le bas du devant du cou est vaguement rayé de lignes brunes assez fines.

Traits distinctifs. Elle ressemble à la maubèche précédente mais avec le croupion plus foncé et plus de chamois étendu en travers du devant. Extrêmement semblable aussi à la maubèche de Wilson, mais plus grande.

Indications sur le terrain. Elle ressemble à une grande maubèche de Wilson avec du chamois étendu sur la poitrine.

Habitat. Couve sur la côte arctique d'un bout à l'autre du continent. Plus commune dans ses migrations vers les provinces de la Prairie que sur les côtes. N'est pas rare dans la région des grands lacs, mais l'est davantage plus à l'est.

Les parages sablonneux et boueux semblent attirer également cette espèce. On la trouve souvent en compagnie de maubèches de Wilson et de maubèches semi-palmées, quoiqu'elle soit moins dépendante de l'eau que plusieurs des membres de cette famille.

242.
parties c
teintes c
poitrine
avec plu

Trait
semi-palm
entre les

Indica
foncé au li

Habit
aussi loin
pendant s

C'

sa tout
troupe
fréquen
voisé et
la sienn
Elle ar

243.

L. 8. C
avec auc
presque
surface a
d'automne
forme, d
dessous

Traits
rousse da
bords des
printannie
vertures s

Indica
visibles.
recourbur
tion.

Habit
dos roux c
teur ordin

SOU.
espèce. I
monde qu

Ce'

salés.

au prin

244.

une petit
en dessou

Traits
ce qu'elle
Habit
oriental.
l'ait été u

C'e

dit qu'il
dans l'e
signalen
bien dét

242. **La Maubèche de Wilson.** (LEAST SANDPIPER). *Pisobia minutilla*. L, 6. Les parties de dessus et la couronne sont brun foncé et bordées plus ou moins de diverses teintes de chamois ocreux et d'un rouge vermeil; blanc en dessous. En travers de la poitrine et du devant du cou une teinte foncée étendue et quelquefois nuancée de chamois avec plus ou moins de raies et de taches d'un noir foncé.

Traits distinctifs. Cette maubèche se distingue de toutes les autres espèces, sauf de la maubèche semi-palmée, par sa taille minuscule, et de la maubèche semi-palmée par l'absence des membranes entre les doigts.

Indications sur le terrain. Elle se différencie de la maubèche semi-palmée par la couleur verdâtre foncé au lieu de noir des pattes.

Habitat. Elle couve sous les hautes latitudes d'un rivage à l'autre du continent et, dans l'Est aussi loin, au sud, que les îles de la Madeleine dans le golfe du Saint-Laurent. Elle est commune, pendant ses voyages, à travers tout le Canada oriental.

C'est un des oiseaux de rivage les plus répandus. Il est probable que sa toute petite taille l'a protégée contre les chasseurs, lors même que de ses troupes serrées on en peut tuer un grand nombre d'un seul coup de fusil. Elle fréquente les plages sablonneuses et les terrains boueux, c'est un oiseau apprivoisé et confiant. Elle se mêle volontiers à des troupes d'autres espèces que la sienne, bien que, si on l'effraie, elle s'en sépare pour les rejoindre plus tard. Elle arrive et repart plus tôt dans l'automne que les semi-palmés.

243. **La Maubèche à dos roux.** (DUNLIN, RED-BACK SANDPIPER). *Pelidna alpina*. L, 8. Cet oiseau printanier est trop fortement caractéristique pour qu'on le confonde avec aucun autre. Le dos brun foncé a une si large bordure de rouge ocre que d'en être presque tout rouge. Une grande tache plus ou moins diffuse, presque noire, occupe la surface abdominale. Le bec est légèrement courbé en bas (figure 22, p. 23). L'oiseau d'automne manque de ces caractères frappants. La surface de dessus est presque uniforme, d'un gris brunâtre, pâle, étendu en travers de la poitrine et du bas du cou. Les dessous et la gorge sont blancs.

Traits distinctifs. Sa couleur d'automne est semblable à celle de la maubèche à poitrine rousse dans la même saison, mais sa plus petite taille et l'absence des demi-cercles pâles sur les bords des plumes la différencieront toujours, même en l'absence de traces accidentelles de plumage printanier. Cette coloration peut aussi faire penser au courlis ou bécasse de mer, mais les ouvertures sus-caudales sont foncées au lieu de grisâtres.

Indications sur le terrain. Au printemps, le dos rouge et la tache noire en dessous sont très visibles. En automne, dos gris uniforme et, quand l'oiseau vole, une ligne de blanc sur l'aile. La recourbure du bec vers le bas quoique assez légère est cependant distincte et facilite l'identification.

Habitat. L'individu européen compris, cette espèce est circumpolaire. Cette maubèche à dos roux d'Amérique couve par places sur la côte arctique, à travers le continent. C'est un migrateur ordinaire dans tout le Canada oriental.

SOUS-ESPÈCE. Le représentant de cette maubèche dans le nouveau monde est une sous-espèce. La maubèche à dos roux d'Amérique *P. a. sakhalina*, ne se distingue de celle de l'ancien monde que par sa taille légèrement grande.

Cet oiseau fréquente les banes de sable, les terrains boueux ou les prés salés. Il est parmi les tout derniers des oiseaux de rivage à arriver à la fois au printemps et en automne.

244. **La Maubèche courlis.** (CURLIEW SANDPIPER). *Erolia ferruginea*. L, 8. C'est une petite bécasse à poitrine rousse. Oiseaux d'automne brun grisâtre en dessus et blanc en dessous.

Traits distinctifs. Elle ressemble à la maubèche à poitrine rousse ou à la bécassine rousse en ce qu'elle a la poitrine rousse, mais elle est beaucoup plus petite et de charpente plus légère.

Habitat. Elle couve dans la Sibérie arctique. Ne se rencontre que par hasard dans le Canada oriental. On l'a signalée plus souvent sur la côte de l'Atlantique que dans l'intérieur bien qu'elle l'ait été une fois près du lac Ontario.

C'est un oiseau de l'ancien monde vu quelquefois dans le nouveau. On dit qu'il ressemble à la maubèche à dos roux par le port, mais il est trop rare dans l'est du Canada pour en parler comme d'un visiteur régulier. Tout signalement de la présence d'un courlis doit être appuyé par des spécimens bien déterminés et soumis à un rigoureux examen.

246. **La Maubèche semi-palmée.** (SEMIPALMATED SANDPIPER). *Ereunetes pusillus*. L, 6-30. Les parties de dessus, y compris la couronne, sont bordées d'un brun foncé avec un ocre ou un chamois pâle, blanc en dessous avec une bande vague légèrement plus foncée en travers de la poitrine avec raies et taches obscures.

Traits distinctifs. Elle ressemble beaucoup par la taille et la coloration à la maubèche de Wilson dont on ne peut pas toujours la distinguer à moins de l'examiner de très près. Les pieds, toutefois, ont de petites membranes entre leurs bases, d'où vient à cet oiseau le nom de semi-palmée.

Indications sur le terrain. Elle se différencie de la maubèche de Wilson par sa taille légèrement plus grande, son dos gris plus pur et la poitrine plus blanche et plus clairement délimitée. Les pattes et les pieds sont noirs au lieu d'être d'un vert olive foncé.

Habitat. Couve le long de la côte est du pôle, au sud du Labrador méridional. C'est un migrateur ordinaire dans tout le Canada oriental.

Cette maubèche est très semblable par son port et son apparence à la maubèche de Wilson (page 99). La maubèche de l'Ouest, *Ereunetes mauri*, est un individu très parent qui peut n'être qu'une sous-espèce de la maubèche semi-palmée. Elle se distingue par un bec légèrement plus long et par une plus forte quantité de roux sur le dos, spécialement au derrière de la tête. Il est fort douteux qu'on la rencontre dans la région des grands lacs.

248. **Le Sanderling.** (SANDERLING). *Calidris leucophaea*. L, 8. Au printemps: les parties de dessus, y compris la couronne, brun foncé, panaché de beaucoup d'ocre rouilleux pâle ou de blanc, ou de l'un et de l'autre. En dessous, du blanc. La gorge, le cou, et le haut de la poitrine sont étendus de plus ou moins d'ocre rougeâtre et tachetés de brun. Les détails de ces colorations sont extrêmement variables. Le dos peut montrer assez de ces différentes couleurs pour le rendre ou généralement grisâtre, ocreux, ou rouilleux, tandis que la gorge colorée et tachetée peut être d'un blanc presque immaculé. L'oiseau d'automne est semblable sans avoir beaucoup de teintes chamois, ou de roux ou d'ocre; il est blanc pur en dessous et sur le devant, et souvent, principalement gris ou cendré pâle en dessus.

Traits distinctifs. A partir de simples traces jusqu'à de fortes teintes de rouille sur le cou et autour de la tête, au printemps, et à la blancheur générale en automne. Le sanderling peut se distinguer de toutes les autres maubèches par les trois doigts, au lieu de quatre, de son pied.

Indications sur le terrain. Teinte d'un brun rougeâtre répandue près de la tête chez quelques oiseaux de printemps; un contraste du blanc et du noir assez général sur l'aile; dans tous les plumages une ligne blanche le long de la base des plumes qui servent au vol. En automne, la poitrine d'un blanc très pur est également caractéristique.

Habitat. Couve dans les îles de l'Ouest du pôle arctique jusque dans l'Alaska. C'est un migrateur ordinaire sur les rivages sablonneux dans tout le Canada oriental.

Cet oiseau des plages sablonneuses fréquente rarement les terres boueuses. C'est un des petits oiseaux de rivage les plus beaux et intéressants. Il aime le bord de l'eau, suit volontiers la vague qui se retire, battant vite en retraite avant qu'elle revienne, menacé à tout instant d'être submergé par le ressac, mais y échappant tout juste. Quand ces oiseaux s'envolent au-dessus de l'eau bleue, que le soleil brille sur leur plumage étincelant, ils forment un tableau ravissant; tantôt tournant leur dos délicatement coloré de blanc et de noir, tantôt, comme obéissant à une seule et même impulsion, frôlant l'eau dans un vaste contour et montrant la blancheur éclatante de leurs dessous.

249. **La Barge marbrée.** (MARBLED GODWIT). *Limosa fedoa*. L, 18. C'est un gros oiseau de rivage; couleur générale: un chamois pâle vaguement teinté de rose sur tout le corps, sauf à la gorge, qui peut être blanche. Le dos, du derrière de son cou jusqu'à la couronne, nuancé de brun foncé et de teintes légères; la poitrine et les flancs plus ou moins rayés de lignes fines de la même couleur foncée.

Traits distinctifs. Pareils à ceux du courlis par son apparence générale, mais le bec est légèrement tourné en haut au lieu de l'être manifestement en bas. Se distingue de la barge de la baie d'Hudson par une marbrure fine, foncée sur le chamois rosé des primaires.

Indic
taille à 1
guer des
Habi
voyage v

La
été ma
douteu
cause j

251
L, 15.
de plus
dessous
du cou.
dessous,

Trait
lieu de te
par les pi
tions pre
printaniè

Indic
blanc à li
brée, les
Habi
à l'est de

La
complè
tre tou:
les cha
la quan
autre il
suffire
ineffic
reprodu

254.
(GREATE
grand.
petites r
sans trac
sur le de
la même

Trait
où que c
oiseaux d
espèce et

Indic
et la gra
a appris à

Habi
on le trou
mun dans

Le
mieux c
nières le
entrepr
capable

Indications sur le terrain. Les barges sont parmi les plus gros de nos oiseaux de rivage, d'une taille à peu près égale à celle des courlis. Leur bec qui n'est pas recourbé en bas les fera distinguer des courlis.

Habitat. Couve dans les provinces de la Prairie et aussi dans quelques régions cultivées; voyage vers l'un et l'autre océan et se rencontre quelquefois dans l'est des Provinces Maritimes.

La barge n'abonde jamais dans le Canada oriental, cette espèce ayant été malheureusement décimée autant que d'autres gros oiseaux. Il n'est pas douteux que son habitude de nicher dans les régions cultivées ne soit la cause principale de sa disparition.

251. La Barge de la baie d'Hudson. (HUDSONIAN GODWIT). *Limosa hemastica*. L. 15. Au printemps—les parties de dessus brun foncé jusqu'à la couronne, maculées de plus ou moins de grisâtre ou de chamois, avec des marques rouilleuses; les parties de dessous brun rougeâtre, plus ou moins rayées de teinte foncée étendue jusqu'au devant du cou. En automne, les parties de dessus sont uniformément gris brunâtre; celles de dessous, blanc chamois ou blanc sale; la poitrine plus grise.

Traits distinctifs. Elle se distingue soit des courlis par le bec légèrement tourné en haut au lieu de tourné en bas, soit de la barge marbrée par les dessous roux au printemps; en toute saison par les primaires toutes foncées, à tuyaux blancs sans marbrure. Cette espèce fait voir des variations presque interminables entre les susdits plumages, mais certaines données de la coloration printanière sont ordinairement reconnaissables chez tous ces oiseaux à l'exception des plus jeunes.

Indications sur le terrain. La grande taille, le bec droit ou recourbé légèrement, le croupion blanc à la base d'une queue noire feront distinguer cette barge soit des courlis soit de la barge marbrée, les seuls oiseaux qu'on serait tenté de confondre avec elle.

Habitat. Couve dans le nord-ouest, au delà des limites de la civilisation. Très commune à l'est des prairies jusqu'aux provinces maritimes en automne, et dans l'intérieur au printemps.

La barge de la baie d'Hudson est un bel oiseau bien près de disparaître complètement. Comme il arrive fréquemment, cet oiseau sembla disparaître tout à coup et avant qu'on se fût douté de sa rareté. On peut douter que les chasseurs soient absolument responsables de cet état de choses. Quand la quantité d'une espèce est déjà très réduite par une cause quelconque, toute autre influence adverse et qui sera relativement de peu d'importance, pourra suffire à éteindre cette espèce d'une façon inattendue. Toute protection est inefficace qui se fait si longtemps attendre que le nombre des individus reproducteurs est devenu trop réduit pour reconstituer l'espèce.

254. Le Grand Chevalier à pieds jaunes. LE CHEVALIER AUX PATTES JAUNES. (GREATER YELLOW-LEGS). *Totanus melanoleucus*. L. 14. C'est un oiseau de rivage plutôt grand. Les parties de dessus jusqu'à la couronne vont d'un brun foncé au noir, avec de petites marques blanches ou grises avec plumes grises intrusives, faisant un effet gris, sans trace de chamois ou de brun rougeâtre. Les parties de dessous sont blanches, rayées sur le devant du cou, la poitrine et les flancs avec des raies distinctes ou des lignes de la même couleur foncée que sur le dos; pattes très longues et jaunes.

Traits distinctifs. La taille, les pattes jaunes et l'absence de tout signe de chamois ou de rouille où que ce soit, sont les traits distinctifs des deux chevaliers à pattes jaunes. Dans les jeunes oiseaux d'automne les marques à la poitrine et au cou peuvent être voilées et indistinctes. Cette espèce et la suivante ne diffèrent que par leur taille.

Indications sur le terrain. Pattes longues, minces, absence complète de couleur ocreuse, la taille, et la grande quantité de blanc ou de couleur blanchâtre sur la queue et le croupion. Dès qu'on a appris à le connaître son vol est très reconnaissable.

Habitat. Il couve dans les hautes latitudes d'un bout à l'autre du continent. Dans l'Est, on le trouve au sud jusqu'à l'île d'Anticosti et au rivage nord du golfe du Saint-Laurent; il est commun dans les migrations par tout le Canada oriental.

Le grand chevalier à pattes jaunes est un des oiseaux de rivages les mieux connus. A cause de sa taille et du grand nombre relatif de ses congénères les chasseurs le recherchent beaucoup, et il paraît avoir tenu tête à leurs entreprises beaucoup mieux que d'autres espèces qui semblaient en être aussi capables que lui. Il aime les rives marécageuses et la boue plutôt que le

sable, et on peut le voir au loin pataugeant dans ces marais, où il entre jusqu'aux cuisses, dans une eau trop profonde pour de plus petits échassiers. Son sifflement clair, comme flûté, en trémolo, et en gamme descendante est un son qui fait battre le coeur à tout vrai chasseur ou à l'ornithologue de profession. Cette espèce ne semble pas être aussi nombreuse, et montre à coup sûr plus de circonspection que le petit chevalier. Avec cette réserve notre description s'applique à tous les deux.

255. **Le Petit Chevalier à pieds jaunes.** (LESSER YELLOW-LEGS). *Totanus flavipes*. L, 10-75. Edition abrégée de la précédente espèce.

Habitat. Il niche partout sur le continent dans les hautes latitudes. C'est un migrateur ordinaire dans tout le Canada oriental, mais non pas à l'intérieur des régions cultivées.

256. **Le Chevalier Solitaire.** (SOLITARY SANDPIPER). *Helodramas solitarius*. L, 8-40. Les parties de dessus foncées, presque noires, avec un lustre légèrement verdâtre relevé par quelques petites taches blanches; les parties de dessous et la gorge, blanches; le bas du cou, la bande pectorale et les côtés des flancs, barrés et rayés avec des teintes plus claires de la couleur du dos; aucune trace de chamois ou d'autres nuances.

Traits distinctifs. Taille et coloration générale; les plumes axillaires blanches, rayées de noir, constituent un trait décisif.

Indications sur le terrain. Il ressemble à la fois à la maubèche tachetée et au petit chevalier à pieds jaunes. Il se distingue de la première par l'absence d'une ligne blanche sur l'aile déployée et par les barres blanches très visibles sur la queue et du second par la taille et par le croupion noir au lieu de blanc.

Nid. Pendant longtemps les habitudes du couvage de cette espèce demeurèrent inconnues et le problème de sa façon de nicher ne fut pas résolu jusqu'à ce qu'on eût découvert que cet oiseau se servait des nids abandonnés d'oiseaux percheurs dans les arbres et les buissons. La maubèche verte d'Europe, qui lui est très apparentée, a la même habitude.

Habitat. Il niche vers le nord à partir des limites intérieures des terres cultivées; il est assez commun dans tout le Canada oriental comme migrateur ou reproducteur.

SOUS-ESPÈCE. Le chevalier solitaire est représenté au Canada par deux sous-espèces, dont une seule, le solitaire de l'Est, l'individu type, se rencontre dans l'Est.

Ainsi que l'indique le nom, cette espèce est plutôt un oiseau solitaire qu'on rencontre soit tout seul soit avec un compagnon plutôt que par bandes, même au temps de la migration. Il fréquente les étangs fangeux et, comme la maubèche tachetée, il est le seul échassier qu'on voit ordinairement près de ces petits réservoirs d'eau tels que les fossés de drainage, ou le long de la lisière des bois submergés.

258. **"Le Chevalier semi-palmé."** (WILLET). *Cototrophorus semipalmatus*. L, 15. Un gros oiseau de rivage; les parties de dessus gris chamois avec marques plus foncées; les parties de dessous sont blanches étendues d'un pâle chamois grisâtre avec barres et raies foncées sur les flancs, la poitrine et le devant du cou; croupion blanc.

Traits distinctifs. Taille, coloration générale claire et grise; tache blanche de l'aile très visible sur les primaires, croupion blanc, et plumes axillaires noires. Le bec caractéristique de la maubèche fera distinguer ce chevalier du pluvier à bec noir qui a aussi ces détails du croupion et des axillaires.

Indications sur le terrain. Par la taille il ressemble aux barges plus qu'à tout autre oiseau, mais le gris cendré et les taches blanches si visibles des ailes sont distinctives.

Habitat. Il couve au sud de notre pays, d'habitude depuis la Virginie jusqu'à la Nouvelle-Ecosse dans l'Est, et vers l'Ouest jusqu'aux parties centrales des provinces de la Prairie. Aujourd'hui il est très rare sur la côte, assez irrégulier mais un peu plus commun dans la région des grands lacs, et assez commun dans l'Ouest dans certaines parties des provinces de la Prairie.

SOUS-ESPÈCES. L'espèce est divisée en deux sous-espèces: l'orientale et l'occidentale, celle-ci basée sur une taille un peu plus grande et sur une couleur plus grise. Le status précis de l'oiseau des grands lacs, en qualité de sous-espèce, n'est pas établi de façon satisfaisante. Très probablement le petit nombre de ces oiseaux qui reste dans les Provinces Maritimes sont des chevaliers de l'Est, tandis que ceux des grands lacs peuvent être le chevalier de l'Ouest, *C. s. inornatus* ou quelque oiseau intermédiaire. Nous avons trop peu d'échantillons sous la main pour nous prononcer à cet égard de façon définitive et, à moins que l'espèce ne recouvre quelques-uns de ses représentants originaux, nous ne serons probablement jamais capables d'établir de façon satisfaisante les limites du territoire spécial à ces deux formes.

L
nombri
territo

261
L, 11-5
forteme
qui se c
blanc cr

Trai
pluvier,
de la pr
sur presc
canadien
mais sur

Indi
comme
bien plu
taille, sa
sifflemer

Hab
se propa
du Cana
côte de l

B
Le ter
raleme
jadis, c
fort ra
dange
oppos
fusil; l
été la c
Kildir
que ce
s'est t
Il est c
Il se p
sons o

V
espèce
d'autre
elle po
parmi
gnées.

262. I
bruficoll
finemen
la poitr
les parti

Trai
des prim
est admi

Indi
peut se i
celle-ci e

Le chevalier semi-palmé est une autre et importante espèce dont le nombre va disparaissant vite; disparition due peut-être surtout au vaste territoire où il niche et à l'imparfaite protection dont il est victime.

261. **La Maubèche à longue queue.** (UPLAND PLOVER). *Bartramia longicauda* L., 11-50. Parties de dessus foncées; plumes à larges bords chamois, couleur qui s'étend fortement sur la tête, la poitrine et le cou. Marques foncées en forme de V sur la poitrine qui se changent en barres sur les flancs et en raies sur le cou; parties de dessous, ternes, blanc crémeux.

Traits distinctifs. Si l'on se rappelle que cette espèce est une maubèche et non un véritable pluvier, on trouvera que la taille et la teinte chamois sont caractéristiques. La barbe intérieure de la première primaire, fortement marquée de dents de scie pointues, foncée sur un fond blanc sur presque toute la longueur, est un caractère qui ne se présente chez aucun autre oiseau de rivage canadien qu'on puisse lui comparer. Le courlis de la baie d'Hudson présente un dessin semblable mais sur un fond chamois.

Indications sur le terrain. Le pluvier des hautes terres est à peine reconnaissable sur le sol, comme étant un échassier par ceux qui ne le connaissent pas, car il ressemble à une jeune gelinotte bien plutôt qu'à une maubèche. Quand il vole, toutefois, il fait voir sa véritable parenté. Sa taille, sa couleur générale, chamois, son habitat des plateaux sont des traits distinctifs. Son beau sifflement prolongé quand une fois on l'a entendu ne peut plus vous tromper.

Habitat. C'est probablement un oiseau de la région des prairies, mais qui, probablement, se propagea vers l'Est quand les forêts furent abattues. Il couve dans les parties plus méridionales du Canada oriental et dans les provinces de la Prairie, faisant d'occasionnelles apparitions sur la côte de l'Atlantique en qualité de migrateur.

Bien qu'on l'appelle pluvier, cette espèce est une véritable maubèche. Le terme de maubèche bartramienne est plus satisfaisant et devrait être généralement employé au lieu de pluvier des plateaux. Infiniment plus commun jadis, qu'il ne l'est aujourd'hui dans la région des grands lacs, il est à présent fort rare. L'espèce nichait dans les contrées cultivées et y était exposée aux dangers que présentent ces localités: empêchement que les travaux agricoles opposent à la couvaison; le jeune homme toujours là et toujours armé de son fusil; le braconnier et le sportsman. Sa taille et sa facilité à s'approviser ont été la cause de sa disparition alors que le plus petit et le plus prudent pluvier Kildir a su survivre dans des conditions analogues. Comme son nom l'indique cette espèce a déserté l'habitat ancestral trop humide de sa famille et s'est transporté vers les prairies des plateaux et leurs pâturages plus secs. Il est cependant rare de le trouver très éloigné de quelque petite nappe d'eau. Il se pose volontiers sur les barrières, sur les poteaux-barrières, sur les maisons ou sur les arbres, suivant l'occasion.

Valeur économique. Comme elle fréquente les terres cultivées, cette espèce se nourrit principalement d'insectes, de sauterelles, de chenilles et d'autres ennemis des cultures fourragères. On a vu de quelle importance elle pouvait être pour combattre le fléau des sauterelles; elle doit donc être parmi les espèces les plus utiles à l'agriculture et qui méritent d'être épargnées.

262. **La Maubèche à poitrine jaunâtre.** (BUFF-BREASTED SANDPIPER). *Tryngites subruficollis*. L., 8-50. Le dos et la couronne sont foncés, les plumes du bas du dos sont finement bordées de jaune crème, les parties de dessous sont blanches; la gorge, le cou, la poitrine et les flancs sont étendus de jaune chamois, couleur qui teinte presque toutes les parties de dessus.

Traits distinctifs. Petite taille et couleur généralement chamois; le dessous des barbes internes des primaires est finement moucheté de tons foncés sur du blanc. La surface de dessous de l'aile est admirablement marbrée d'une façon qui ne se retrouve dans aucune autre espèce de l'Est.

Indications sur le terrain. Petite taille et couleur généralement jaune chamois. Cette couleur peut se rencontrer sur les oiseaux des hautes terres, telle que la maubèche à longue queue, mais celle-ci est beaucoup plus grande.

Habitat. Elle couve sur les rivages arctiques de l'extrême nord-ouest, voyageant au sud le long de la vallée du Mississippi; de là vient qu'elle est très rare dans les Provinces Maritimes, peu nombreuse dans la région des grands lacs, et plus commune vers l'ouest.

Valeur économique. Ce qui a été dit de la maubèche à longue queue est probablement vrai aussi de cette espèce-ci.

263. **La Maubèche tachetée. L'Alouette à branle-queue.** (SPOTTED SAND-PIPER). *Actitis macularia.* L., 7-50. Planche VIII B.

Traits distinctifs. Les adultes ont très manifestement des taches rondes à la poitrine et un éclat légèrement verdâtre sur le dos. Les jeunes oiseaux d'automne ressemblent au chevalier solitaire, mais se distinguent par des axillaires blanches au lieu de barrées.

Indications sur le terrain. La taille et les taches rondes bien distinctes sur la poitrine. Quand cet oiseau vole on peut le distinguer du chevalier solitaire, auquel il ressemble le plus, par la ligne blanche le long des bords des secondaires et par la beaucoup plus petite quantité de barres noires et blanches sur la queue. Le vol, quand l'observateur le connaît bien, est aussi très caractéristique.

Nid. Un petit creux dans le sol non loin de l'eau, abrité par un bout de buisson ou d'herbe.

Habitat. Couve dans tout le Canada oriental jusqu'aux parties les plus septentrionales de l'Ungava. Elle est commune dans toute l'étendue de ce territoire.

C'est la plus commune des maubèches d'été du Canada; quelquefois des couples sont vus le long des plus petits cours d'eau. Elle fréquente toute sorte de terrains, les plages sablonneuses, les banes de gravier, les terrains fangeux ou les côtes rocheuses. Presque toute maubèche qu'on voit en été près de nos cours d'eau ou de nos étangs peut être regardée comme appartenant à cette espèce, à moins qu'il n'y ait de fortes raisons pour la croire d'une autre espèce. Son habitude de balancer parfois son corps de haut en bas, même quand on la croit au repos, ou très rapidement quand elle est agitée, lui a fait donner le nom de "Tip-up". Ses ailes à barres blanches, son vol bizarre où quelques battements d'ailes sont suivis d'une courte envolée avec les ailes rabattues, et son cri triomphant de "piou-it-piou-it-piou-it" quand elle se laisse choir sur le bord de la rivière, bien en avant du déranger, sont suffisamment connus des observateurs. On peut la chasser d'un lieu, à un autre, jusqu'à une certaine distance de son nid, quand, rattrapée par son camarade, elle viendra voler en cercle autour de l'intrus et puis retournera à la place d'où elle partit.

Valeur économique.—Bien qu'elle fréquente d'habitude les bords de l'eau elle est souvent vue dans les champs voisins courant entre les sillons de la terre fraîchement retournée ou entre les rangs des plantes grandissantes. Sa nourriture se compose principalement, sinon entièrement, d'insectes, par où elle rend service à l'agriculteur. L'espèce ne semble pas avoir eu beaucoup à souffrir du fait des chasseurs et paraît se maintenir dans les parages les plus cultivés.

GENRE—MUMENIUS.—COURLIS. CORBIGEAU. (CURLEWS.)

Description générale. Ce sont de gros oiseaux de rivage, entre 13 pouces .50 et 24 pouces de long. La coloration est de diverses teintes depuis le jaune crème au brun clair, pommelée en dessus, plus claire en dessous; le cou et la poitrine finement rayés, avec un jaune chamois plus ou moins étendu ou seulement indiqué sur le tout. Les becs sont longs et recourbés vers l'intérieur.

Traits distinctifs. Taille grande; bec recourbé en dessous; couleur générale chamois. Se distingue des barges par le bec recourbé vers le bas au lieu de l'être légèrement vers le haut.

Indications sur le terrain. Taille grande, bec recourbé, couleur chamois par tout le corps.

Un grand corps constitue pour les oiseaux une menace certaine à leur existence. Les courlis en sont un bon exemple, et à moins que d'intelligentes mesures ne soient prises bientôt pour les protéger il n'en restera bientôt plus. Dans l'Est les courlis ont à peu près disparu, mais il en reste

encor
est su
les n
myrt
princ
inclu
au cu

26
C'est l
mais l
(voir t

Tr
de cett
cialisée
caract
primaï
foncée,
rieures
axillair

Ind
disting

Hai
l'origin
vines t
grands
baie d'
ne devr
spécime

26.
cus. I
Il est d
chamoï
page p

Tra
tinguer
uniform
primair

Indi
Les cou
mais la
quelque

Hab
à traver
migrates

C
lacs.
comme
Est, o

266
nius bor
que le c

Trai
petite ta
courlis d
comme l

Indic
jours pou
Habi
vers le L
sippi.

encore passablement dans l'Ouest. La partie végétale de leur nourriture est surtout le fruit sauvage, et dans les provinces maritimes ils fréquentent les marais déserts et ceux des plateaux pour y trouver les airelles et les myrtilles dites atocas. Dans les champs cultivés les insectes sont leur principal aliment, et comme beaucoup d'espèces nuisibles, les sauterelles incluses, sont mangées, la présence des courlis est certainement profitable au cultivateur.

264. Le Courlis à long bec. (LONG-BILLED CURLEW). *Numenius americanus*. L, 24. C'est le plus grand de l'espèce. Sa coloration de tous les courlis est tout à fait la même, mais le courlis à long bec est visiblement chamois en dessous au lieu du blanc crèmeux (voir titre précédent).

Traits distinctifs. Chez les spécimens de belle taille, la longueur extrême du bec (6 pouces) de cette espèce est un signe déterminant, mais, comme dans beaucoup d'autres espèces ou très spécialisées ou très grandes, la taille continue à croître pendant quelque temps après la maturité, ce caractère ne suffit pas à lui seul à nous guider. La couronne, les axillaires et les caractères des primaires sont toutefois d'excellents critères pour les courlis. Chez cette espèce la couronne est foncée, uniformément tachée de points clairs non réunis en une ligne médiane, et les barbes intérieures des primaires sont marquées de dessins dentelés foncés sur un fond chamois pâle. Les axillaires ont une coloration totale sans raies.

Indications sur le terrain. Pour reconnaître le courlis voir la page précédente. On ne peut pas distinguer séparément les courlis à l'état vivant avec une certitude absolue.

Habitat. Il couve dans les provinces de la Prairie et tout à fait vers le sud. On le signalait à l'origine comme un migrateur plus ou moins commun sur la côte de l'Atlantique, au nord des provinces maritimes, mais on ne l'y rencontre pas actuellement; on le signale aussi dans la région des grands lacs mais sans preuve suffisante. La confusion qu'on fait de ce courlis et du courlis de la baie d'Hudson a été la cause de nombreuses fausses identifications d'importants constats et l'espèce ne devrait, à l'avenir, être signalée dans le Canada oriental que sur le témoignage irréfutable de spécimens probants.

265. Le Courlis de la baie d'Hudson. (HUDSONIAN CURLEW). *Numenius hudsonicus*. L, 17. C'est un courlis plus petit que le précédent, mais plus grand que le suivant. Il est de la même coloration générale, mais le courlis de la baie d'Hudson est moins jaune chamois que celui à long bec, les dessous étant jaune crème mat; voir le titre du courlis, page précédente.

Traits distinctifs. Il a souvent été pris pour le courlis à long bec, mais il peut aisément se distinguer des autres courlis par la raie médiane très prononcée sur la couronne, plutôt que par les taches uniformément distribuées, ajoutée aux marques en dents de scie dans les barbes intérieures des primaires et les axillaires barrées.

Indications sur le terrain. Pour reconnaître les courlis comme tels, voir Courlis, page précédente. Les courlis ne peuvent pas être facilement distingués à l'état vivant, avec une absolue certitude, mais la grosseur et la longueur du bec peuvent y aider. C'est la seule espèce de courlis qu'on ait quelque chance de rencontrer dans l'est du Canada.

Habitat. Il couve dans le nord-ouest du pôle. Il voyage le long de la côte du Pacifique et à travers le continent jusqu'à l'Atlantique où il est plus commun que dans l'intérieur. C'est un migrateur régulier quoique peu abondant dans la région des grands lacs.

C'est le seul courlis authentique dans la partie inférieure des grands lacs. L'expérience lui a appris à être un oiseau sauvage et prudent et comme il ne se rencontre actuellement en grand nombre que dans l'extrême Est, on n'en prend que fort peu.

266. Le Courlis du Nord. CORBIGEAU DES ESQUIMAUX. (ESKIMO CURLEW). *Numenius borealis*. L, 13-50. C'est le plus petit des courlis. De la même coloration générale que le courlis de la baie d'Hudson.

Traits distinctifs. Facilement distinguable de l'un quelconque des autres courlis par sa plus petite taille et ses primaires, sans marque, bien que les axillaires soient barrées comme chez le courlis de la baie d'Hudson et que la couronne soit tachetée uniformément, sans raie médiane, comme le courlis à long bec.

Indications sur le terrain. Voir l'espèce précédente. Cet oiseau est cependant trop rare de nos jours pour qu'il suffise de l'avoir vu pour en parler.

Habitat. Couve sur les terrains déserts de la région du Mackenzie. En automne il émigre vers le Labrador et puis il descend le long de la côte. Au printemps il remonte la vallée du Mississippi.

Cet oiseau est bien près de disparaître. Qu'une chasse, ou permise ou illicite, soit ou non la cause principale de la grande diminution de cette espèce, car d'anciens récits parlent de ses bandes immenses, elle y a certainement contribué. C'est un nouveau cas de l'extinction d'une espèce avant qu'on ait aperçu la nécessité de la protéger et de la menace de voir se perdre une espèce qui ne pourra plus se remplacer.

FAMILLE—CHARADRIIDÆ. PLUVIERS.

Description générale. Les pluviers ont un corps plus gros et massif que les oiseaux du genre bécasse. Leur bec est plus court, mou à la base, mais terminé en pointe cornée et dure (Fig. 24, p. 24). Le doigt postérieur manque dans toutes les espèces sauf dans celle à ventre noir (n° 270) dans laquelle il est très petit, presque rudimentaire.

Traits distinctifs. Avec la susdite description le pluvier ne court pas le risque d'être confondu avec aucun autre oiseau.

Nid. Sur le sol dans un petit creux généralement garni d'un peu d'herbe, de mousse, d'autres végétaux, de rebut ou de petits cailloux.

Habitat. Représenté par des variétés très proches parentes ou presque identiques, la famille est circumpolaire, couvant surtout au nord des régions habitées.

Les pluviers sont très connus des chasseurs. Leur taille moyenne est plus grande que celle des bécasses, et quelques-uns qui trouvent leur nourriture dans les champs des plateaux font passablement trimer les chasseurs.

Valeur économique.—Considérés comme une famille, les pluviers recherchent les terres cultivées plus que ne font les autres oiseaux de rivage, ce qui les rend plus intéressants au point de vue économique. Ils prêtent à l'homme une assistance efficace.

270. **Le Pluvier à ventre noir.** LE VANNEAU GRIS. (BLACK-BELLIED PLOVER). *Squatarola squatarola*. L. 11. Plumage de printemps: dos, presque noir avec beaucoup de pointes de pennas larges et blanches rassemblées sur les ailes, couronne et arrière-cou presque blancs; joues, gorge, partie antérieure et poitrine jusqu'à l'abdomen sont noir pur, montrant souvent des plumes blanches qui survivent à la période d'imparfait développement. Plumage d'automne: dos, brun pâle avec bouts de pennas crème ou jaunâtre jusqu'au sommet de la tête; gorge, avant-cou et dessous blanchâtre terne avec bande indistincte de poitrine formée de raies voilées. Tous les plumages intermédiaires sont pris en dedans de nos frontières.

Traits distinctifs. A tous les caractères du pluvier; ne pourra être confondu qu'avec le pluvier doré auquel il ressemble tout à fait. La présence d'un doigt postérieur petit quoique bien formé est particulier à cet oiseau, car c'est notre seul pluvier qui ait un quatrième doigt.

Indications sur le terrain. Il ne doit être distingué que du pluvier doré, une bande assez peu distincte sur l'aile étendue; les axillaires noires, en violent contraste avec l'arrière-plan des dessous de l'aile quand l'oiseau vole, et croupion blanc qu'on pourra voir si les circonstances s'y prêtent.

Habitat. Espèce circumpolaire couvant en Amérique le long des rivages polaires au nord-ouest de la baie d'Hudson. Plus ou moins commune pendant ses migrations vers des habitats propices dans tout l'est du Canada.

272. **Le Pluvier doré d'Amérique.** (AMERICAN GOLDEN PLOVER). *Charadrius dominicus*. L. 10-50. Plumage de printemps: dos presque noir jusqu'au sommet de la tête, avec de nombreuses pointes de plumes jaunes, plus rares sur la couronne; le front et la ligne sur l'œil, qui descend vers les côtés de la poitrine, sont blancs; la gorge, le devant du cou et tous les dessous sont tout noirs. Plumage d'automne: dessus, brun terne avec beaucoup de taches d'un jaune crémeux sur le bord des plumes, se réunissant sur le croupion et la couronne; la gorge et la face légèrement tachetées de blanc; la poitrine et tous les dessous vaguement barrés d'un blanc mat et de légères teintes du même brun que sur le dos. On peut voir là tous les plumages intermédiaires.

Traits distinctifs. C'est un oiseau un peu plus petit que le précédent, mais avec lequel il est facile de le confondre. La forte quantité de jaune sur le dos du plumage de printemps et les barres indistinctes de la poitrine et des dessous en automne sont caractéristiques. L'absence de toute trace du doigt postérieur est une indication dans tout plumage.

Indic
déployée
très mar

Habi
suivre de
puis au s
la mer ju
Du Brési
Sud, ven
remonte
traverse
mais con
croire de:
SOU
le pluvier

Il
du viv:
Aujourd
parent

273.
IXA.

Trait
peut guère
de la poit

Indica
pion de oc

Nid.
Habit
les limite:
absente d

C'
de la cé
et mêm
quente
son nid
sont éc
étang p
tout set
espèce
de la ci
rence, c
par ses
de se r

Vai
et pend
terres o

274.
L. 6-75.
seule au li
d'ocre de
sont délav

Traits
fondu qu'a
mages au l
marquée n
parfaiteme
surnom; c'

Indications sur le terrain. Il n'est besoin que de le distinguer de l'espèce précédente. L'aile déployée ne porte aucune indication de bande blanche; les axillaires sont gris fumée au lieu de noir très marqué; le croupion n'est pas blanc.

Habitat. Couve sur les terrains stériles depuis la baie d'Hudson vers l'Ouest. Il passe pour suivre des routes étranges dans ses migrations. En automne il se dirige à l'est vers le Labrador, puis au sud à travers le golfe du Saint-Laurent, jusque dans la Nouvelle-Ecosse, d'où il traverse la mer jusqu'au Brésil sans toucher de terre intermédiaire à moins d'être entraîné par la tempête. Du Brésil il gagne les Pampas de l'Argentine. Au printemps il touche à l'ouest de l'Amérique du Sud, vers la république de l'Equateur, traverse l'isthme de Panama et le golfe du Mexique, puis remonte la vallée du Mississipi pour regagner les terrains où il a niché. Le fait que cet oiseau traverse au vol l'immense Atlantique sans se reposer, semble trop extraordinaire pour être vraie, mais comme il n'est pas nageur émérite, capable de se reposer sur l'eau, à volonté, il faut bien en croire des faits évidents.

SOUS-ESPÈCES. Le pluvier doré d'Amérique comprend deux sous-espèces; mais seul, le pluvier doré de l'Est comme forme typique, se rencontre dans le Canada oriental.

Il était jadis plus commun qu'aujourd'hui on en voyait régulièrement du vivant même des chasseurs de nos jours, ou des bandes considérables. Aujourd'hui on n'en rencontre plus que par hasard. Ce pluvier est proche parent du pluvier doré d'Europe.

273. **Le Pluvier kildir.** (KILLDEER PLOVER). *Oxyechus vociferus*. I, 10-50. Planche IXA.

Traits distinctifs. Comme le pluvier Kildir est le plus grand des pluviers semi-palmés il ne peut guère être confondu avec ses congénères plus petits que lui. La bande double, au lieu de simple, de la poitrine l'en distingue aussi.

Indications sur le terrain. La taille, deux bandes de poitrine au lieu d'une, une queue et un croupion de couleur ocreuse, et un cri très particulier qui dit « Kildi-kildi-kildi ».

Nid. Un simple trou dans le sol maigrement garni de fragments de végétaux.

Habitat. C'est une espèce dont le territoire est remarquablement étendu, car elle couve depuis les limites nord de la culture agricole au Canada, jusqu'au golfe du Mexique. Elle est rare ou même absente des parages de l'une ou de l'autre côte.

C'est un oiseau d'été commun par tout le Canada sauf dans les districts de la côte maritime. Son cri sonore est bien connu des habitants du pays et même de gens de passage. Quoique véritable oiseau de rivage, il fréquente les hauts plateaux desséchés, et les champs cultivés, faisant souvent son nid dans les sillons labourés au sein des récoltes, mais quand ses petits sont éclos il a coutume de les mener vers l'eau, toujours vers quelque étang prochain et paisible, et sitôt qu'ils sont capables de se conduire tout seuls ils se rassemblent en petites troupes séparées. Le fait que cette espèce a pu survivre et prospérer au sein même des régions cultivées et de la civilisation alors que d'autres espèces tout aussi capables, en apparence, de se protéger ont cependant succombé, s'explique probablement par ses habitudes relativement solitaires et parce qu'elle n'a pas coutume de se rassembler en troupes serrées dont la chasse est avantageuse.

Valeur économique.—Sa nourriture se compose largement d'insectes, et pendant le printemps et le commencement de l'été il fréquente des terres où il peut faire beaucoup de bien.

274. **Le Pluvier semi-palmé.** (SEMI-PALMATED PLOVER). *Agialitis semipalmata*. L, 6-75. C'est un petit pluvier qui ressemble de façon générale au kildir, mais avec une seule au lieu de deux bandes foncées sur la poitrine, et sans le croupion et la queue couleur d'oere de cette espèce. Les oiseaux d'automne sont semblables, mais leurs couleurs sont délavées et sans un noir pur où que ce soit.

Traits distinctifs. Avec sa taille et la description sus-mentionnée ce pluvier ne peut être confondu qu'avec le pluvier criard, mais la coloration du dos est à coup sûr brunâtre dans tous les plumages au lieu de gris fumé ou sable sec; la bande pectorale est toujours large, continue et bien marquée même en automne, et les couvertures d'oreilles derrière et au-dessous de l'œil, sont toujours parfaitement noires au lieu d'un blanc pur. Les pieds avec de petites membranes expliquent le surnom; c'est le seul pluvier au Canada qui ait cette membrane.

Indications sur le terrain. Sa taille et la bande pectorale unique au lieu de double distinguent ce pluvier du kildir, et le dos très foncé comme du sable mouillé le distingue du pluvier criard qui est plus clair et gris comme du sable sec.

Nid. Dans un creux du sol ou dans des débris de rivage.

Habitat. Il couve dans l'extrême nord à travers le continent; au sud, dans l'est, jusqu'au golfe du Saint-Laurent. Il est commun dans ses migrations vers les localités qui lui agréent dans le Canada oriental.

C'est un joli petit pluvier qui fréquente indifféremment les lieux fangeux ou les plages sablonneuses. Très proche parent du pluvier rayé d'Europe et ne s'en distinguant que par une plus petite taille et quelques menus détails.

277. **Le Pluvier criard.** (PIPING PLOVER, RING-NECK). *Agialitis meloda*. L., 7-10
Plumage de printemps; mêmes marques que celles du semi-palmé précédemment décrit, mais le dos a des couleurs plus claires. Le dos et la couronne sont gris fumée clair, une barre noire en travers du devant de la couronne; le reste, le col autour du cou et le front sont blancs, un anneau noir autour du cou, droit au-dessous du col blanc, quelquefois brisé sur la poitrine. Oiseaux d'automne: semblables mais sans l'anneau noir et généralement de coloration plus faible.

Traits distinctifs. Ne peut être confondu qu'avec le semi-palmé, mais facilement distinguable par les caractères indiqués sous ce titre.

Indications sur le terrain. Distinguable du pluvier semi-palmé par sa coloration plus claire, comme le sable sec du sable mouillé. Son chant mélodieux ne s'oublie plus une fois entendu.

Nid. Dans un trou fait dans le sable par l'oiseau et ne contenant que quelques petits cailloux, des grains de sable ou des fragments de coquilles sur lesquels reposent les œufs.

Habitat. Il couve sur les rivages sablonneux dans des endroits situés entre les provinces de la Prairie, le golfe du Saint-Laurent et l'île au Sable.

C'est un petit pluvier surnommé *meloda*, et un oiseau de plage sablonneuse qu'on ne voit jamais dans des places herbeuses ou marécageuses. Chez certains individus les bandes pectorales noires sont brisées, chez d'autres elles sont entières. Ces derniers ont été pendant quelque temps considérés comme une sous-espèce; tous, actuellement, ne constituent plus qu'une seule espèce. Le pluvier neigeux, *agialitis nivosa*, a été pris sur le lac Ontario, mais on ne l'y reverra probablement plus. Il est un peu plus petit que le pluvier criard, de la même coloration mais avec une mouche noire sur l'oreille ou la joue, et seulement une tache noire sur les côtés de la poitrine au lieu d'une barre complète en travers. Un oiseau qu'on surprendrait plus au sud ou à l'ouest ne pourrait être qu'un vagabond.

FAMILLE—APHRIZIDÆ. TOURNE-PIERRE

Description générale. Oiseau de rivage de taille moyenne avec un bec quelque peu court (figure 27, p. 24) corné en sa moitié terminale, le bout légèrement aplati (sur un plan horizontal) mais non distinctement agrandi comme chez le pluvier.

C'est une petite famille dont l'habitat est le monde entier. Il n'y en a qu'une seule espèce dans l'est du Canada.

283a. **Le Tourne-pierre à poitrine noire.** **Le Tourne-pierre.** (TURNSTONE).
Arenaria interpres. L., 9-50.

Traits distinctifs. C'est un oiseau d'une coloration frappante. Le dos présente des amas assez étendus de rouge mat, de noir, et de blanc, couleurs plus ou moins entremêlées. Le croupion et la tête blancs, la couronne a des raies brunes ou noires. Les dessous d'un blanc pur, avec bande pour torale noire, allant des côtés du cou jusqu'à la face où elle fait un cercle en travers de l'œil et autour d'une tache blanche lorale. Les oiseaux d'automne ont leurs couleurs diffuses et la coloration du dos ou perdue ou vaguement indiquée, mais il reste toujours assez de marques sur la face de la poitrine pour faire admettre les traits distinctifs susdits.

Indications sur le terrain. La singulière coloration mixte de rouge, noir et blanc du plumage de printemps. En automne les couvertures blanches du bas du dos et celles du dessus de la queue sont séparées par une barre noire.

Ni
H.
voluté
d'les
d'Hud
Dans s
SO
nella, l
de l'Al

(
préfer
les pe
il se r
il peu
secou
distar
l'anci
dessus

Des
l'habitu
espèce c

280
L., 19.
contras
le bec,

Hab
Jersey t
de son h

L
mariti
et il y

Ai
sont oi
le plus
se com
oiseau
et se t
n'avon
vraies.

S

Desci
quatre de
mieux à l
reposit.
une matiè
ment de l

Nid.
de prépar

Habit
huppée, le
gelinotte;
nord.

Nid. Dans un creux du sol garni de quelques feuilles mortes ou de fibres végétales.

Habitat. Le Tourne-pierre considéré comme espèce a un des habitats les plus vastes de la zone volatile; il y a, en effet, peu de pays où il ne se rencontre pas. La sous-espèce américaine, type de l'espèce, le Tourne-pierre à poitrine noire couve depuis le rivage polaire, à l'ouest de la baie d'Hudson, vers le nord; il est plus commun sur la côte de l'Atlantique que sur celle du Pacifique. Dans ses migrations, il est commun dans la région des grands lacs.

SOUS-ESPÈCE. Le Tourne-pierre est représenté en Amérique par une sous-espèce *A. i. morinella*, le Tourne-pierre à ventre noir, bien que la forme typique se rencontre, dit-on, dans l'ouest de l'Alaska.

C'est un oiseau des rivages sablonneux, boueux ou rocheux mais qui préfère les premiers. Son nom lui vient de son habitude de retourner les petites pierres et les cailloux de la plage pour chercher dessous ce dont il se nourrit; il est surprenant de voir quelles pierres, relativement grosses, il peut retourner. Il fait pénétrer son bec sous le bord, donne une petite secousse et la pierre s'en va rouler ou glisser sur la plage à une grande distance. Cet oiseau est bon nageur. Il diffère du Tourne-pierre de l'ancien monde par sa taille un peu plus petite, par moins de noir sur les dessus, et par une coloration plus forte des jambes.

FAMILLE—HÆMATOPODIDÆ. HUÎTRIERS

Description générale. C'est un grand oiseau de rivage, de charpente plus lourde que ce n'est l'habitude dans cet ordre; gros bec corné, aplati sur les côtés vers la pointe. Il n'y a qu'une seule espèce qui peut, peut-être, se rencontrer dans l'est du Canada.

286. **L'Huîtrier d'Amérique.** (AMERICAN OYSTER-CATCHER) *Hæmatopus Palliatus*. L. 19. La tête, le cou et le haut de la poitrine sont noirs; le dos, brun olive, avec, en contraste, des plaques blanches aux ailes et au croupion. Tous les dessous, blanc pur; le bec, grand, rouge brillant.

Habitat. La côte de l'Atlantique du nord jusqu'en Virginie. Autrefois jusqu'au Nouveau Jersey et accidentellement au Nouveau-Brunswick. Il naît probablement dans toute l'étendue de son habitat.

L'habitat nord de cet oiseau remarquable était une fois sur nos côtes maritimes méridionales. Il y a longtemps qu'on l'a chassé du Canada, et il y a peu de chance qu'il s'y représente de nouveau.

Ordre—Gallinæ. Gallinacés

Ainsi que l'indique leur nom anglais «Scratching birds» ces oiseaux sont organisés pour obtenir leur nourriture en grattant la terre. Le type le plus populaire en est la volaille ordinaire de basse cour, mais cet ordre se confond presque imperceptiblement avec les pigeons d'une part et les oiseaux de rivage d'autre part. Ils sont très répandus par tout le monde et se trouvent dans presque tous les pays du globe. Au Canada nous n'avons qu'un seul sous-ordre de ce groupe, celui de *Phasiani*, les poules vraies.

SOUS-ORDRE—PHASIANI. POULES VRAIES GELINOTTES, CAILLES ET LAGOPÈDES.

Description générale. Ce sous-ordre se compose d'oiseaux pourvus de pieds forts, compacts, quatre doigts avec ongles obtus propre à gratter la terre (figure 28, p. 24). Bien qu'ils s'adaptent mieux à la vie terrestre ils se perchent facilement sur les arbres et bien souvent y mangent et s'y reposent. Bec court, corné avec culmen fortement arqué (figure 29, p. 25); narines enfoncées dans une matière molle à la naissance du bec; ailes courtes et arrondies. Ces oiseaux se servent rarement de leurs ailes, sauf pour franchir de courtes distances ou en cas de danger immédiat.

Nid. Ils nichent à terre, déposent leurs œufs sur l'herbe ou les feuilles mortes avec peu ou point de préparation.

Habitat. On trouve des espèces de ce sous-ordre dans toutes les parties du Canada. La gelinotte huppée, le tétras et le dindon sauvage sont des oiseaux des bois; la caille, la poule des prairies et la gelinotte à queue aiguë fréquentent la prairie; et le lagopède fréquente les terres stériles de l'extrême nord.

Trois familles de cet ordre sont représentées au Canada, savoir: *Odontophoridae*, la caille d'Amérique, *tetraonidae*, la gelinotte, et *Meleagridae*, le dindon.

Valeur économique.—Ils sont à la fois insectivores et végétariens, et mangent indifféremment grains, bourgeons, feuilles, fruits et insectes. Comme plusieurs espèces fréquentent les terres cultivées, leur régime économique intéresse particulièrement le cultivateur et a été l'objet de beaucoup de recherches dont les résultats démontrent qu'ils comptent parmi les oiseaux les plus utiles de la ferme. Le type d'insectes qui constituent une partie de la nourriture de certaines espèces est manifestement très malfaisant et l'on a très peu à se plaindre quant au reste de leur menu qui se compose principalement de déchets ou de matières sauvages de peu ou point d'utilité pour l'agriculteur.

De même que la plupart de nos grands oiseaux, leur nombre a été considérablement réduit et il faudrait qu'ils fussent protégés et que la chasse en fût limitée au surplus annuel de la reproduction afin de conserver en permanence un nombre plus que suffisant de reproducteurs. Les individus canadiens de ce sous-ordre, sont divisés en trois familles, savoir: *Odontophoridae*, la caille d'Amérique; *Tetraonidae*, la gelinotte, et *Meleagridae*, les dindons.

FAMILLE—ODONTOPHORIDÆ. CAILLES D'AMÉRIQUE

Description générale. Ce sont les plus petits oiseaux de ce sous-ordre au Canada. La narine est en partie recouverte d'une lame charnue qui n'est pas aussi bien dissimulée dans le plumage que celle de la gelinotte. Cette famille n'est représentée que par une seule espèce dans l'est du Canada.

Le nom de «Caille» est improprement employé pour nos oiseaux canadiens. Ils n'ont rien de commun avec la caille d'Europe, mais ce sont de véritables perdrix. Par contre, nos «perdrix» sont des gelinottes. Voilà des exemples de noms européens improprement appliqués à des formes du nouveau monde. Il y a beaucoup de cas semblables, ce qui donne lieu à la confusion au début, mais ils sont tellement implantés dans les usages nationaux qu'il est maintenant trop tard pour les corriger.

Cette famille habite plutôt les régions méridionales et c'est dans les états du Sud-Ouest et au Mexique qu'on trouve en plus grand nombre tant les espèces que les individus.

289. **La Caille d'Amérique.** (BOB-WHITE, AMERICAN QUAIL). *Colinus virginianus*. L., 10, Planche IXB.

Traits distinctifs. Ne peut être confondu avec aucun autre oiseau au Canada. Taille et couleur avec traits distinctifs des gallinacés.

Indications sur le terrain. Petites perdrix qui s'enlèvent soudainement et volent par battements rapides avec des coups d'ailes qui s'entendent de loin.

Habitat. La caille d'Amérique et ses sous-espèces alliées sont répandues sur toute la partie est de l'Amérique du Nord, dans l'Ontario-sud et plus au nord.

SOUS-ESPÈCE. La sous-espèce indigène à l'est du Canada est le spécimen type: la Caille de la Virginie.

La caille d'Amérique n'apparaît, au Canada, que dans le sud de l'Ontario où elle est connue de tous les habitants de la campagne. À l'automne, le chasseur la poursuit avec des chiens et au printemps, le laboureur et ses enfants trouvent son nid au cours des travaux de la ferme où chacun donnait son sifflement perçant qui semble crier «Bob-white» ou ainsi que q'autres l'interprètent «More-wet». Ce n'est pas une espèce solitaire qui se retire dans les plus profonds sous-bois à l'époque de la culture;

mais
briss
des
bass
s'abr
débo
prog
dans
de fa
pas l
proli
inter
mais
rédui
natu
teau
l'hun
sonne
On di
un gi
com
cultiv
ferait
(
épuis
encor
clima
gènes
le Suc
vérita
nant
V
de gr
sur la
compr
oiseau
des ra
terre.

L
plage
Le tar
lagopé
emplu
cailles
l'été.
savane
seurs.
lagopé
et ces

mais elle se tient dans les clairières, sur les lisières des bois, les lignes d'arbrisseaux, le long des clôtures ou des taillis incultes au voisinage immédiat des champs. Quand elle manque de nourriture elle s'aventure dans la basse-cour pour manger avec les volailles. Elle mange dans la plaine et s'abrite dans les broussailles contre le danger. Avant que les terres fussent déboisées, la caille d'Amérique était peut-être rare au Canada mais les progrès de la colonisation lui ont ouvert de nouveaux terrains. Même dans les parties les plus méridionales du pays aujourd'hui cet oiseau demeure de façon précaire et en nombre très variable; il est évident qu'il ne s'adapte pas très bien à cette limite septentrionale de son habitat. Elle est très prolifique cependant, et à la suite de quelques hivers propices, si l'on en interdit la chasse, le nombre d'individus se doublera plusieurs fois; mais les abris sont presque invariablement mitraillés et les durs hivers réduisent périodiquement le nombre de ces oiseaux. Les conditions naturelles les plus dures qu'ils aient à combattre résultent de l'épais manteau de neige recouvrant la terre qui leur fournit à manger, comme de l'humidité glacée et du grésil qui non seulement les gèle mais les emprisonne sous une croûte de glace lorsqu'ils se réfugient dans la neige la nuit. On dit, avec des preuves à l'appui, que le faisan à cou annelé qui est devenu un gibier très recherché est hostile à ces oiseaux. En sus de son importance comme gibier cette espèce mérite véritablement d'être encouragée par les cultivateurs au seul point de vue économique et, pour cette raison, on ferait très bien de le rayer de la liste des oiseaux-gibiers.

On a eu beaucoup pour habitude de repeupler les terrains de chasse épuisés avec des oiseaux importés des États du sud. L'on ne s'est pas encore rendu compte si l'introduction de ces animaux non habitués au climat du nord a eu pour effet d'affaiblir la constitution des oiseaux indigènes. Plusieurs sous-espèces de la caille d'Amérique se présentent dans le Sud et, à cause des importations, il est devenu difficile de reconnaître les véritables caractères de nos oiseaux indigènes, lesquels ne peuvent maintenant être reconnus que sur des spécimens antérieurs à ces introductions.

Valeur économique. La caille d'Amérique se nourrit principalement de graine d'ivraie. Le grain qu'elle mange se compose de déchets glanés sur la terre. La partie insecte de sa nourriture, bien que plutôt faible, comprend certaines espèces que ne mangent pas ordinairement les autres oiseaux, c'est pourquoi elle est particulièrement importante. C'est l'un des rares oiseaux qui mange les doryphores ou insectes de la pomme de terre.

FAMILLE—TETRAONIDÆ. TÉTRAS

Le tétras a les narines dissimulées sous un plumage qui occupe une plage de pénétration à la naissance du bec sur les côtés (figure 29, p. 25). Le tarse est soit complètement soit partiellement emplumé, et chez le lagopède, le plumage recouvre les doigts. Les doigts, s'ils ne sont pas emplumés, sont bordés de chaque côté d'une petite frange composée d'écaillés cornées ou pectineuses (figure 28, p. 24), qui tombent au milieu de l'été. Le tétras du Canada, vulgairement appelé perdrix, est le gibier de savane le plus répandu de nos plaines et c'est l'oiseau favori de nos chasseurs. Les deux sexes sont semblables ou à peu près et, si l'on excepte le lagopède, subissent de légères variations saisonnières quant au plumage, et ces oiseaux n'émigrent généralement pas. Le lagopède à qui on peut

attribuer l'inverse de ces remarques est d'autre part tellement bien caractérisé qu'il n'est pas de confusion probable. Toutes les espèces font leur nid à ras de terre sans beaucoup de préparation pour les œufs. Ils pondent ordinairement beaucoup d'œufs, de six à dix-huit, et les petits, comme les poussins, suivent la mère dès qu'ils sont sortis de la coquille.

298. Le Tétrás du Canada. (CANADA GROUSE, SPRUCE PARTRIDGE). *Canachites canadensis*. L, 15. Planche XA.

Traits distinctifs. Facile à distinguer par sa couleur, etc., de la gelinotte à fraise qui est à peu près la seule espèce dans l'est du Canada avec laquelle on peut le confondre. Il y a dans l'extrême Ouest certaines espèces qui lui ressemblent étroitement.

Indications sur le terrain. Couleur généralement bleuâtre du mâle. Absence de huppe ou de collier de plumes et présence au-dessus de l'œil, tant chez le mâle que chez la femelle mais plus en évidence sur celui-ci.

Habitat. Habite en permanence là où il se trouve dans les régions boisées de conifères du nord du Canada.

SOUS-ESPÈCES. Le tétras du Canada comprend plusieurs races géographiques dont deux, la gelinotte noire d'Amérique, *Canachites canadensis canadensis*, la forme type, et le tétras du Canada *C. c. canace*, fréquentent l'est du Canada. Le premier de ces oiseaux habite la péninsule du Labrador et les collines plus au nord; le deuxième habite le Nouveau-Brunswick, le sud de l'Ontario, etc. Ils se ressemblent trop cependant pour qu'on les différencie dans un ouvrage de vulgarisation.

C'est un oiseau septentrional des épinettières. Sa nature pleine de confiance lui a fait donner le nom de «Fool Hen», car si l'on ne fait pas beaucoup de bruit, on peut souvent le tuer avec un bâton ou avec des pierres. Du fait qu'il se nourrit beaucoup de bourgeons de mélèze ou de conifères, sa chair a un goût trop fort pour un palais ordinaire.

Valeur économique. Comme il habite au nord et dans des forêts de conifères, il n'a aucune influence économique.

300. La Gelinotte à fraise. GELINOTTE HUPPÉE. (RUFFED GROUSE). *Bonasa Umbellus*. L, 17. Planche XB. (Pieds et bec, figures 27, 28, p. 24).

Traits distinctifs. La gelinotte à fraise avec sa fraise soyeuse noire, sur les côtés du cou, sa grande queue en éventail et ses taches semblables à des yeux sur le croupion et le bas du dos, ne saurait être confondue avec aucune autre espèce.

Indications sur le terrain. Grande taille et queue en éventail.

Habitat. La gelinotte à fraise habite toutes les régions boisées du Canada vers le nord jusqu'aux limites des arbres.

SOUS-ESPÈCES. On reconnaît plusieurs races géographiques de la gelinotte à fraise. L'oiseau type habite le sud et est remplacé dans l'est du Canada par la gelinotte du Canada *Bonasa umbellus togata* qui est caractérisée par une coloration plus grise ou moins rouge.

C'est la «perdrix» de la plupart de nos chasseurs canadiens. Elle habite le fond des bois au milieu des broussailles, se cache à ras de terre, s'enlève comme une petite explosion et vole avec une grande rapidité à travers la forêt sombre de façon à éprouver l'habileté et l'adresse de tout bon tireur. La gelinotte du Canada ne se rencontre aujourd'hui que dans les coins de forêts où elle trouve suffisamment d'espace et d'abri pour se protéger et sur les lisières des terrains cultivés où elle n'existe encore qu'à titre précaire.

Les changements subits de température sont très mauvais pour cette gelinotte. Les printemps froids, humides, sont mortels pour les jeunes et un bon nombre d'oiseaux reproducteurs périssent en hiver par l'effet du grésil. Durant les hivers rigoureux, elle cherche un abri sous la neige ou se laisse recouvrir par ses tourbillons. Après un dégel suivi de temps froid, comme il arrive souvent, elle est gelée sous une croûte qu'il lui est impossible de briser et par suite elle périt.

1
fréquent
sante
sité p
Les t
ce qu
dans
trone
tamb
et, bi
de mo
nage,
soit p
de l'u
batter
sauf e
à prod
comme
l'on e
l'été e
du Can
bien d
Il y a
plutôt
même
gelinot
grisee,
faible é

V
guère s
mental
mique.

Descr
tonnante
diverses t
qu'à l'ext
majeure p
de grande
été des ta
doigts, il
l'ancien q
sont très
boréal au
a perdu sa
y en a deu
lagopèdes
guées que
économiqu
les chasse

301. Le
pus. L, 1
presque u
et de roui

Le tambourinage de la perdrix est un bruit familier à tous ceux qui fréquentent les bois. C'est une série de palpitations sourdes et retentissantes produites par le battement rapide des ailes, et ce bruit a une intensité pénétrante qui fait qu'il est difficile de se rendre compte d'où il vient. Les battements commencent lentement et augmentent en vitesse jusqu'à ce qu'au bout de peut-être cinq secondes ils se confondent et se perdent dans un bruissement confus. L'animal se pavane ordinairement sur un tronc d'arbre renversé lorsqu'il s'arrête pour tambouriner. Durant ce tambourinage, l'oiseau étale tous ses ornements—queue, crête et fraises—et, bien que debout et immobile, ses ailes se perdent dans un brouillard de mouvement. On explique de deux manières cet espèce de tambourinage, soit par le frottement des ailes l'une contre l'autre au-dessus du dos, soit par leur battement sur les côtés du corps. L'effet peut être produit de l'une ou de l'autre ou d'aucune de ces façons. Le bruit produit par le battement des ailes au moment où l'oiseau prend son vol est de même nature sauf en intensité et en mesure, et le seul battement de l'air semble suffire à produire cet effet. Le but de ce geste est évidemment d'attirer la femelle comme la roue du paon ou du dindon. C'est au printemps surtout que l'on entend ce roulement, mais il se produit plus ou moins pendant tout l'été et encore plus fréquemment à l'automne. Chez la gelinotte huppée du Canada *Bonasa umbellus togata*, il se présente deux phases de coloration bien définies qui ne dépendent ni du sexe ni de la saison ni de la localité. Il y a une certaine espèce qui est très rouge; un autre type rare a les huppées plutôt cuivrées que noires, la queue est remarquablement rouge et cette même couleur se retrouve plus ou moins sur les autres parties. Chez la gelinotte grise qui est peut-être la plus typique, la queue est manifestement grise, il y a moins de rouge autre part et les huppées sont noires avec un faible éclat verdâtre. On rencontre toutes sortes de types intermédiaires.

Valeur économique. Comme cette espèce vit dans les bois on ne peut guère avoir à s'en plaindre et, à part son intérêt au point de vue sentimental et des plaisirs cynégétiques, elle n'a que peu d'importance économique.

GENRE—LAGOPUS. LAGOPÈDES.

Description générale. Le lagopède est un tétras plus septentrional et remarquable pour l'étonnante variation saisonnière de son plumage. En hiver il est tout blanc; en été il est rayé de diverses teintes de rouge, brun et ocre, principalement de rouge. Ses pieds sont emplumés jusqu'à l'extrémité des doigts et il fait régulièrement de longues migrations, allant à pied sur la majeure partie de leur parcours mais volant quelquefois d'un point à un autre ou pour traverser de grandes nappes d'eau comme par exemple le détroit d'Hudson. Comme il lui reste même en été des taches irrégulières de blanc à son plumage et que son pied est toujours emplumé jusqu'aux doigts, il est impossible de ne pas le reconnaître. Il habite les régions polaires et se trouve tant sur l'ancien que sur le nouveau continent. De même que bien d'autres oiseaux arctiques les lagopèdes sont très répandus au sud le long des chaînes de montagnes où l'altitude transporte le climat boréal aux latitudes moins élevées. La gelinotte rouge d'Écosse est un lagopède intéressant qui a perdu sa faculté de devenir blanc en hiver et, toute l'année, sa coloration estivale subsiste. Il y en a deux espèces dans l'est du Canada. En raison de la grande variabilité de cette espèce, les lagopèdes américains ont été divisés en un grand nombre de sous-espèces qui ne peuvent être distinguées que par un spécialiste pourvu de nombreux spécimens de comparaison. Au point de vue économique, le lagopède a peu d'importance sauf comme source d'alimentation pour les trappeurs, les chasseurs et les prospecteurs de l'extrême nord.

301. **Le Lagopède des saules.** (WILLOW GROUSE, WILLOW PTARMIGAN). *Lagopus lagopus*. L, 15. Tout blanc en hiver, sauf la queue qui est tout à fait noire. En été il est presque uniformément rayé de noir sur tout le corps et de diverses teintes de brun, d'ocre, et de rouille. Ce peut être soit l'ocre soit la rouille qui domine.

Traits distinctifs. En hiver, c'est la tête toute blanche et l'absence de ligne noire à travers les yeux qui le distingue du lagopède des rochers. En été sa taille supérieure qui se distingue surtout par la comparaison des becs le rend très facile à reconnaître.

Habitat. Régions polaires, à travers tout le continent, émigre au sud en hiver jusqu'aux frontières de la civilisation.

SOUS-ESPÈCES. La sous-espèce apparaissant dans la majeure partie du Canada est l'oiseau type. Une autre, le lagopède d'Allen *L. i. alleni*, se rencontre en Terre-Neuve.

302. **Le Lagopède des rochers.** (ROCK PTARMIGAN). *Lagopus rupestris*. L. 13. Tout blanc en hiver sauf la queue qui est noire et une ligne à travers l'œil jusqu'à la naissance du bec. En été, il ressemble beaucoup à l'espèce précédente.

Traits distinctifs. En hiver, ligne noire des yeux. En été, on le reconnaît à sa taille, particulièrement celle du bec, comparée à celle du lagopède des saules.

Habitat. Régions polaires à travers tout le continent, en hiver habite un peu plus au nord que l'espèce précédente.

SOUS-ESPÈCES. Trois sous-espèces de lagopèdes de rochers sont reconnues au Canada: le lagopède de Reinhardt, *L. r. reinhardti*, dans l'extrémité nord de l'Ungava; le lagopède de Welsh, *L. r. welchi*, en Terre-Neuve; et la forme type, le lagopède arctique, dans les autres régions.

305. **Poule des prairies.** (PRAIRIE CHICKEN, PINNATED GROUSE). *Tympanuchus americanus*. L. 18. Une gelinotte de la même taille que la gelinotte huppée, colorée avec des teintes de brun, d'ocre clair et de blanc, mais sans la longue queue en éventail, et dont la huppe souple est remplacée par quelques longues plumes droites et raides, dirigées de haut en bas au-dessus des épaules. Les rayures sur le ventre et la poitrine sont nettes et distinctes et se continuent à travers le dos, puis sur les parties supérieures et inférieures.

Traits distinctifs. Les indications précitées distinguent facilement cette espèce de la gelinotte huppée. On peut tout aussi facilement la distinguer de l'espèce suivante—la gelinotte à queue aiguë—par sa poitrine rayée au lieu d'être recouverte de marques en forme de V. Les autres caractères distinctifs sont la présence de longues plumes raides sur les côtés du cou et la queue raide ne se terminant pas en pointe quand elle est fermée.

SOUS-ESPÈCES. Deux sous-espèces de poule des prairies sont reconnues. Celle qui se rencontre au Canada est la race type—la poule des prairies du Nord.

C'est la véritable poule des prairies qui fréquente les prairies de l'Ouest, bien que dans l'ouest du Canada, on donne vulgairement et improprement ce nom à l'espèce dont la description va suivre. Nous la faisons figurer ici seulement parce qu'on en a pris des spécimens dans le sud de l'Ontario qui semblent s'être répandus à partir du côté de Michigan de la rivière Détroit où elle était autrefois commune mais est devenue rare et restreinte à un petit nombre d'endroits. D'après les souvenirs de la présente génération, dans certaines parties de l'Ouest elle a considérablement empiété sur le territoire de l'oiseau suivant qu'elle a fini par chasser.

Valeur économique.—Cet oiseau est trop rare dans l'est du Canada pour être étudié au long ici. Dans l'Ouest où elle est très répandue, son importance économique est considérable, mais elle n'est aucunement nuisible.

308. **La Gelinotte à queue aiguë.** (SHARP TAILED GROUSE). *Pedioecetes phasianellus*. L. 17-50. Décorée de vagues dessins de couleur rouge blanc ou crème sur les parties supérieures, qui se transforment en rayures seulement sur les épaules; parties inférieures d'un blanc pur. Sur la poitrine chaque plume est bordée d'un dessin foncé en forme de V qui se change en rayure vers le cou et en fines taches sur la gorge qui est de couleur crème.

Traits distinctifs. Les marques en V sur la poitrine et la pointe molle et aiguë de la queue lorsqu'elle est fermée constituent des marques d'identification concluantes et faciles à reconnaître.

Habitat. L'espèce est plus septentrionale et moins nettement une poule de la plaine que la poule des prairies. Elle habite tout le continent au nord des terres actuellement cultivées dans l'Est mais ne se rencontre que par endroits isolés alors qu'il se trouve de vastes territoires où elle fait défaut ou ne se rencontre que rarement. Elle vient irrégulièrement vers le sud à l'automne jusqu'aux confins des terres cultivées. Dans les provinces de la prairie elle s'avance au sud jusqu'aux frontières des États-Unis et au delà.

St
la fron
cetes
aiguë

endro

domo
n'en

3
ble tel

Tr
ou don
au bou

He
Maine

SC
habite
vestris.

] le su

nées.

boisé

tend

indigi

et il ;

sont

(

les di

Ornit

dans

du pi

(

sembl

caract

leur l

laquel

molle

p. 26)

sur ur

domes

les ca

rence

les col

31/

Planch

SOUS-ESPÈCES. Cette espèce est divisée en plusieurs races géographiques. Le long de la frontière manitobaine, on peut s'attendre à trouver la gelinotte des prairies à queue aiguë, *Pediocetes phasianellus campestris*; dans les autres parties de l'est du Canada c'est la gelinotte à queue aiguë typique ou du nord.

Dans l'Ouest cet oiseau est bien une poule des prairies mais, par endroits, elle est remplacée par l'espèce précédente.

FAMILLE—MELEAGRIDAE. DINDONS.

C'est le plus grand de nos gallinacés, et il est si connu sous sa forme domestique qu'il est inutile d'en donner une description détaillée. Nous n'en avons eu qu'une seule espèce au Canada.

310. Le Dindon sauvage. (WILD TURKEY). *Meleagris gallopavo*. L. 48-50. Ressemble tellement à notre dindon domestique qu'une description spéciale serait superflue.

Traits distinctifs. Le seul oiseau dont il a besoin d'être distingué c'est la variété apprivoisée ou domestique. Celle-ci est d'origine mexicaine et, par conséquent, a toujours un peu de blanc au bout de la queue. La queue du dindon sauvage se termine toujours en brun cendré.

Habitat. Primitivement distribué sur toute la partie est de l'Amérique du Nord jusqu'au Maine et au sud de l'Ontario.

SOUS-ESPÈCES. On reconnaît plusieurs sous-espèces de dindon sauvage. L'oiseau type habite le Mexique. Le spécimen canadien est le dindon sauvage du Nord, *Meleagris gallopavo silvestris*.

Le dindon sous sa forme sauvage n'a paru au Canada que dans le sud de l'Ontario et il a maintenant disparu depuis un nombre d'années. Actuellement le dindon sauvage n'habite plus que les régions boisées les plus reculées des Etats du sud les plus déserts et même là, il tend à bientôt disparaître. Il y a probablement beaucoup de sang sauvage indigène chez les troupeaux de dindons apprivoisés, le long du lac Erié, et il y a un bon nombre de spécimens de soi-disant dindons sauvages qui sont certainement au moins à demi mêlés de sang domestique.

Ordre—Columbae. Pigeons et colombes.

Cet ordre, d'une distribution mondiale, est divisé différemment par les divers auteurs. D'après le système de classification de l'Union des Ornithologistes américains, toutes nos espèces américaines sont comprises dans une seule famille, les *Columbidae*. Ils ont tout à fait la forme typique du pigeon, c'est pourquoi on peut les appeler les pigeons authentiques.

FAMILLE—COLUMBIDAE. PIGEONS VÉRITABLES ET COLOMBES.

On peut dire d'une façon générale que les pigeons et les colombes ressemblent, quant au profil et aux habitudes, à notre race domestique. Leurs caractères sont plus faciles à reconnaître qu'à décrire. C'est surtout à leur bec qu'on peut les reconnaître. Il est dur et corné à la pointe, laquelle s'élargit très légèrement, et il est pourvu, à la base, d'une membrane molle légèrement renflée dans laquelle s'ouvrent les narines (figure 35, p. 26). Les pattes et les pieds sont faibles, ne pouvant servir qu'à marcher sur une petite étendue plane ou pour simplement se percher. Nos pigeons domestiques ordinaires qui descendent du Biset d'Europe présentent tous les caractères les plus distinctifs de cette famille. Il n'existe aucune différence reconnaissable ou taxonomique entre ce qu'on appelle les pigeons et les colombes.

315. Le Pigeon voyageur. (PASSENGER PIGEON). *Ectopistes migratorius*. L. 16-29. Planche XIA.

Indications sur le terrain. Cette espèce étant maintenant tout à fait éteinte, toute indication serait inutile.

Nid. Les pigeons voyageurs se construisaient un nid grossier de branchettes dans les arbres et nichaient par bandes.

Habitat. Cet oiseau couvait dans les sections boisées de la majeure partie du Canada à l'est des montagnes et au sud jusqu'aux Etats du Centre, et hivernait dans les Etats du Sud et au delà.

Les immenses troupes de pigeons voyageurs qui autrefois obscurcissaient le ciel étaient l'une des merveilles de l'Amérique. Si les descriptions de leur nombre n'étaient accompagnées de témoignages détaillés, rapportés par des personnes absolument dignes de foi, elles sembleraient purement fantaisistes; des troupes, tellement compactes qu'un coup de fusil au hasard en aurait abattu des quantités, voyageaient avec rapidité, formant un front de plusieurs milles de largeur sur une longueur telle qu'il fallait des heures pour les voir passer. Audubon estime qu'une seule de ces troupes renfermait au delà d'un milliard d'oiseaux, en basant ce chiffre sur la densité et l'étendue du groupement et non sur une simple conjecture. Ils couvaient dans de denses refuges à corbeaux où leur poids brisait souvent les arbres de la forêt. On coupait les arbres qui renfermaient leurs nids et bien que chaque nid ne contint qu'un seul pigeonneau, il y en avait tellement que l'on fit venir des cochons pour les leur donner en pâture. Plus tard les oiseleurs de profession les prenaient au filet et les expédiaient par pleins wagons aux divers centres de population. On comprendra que même ces immenses troupes de pigeons voyageurs ne purent pas résister à de pareilles attaques et graduellement ils ont diminué. Il a été question de mettre un terme à ce massacre à cette époque mais ces démarches n'ont fait que provoquer des risées. L'on disait que leur nombre était inépuisable, mais aujourd'hui l'espèce est éteinte et le dernier survivant, un oiseau captif, est mort il y a peu de temps à Cincinnati. Leur dernier grand ralliement fut près de Petosley, Mich. A l'automne de 1878 les pigeons sont repartis sans toutefois revenir en nombre exploitable le printemps suivant. Pendant quelques années, par la suite, on en aperçut parfois de petits troupeaux et quelques ralliements isolés furent signalés, mais comme les oiseleurs ont suivi chaque cas de très près, il est devenu évident qu'il n'y avait plus rien à faire pour les chasseurs de pigeons. Ces oiseaux devinrent ensuite de plus en plus rares tous les ans jusqu'à ce que finalement on n'en ait plus aperçu du tout. Il y a même encore parfois des rumeurs que des bandes sont été vues en des endroits éloignés dans les montagnes occidentales du Mexique ou de l'Amérique du Sud et autre part, mais dans chaque cas, les recherches ont démontré qu'il s'agissait d'autres espèces ou qu'on avait été mal informé. Pendant plusieurs années une forte récompense a été offerte à quiconque signalerait un couple reproducteur. Il va sans dire que la personne qui a offert la récompense a été inondée de lettres mais aucun des cas signalés n'a fait rien découvrir et la récompense n'a pas été gagnée; finalement cet offre a été retiré. Dans l'Est, c'est ordinairement la tourterelle de la Caroline que l'on prenait pour le pigeon voyageur et, dans l'Ouest, le pigeon à queue rayée. Même encore de temps en temps on entend certaines personnes raconter avec tous les détails qu'ils ont vu cet oiseau dans leur enfance, mais il n'est guère douteux que l'espèce est éteinte.

316. La Tourterelle de la Caroline. (MOURNING DOVE). *Zenaidura macroura*. L. 11-85. Planche XIA.

Trai
caractér
au-dessu

Nid.
ches infé
par band

Hab.
les parti
tropique

SOI
l'Améric
espèce gé
ment les

Bi
de la C
rablem
menta
propor
line m
tuaient
forestie
se renc
probab
son cor
pas se
calamit
toute
comme
ment c
ment a
peut pi
cepend

So
lui a vi
comme
bouteil

Vo
forestie
elle ma
qu'elle
plantée
la terre
soit fac

Descr
loppés (fi
Le bec est
molle ou
en ce que
attribuer
de la force
possède et
compagne

Habit
ils sont re

Traits distinctifs. Plus petite et d'un fauve plus brunâtre que le pigeon voyageur, sans le rouge caractéristique sur la poitrine ni le bleu sur le dos; porte une petite tache noire sur le côté du cou au-dessus de l'oreille. Ne saurait être confondue qu'avec l'espèce précédente.

Nid. Le tourterelle de la Caroline se bâtit une simple plate-forme de bûchettes dans les branches inférieures des arbres ou les parties supérieures des buissons. Elle niche solitairement et non par bandes.

Habitat. Elle couve sur les frontières méridionales de l'est du Canada et hiverne sur place dans les parties les plus méridionales et dans les États immédiatement au sud de la frontière jusqu'aux tropiques.

SOUS-ESPÈCE. La tourterelle plaintive (Mourning dove) qui habite la majeure partie de l'Amérique du Nord est bien la tourterelle de la Caroline, *Z. m. carolinensis*, et c'est la seule sous-espèce généralement reconnue comme apparaissant au Canada. L'oiseau type dépasse habituellement les limites de son habitat.

Bien que le pigeon voyageur ait complètement disparu, la tourterelle de la Caroline existe encore et il est probable que le nombre en a considérablement augmenté depuis que l'on déboise le pays. Les régimes d'alimentation de ces deux oiseaux se ressemblaient beaucoup sauf quant à la proportion des divers éléments de nourriture. La tourterelle de la Caroline mange facilement des fruits d'arbres forestiers mais ceux-ci constituaient l'aliment principal du pigeon lequel était donc plutôt un oiseau forestier. La tourterelle de la Caroline a des habitudes plus solitaires et se rencontre rarement par bandes. Elle couve tout à fait seule. C'est probablement ce qui a le plus contribué à conserver l'espèce alors que son congénère de plus forte taille n'a pas survécu. La maladie ne pouvait pas se propager parmi ces oiseaux aussi complètement et toute autre calamité affectant les individus ou les petits groupements n'englobait pas toute l'espèce. Dans plusieurs sections, la tourterelle est considérée comme un oiseau-gibier, mais la loi de chasse ne la reconnaît pas ordinairement comme tel. Il s'en tue cependant de grands nombres accessoirement aux autres chasses, malgré qu'elle soit protégée par la loi, et l'on ne peut pas dire que la vie de cet oiseau ne soit pas toujours exposée. C'est cependant une race forte et elle ne court en ce moment que peu de danger.

Son long cri plaintif «O-woe-woe-woe» est très connu et c'est ce qui lui a valu son nom anglais de «Mourning Dove». C'est un son très bizarre comme celui que l'on obtient en soufflant légèrement dans le goulot d'une bouteille vide.

Valeur économique.—Bien que se nourrissant surtout des fruits d'arbres forestiers (glands, châtaignes et autres fruits semblables à l'écorce tendre), elle mange très bien le grain et aussi passablement d'insectes. Le grain qu'elle mange se compose en grande partie de déchets et la semence bien plantée et recouverte ne peut avoir à en souffrir, car elle ne gratte jamais la terre. On ne peut lui reprocher aucun dommage aux récoltes qui ne soit facile à prévenir et le bien qu'elle fait est manifeste.

Ordres—Raptore. Oiseaux de proie.

Description générale. Ce sont des oiseaux mangeurs de poissons avec quatre doigts bien développés (figures 31 et 32, p.25), armés de griffes puissantes et crochues pour saisir et retenir leur proie. Le bec est recourbé (figures 30, 33A et B, et 34, p. 25 et 26) et la base en est revêtue d'une membrane molle ou cire au sein de laquelle sont situées les narines. Les oiseaux de proie diffèrent des autres en ce que les femelles sont de beaucoup plus forte taille que les mâles, ce qu'il faut probablement attribuer aux plus grands efforts qu'elle doit faire pour nourrir ses petits; comme ce travail exige de la force, de la pesanteur et de l'endurance plutôt que de la finesse et de la dextérité, la femelle possède ces qualités à un plus haut degré que le mâle lequel, bien qu'il puisse porter secours à sa compagne, n'a pas la responsabilité finale d'élever la famille.

Habitat. Les rapaces sont distribués par tout le monde sauf dans le continent antarctique où ils sont remplacés par les stercoires, mouettes et autres rapaces de la mer.

Bien que la classification de cet ordre soit loin d'être satisfaisante et qu'elle doive probablement être révisée, c'est l'habitude américaine de diviser notre espèce en trois sous-ordres: *Sarcorhamphi*, les vautours d'Amérique, qui sont différents de ceux de l'ancien monde; *Falcones*, les oiseaux de proie diurnes; et *Striges*, les oiseaux de proie nocturnes ou hiboux.

Valeur économique.—Il n'est peut-être pas d'oiseau plus connu et en même temps plus mal compris d'une façon générale dans ses rapports économiques. Tout le monde connaît les éperviers, les hiboux et les aigles et leurs habitudes de carnivores, mais peu de gens se rendent compte que certains d'entre eux comptent parmi les meilleurs amis de l'homme et que la manie de les tuer à première vue est désastreuse. Il y en a qui sont très malfaisants, mais c'est une très grave erreur au point de vue économique que de les condamner tous en bloc. Ceux de la première famille, les vautours, sont des oiseaux repoussants mais ils sont précieux pour faire disparaître les déchets et il n'y a vraiment rien à redire à leur sujet. Quant aux deux autres divisions, les rapaces diurnes et nocturnes, la différence de leurs habitudes donne lieu à beaucoup de malentendus. Nous sommes heureux, en ce sens, de pouvoir donner une opinion basée sur des faits établis et non sur de simples théories. Le service biologique des États-Unis a fait une étude approfondie sur le régime d'alimentation des éperviers et hiboux d'Amérique et ses conclusions s'appuient sur l'examen de quelque 2,700 estomacs pris dans toutes les saisons de l'année dans diverses parties des États-Unis et du Canada. Toutes ces recherches accompagnées des témoignages qui en établissent l'authenticité sont publiées sous forme de rapport intitulé: "The Hawks and Owls of the United States", par le Dr. A. K. Fisher¹. Bien que ce travail soit fait au pays voisin pour son propre usage, toutes les espèces canadiennes sont étudiées et les résultats s'appliquent tout aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. Comme certaines des espèces les moins malfaisantes n'apparaissent pas au Canada, les proportions ci-dessous devront être légèrement corrigées pour notre usage mais pas suffisamment pour modifier sensiblement les conclusions générales. Six seulement parmi les soixante-treize espèces étudiées sont malfaisantes, dont trois qui sont extrêmement rares au Canada et une ne mange que des poissons. Quant aux autres, 58 pour cent des estomacs examinés contenaient des souris et des petits mammifères, 27 pour cent des insectes, et seulement 3½ pour cent des volailles ou oiseaux-gibiers. En divisant les rapaces de l'est du Canada, en plusieurs groupes, il se trouve que trois espèces sont bienfaisantes et absolument inoffensives; seize sont principalement bienfaisantes et font véritablement plus de bien que de mal; quatre font à peu près autant de bien que de mal; et six sont manifestement malfaisantes. Trois seulement de ces dernières sont assez communes pour qu'on s'en occupe, et deux seulement, l'épervier brun et l'épervier de Cooper, qui sont assez répandus dans les localités à population dense, pour qu'on se prémunisse contre eux. L'autour à tête noire est une espèce plus septentrionale dont la distribution s'étend au delà des régions habitées dans le nord. Il est difficile de déterminer ce qui peut être considéré comme un juste milieu entre le bien et le mal que font ces oiseaux; la perte d'un poulet est une chose définie, facile à estimer, tandis que la disparition des souris et des insectes emportés

¹Voir aussi "The Hawks of the Canadian Prairie Provinces; their relation to agriculture". Commission géologique du Canada, Bulletin du Musée, n° 28, 1918.

par un
cier.

C
témat
famill
se nou
quent
d'épui
décom
choix,
consti
done p
forcés

Desc
relativen
tête et le
du dindo
plutôt qu
conformé

Habi
du Cana

On
les Eta
du jour
région
Lorsqu
forme r
d'une
seul ois
Bien qu
tours n
On rec
vrir let
qui éme
s'élève
étendue
toujour
sa posi
donner
été app
Nous n
bien qu
valles.

Va
dans l'a
mangen
et peut-
ne s'att

par un oiseau de proie est un vague avantage difficile à vérifier ou à apprécier.

SOUS-ORDRE—SARCORAMPHI. VAUTOURS D'AMÉRIQUE.

Ce sous-ordre se compose de vautours d'Amérique, lesquels sont systématiquement très distincts de ceux de l'ancien monde. Une seule famille est représentée au Canada, *Cathartidae*, les busards. Les vautours se nourrissent de chair corrompue, recherchent la chair morte et ne s'attaquent pas à une proie vivante à moins que celle-ci ne soit au dernier degré d'épuisement. Ils ne touchent ordinairement rien que de la viande en décomposition. L'on se figure ordinairement que c'est une question de choix, mais ce peut-être une nécessité, puisque leurs pieds ne sont pas constitués pour saisir la proie et leur bec est relativement faible. Ils sont donc peut-être incapables de déchirer de grosses carcasses encore saines et forcés d'attendre la décomposition qui rend la matière moins réfractaire.

FAMILLE—CATHARTIDAE. BUSARDS.

Description générale.—Ce sont de grands oiseaux, presque uniformément noirs de couleurs. Le bec est relativement long et moins fortement recourbé que chez les autres rapaces (figure 30, p. 25). La tête et le haut du cou sont dépourvus de plumage et ont une ressemblance superficielle avec ceux du dindon moins les caroncules ou excroissances verruqueuses. Pieds semblables à ceux du poulet plutôt qu'à ceux de l'épervier. Les griffes sont sans pointes et le pied dans son ensemble n'est pas conformé pour saisir ou retenir une proie.

Habitat.—Le vautour est essentiellement un oiseau des pays chauds. Il ne pénètre dans l'est du Canada que sur les frontières les plus méridionales.

On ne peut convenablement étudier les vautours au Canada. Dans les États du Sud ils sont plus communs et on peut les voir à chaque heure du jour planant haut dans les airs avec leurs ailes immobiles, fouillant la région de leurs yeux télescopiques pour y découvrir de la chair corrompue. Lorsqu'un animal meurt (ou même avant) il est tout de suite aperçu et une forme noire vient du ciel s'abattre auprès de lui; celle-ci est bientôt suivie d'une autre et, dans peu de temps, un endroit où l'on ne voyait pas un seul oiseau se trouve peuplé de ces rapaces s'arrachant cet infect repas. Bien que l'on constate à la dissection, de très puissantes narines, les vautours ne semblent pas être guidés d'une façon appréciable par l'odorat. On reconnaît par expérience qu'ils comptent sur la vue seule pour découvrir leur nourriture. Le vol du vautour constitue l'un des phénomènes qui émerveille le physicien. Cet oiseau reste suspendu dans l'air ou même s'élève à perte de vue sans aucun effort visible. Sur des ailes à demi étendues et immobiles il s'élève dans des spirales ascendantes, s'élevant toujours de plus en plus haut, et ensuite, toujours en tournant, maintient sa position dans l'air pendant des heures à la fois, sans apparemment donner un seul coup d'aile. Plusieurs explications de ce phénomène ont été apportées mais aucune jusqu'à présent ne saurait être concluante. Nous n'avons au Canada qu'une seule espèce dont l'habitat soit régulier bien que limité. Il y en a une autre qui n'apparaît qu'à de rares intervalles.

Valeur économique.—Les vautours ne sont pas des oiseaux de proie dans l'acception ordinaire de ce terme, car ils ne tuent pas ce qu'ils mangent mais se nourrissent entièrement de charognes. On les a accusés, et peut-être avec raison, de précipiter parfois la mort d'un animal, mais ils ne s'attaquent jamais à une proie qui n'est pas à la dernière phase de

son existence. Cette espèce n'a que peu d'importance économique au Canada, mais dans le Sud, du fait qu'elle fait disparaître les chairs corrompues c'est une bonne sauvegarde pour la santé des familles sans précautions et dans bien des endroits typiques ils sont vigoureusement protégés par la loi dans un but purement sanitaire.

325. **Le Vautour aura.** (TURKEY VULTURE, TURKEY BUZZARD). *Cathartes aura*. L. 30. Un oiseau tout noir; la tête et le cou sans plumage ou, chez les jeunes, recouverts d'un duvet brun grisâtre semblable à de la fourrure.

Traits distinctifs. Cette espèce ne saurait être confondue qu'avec la suivante, mais comme l'habitat de chaque espèce au Canada est bien distinct il n'y a guère de danger que l'on se trompe. La base du bec est d'un rouge vif chez l'adulte, et la tête et le cou d'un rouge sombre. Les surfaces sous les ailes sont dépourvues d'éclat argenté.

Indications sur le terrain. La tête et le cou sans plumes constituent la meilleure marque d'identification des vautours. On reconnaît cette espèce à la couleur rouge de ces parties.

Nid. Sur le sol, généralement dans un tronc d'arbre creux.

Habitat. Presque toute l'Amérique septentrionale, au nord de la frontière canadienne, qu'il ne traverse, dans l'Est, qu'au sud de l'Ontario. Il peut s'en introduire quelques-uns, plus ou moins régulièrement, qui viennent du Manitoba.

SOUS-ESPÈCES. L'espèce qui occupe la majeure partie des Amériques du Nord et du Sud est divisée en sous-espèces. Celle qui se présente dans le nord du Mexique est le busard du Nord. *Cathartes aura septentrionalis*.

Valeur économique. Comme cette espèce se nourrit de chairs corrompues il n'y a rien à lui reprocher.

326. **Le Vautour noir.** (BLACK VULTURE). *Catharista uruba*. L. 24. Très semblable au busard mais un peu plus petit.

Traits distinctifs. On le distingue du précédent par le cou, la tête et la base du bec qui sont blancs au lieu de rouges ou roses.

Indications sur le terrain. L'aspect généralement noir de la tête sans plumes et l'éclat argenté de la surface sous les ailes permettent de reconnaître l'animal vivant. La queue est plus courte et l'oiseau paraît plus noir que chez le busard.

Habitat. Il est plus répandu dans l'Est que le busard. Régulièrement il vient du sud de la Virginie et s'égaré parfois à travers nos frontières dans les Provinces Maritimes.

Cet oiseau fréquente trop peu le Canada pour qu'on s'y arrête longuement. On ne peut s'attendre à le rencontrer que par occasion dans les Provinces Maritimes.

SOUS-ORDRE—FALCONES. OISEAUX DE PROIE DIURNES.

Description générale. Bec fortement recourbé à partir de la base (figure 33, p. 25) où il est recouvert d'une cire renflée ou d'une masse de tissus cireux jaunâtre dans laquelle apparaissent les narines. Ce tissu est nettement plus mou que le bec proprement dit et ordinairement de couleur jaune. Les pieds sont forts et pourvus de puissantes serres pour capturer et retenir une proie vivante (figure 31, p. 25).

Traits distinctifs. Les membres de ce sous-ordre diffèrent des vautours en ce qu'ils ont le bec plus court et plus fortement recourbé, et la tête emplumée au lieu de sans plumes (à comparer les figures 30 et 33, p. 25); et ils se distinguent du sous-ordre suivant, les hiboux, en ce qu'ils ne possèdent pas les disques faciaux (figure 34, p. 26) autour des yeux qui obligent ces oiseaux à regarder droit en face au lieu de pouvoir regarder de côté comme la plupart des autres oiseaux.

Ce sont les oiseaux généralement connues sous le noms de faucons et aigles. Ils sont représentés au Canada par trois familles: *Buteonidæ*, les buses communes et les aigles; *Falconidæ*, les faucons vrais et caracaras; et *Pandionidæ*, les orfraies ou aigles pêcheurs.

FAMILLE—BUTEONIDÆ. BUSES, MILANS, ÉPERVIERS, BUSARDS ET AIGLES.

Description générale. La meilleure façon de décrire les éperviers, c'est que ce sont ni les faucons ni des orfraies.

Traits distinctifs. Ailes courtes arrondies et concaves sauf chez les milans et les busards, et leur vol est relativement lourd. Le bec (figure 33B, p. 25) est dépourvu des dents aiguës de chaque

côté de
sur la
comme

(
térisé
prenr
rapac
la rol
conni

Les
pris q

327.
L. 24.
Un épe
extérier
noir pu
blanc.
fondém
n'est g

Hal
de notre

C

ter ph

V

limace

331
XI B.

Trai
des yeux
la mouet

Indic
blanc qu
étroite q
différent.

Nid.

Habi
tout le C.

L'

partout
prés et

fouillar

momen

instant

cette n

méfianc

plus prt

Va

des vol

d'autres

et 1 des

côté de la pointe (figure 33, p. 25) qui caractérisent celui des faucons. Les pieds (particulièrement sur la surface inférieure) n'ont pas de corrugations dures et aiguës pour retenir une proie glissante comme chez les orfraies ou aigles pêcheurs.

Cette famille est composée d'un certain nombre de genres bien caractérisés dont chacun est relativement facile à reconnaître. Ces genres comprennent la majorité de nos oiseaux de proie. Bien que véritablement rapaces de nature, ils n'ont pas l'esprit intrépide, l'adresse à l'attaque ou la robuste endurance des faucons vrais, et c'est pourquoi les anciens fauconniers les appelaient "éperviers ignobles".

GENRES—ELANOIDES ET CIRCUS. MILANS ET BUSARDS.

Les milans sont des oiseaux qui habitent le Sud et l'on n'en a jamais pris qu'une espèce au Canada.

327. **Le Milan à queue d'aronde.** (SWALLOW-TAILED KITE). *Elanoides forficatus*. L. 24. (Les plumes extérieures de la queue avancent de 8 pouces sur celles du milieu). Un épervier plutôt petit, qui semble long en raison de la longueur démesurée des plumes extérieures de sa queue qui dépassent de 8 pouces celles du milieu. Ailes et queue d'un noir pur; tout le reste, y compris la tête, les épaules et la partie supérieure du dos, est blanc. Cet oiseau est remarquablement coloré en blanc et noir intenses; la queue profondément fourchue; il a les ailes longues et pointues d'une hirondelle des granges; il n'est guère possible de confondre cette espèce avec une autre.

Habitat. Régions tropicales et semi-tropicales de l'Amérique. Apparaît très rarement le long de notre frontière méridionale.

Cette espèce est de toute beauté mais trop rare au Canada pour mériter plus qu'une simple mention.

Valeur économique. Sa principale nourriture se compose d'insectes, de limaces et de reptiles; il ne touche jamais aux mammifères ou aux oiseaux.

331. **Le Busard des marais.** (MARSH HAWK). *Circus hudsonius*. L. 19. Planche XI B.

Traits distinctifs. L'espèce se distingue par un cercle incomplètement garni de plumes autour des yeux qui rappelle un peu ceux du hibou. L'adulte possède d'une façon générale les couleurs de la mouette et les jeunes sont caractérisés par des tons rouges chaud.

Indications sur le terrain. Les meilleures indications sont la coloration générale et le croupion blanc que l'on distingue très bien quand l'oiseau vole. Les longues ailes pointues et sa longue et étroite queue lui donnent la silhouette d'un faucon au vol, mais son mouvement est entièrement différent.

Nid. Il niche à terre sur un lieu sec des marais ou dans un champ de foin.

Habitat. Tous les Etats-Unis et tout le Canada jusque près des régions polaires. Couve dans tout le Canada.

L'un des plus communs d'entre nos éperviers se rencontre presque partout dans l'est du Canada. Il fréquente les marais découverts, les prés et les champs; on peut le voir s'agitant de haut en bas, parcourant et fouillant le terrain comme un chien de chasse bien dressé. Pendant un moment il voltige au-dessus de sa proie et s'abat dessus pour s'élever un instant après et se poser sur un poteau de clôture ou autre élévation de cette nature afin de dévorer sa capture. Les jeunes ne sont pas sans méfiance, mais les adultes de couleur bleue comptent parmi les oiseaux les plus prudents et sont assez rarement atteints par le fusil du chasseur.

Valeur économique. Sur 116 estomacs qu'on a examinés, 7 contenaient des volailles ou oiseaux-gibiers; 34, d'autres oiseaux; 57, des souris; 22, d'autres mammifères; 7, des reptiles; 2, des grenouilles; 14, des insectes; et 1 des matières indéterminées. Donc, sur 144 contenus alimentaires, 41

étaient nuisibles, 93 utiles et 10 indifférents. Sur les 41 aliments auxquels on peut trouver à redire, 3 seulement étaient des oiseaux de basse-cour et le reste des oiseaux sauvages, se composant de 46 individus de valeur beaucoup moindre que les variétés domestiques. Les 99 souris et autres mammifères comprenaient environ 117 individus. Les insectes étaient surtout des locustes, des sauterelles et des coléoptères. La balance penche évidemment en faveur de cette espèce qui est incapable d'emporter des volailles, si ce n'est des jeunes, et seulement lorsque celles-ci s'aventurent jusque dans leur habitat. Si l'on élève des poules autour de la maison, elles sont pour ainsi dire parfaitement protégées contre cet oiseau. Comme il fréquente les marais, les plaines herbeuses et les haies embroussaillées, c'est l'ennemi naturel des souris des champs, et il contribue probablement plus que toute autre influence naturelle à réduire comme il convient le nombre de ces rongeurs.

GENRES—ACCIPITER ET ASTUR. ACCIPITRES, ÉPÉVRIERS AUX COURTES AILES.

Description générale.—Épévier à ailes courtes et arrondis et à longue queue.

Les accipitridés sont des oiseaux des bois qui voltigent autour du sommet des arbres ou sur les lisières des bois; ils n'ont pas l'habitude de s'élever très haut dans les airs. Ils prennent leur proie par surprise et attaquent vivement plutôt qu'après une longue poursuite. Leurs courtes ailes et leur longue queue qui leur permettent de prendre de rapides élan de vitesse et de faire de brusques évolutions, s'adaptent bien à ces manœuvres mais ne se prêtent pas à un effort soutenu.

Valeur économique. Ce sont les seules espèces communes d'épériers canadiens qui peuvent être tant soit peu utiles. Ils sont pleins de vie et d'activité, et bien qu'ils n'aient pas la force et l'endurance des faucons vrais, ils font en réalité beaucoup plus de tort que leurs plus grands et plus puissants congénères. C'est d'après cet oiseau que l'on donne vulgairement le nom de "Chicken Hawk" à tous les petits épériers. Ils ne mangent jamais de chair corrompue, ne cherchant toujours que la viande fraîche, et ne reviennent presque jamais à une proie déjà en partie dévorée. Heureusement les deux espèces les plus communes sont les plus petites, ce qui réduit d'autant le tort qu'ils peuvent faire. Le seul gros et puissant oiseau de ce groupe est l'Autour, mais il est moins répandu et, sauf au cours de certains hivers, il se rencontre rarement dans les parties les plus habitées du sud du Canada.

332. L'Épévier brun. (SHARP-SHINNED HAWK). *Accipiter velox*. L, 11.25. Plaque XIII.

Traits distinctifs. En règle générale, c'est par la taille que l'on distingue l'épévier brun de tous les autres, sauf du faucon épévier, mais on ne le confondra pas avec celui-ci car il ne possède aucunement les caractéristiques du faucon. Une forte femelle est à peu près de la taille d'un petit épévier de Cooper mâle dont elle est une parfaite miniature comme coloration. Il diffère de cette espèce par la queue qui est rectangulaire au lieu d'être arrondie; quand elle est fermée, les plumes extérieures sont tout aussi longues que les intérieures au lieu d'être manifestement plus courtes. Le tarse est relativement plus mince et plus élancé, une différence très perceptible quand on compare les spécimens.

Indications sur le terrain. Leurs ailes courtes et arrondies, leur longue queue et leur vol par coups rapides et uniformes, et leurs courtes envolées aideront à reconnaître cette espèce comme un accipitridé. Sa queue rectangulaire au lieu d'arrondie facilitera son identification d'avec l'épévier de Cooper, mais c'est la taille qui constitue la principale différence.

Nid.
Habit.
boisées au
de la régie
C'
vigueur
agile.
et n'att
proie ne

Va.
faucon
un parei
épévier
Hawk''
et autre

Sur
gibiers;
donne 1
Les sour
se chiff
tourtere
très inté
vier c'est
des com
Ontario,
grands r
tombent

333. I
blable à l'

Traits d
d'une forte
un petit aut
arrondie au
à aucun âge
coup. La m
de revêtu el
ressembler
pour le jeun
primaires ex

Indicatio
queue arron
des adultes

Nid. II
Habitat.
tous les Eta

C'est
sa plus fo
Avec pre
très bien
une poule
Valei
valailles o
l, une gr

Nid. Sur les arbres, ordinairement des conifères à une hauteur de 10 à 40 pieds.

Habitat. Presque toute l'Amérique du Nord, probablement jusqu'aux limites des régions boisées au nord. Dans l'est du Canada, il se reproduit partout, sauf dans la partie la plus méridionale de la région inférieure des grands lacs.

C'est l'un des plus petits éperviers que nous ayons. Il n'a pas la vigueur soutenue ou la persistance des "faucons nobles" mais il est actif et agile. Il attaque sa proie avec fureur mais revient rarement à la charge et n'attaque presque jamais sa proie au vol comme le font les "oiseau de proie nobles".

Valeur économique. C'est cette espèce qui aurait dû s'appeler le faucon épervier au lieu du petit faucon auquel on a assigné ce nom. C'est un parent rapproché de celui-ci et c'est le représentant américain du faucon-épervier d'Europe, lequel est aussi un accipitridé. Le nom de "Sparrow Hawk" lui conviendrait très bien puisqu'il se nourrit surtout de moineaux et autres petits oiseaux.

Sur 107 estomacs examinés, 6 contenaient des volailles ou des oiseaux gibiers; 99, d'autres oiseaux; 6, des souris, et 5, des insectes. Cela nous donne 105 aliments qui condamnent l'oiseau contre 11 qui le font utile. Les souris ne se composaient pas de plus de 9 individus, mais les petits oiseaux se chiffraient à 115, dont la taille variait entre celle du roitelet et celle de la tourterelle. C'est un fort argument contre cette espèce qui autrement est très intéressante. Un bon point qu'on peut relever en faveur de ce petit épervier c'est qu'il est friand des moineaux domestiques et qu'il en supprime des compagnies aux abords des petites villes. La pointe Pelée sur le lac Ontario, est un endroit favori de cet épervier et, tous les ans, il y a de grands nombres de grives, vireos, moineaux et autres petits oiseaux qui tombent victimes de ces entreprenants petits maraudeurs.

333. **L'Épervier de Cooper.** (COOPER'S HAWK). *Accipiter cooperi*. L., 15.50. Semblable à l'épervier brun mais plus gros.

Traits distinctifs. Un petit épervier de Cooper mâle peut se rapprocher beaucoup comme taille d'une forte femelle de l'épervier brun, et une forte femelle de la même espèce peut ressembler à un petit autour mâle. L'épervier de Cooper peut être distingué de l'épervier brun par sa queue arrondie au lieu de rectangulaire et par son tarse relativement plus court et plus épais. Il ne possède à aucun âge la coloration de l'autour, mais chez les tout jeunes, les plumages se ressemblent beaucoup. La meilleure indication pour les distinguer c'est le plumage du tarse; il y en a environ un tiers de revêtu chez l'épervier de Cooper, et la moitié chez l'autour. Le plumage des jeunes peut aussi ressembler à celui de la buse à manteau roux (voir cet oiseau). Il peut aussi être pris facilement pour le jeune de la buse de Pensylvanie, mais il a les quatre premières primaires au lieu des trois primaires extérieures brusquement rétrécies ou émargées.

Indications sur le terrain. On le reconnaît d'abord à sa taille et sa silhouette d'accipitre. Sa queue arrondie au lieu de rectangulaire aidera à le distinguer d'avec l'épervier brun. La coloration des adultes est la seule indication sur le terrain, outre la taille, pour le différencier d'avec l'autour.

Nid. Il niche sur les arbres à peu près comme l'épervier brun, mais rarement sur des conifères.

Habitat. Depuis les frontières septentrionales des régions habitées en allant au sud à travers tous les Etats-Unis.

C'est une espèce même plus malfaisante que l'épervier brun, puisque sa plus forte taille lui donne plus de puissance et plus de moyens de nuire. Avec presque autant d'activité il poursuit une plus grosse proie et peut très bien emporter un poullet de taille ordinaire. Il s'attaque rarement à une poule adulte, à moins que celle-ci ne soit faible.

Valeur économique. Sur 94 estomacs examinés, 34 contenaient des volailles ou des oiseaux-gibiers; 52, d'autres oiseaux; 11, des mammifères; 1, une grenouille; 3, des lézards; et 2, des insectes. Les mammifère se

composaient d'animaux rongeurs, la plupart malfaisants, mais il y avait cependant un écureuil gris. Cela fait un total de 87 aliments qui condamnent l'espèce, 12 en sa faveur, et 4 indifférents. Comme c'est un épervier relativement commun dans un grand nombre des régions habitées du pays, c'est certainement une menace et il est, en bonne partie, cause de la mauvaise réputation de tout cet ordre d'oiseaux.

334. **L'Autour à tête noire.** (AMERICAN GOSHAWK). *Astur atricapillus*. L., 22. Planche XII B.

Traits distinctifs. Les adultes, avec leur coloration caractéristique bleu ardoisé et finement vermiculaire, ne peuvent être confondus avec aucun autre oiseau d'Amérique. Les jeunes cependant sont très semblables aux autres jeunes accipitres et souvent un jeune mâle aura presque la même taille qu'une forte femelle de l'épervier de Cooper. Dans un pareil cas, on pourra les distinguer par le tarse qui est revêtu de plumes sur la moitié au lieu du tiers de sa longueur et par la légère teinte de chamois sur le blanc des parties inférieures de cette espèce.

Indications sur le terrain. Les adultes se distinguent par leur coloration. Les jeunes se reconnaissent à leur taille et leurs silhouettes d'accipitres avec une longue queue et des ailes courtes et arrondies.

Nid. Sur les arbres.

Habitat. Il couve sur tout le continent dans les limites des régions habitées. Les mouvements migratoires sont ordinairement de peu d'étendue, bien qu'il visite parfois nos frontières méridionales en nombre considérable. De même que dans le cas du harfang, ce genre de gibier se compose surtout d'individus adultes, bien que, normalement, les jeunes soient beaucoup plus communs au sud de la région où ils se reproduisent. Il est probable que ces envolées occasionnelles sont causées par une disette périodique de lapins dans leurs habitats usuels.

SOUS-ESPÈCES. L'autour à tête noire est divisé en deux sous-espèces, mais la forme typique seulement—l'autour de l'Est—se rencontre dans l'est du Canada.

C'est le représentant américain de l'autour d'Europe ou "Goose Hawk", désignation qui semble avoir été son nom primitif. C'était le seul épervier aux courtes ailes qui servait régulièrement dans l'ancienne fauconnerie. On lui faisait chasser les lièvres, les perdrix, et ce genre de gibier de terre, que sa longue queue et ses courtes ailes lui permettait de suivre à travers les détours brusques et enchevêtrés, tandis que sa taille lui permettait de tuer du gros gibier. On ne le considérait pas cependant comme un oiseau chasseur de haut vol, parce qu'il n'avait pas la vigueur et l'énergie des faucons aux longues ailes et sa chasse n'excitait pas le même intérêt que les "oiseaux de proie nobles".

Valeur économique. Heureusement, cet oiseau n'est qu'un hôte irrégulier dans nos régions les moins habitées. Autrement il serait une menace sérieuse pour les basses-cours. Sur 20 estomacs examinés, 9 contenaient des volailles ou oiseaux-gibiers; 2, d'autres oiseaux; 10, des mammifères; 3, des insectes; et 1, un mille pattes. Sur les 10 mammifères, 3 étaient des lapins et 1 un écureuil gris, deux espèces que l'on peut considérer comme utiles. Cela nous donne un total de 15 aliments qui condamnent l'oiseau, 15 en sa faveur et 1 qui est indifférent. Il n'y a aucun doute que cette espèce est plutôt malfaisante. Sa taille lui donne assez de puissance pour enlever un poulet et même une poule, et elle fait de la gelinotte du Canada sa nourriture favorite. Bien que le véritable habitat de l'épervier à tête noire soit dans les forêts les plus septentrionales sur les lisières des terres cultivées, lorsqu'une fois ils s'établissent au voisinage d'une ferme, on peut s'attendre à leur visite tous les jours. Ils fondent subitement, au-dessus ou autour des bâtiments, sur un troupeau de volailles, saisissent leur victime et l'emportent avant que le fermier ait le temps de la protéger.

Di
pourvu
et am
emplu
Inc
tituent

(
quelq
tout
sont i
les ép
dans l
de fo
vanie
habiti

I
souris
certai
quelq
comp
la plu
Ces oi
sibles

337
che XI

Tra.
de tous
tinguée
l'adulte.
plus gro
cette es
à peu pr

Indi
leur que
et de la
manteau
tinguer c
Les note
l'exécute

Habi
au Cana
SOL
espèces n
Nid.

Le
plutôt
Elle ex
mantes
trée dé

Vo
discuta
tions lo

GENRES—BUTEO ET ARCHIBUTEO. BUSES VRAIES

Description générale. Éperviers solidement bâtis, de taille moyenne ou forte, le bec dépourvu de dents (figure 33B, p. 25). Les ailes sont plutôt courtes et arrondies et la queue longue et ample qui s'étale en un grand demi-cercle. Le genre *Buteo* a le tarse nu mais l'*Archibuteo* est emplumé jusqu'à la base des doigts.

Indications sur le terrain. L'arrondissement des ailes et la largeur, l'ampleur de la queue constituent les meilleurs signes pour reconnaître les buses.

Ce sont les buses vraies. Le busard d'Amérique (Turkey Vulture) est quelquefois improprement appelé buse dans le Sud. Les buses n'ont pas tout l'élan, la rapidité et la vigueur soit des faucons soit des accipitres; elles sont moins agiles, moins rusées et ne chassent que le petit gibier. Ce sont les éperviers de haut vol de la saison d'été, on peut les voir tourner en cercles dans les régions supérieures, mais c'est assez rare qu'ils se précipitent autour de fourrés comme les agiles accipitres. Si l'on excepte la buse de Pensylvanie, leur habitat caractéristique est le plein air, bien qu'ils fassent leur nid habituellement dans la forêt.

Valeur économique. D'une façon générale, le fait qu'ils mangent les souris et les insectes fait plus que compenser le tort incontestable que font certains individus de quelques espèces. Bien que les buses comprennent quelques-uns de nos plus grands éperviers, le tort qu'ils font n'est pas du tout comparable à celui qu'on peut attribuer aux plus petits accipitres. De fait, la plus grande espèce de ce groupe, la buse pattue, est la plus inoffensive. Ces oiseaux se nourrissent principalement de souris, d'autres petits mammifères, de reptiles et d'insectes; et la taille d'un bon nombre de ces bêtes nuisibles est un témoignage du bien qu'ils font sur une très grande échelle.

337. **La Buse à queue rousse.** (RED-TAILED HAWK). *Buteo borealis*. L, 20. Planche XIII A.

Traits distinctifs. C'est notre plus grand épervier commun; on le distingue ordinairement de tous les autres par sa taille. La buse pattue qui est de taille égale ou plus forte peut être distinguée facilement par son tarse emplumé. Une large queue rouge est un signe distinctif chez l'adulte. Les jeunes ne varient que très peu d'avec les buses à manteau rouge du même âge mais plus gros. A part cela, la différence la plus frappante entre les deux c'est l'absence de rouge chez cette espèce sur les épaules ou sur les couvertures supérieures des ailes et la présence d'une surface à peu près circulaire, sans taches, sur la poitrine.

Indications sur le terrain. On peut spécifiquement reconnaître les adultes sur le terrain par leur queue rouge, et tous les âges, génériquement par le profil, propre aux buses, des courtes ailes et de la large et ample queue arrondie. Les jeunes seulement peuvent être pris pour des buses à manteau roux, et c'est probablement par leur poitrine blanche et leur cri qu'on peut mieux les distinguer de celle-ci. Le chant de la buse à manteau roux est identique à certains cris du geai huppé. Les notes de celle-là sont semblables mais il y a une assez forte différence dans le timbre et dans l'exécution pour les reconnaître quand une fois on les a entendues.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord jusque près de la limite des régions boisées. Couve au Canada partout où il se trouve.

SOUS-ESPÈCES. La buse à queue rousse est représentée au Canada par plusieurs sous-espèces mais on ne trouve guère dans l'Est, que la forme typique, la buse à manteau rouge de l'Est.

Nid. Sur les hautes branches des arbres dans les grandes régions boisées.

La buse à queue rousse est un épervier timide et prudent. On la voit plutôt planer en grands cercles dans les régions élevées que près du sol. Elle exige pendant l'été des bois plus grands et plus sauvages que la buse à manteau rouge, bien que, comme cette autre espèce, elle chasse dans la contrée découverte du voisinage.

Valeur économique. Ce grand et magnifique oiseau occupe une position discutée au point de vue de son utilité et cela dépend tellement des conditions locales et des caractéristiques personnelles de l'individu qu'on ne peut

guère arriver, à son sujet, à une conclusion certaine et définitive. Sur 473 estomacs examinés, 54 contenaient des volailles ou oiseaux-gibiers; 51, d'autres oiseaux; 278, des souris; 131, d'autres mammifères; 37, des batraciens ou reptiles; 47, des insectes; 8, des écrevisses; 1, un mille-pattes; et 13, des restes. Parmi les autres mammifères, 16 étaient des lapins ou des écureuils gris. Cela nous donne environ 121 aliments qui condamnent l'oiseau et 464 en sa faveur et il y en a 48 qui peuvent être considérés comme indifférents à part les 13 qui se composent de restes qui ne peuvent être comptés que comme favorables. Il faut aussi se rappeler en étudiant ces aliments que ceux de ces oiseaux qui se rapprochent le plus des fermes sont les plus exposés à se faire tirer et se faire examiner l'estomac. Il y a ainsi une certaine sélection défavorable contre l'ensemble de l'espèce dans le choix des témoignages.

D'une façon générale cette espèce est extrêmement utile et fait beaucoup plus de bien que de mal. Certains individus, cependant, prennent souvent l'habitude de visiter régulièrement la basse-cour. Ce sont presque toujours de jeunes oiseaux de l'année à la recherche d'une proie facile. Les vieux oiseaux sont ordinairement trop prudents pour s'aventurer ainsi. Il est évident que ces individus devraient être éliminés le plus tôt possible, mais on ne peut certainement pas soutenir qu'une espèce généralement utile devrait être systématiquement persécutée en raison des méfaits de quelques-uns. En économie ornithologique c'est une bonne règle à suivre, quand les témoignages sont à peu près également divisés, que d'accorder à l'oiseau le bénéfice du doute.

339. **La Buse à manteau roux.** (RED SHOULDERED HAWK, CHICKEN HAWK). *Buteo lineatus*. L, 18. 30. Planche XIIIIB.

Traits distinctifs. Parties inférieures rougeâtres des adultes. Le plumage des jeunes peut être semblable à celui de la buse à queue rouge, mais leur plus petite taille et la présence d'au moins une indication de teinte rougeâtre sur les épaules ou les couvertures et les mouchetures au milieu de la poitrine faciliteront la distinction.

Indications sur le terrain. Avec son profil caractéristique de buse et ses habitudes, elle n'est guère susceptible d'être confondue avec aucune espèce autre que la buse à queue rouge. L'absence de queue rouge et la teinte rougeâtre des parties inférieures feront reconnaître les adultes. Pour ce qui est des jeunes, le chant et la taille sont probablement les indications les plus sûres. Le chant de cette espèce ressemble tellement à certains cris du geai huppé qu'on ne peut les différencier qu'avec difficulté. Les cris aigus de la buse à queue rouge sont de même nature mais très faciles à distinguer.

Nid. Sur les arbres, à une hauteur de 35 à 75 pieds de terre.

Habitat. Dans tout l'est de l'Amérique du Nord jusqu'aux limites des régions habitées. Couve partout où on la trouve au Canada.

SOUS-ESPÈCES. On reconnaît plusieurs sous-espèces de la buse à manteau roux mais une seule, l'oiseau type, la buse à manteau roux de l'Est se rencontre dans l'est du Canada.

C'est probablement l'épervier le plus répandu de l'est du Canada. Elle a les mêmes habitudes que la buse à queue rouge, sauf qu'elle ne recherche pas les bois profonds pour y faire son nid, qu'elle pourra construire dans n'importe quel petit bois, quelquefois à une surprenante proximité des habitations.

Valeur économique. Cette espèce est, dans le fond, très semblable, quant à son régime alimentaire, à la buse à queue rouge, mais comme elle est plus petite et plus légère elle peut faire proportionnellement moins de tort, tandis que les services qu'elle peut rendre sont à peu près sans mélange. Sur 206 estomacs examinés, 3 contenaient de la volaille; 12, d'autres oiseaux; 102, des souris; 40, d'autres mammifères; 20, des reptiles; 30, des batraciens (grenouilles, etc.); 92, des insectes; 16, des araignées; 7, des écrevisses; 1, un ver de terre; 2, des restes de table; et 3, du poisson. On peut ainsi voir

que
gren
l'est
com
espè

;
peu l
une p
térist
des p
indici

T
comm
sont a
certai

H
s'aven

l'Ouc
soit t
trop

3

15-89.

rieures

partie

blanch

;

leur ta

lequel c

Ina

ressem

bons si

Ni

Ha

endroit

très loi

N

V

oiseau

batrac

écrevi

pour c

34;

sancti-j

phases:

de nuar

commu

lièrement

l'abdom

jusqu'au

genre.

Trai

doigts.

Indic

blanche

de l'aile.

Nid.

Habi

tant amé

incultes c

que sa nourriture est très variée. Il est difficile d'établir si les musaraignes, grenouilles, reptiles et araignées doivent être comptés comme condamnant l'espèce, mais le grand nombre de souris et d'insectes contre 3 aliments se composant de volailles et 12 d'oiseaux, suffit évidemment à exonérer cette espèce de l'accusation de faire beaucoup de tort.

342. La Buse de Swainson. (SWAINSON'S HAWK). *Buteo swainsoni*. L, 20. à peu près de la même taille que la buse à manteau rouge. Elle peut se présenter sous une phase soit presque noire, soit plus claire, soit entre les deux. Le plumage clair caractéristique laisse voir un dos, une tête et des parties supérieures uniformément bruns, des parties inférieures blanches avec une bande lie de vin sur la poitrine et de légères indications de bandes de même couleur sur les flanes.

Traits distinctifs. Beaucoup d'oiseaux ont l'extrémité de leurs primaires réduites en largeur comme si on avait taillé le bord avec un canif. Chez cette espèce, les trois primaires extérieures sont ainsi atténuées ou émargées. Chez la buse à manteau roux avec laquelle on pourrait confondre certains plumages, quatre des primaires sont ainsi émargées.

Habitat. Les provinces de la prairie et les régions à l'ouest. Au nord jusqu'aux régions polaires s'aventurant quelquefois jusqu'aux grands lacs des régions inférieures.

L'espèce n'apparaît dans l'Est que comme vagabond provenant de l'Ouest; il faudra beaucoup de précaution pour l'identifier. Bien que ce soit un oiseau de proie, il ressemble trop aux espèces précédentes et se voit trop rarement pour mériter une description détaillée.

343. La Buse de Pensylvanie. (BROAD-WINGED HAWK). *Buteo platypterus*. L, 15-89. La plus petite de nos buses. Adulte: brun aux parties supérieures, parties inférieures toutes rayées de brun rougeâtre et de blanc d'une façon plutôt irrégulière. Jeunes: parties supérieures brunes plus ou moins tachetées de blanc; aux parties inférieures, bandes blanches et brunes sur la poitrine jusqu'à la gorge, et rayures sur les flanes et les pattes.

Traits distinctifs. Les jeunes de cette espèce se distinguent des jeunes buses à manteau roux par leur taille. L'espèce se reconnaît tant d'avec celle-ci que d'avec l'épervier de Cooper avec lequel elle peut aussi être confondue, par ses trois primaires atténuées ou émargées au lieu de quatre.

Indications sur le terrain. La taille, la coloration générale des adultes, et son cri allongé, aigu, ressemblant au grincement prolongé que fait la charnière rouillée d'une porte de grange, sont de bons signes pour la reconnaître.

Nid. Sur les arbres, à une hauteur de 25 à 70 pieds.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord jusqu'aux limites des régions habitées. Couve par endroits dans l'est du Canada, dans toutes les parties de l'Ontario sauf les plus méridionales et très loin au sud dans la vallée du Mississippi.

N'habite que certains endroits et préfère les régions les plus sauvages.

Valeur économique. Sur 57 estomacs examinés, 2 contenaient des petits oiseaux; 15, des souris; 13, d'autres mammifères; 11, des reptiles; 13, des batraciens (grenouilles, etc.); 30, des insectes; 2, des vers de terre; 4, des écrevisses. Sans pousser plus loin l'examen, ces données sont suffisantes pour exonérer cette espèce de tout blâme.

347a. La Buse pattue d'Amérique. (ROUGH-LEGGED HAWK). *Archibuteo lagopus sancti-johannis*. L, 22. Le plus grand de nos véritables éperviers. Il se présente sous deux phases: l'une toute foncée, presque noire, et l'autre claire, d'une variété presque infinie de nuances et de dessins; il y a aussi toutes les phases intermédiaires. La forme la plus commune a les parties supérieures brunes plus ou moins mêlées de jaune d'ocre, particulièrement autour de la tête, et les parties inférieures jaune d'ocre avec bande foncée sur l'abdomen et des rayures sur la poitrine et la gorge. C'est à cause du tarse emplumé jusqu'aux doigts que cet oiseau est ainsi nommé, et c'est là un trait caractéristique du genre.

Traits distinctifs. On la distingue par sa forte taille et son tarse emplumé jusqu'à la base des doigts.

Indications sur le terrain. Forte taille, larges amas noirs sur les parties inférieures, queue blanche à la base (le croupion n'est pas blanc) et taches noires très visibles sur la surface inférieure de l'aile.

Nid. Dans l'extrême nord, elle niche à terre sur les bancs rocheux ou sur les arbres.

Habitat. Habite, en tant qu'espèce, les parties du nord de l'hémisphère boréal. Le représentant américain se rencontre depuis le Mexique jusqu'aux régions polaires. Couve dans les terrains incultes ou du voisinage.

SOUS-ESPÈCES. La buse pattue est représentée dans l'ancien et le nouveau continent par deux sous-espèces. Celle qui est propre à l'Amérique est la buse pattue d'Amérique *A. l. sancti-johannis* et se distingue de celle d'Europe et d'Asie par sa couleur légèrement plus pâle et la plus grande rareté, chez cette espèce, de la phase noire.

Ce grand épervier n'est que passager dans les régions habitées du Canada et les terres incultes du nord. C'est un oiseau des grands marais et on peut le voir voltiger au-dessus des prés jusqu'à une heure avancée de la nuit à peu près comme le busard des marais. On le voit ordinairement, cependant, dans les hautes régions, faire de nombreuses évolutions en cercles interrompus par des pauses pour retrouver son chemin vers les lieux de nidification. En raison du dichroïsme de l'espèce il faut s'attendre à trouver chez elle une variété infinie de plumages.

Valeur économique. Bien que ce soit notre plus grand épervier, c'est l'oiseau le moins malfaisant. Sur 47 estomacs examinés, 40 contenaient des souris; 5, d'autres mammifères; 1, un lézard; 1, était vide. Un pareil résultat suffit pour condamner la destruction générale des éperviers. Les pieds de la buse pattue sont faibles et incapables de retenir une grosse proie; c'est donc un épervier chasseur de souris par excellence. Il se nourrit également de sauterelles et l'on sait qu'ils ont largement contribué à supprimer les fléaux occasionnés par ces insectes destructeurs.

GENRES—AQUILA ET HALIÆTUS. AIGLES

Les aigles sont nos plus grands oiseaux de proie. La taille seulement les différencie d'avec les éperviers. Tout oiseau de proie de plus de 30 pouces de long et de 6 pieds d'étendue est un aigle. Contrairement à l'idée répandue, l'aigle ne compte pas parmi ce qu'on appelle les oiseaux de proie nobles. C'est tout simplement une buse de taille démesurée. Il se nourrit en grande partie de grosses proies mais il est rarement funeste aux intérêts de l'homme. Dans certaines régions il est quelquefois une menace pour les jeunes agneaux mais, dans l'est du Canada, on peut les considérer plutôt comme nettoyeurs de déchets qu'autrement, puisqu'ils n'enlèvent presque rien qui soit de valeur économique et qu'ils se nourrissent principalement de restes.

349. **L'Aigle doré.** (GOLDEN EAGLE). *Aquila chrysaetos*. L., 30. Un grand aigle brun foncé, la tête saupoudrée de jaune d'ocre, ce qui fait qu'on l'appelle doré, et la première moitié de la queue ornée de barres grisâtres sur un blanc terne. Tarses emplumés jusqu'aux doigts.

Traits distinctifs. L'aigle doré est entièrement différent de l'aigle à tête blanche adulte, mais très semblable au jeune de cette espèce. On peut toujours, cependant, quelque soit le plumage, le reconnaître à son tarse emplumé, cette dernière espèce ayant toujours des pattes nues d'un jaune brillant.

Nid. Sur les rochers, les saillies rocheuses ou sur les arbres.

Habitat. Dans la zone tempérée des deux hémisphères. En Amérique, il habite toute la partie nord, sauf l'extrême nord, et va au sud jusqu'au Mexique dans les plaines et les montagnes occidentales et sur les hautes terres de l'Est. Ne fréquente qu'accidentellement la région des grands lacs.

L'aigle doré est trop rare dans l'est du Canada pour qu'on s'y arrête longuement dans cet ouvrage. C'est un oiseau magnifique et comme, de sa nature, il est moins porté à enlever des animaux ou des déchets, il s'adapte mieux dans la conception populaire que l'aigle à tête blanche, au titre de roi des oiseaux.

être
surto
poids
marn
anim
tons,
être s
trop
c'est
On p
plutô
repaf
comm

352.
L'adul
jeunes
devien

Tr
on pour

Ind
les cont

et qui

blanc d

la gross

porté à

qu'il ne

par en

de 2 à 4

entière

âge un

visioier

concluai

Habit

SO

a été re

T

teaux

loin d

l'Est

événé

inoffe

sauva

devrai

V

des m

ces do

et du

pris à

venus

eussen

alimen

plonge

nécess

Valeur économique. Le point de vue économique de cet oiseau doit être considérablement influencé par les conditions locales. Il se nourrit surtout de mammifères et sa forte taille lui permet d'en enlever qui sont d'un poids considérable. Ce sont principalement des animaux sauvages, tels que marmottes, lapins et rongeurs malfaisants, mais il enlève de préférence les animaux nouveau-nés. Dans les régions de l'Ouest où l'on élève des moutons, les dégâts occasionnés par un certain nombre d'aigles dorés peuvent être sérieux, mais ils ne le sont jamais dans l'Est. Heureusement l'espèce est trop rare dans l'est du Canada, pour qu'on trouve beaucoup à redire; de fait, c'est à peine si l'on rencontre en moyenne un seul individu dans une année. On pourra donc voir apparaître l'un de ces magnifiques oiseaux dans l'Est plutôt avec plaisir qu'avec crainte. Par occasion, cette espèce pourra se repaître de chair corrompue mais ne semble pas exiger cette nourriture comme son congénère de l'espèce suivante.

352. **L'Aigle à tête blanche.** (BALD EAGLE). *Haliaeetus leucocephalus*. L, 32. 85. L'adulte est d'un brun foncé avec la tête, le cou et la queue de couleur blanche. Les jeunes sont tout bruns avec plus ou moins d'indices, suivant l'âge, des parties qui deviendront blanches.

Traits distinctifs. Bien que le plumage du jeune oiseau soit semblable à celui de l'aigle doré on pourra toujours l'identifier par ses pattes jaunes et sans plumes.

Indications sur le terrain. Le profil de l'aigle et sa taille sont très caractéristiques quand on les connaît bien. Le grand bec recourbé, le culmen qui s'avance en ligne droite avec la couronne et qui remplit toute la surface du front sont très apparents et tout de suite reconnaissables. Le blanc de la tête et de la queue sont des signes infaillibles pour reconnaître l'adulte et, en raison de la grosseur des détails, on distinguera les jeunes d'avec l'aigle doré plus facilement qu'on ne serait porté à croire. Le ton fauve doré sur le haut du cou chez l'aigle doré est très en évidence tandis qu'il ne se voit pas chez l'aigle à tête blanche. La queue blanchâtre ou mouchetée laisse voir par en dessous une pointe terminale qui forme un perceptible contraste avec sa base, variant de 2 à 4 pouces de profondeur, suivant l'âge; tandis que la queue du jeune aigle à tête blanche est entièrement d'un blanc sale avec peu ou point de bande terminale distincte, mais présentant à tout âge un aspect uniformément moucheté. Tout aigle remarqué dans l'est du Canada doit être provisoirement reconnu comme un aigle de cette espèce, à moins qu'il n'y ait des raisons claires et concluantes pour que ce soit un aigle doré.

Habitat. Dans tous les Etats-Unis et le Canada, sauf sur les côtes extrêmes des régions polaires.

SOUS-ESPÈCES. Il y a deux sous-espèces dont une seule, l'aigle doré du nord, *H. l. alascanus*, a été rencontrée jusqu'à présent au Canada. La race typique habite plutôt le Sud.

Tandis que l'aigle doré est un résidant typique des montagnes et de plateaux, l'aigle à tête blanche est un oiseau de rivage et se rencontre rarement loin de l'eau. Bien qu'il fût autrefois une espèce typique des contrées de l'Est il est devenu tous les ans plus rare, et à l'heure qu'il est c'est tout un événement quand on en aperçoit un. L'aigle à tête blanche est une espèce inoffensive. Le dommage qu'il cause est insignifiant et à titre d'élément sauvage caractéristique de nos paysages lacustres ce pittoresque oiseau devrait être conservé.

Valeur économique. Sur 17 estomacs examinés, 1 contenait du gibier; 5, des mammifères; 9, du poisson; et 2, de la chair corrompue. En examinant ces données, il est à remarquer que les 6 estomacs contenant des mammifères et du gibier étaient des spécimens d'hiver et, à l'exception d'un seul, furent pris à une certaine distance de l'eau. Si les spécimens étudiés fussent provenus des lieux de nidification en été, les mammifères et oiseaux-gibiers eussent probablement été remplacés par du poisson, car c'est surtout de cet aliment que se nourrit l'oiseau. Il s'en nourrit de diverses façons. Il plonge pour atteindre le poisson à la vraie manière de l'orfraie quand c'est nécessaire, mais d'habitude il le ramasse mort sur le rivage ou bien, là où les

orfraies sont communes, il les lui enlève de force. Pour arriver à cette fin, il poursuit et tourmente l'oiseau pêcheur jusqu'à ce qu'il lâche sa proie, laquelle, rapide comme l'éclair, l'aigle attrappe dans l'air et emporte en triomphe. Il n'est pas d'habitude aussi habile à ce manège que les oiseaux plus rapides, mais il est prompt à se saisir des canards ou autres oiseaux-gibiers blessés ou meurtris dans les marais. Quand l'occasion se présente, l'aigle à tête blanche mange volontiers des restes.

On reconnaîtra qu'un nombre raisonnable de ces aigles ne peut être une grande menace pour l'humanité. Ils s'attaquent rarement à la volaille. Le poisson qu'ils prennent n'est qu'une bagatelle, se composant surtout de déchets ou du surplus d'une grande abondance. Ils font beaucoup de bien comme enleveurs de déchets et doivent être plutôt encouragés que réprimés.

FAMILLE—FALCONIDÆ. FAUCONS ET CARACARAS.

La famille des falconidés comprend deux sous-familles : les faucons vrais *Falconidæ* et les caracaras, *Polyborinae*. Cette dernière sous-famille habite le Sud et il n'a été trouvé au Canada qu'un seul caracara.

Sous-Famille—*Falconinæ*. Faucons vrais.

Les faucons étaient désignés par les anciens fauconniers sous le nom d'oiseaux de proie nobles ou aux grandes ailes et, en raison de leur vigueur, de leur force et de leur adresse, c'étaient les oiseaux préférés pour la chasse. Leurs longues ailes leur donnent une grande rapidité, qu'une longue endurance leur permet de maintenir. Ils sont hardis et puissants et fondent sur leur proie pour la saisir quand c'est possible, mais, contrairement aux accipitres, ils ne se découragent pas s'ils ont manqué leur coup. Leur première idée est de s'élever au-dessus de leur proie, ce qu'ils font au moyen d'une longue montée en spirale. Une fois au-dessus de leur proie, ils fondent dessus et la frappent en même temps de leurs puissantes serres.

Le vol du faucon est très reconnaissable, il avance par coups rapides de ses ailes pointues, ne planant que très peu. Vue de près, la mandibule supérieure pourvue d'une dent, distingue toujours le faucon des autres éperviers. Par bonheur, il n'y a que les plus petits et les plus inoffensifs de cette sous-famille qui soient communs dans les régions cultivées, et ceux que la taille rend redoutable sont soit très rares ou ne fréquentent que l'extrême nord où leurs déprédations ne peuvent nuire en rien aux cultivateurs. Même ceux qui apparaissent parfois dans les régions cultivées sont généralement sauvages et assez prudents pour se tenir éloignés du voisinage immédiat des habitations.

FAUCONS.

Description générale. Grands rapaces de 20 à 22 pouces de longueur, ordinairement d'une coloration très blanche. Leur forte taille distingue ces oiseaux de tous les autres de la sous-famille.

Les faucons étaient très hautement prisés pour la chasse par les anciens fauconniers et, suivant les lois restrictives de l'époque, leur usage était réservé aux personnalités du plus haut rang. Ils possèdent à la fois toute l'ardeur et l'endurance des petites espèces avec une plus forte taille et plus de vigueur; c'est pourquoi ils étaient utilisés pour le plus gros gibier qui pouvait se

ch

et

qu

so

se

gra

aile

fauc

Ne

c'es

que

ardc

blan

chez

et, cl

queu

l

régio

s

espéc

ticolu

ces su

indivi

de co

a la ti

le troi

noires

3

L. 16i

7i

table l

In

ristiqu

Ni

des gri

He

misphe

endroit

SO

seul rej

I

fameu

dit ét

con pi

qu'il s

partou

chasser avec des oiseaux. Les faucons habitent l'extrême nord du Canada et sont très rares dans les contrées habitées ou dans les terrains de chasse, sans quoi il faudrait probablement leur livrer une guerre d'extermination, car ce sont incontestablement de terribles destructeurs.

Il y a, au Canada, deux espèces. Elles habitent les régions polaires et se présentent dans les parties boréales de l'ancien et du nouveau continent.

353. Le Faucon blanc. (WHITE GYRFALCON). *Falco islandus*. L, 22. Un très grand faucon, presque tout blanc avec quelques petites taches distinctes d'un brun clair.

Traits distinctifs. La blancheur prédominante et l'absence de taches sous les couvertures des ailes distingueront cette espèce de la suivante. Sa forte taille et ses caractéristiques visibles de faucon le feront tout de suite reconnaître.

Nid. Sur des saillies rocheuses.

Habitat. Les régions polaires. Couve dans le Groënland et les contrées voisines en Amérique. Ne se montre que par occasion dans les parties habitées du Canada.

Aucun des faucons n'est commun dans les régions habitées du Canada, c'est pourquoi nous ne les étudierons pas en détail.

354a. Le Faucon noir. (GYRFALCON). *Falco rysticolus*. L, 20. De même taille que le faucon blanc et d'une coloration beaucoup plus foncée, parties supérieures brun ardoisé, plus ou moins bordées ou rayées de crème ou de blanc. Tête et parties inférieures blanches ou blanc de crème rayé de noir.

Traits distinctifs. Chez le faucon blanc, c'est de beaucoup le blanc qui domine, tandis que chez le moins foncé de cette espèce le blanc et le brun ardoisé sont à peu près également répartis et, chez le plus foncé, c'est le brun qui l'emporte de beaucoup. Les couvertures inférieures de la queue sont toujours quelques peu rayées.

Nid. Sur les rochers ou sur les arbres.

Habitat. Les régions polaires de l'hémisphère boréal; ne fréquente qu'accidentellement les régions cultivées.

SOUS-ESPÈCES. Le représentant américain de cette espèce a été divisé en trois sous-espèces ou races géographiques, basées sur le degré de coloration foncée, le faucon gris *F. r. rusticolus*, l'oiseau type le faucon *F. r. gyrfalco rusticolus*, et le faucon noir, *F. r. obsoletus*. Certaines de ces subdivisions sont peut-être basées sur les plumages propres à l'âge ou sur la variation chez les individus et seront peut-être trouvées inutiles. Les divers noms se rattachent aux différences de couleur. Le premier a la tête largement rayée de noir sur un fond presque blanc, le deuxième a la tête presque complètement foncée, et le foncé du dos est bordé d'une large bande plus claire, et le troisième a le dos presque noir et les parties inférieures si fortement rayées qu'elles sont presque noires.

356. Le Faucon pèlerin. (PEREGRINE FALCON, DUCK HAWK). *Falco peregrinus*. L. 1650. Planche XIV A.

Traits distinctifs. La coloration représentée planche XIVA, la taille comparative et son véritable bec et son aile de faucon doivent servir à faire reconnaître cet oiseau.

Indications sur le terrain. Ses longues ailes de faucon, sa coloration et sa taille sont caractéristiques. Son vol est aussi facile à reconnaître: il bat rapidement des ailes sans beaucoup planer.

Nid. Habituellement sur des bancs de saillies rocheuses, parfois dans des branches creuses des grands arbres.

Habitat. Il habite dans la plupart des régions polaires, tempérées et semi-tempérées de l'hémisphère boréal, n'étant commun nulle part mais vivant par couples isolés et retournant au même endroit tous les ans.

SOUS-ESPÈCE. Le faucon du nouveau monde qui porte le nom de faucon pèlerin est le seul représentant de l'espèce qui se rencontre en Amérique.

Le représentant américain de cette espèce est une sous-espèce du fameux faucon pèlerin de l'ancien continent, qui, après le faucon proprement dit était l'oiseau de chasse le plus recherché par les fauconniers, et notre faucon pèlerin est presque impossible à distinguer de l'oiseau européen. Bien qu'il se rencontre dans toute la majeure partie de l'hémisphère boréal, il est partout rare et n'apparaît que comme visiteur ou reproducteur casuel.

Valeur économique. On est étonné de la taille de la proie dont peut s'emparer cet oiseau. On l'a vu souvent abattre même un canard ordinaire pesant quelquefois trois fois autant que le faucon. L'auteur de cet ouvrage a trouvé autour d'un nid dans le district de Muskoka, les restes de plusieurs gelinottes de taille normale qui ont dû être transportées là de toute pièce. Un examen du contenu des estomacs de 16 spécimens ont donné les résultats suivants: 7 contenaient des volailles ou oiseaux-gibiers; 9, d'autres oiseaux; 1, des souris; et 2, des insectes. Heureusement il est aussi prudent que plein de vie. Les adultes se cantonnent ordinairement dans les champs et les marais où ils ne peuvent causer directement que peu de dommages.

357. Le Faucon des pigeons. (PIGEON HAWK). *Falco columbarius*. L, 10. Un petit faucon. Adulte mâle: bleu ardoisé foncé en dessus, plus bleu sur le bas du dos et le croupion. Partie inférieure rayée de brun sur un fond jaune d'ocre, les rayures se réunissant légèrement sur le bas de la poitrine. Jeunes: semblables, sauf que le dos est brun au lieu de bleu ardoisé. Adultes femelles: entre les deux.

Traits distinctifs. Caractères du faucon vrai: la prédominance de coloration foncée et la petite taille de ce rapace sont caractéristiques.

Indications sur le terrain. Le vol et le profil du faucon, avec sa petite taille et sa couleur foncée, sont des signes distinctifs.

Nid. Dans les branches creuses des arbres ou sur des bancs de rochers.

Habitat. Toute l'Amérique du Nord jusqu'au nord de l'Amérique du Sud. Couve au sud jusqu'aux confins des régions cultivées dans l'est du Canada.

SOUS-ESPÈCES. Il y a plusieurs sous-espèces du faucon des pigeons au Canada, mais on ne rencontre dans l'Est que l'oiseau type, le faucon des pigeons de l'Est.

Au point de vue de la vie et de l'activité c'est une miniature du faucon pèlerin, mais il est beaucoup plus commun qu'aucun des faucons précités. On dressait aussi cette espèce pour la fauconnerie royale.

Valeur économique. Ainsi que l'indique son nom, le faucon des pigeons s'attaquait probablement beaucoup aux pigeons sauvages. De nos jours, cependant, il poursuit ordinairement le petit gibier. Sur 51 estomacs examinés, 2 contenaient des jeunes poulets; 41, des petits oiseaux; 2, des souris; et 16 des insectes. On verra d'après ce résultat que le faucon des pigeons est funeste aux petits oiseaux sauvages, mais trop petit pour nuire sérieusement à l'éleveur de volailles. Il poursuit souvent les oiseaux de rivage et semble particulièrement friand du pluvier à ventre noir. Bien que plus répandu que le faucon pèlerin il n'est encore nulle part un oiseau commun.

360. Le Faucon épervier. (AMERICAN SPARROW HAWK). *Falco sparverius*. L, 10. Planche XIV B.

Traits distinctifs. La coloration de cet oiseau le rend impossible à confondre avec aucune autre espèce.

Indications sur le terrain. Avec son profil de faucon et sa petite taille on ne peut le prendre pour aucun oiseau sauf peut-être le faucon des pigeons. Sa forme plus svelte et sa plus longue queue le différenciera tout de suite quand ses vives couleurs ne sont pas perceptibles.

Nid. Dans des trous de pics abandonnés ou des cavités naturelles de bois mort.

Habitat. La majeure partie de l'Amérique du Nord, à partir des régions habitées jusqu'au golfe du Mexique. Couve partout où il se trouve au Canada.

SOUS-ESPÈCES. Deux sous-espèces de faucon-épervier sont reconnues au Canada, mais seulement l'oiseau type, le faucon-épervier de l'Est, se rencontre dans l'Est.

C'est le seul faucon qui soit commun en ce pays. C'est un magnifique oiseau, c'est lui qui de tous nos oiseaux de proie possède les couleurs les plus vives. Il chasse en plein champ et ses points d'observation préférés sont sur les plus hautes branches mortes d'arbres solitaires dans les champs ou sur les

lisiè
rap
sa I

vier
fau
cett
couj
inse
facil

plus
min
ris; 1
215,
pris
pris
seult
oisea
sont
Les i
dont
que 1

nouri
profo
ordin
me il
d'en

36
Planç
Tr
bleu pl
sont de
Ina
aigle. 1
de ses
Ni
menté
Ha
le sud c
endroit
SO
sous-ep
le type

L
dessa
comm
longu

lisières des prés; dès qu'il aperçoit sa proie il hésite un moment en battant rapidement des ailes, comme un martin-pêcheur, et alors il se précipite sur sa proie.

Le nom de faucon-épervier devrait plus proprement s'appliquer à l'épervier brun; c'est ce que l'on reconnaît dans l'ancien continent où le nom de faucon-épervier s'applique à un petit accipitre qui se rapproche beaucoup de cette espèce. Faucon des sauterelles serait un nom qui désignerait beaucoup mieux ce petit faucon, puisqu'il se nourrit en grande partie de ces insectes. Quand on le prend jeune dans son nid, ce petit faucon s'apprivoise facilement.

Valeur économique. Bien que ce soit un épervier, cet oiseau est l'un des plus actifs et plus efficaces protecteurs de la ferme. Sur 291 estomacs examinés, 1 contenait un oiseau-gibier (caille); 53, d'autres oiseaux; 89, des souris; 13, d'autres mammifères; 12, des reptiles ou batraciens (grenouilles, etc.); 215, des insectes; et 29, des araignées. Sur les oiseaux examinés, 43 furent pris pendant les mois d'hiver entre décembre et avril. Parmi les spécimens pris au cours de la saison pendant laquelle il y a des insectes, 10 estomacs seulement contenaient des oiseaux, ce qui prouve que ce faucon détruit les oiseaux plutôt par nécessité que par goût. Les "autres mammifères" sont surtout des rongeurs malfaisants avec seulement quelques écrevisses. Les insectes sont ordinairement des sauterelles qui font beaucoup de mal et dont il est difficile de se débarrasser. D'après ce témoignage il est évident que le faucon-épervier est bienfaisant et devrait être protégé.

FAMILLE—PANDIONIDÆ. BALBUZARDS, AIGLES PÊCHEURS.

Les balbuzards ou aigles-pêcheurs forment une famille de rapaces se nourrissant entièrement de poissons, qu'ils capturent en plongeant en eau peu profonde. Il y a d'autres oiseaux qui mangent du poisson, mais ce sont ordinairement des poissons morts ou arrachés à des oiseaux pêcheurs. Comme il n'y a qu'une seule espèce d'aigle-pêcheur en Amérique il sera inutile d'en étudier la famille.

364. **L'Orfraie d'Amérique.** (OSPREY). *Pandion halioetus carolinensis*. L., 23. 10. Planche XV A.

Traits distinctifs. La coloration de l'orfraie est tout à fait caractéristique. Ses pattes bleu pâle et ses pieds recouverts d'écaillés hérissées particulièrement sur la plante et les serres sont des caractères distinctifs.

Indications sur le terrain. L'envergure de cet oiseau est telle qu'on le prend souvent pour un aigle. Il est cependant beaucoup plus petit qu'aucun des aigles et il se distingue de ceux-ci par le blanc de ses parties inférieures.

Nid. Se compose d'un gros amas de buchettes sur les arbres ou à terre, et comme il est augmenté d'année en année, il devient parfois de la taille d'une petite veillote.

Habitat. L'orfraie se rencontre dans la majeure partie de l'Europe, l'Asie, l'Afrique et dans le sud de l'Amérique jusqu'au nord de l'Amérique du Sud. Le balbuzard d'Amérique couve par endroits au Canada sauf dans les régions méridionales.

SOUS-ESPÈCES. L'orfraie qui habite et l'ancien et le nouveau monde est divisé en races sous-spécifiques dont le balbuzard d'Amérique est le représentant américain. Sa distinction d'avec le type européen est fondée sur des caractères trop subtiles pour être étudiée ici.

L'orfraie est un oiseau des plus pittoresques. Il plane en hauteur au-dessus de l'eau, s'arrête un moment, et puis s'abaisse soudainement, non pas comme une sonde, ainsi que fait le fou de Bassan, mais en décrivant une longue spirale et vient s'abattre sur l'eau les pieds devant et les ailes redres-

sées au-dessus du dos. On voit rejaillir en l'air une poussière blanche et l'oiseau remonte avec un poisson renfermé dans ses fortes serres. Les orfraies fréquentent les bas-fonds larges, les platières de marée et les baies peu profondes où il leur est facile de plonger pour atteindre le poisson, plutôt qu'en eau profonde où il faudrait compter sur la chance de trouver des poissons à la surface. Dans la région des grands lacs, l'espèce devient plus rare. Son gros nid massif augmente d'une année à l'autre jusqu'à ce qu'il atteigne des proportions telles qu'il devient un point de mire dans tout le voisinage et s'attire ainsi les attaques des dénicheurs d'oiseaux, de sorte que ce n'est maintenant que dans les endroits les plus retirés que cet oiseau peut couvrir en toute tranquillité. Il est encore assez répandu le long des côtes de l'Atlantique et du golfe Saint-Laurent, mais, à l'intérieur, il est rare.

Valeur économique. Lors même que l'orfraie se nourrit entièrement de poisson, l'anthipatie qu'éprouve le pêcheur à son égard est plutôt exagérée. Du fait qu'il ne pêche qu'en eau peu profonde il ne prend que peu de poissons d'importance économique. Sur la côte ce sont le carrelet, la petite morue ou tacaud et autres petites espèces qui constituent la majeure partie de sa nourriture. Sur les lacs d'eau douce c'est le crapet jaune, la perche et la carpe qui semblent composer son régime alimentaire. Le nombre de poissons gibier ou de poissons marchands qu'il prend est incontestablement faible. Sur onze estomacs examinés, il n'y en avait aucun. Les truites de ruisseaux ne sont pas recherchées par cet oiseau et la plupart des poissons marchands tel que l'achigan et le brochet sont en eau trop profonde pour qu'il puisse les atteindre.

SOUS-ORDRE—STRIGES. OISEAU DE PROIE NOCTURNES, HIBOUX.

Les hiboux sont faciles à reconnaître. La cire dissimulée dans le plumage de la face et les cercles faciaux très en évidence autour des yeux (figure 34, p 26) sont des signes distinctifs pour l'observateur le plus ordinaire. Ils sont principalement nocturnes, la chouette épervière et le harrang étant les seules espèces de l'est du Canada qui chassent habituellement de jour. Même les oiseaux nocturnes cependant voient très bien le jour. Ils peuvent se trouver momentanément éblouis lorsqu'ils sont soudainement transportés de l'obscurité à la lumière vive et certaines espèces ont tellement de confiance dans leur immobilité pour échapper à la découverte qu'on pourrait presque les prendre à la main. Le plumage est un des traits les plus intéressants chez les hiboux. Les plumes sont singulièrement molles et se tiennent ensemble de façon à empêcher l'air de passer à travers les petits interstices, ce qui leur assure le vol silencieux. Un hiboux pourrait passer assez près de vous pour vous éventer la figure de son aile sans qu'on ait rien entendu.

Deux familles sont représentées au Canada: *Aluconida*, effraies communes, représentées par une espèce qui est un visiteur accidentel du sud, et *Strigida*, connues sous le nom de hiboux à aigrettes, lors même que beaucoup d'entre eux ne sont pas pourvus de ces ornements, comprenant toutes les autres espèces canadiennes.

FAMILLE—ALUCONIDÆ. EFFRAIES.

Les effraies appelées quelquefois chouettes à figure de singe d'après la forme en cœur de leurs cercles faciaux réunis sont représentées au Canada par une seule espèce laquelle est assez rare. La serre médiane est pectinée,

éta:
p. 2
con

Cou
sont
som
nées
7
color
A
B
cont

ruin
nant
plut

consi
retro:
jusqu
tous
dérin

36
nus.

Virgini
Tra
rence d
touffes
l'une de
noir éte

Indi
milieu
avec lac

Nid
à une ha

Hab
cultivée

C
ies bo
compa

V
gibier
1, des
très m
utile et
s'attaq

367.
meus. I
d'ensem

étant munie de dentelures sur son bord intérieur comme le héron (figure 10, p. 21) et le pouce est aussi long que le médian au lieu d'être un peu plus court comme chez les hiboux à aigrettes.

365. L'Effraie d'Amérique. (AMERICAN BARN OWL). *Aluco pralincola*. L, 18. Couleur générale de fond ocre rougeâtre, plus claire en dessous, cercles faciaux blanc sombre avec bordure extérieure d'un ocre plus foncé tirant sur le brun. Le dos jusqu'au sommet de la tête recouvert de gris cendré, ocellé de nombreuses petites taches contournées de noir. Parties inférieures, gorge et tour de la face mouchetés de noir.

Traits distinctifs. Le disque facial en forme de cœur, clairement et nettement délimité, la coloration jaune claire avec nuance rosâtre et les tarses presque nus sont des traits distinctifs.

Nid. Dans des tours, clochers, greniers, terrasses ou arbres.

Habitat. Depuis le golfe du Mexique jusqu'aux Etats du milieu de l'Atlantique sur tout le continent. Il n'apparaît au Canada qu'à titre de vagabond le long de la frontière sud.

C'est le représentant américain de la chouette européenne qui hante les ruines dans les vieilles légendes et chansons. Elle est d'une activité étonnante pour détruire les souris et, de ce fait, un oiseau précieux, mais elle est plutôt rare au Canada.

FAMILLE—STRIGIDÆ. HIBOUX À AIGRETTES.

Cette famille est caractérisée par un développement plus ou moins considérable de plumes formant aigrette au-dessus des oreilles qui ne se retrouve pas cependant dans toutes les espèces. Les pieds sont emplumés jusqu'à l'extrémité des doigts (figure 32, p. 25). Cette famille comprend tous les hiboux canadiens sauf l'effraie (Barn Owl) que nous venons de décrire.

366. Le Hibou à oreilles longues. (AMERICAN LONG-EARED OWL). *Asio wilsonianus*. L, 14-80. Hibou de taille moyenne ressemblant comme coloration au Duc de Virginie (p. 139) mais beaucoup plus petit et de charpente plus légère.

Traits distinctifs. Bien que sa coloration se rapproche de celle du Duc de Virginie, la différence de taille sert à les différencier. On peut le distinguer des hiboux à oreilles courtes par les touffes de plumes très apparentes au-dessus des oreilles qui se dressent sur le front à peu de distance l'une de l'autre, par l'absence générale de raies dans sa coloration et par la quantité de blanc et de noir étendue sur tout le corps.

Indications sur le terrain. Les aigrettes proéminentes se dressant presque verticalement au milieu du front, et le disque facial brun rouilleux différencie cette espèce de la suivante, la seule avec laquelle on pourrait la confondre.

Nid. Sur les arbres, s'empare ordinairement des nids abandonnés de corneilles ou d'éperviers, à une hauteur de 20 à 40 pieds du sol.

Habitat. Dans toute la zone tempérée de l'Amérique du Nord jusqu'aux limites des régions cultivées.

Cette espèce habite de préférence des fourrés d'aunes ou de conifères sur les bords des marais, pendant la migration, on les trouve quelquefois en compagnies, se reposant le jour dans les retraites sombres des forêts humides.

Valeur économique. Sur 92 estomacs examinés, 1 contenait un oiseau gibier (caille); 15, d'autres oiseaux; 84, des souris; 5, d'autres mammifères; et 1, des insectes. D'après ces données, il est évident que l'espèce n'est pas très malfaisante. Sa préférence pour les souris suffit à en faire un oiseau utile et sa petite taille de même que ses habitudes nocturnes l'empêchent de s'attaquer aux jeunes volailles.

367. Le Hibou à oreilles courtes. (AMERICAN SHORT-EARED OWL). *Asio flammeus*. L, 15-50. Hibou de taille moyenne à aigrettes courtes, à peine visibles. Couleur d'ensemble jaune d'ocre avec passablement de petites plumes blanches en dessous sur la

face et des raies de brun nettement définies sur tout le corps, plus étroites en dessous et plus élargies au-dessus.

Traits distinctifs. La couleur générale chamois clair et les raies sont distinctives. Les aigrettes sont quelquefois indistinctes; lorsqu'elles sont perceptibles, elles se dressent verticalement comme celles de l'espèce précédente entre les yeux. L'absence de dessins noir et blanc dans la coloration sert à distinguer cette espèce d'avec le hibou à oreilles longues.

Indications sur le terrain. La couleur chamois constitue la meilleure marque sur le terrain.

Habitat. A peu près cosmopolite. Se rencontre partout au Canada et couve par endroits où il se trouve.

C'est un véritable hibou des marais; il est un peu plus diurne dans ses habitudes que beaucoup de ses congénères. On l'aperçoit souvent sur la brune survolant les marais avec un vol puissant comme celui des éperviers. Du fait qu'il vit dans les marais sur les lisières broussailleuses, il en est tous les ans un grand nombre de tués par les chasseurs.

Valeur économique. Sur 97 estomacs examinés, 11 contenaient de petits oiseaux; 77, des souris; 7, d'autres mammifères; et 7, des insectes. D'après ces données et du fait que les lisières des marais, les lopins de terre incultes, les rangées de clôture que cet oiseau fréquente, sont précisément les endroits à partir desquels les petits rongeurs se répandent dans les terrains bien cultivés, il est évident qu'il s'agit ici d'une espèce très utile, qu'en l'exterminant on se priverait de l'un des plus efficaces destructeurs d'innombrables fléaux.

368. La Chouette du Canada. (BARRED OWL). *Strix varia*. L, 20. Planche XV B.

Traits distinctifs. Il est presque impossible de ne pas reconnaître cet oiseau. La seule chouette sans aigrette qui lui ressemble est la chouette cendrée. La chouette du Canada peut être reconnue par sa petite taille, ses yeux noirs au lieu de jaunes et ses raies et barres bien caractérisées en dessous. C'est le seul hibou avec l'effraie qui ait les yeux noirs.

Indications. Taille, l'absence d'aigrettes et couleur générale brun grisâtre avec bandes sur la poitrine.

Nid. Niche dans des arbres creux ou dans des nids abandonnés de corbeaux ou d'éperviers.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord depuis les limites de la colonisation jusqu'aux Etats de Kansas et Georgia.

SOUS-ESPÈCES. Il y a plusieurs sous-espèces de cette chouette dont deux se présentent au Canada. L'oiseau type qui se rencontre dans l'est du Canada est la chouette du Canada de l'Est.

Bien qu'apparemment d'assez forte taille cet oiseau, une fois dépouillé de ses plumes, est relativement petit. De plus, il est d'une nature plutôt douce et n'a pas le tempérament agressif de quelques-uns de ses congénères. Son cri retentissant et étrange s'entend de loin au milieu d'une nuit tranquille.

Valeur économique. Lors même qu'on a vu souvent des volailles perchées impunément dans des arbres d'où l'on entendait tous les soirs le cri de cette chouette, elle est ordinairement considérée comme malfaisante et tuée sans merci. Sur 189 estomacs examinés, 5 contenaient des volailles ou oiseaux-gibiers; 13, d'autres oiseaux; 46, des souris; 18, d'autres mammifères; 4, des grenouilles; 1, un lézard; 2, des poissons; 14, des insectes; 2, des araignées; et 9, des écrevisses. Les deux cas où l'on a trouvé des volailles peuvent être considérés comme accidentels, puisque celles-ci ont été prises en janvier alors qu'elles devaient être arrivées à toute leur taille et par conséquent trop robustes pour être abattues par cette faible chouette. L'influence économique de cet oiseau est très satisfaisante.

los
msfoi
à l
de
bie

rég

nou
cho

Cai

avo
tair
4, dL, 1
blan
dessi7
géné
cont
cité d
festenI
tions

N

B

Mack

St

habita

chouet

ne pe
passa

V

miqu

Sur 9

d'aut

37

L, 8.

ment r

se tran

au-dess

tendan

plumag

que ce

pas la r

chez l'a

370. **La Chouette cendrée.** (CINEREOUS OWL, GREAT GREY OWL). *Scotiaptex nebulosa*. L. 27. A peu près de la même couleur générale grisâtre que la chouette du Canada, mais de beaucoup plus forte taille.

Traits distinctifs. Le plus gros, tant en apparence qu'en taille, de tous nos hiboux, mais une fois dépouillé de son volumineux plumage, on est étonné de la petite taille de l'oiseau. Semblable à la précédente quant à la coloration et à l'absence d'aigrettes; mais les yeux sont jaunes au lieu de noirs et la coloration de la poitrine et du dessous est diffuse et dépourvue de raies et de bandes bien définies.

Indications sur le terrain. Taille, coloration grisâtre et absence de bandes sur la poitrine.

Nid. Sur les arbres.

Habitat. Les forêts du Nord, à travers tout le continent; émigre parfois en hiver dans les régions cultivées.

SOUS-ESPÈCES. La chouette cendrée se présente dans les parties nord de l'ancien et du nouveau monde, mais dans chacun sous une sous-espèce distincte. La forme européenne est la chouette de Laponie, *S. n. lapponica* et l'américaine, la chouette cendrée qui est la race type.

Cet oiseau n'est qu'un visiteur occasionnel dans les régions habitées du Canada.

Valeur économique. Son influence économique, autant qu'il peut en avoir, est plutôt bienfaisante. On a peu de données sur son régime alimentaire. Sur 9 estomacs examinés, 1 contenait un petit oiseau; 7, des souris; et 4, d'autres mammifères. C'est évidemment un bon destructeur de souris.

371. **La Nyctale de Richardson.** (ARCTIC SAW-WHET OWL). *Cryptoglaux funerea*. L. 10. Petite chouette grise sans aigrettes. Brun cendré au-dessus, avec points blancs; blanchâtre au-dessous, avec raies indistinctes. Les taches de couleur sont légères et le dessin en est vague et diffus.

Traits distinctifs. Cette espèce ressemble au hibou maculé quant à sa taille et la coloration générale mais pas autrement; elle n'a pas d'aigrettes et les taches de couleur n'ont nulle part de contours définis. La disposition des couleurs est trop indistincte pour être facilement différenciée d'avec celle qui caractérise la Nyctale d'Acadie. On la reconnaîtra cependant à sa taille manifestement plus forte.

Indications sur le terrain. Elle est trop rare pour être identifiée au moyen des vagues indications que nous pourrions donner.

Nid. Ordinairement dans des trous sous les arbres.

Habitat. Dans les forêts du Nord, jusqu'aux limites des régions boisées, depuis la vallée du Mackenzie en allant vers l'Est.

SOUS-ESPÈCE. C'est une espèce européenne en même temps qu'américaine, mais le type habitant le nouveau monde est une sous-espèce distincte de celle de l'ancien et porte le nom de chouette de Richardson, *C. f. richardsoni*.

C'est peut-être l'espèce la plus rare de tous les hiboux canadiens, et qui ne peut être considérée, dans le cadre de cet ouvrage, que comme un oiseau passager d'hiver très irrégulier.

Valeur économique. Bien que trop rare pour avoir une influence économique notoire on peut considérer cette espèce comme plutôt bienfaisante. Sur 9 estomacs examinés, 1 contenait un petit oiseau; 7, des souris; et 4, d'autres mammifères.

372. **La Nyctale d'Acadie.** (SAW-WHET OWL, ACADIAN OWL). *Cryptoglaux acadie*. L. 8. Une très petite chouette. Le dessus est d'une couleur brun cendré chaud, vaguement marqué de taches blanches peu apparentes, particulièrement sur le derrière du cou, se transformant sur la tête en de fines raies distinctes qui se réunissent en une seule ligne au-dessus du disque facial. Le dessous est blanc avec petites raies brun clair et une vague tendance à former une bande massive, sur la poitrine. Certains individus ont un rare plumage qui leur a fait donner le nom de chouette de Kirtland; l'on a reconnu, cependant, que ce n'était qu'une phase passagère du plumage des jeunes, bien que l'on ne s'explique pas la raison de sa rareté. Le dessous est complètement brun, un peu plus rougeâtre que chez l'adulte et cette couleur se prolonge à travers la poitrine en une bande presque rouge;

le dessous est d'un jaune d'ocre uniforme. Le disque facial autour des yeux est presque noir formant un contraste saillant avec le blanc qui surmonte et sépare les yeux.

Traits distinctifs. Son plumage ordinaire est tellement semblable à celui de la chouette de Richardson qu'on ne peut les distinguer que par la taille. L'absence d'aigrettes et de taches de couleurs nettement dessinées la rend facile à reconnaître d'avec le hibou maculé.

Indications sur le terrain. Très petite taille et absence d'aigrettes.

Nid. Dans des trous sur les arbres, quelquefois des trous naturels, d'autres fois dans ceux faits par les pics et les écureuils.

Habitat. Principalement la zone tempérée de l'Amérique du Nord. Il couve d'une façon irrégulière et ordinairement dans les parties nord de son habitation à de hautes altitudes plus au sud.

SOUS-ESPÈCES. Il y a deux sous-espèces de "Saw-whet owl" au Canada, mais une seule, l'oiseau type, la Nyctale d'Acadie, se rencontre dans l'Est.

Cette chouette en miniature est le plus petit des oiseaux de proie de l'est du Canada. Elle fréquente les sombres fourrés des marais de cèdre et de tamarac, passant la journée accolée à un tronc d'arbre de façon que son plumage se fond imperceptiblement avec la couleur de l'écorce. Elle a tellement confiance en sa coloration pour se protéger qu'on peut l'approcher de très près et même parfois la prendre avec les mains. Son nom indigène de "Saw-whet" vient de son cri d'appel que l'on dit ressembler au son produit par une scie que l'on affûte.

Valeur économique. Sur 19 estomacs examinés, 1 contenait un moineau; 17, des souris; et 1, une mite. Ce résultat devrait suffire pour que l'on protège l'espèce.

373. Le Hibou maculé. (SCREECH OWL). *Otus asio*. L. 9-40. Planche XVIIA.

Traits distinctifs. Cette espèce est dichromatique, c'est-à-dire, se présente sous deux couleurs très distinctes sans égard au sexe, à l'âge ou à la saison. L'un des types est d'un beau brun avec nuances de gris et de blanc, et chez l'autre le gris est remplacé par un rouge vif. Le dessin du plumage est le même chez les deux types. Il se rencontre beaucoup de phases intermédiaires. Sa taille apparente varie entre celles des chouettes de Richardson et d'Acadie, mais la présence d'aigrettes bien caractérisées sur les côtés de la couronne et le dessin nettement défini de ses panachures sont caractéristiques.

Indications sur le terrain. La taille et les aigrettes bien en vue sont les meilleures indications.

Nid. Dans les arbres creux.

Habitat. Toute la zone tempérée de l'Amérique du Nord. Couve au Canada partout où il se trouve.

SOUS-ESPÈCES. Le hibou maculé comprend un grand nombre de sous-espèces: le catalogue de l'American Ornithologists' Union en reconnaît neuf races géographiques. La seule trouvée dans l'est du Canada, cependant, est l'oiseau type, le hibou maculé de l'Est.

Lors même qu'on l'appelle «Screech owl», le chant de cet oiseau est mélodieux et agréable avec une note mélancolique et n'a rien de dur ni de choquant. Son cri le plus ordinaire est un long sifflement, doux et chevrotant sur un ton uniforme ou une gamme descendante. Parfois ce sont de fait des fredonnements ou glouglous ou autres notes tranquilles et familières. Ce petit oiseau est inoffensif et fait preuve toutefois d'un courage étonnant tant pour défendre ses petits. Le soir, il s'abat sur la tête de tout intrus en émettant un sinistre "hou-hou" au son creux et faisant claquer son bec. Juste au moment de frapper, cependant, il s'écarte un peu pour fondre avec plus d'élan. Ces attaques, bien que déconcertantes, sont loin d'être dangereuses. L'habitude qu'il a de faire son nid dans les vieux pommiers creux de la ferme où la chasse qu'il fait aux souris est de toute première importance, en fait pour le cultivateur un oiseau très précieux.

Valeur économique. Les recherches sur le régime alimentaire du hibou maculé indiquent qu'il doit être protégé. Sur 212 estomacs examinés, 1 contenait de la volaille; 38, d'autres oiseaux; 91, des souris; 11, d'autres mam-

mif
inse
scor
com
de t

;
che X
T
Sa col
In
N.
H.
Pour c
SC
de rac
l'est di
presqu
très réc
entre c
du Lab
interné
saurait
et seule

L
semen
grands
espèce

V
contré
éviden
proie c
toutes
examin
oiseaux
son; et
l'oiseau
est pari
où l'esp

376.
des band
visibles.

Traits
région pola

Indicat

Nid.

Habitat
des grands

Il a
da. Il f
oiseau d
sont des
parmi les

mifères; 2, des lézards; 4, des grenouilles et crapauds; 1, du poisson; 100, des insectes; 5, des araignées; 9, des écrevisses; 7, des aliments divers; 2, des scorpions; et 2, des vers de terre. L'élément volaille doit être considéré ici comme accidentel, car l'oiseau en question, qui était un pigeon, est une proie de trop forte taille pour ce hibou.

375. Le Duc de Virginie. (GREAT HORNED OWL). *Bubo virginianus*. L, 22. Planche XVI B.

Traits distinctifs. Notre seul hibou d'au delà de 15 pouces de longueur qui porte des aigrettes. Sa coloration ocreuse, et noire et blanche, est le signe distinctif.

Indications sur le terrain. Forte taille, couleur ocreuse et aigrettes proéminentes.

Nid. Niche ordinairement dans des nids abandonnés d'éperviers ou dans des arbres creux.

Habitat. Plusieurs sous-espèces du Duc de Virginie fréquentent toute l'Amérique du Nord. Pour celles qui habitent le Canada, leur nom indique suffisamment leur habitat.

SOUS-ESPÈCES. Cette espèce comprend dans l'Amérique du Nord un grand nombre de races géographiques ou sous-espèces dont quelques-unes apparaissent comme sous-espèces dans l'est du Canada. Le spécimen arctique *B. v. subarcticus* est presque blanc de couleur et manque presque totalement des parties ocreuses et rousses de la variété commune, et les taches noires sont très réduites. Le Duc de la Virginie de l'Ouest, *B. v. pallascens* est à peu près de taille intermédiaire entre celui de la région polaire et celui de l'Est—l'oiseau type représenté par l'illustration. Celui du Labrador est un oiseau très foncé. Attendu qu'il y a encore, entre ces sous-espèces, des variétés intermédiaires difficiles à distinguer, et qui dépassent leur habitat dans les migrations, on ne saurait les désigner qu'avec beaucoup de circonspection, sauf dans les cas de plumages distinctifs, et seulement après comparaison avec des spécimens authentiques.

Le Duc de Virginie est le mauvais génie des bois. Il s'infiltré silencieusement à travers l'ombrageux feuillage et règne en maître, sauf sur les plus grands animaux. L'animosité qu'éprouvent les corbeaux à l'endroit de cette espèce doit résulter d'une cruelle expérience.

Valeur économique. L'influence économique de cet oiseau dépend de la contrée qu'il habite. Dans les bois profonds, loin des habitations, il est évidemment inoffensif, et il n'y a que les animaux sauvages lui servant de proie qui ont à en souffrir. Mais, dans les régions habitées, il faut de toutes les façons possibles se mettre en garde contre lui. Sur 110 estomacs examinés, 31 contenaient de la volaille ou des oiseaux-gibiers; 8, d'autres oiseaux; 13, des souris; 65, d'autres mammifères; 1, un scorpion; 1, du poisson; et 10, des insectes. Ce relevé est donc manifestement défavorable à l'oiseau. On peut lui faire la guerre sans craindre de l'exterminer puisqu'il est parfaitement capable de se défendre, et il y a de vastes régions sauvages où l'espèce peut régner en souveraine sans être molestée.

376. Le Harfang. (SNOW OWL). *Nyctea nyctea*. L, 25. Un gros hibou blanc avec des bandes courtes et distinctes d'un brun foncé sur presque tout le corps, sans aigrettes visibles. L'adulte arrivé à son plein développement est souvent presque tout blanc.

Traits distinctifs. Le seul hibou qui soit distinctement blanc, sauf le Duc de Virginie de la région polaire qui parfois s'en rapproche. Toutefois l'absence d'aigrettes ou d'oreilles le distingue.

Indications sur le terrain. Presque tout blanc, sans aigrettes.

Nid. Sur le sol.

Habitat. Régions polaires de l'Amérique du Nord, émigre au sud en hiver jusqu'à la latitude des grands lacs, sur tout le continent.

Il apparaît à titre de visiteur en hiver dans les régions habitées du Canada. Il fréquente les marais gelés et les rives des lacs et c'est typiquement un oiseau de plein air. Habituellement les spécimens qui viennent du Nord sont des jeunes passablement blancs, mais il s'en présente parfois des vols parmi lesquels les adultes très blancs et presque sans taches sont en majorité.

Il est probable que les jeunes sont naturellement plus vagabonds que les adultes, lesquels n'émigrent au loin que lorsqu'ils y sont forcés par le manque de nourriture ou attirés vers le sud par une grande abondance de lapins.

377. **La Chouette épervière.** (HAWK OWL) *Surnia ulula*. L, 15. Une chouette de taille moyenne ayant à peu près la charpente et les habitudes de l'épervier. Les parties de dessus sont d'un beau brun chaud diversement maillé de blanc. Toutes les parties inférieures et la poitrine sont nettement et régulièrement barrées de brun et de blanc. Une ligne d'un beau brun de phoque contourne extérieurement les disques faciaux dont les deux côtés se rencontrent sous la gorge. Le disque facial n'est pas aussi parfait.

Traits distinctifs. Figure moins aplatie et moins typique de la chouette, queue longue et parties inférieures distinctement et régulièrement rayées.

Indications sur le terrain. Les habitudes diurnes, sa coloration générale et sa longue queue sont de bonnes indications. Tout hibou chassant durant le jour ou perché ouvertement en pleine lumière du jour appartient probablement à cette espèce, bien que les chouettes à oreilles longues et à oreilles courtes en fassent parfois autant.

Nid. Sur les arbres conifères ou dans des trous d'arbres morts.

Habitat. Régions septentrionales boisées du continent; ne se présente que rarement en hiver dans les régions habitées.

SOUS-ESPÈCE. La chouette épervière habite tout le nouveau ainsi que l'ancien monde à titre de sous-espèce, mais le type est européen. La chouette épervière d'Amérique est la seule qui se trouve au Canada.

C'est la plus strictement diurne parmi les chouettes du Canada. Elle possède bien la forme et le mouvement de l'épervier étant plus svelte et d'une charpente plus légère que les autres membres de cette famille. On la voit souvent perchée à l'extrémité d'un tronc d'arbre sec, et elle rappelle beaucoup le faucon épervier, tant par son profil que par sa façon distinctive d'agiter sa queue.

Valeur économique. C'est un oiseau septentrional qui n'apparaît que dans les régions cultivées, seulement en hiver et peu souvent. Nous n'avons que peu de renseignements sur son régime alimentaire, mais il doit sans doute se nourrir de souris car il est trop petit pour s'attaquer à de plus gros animaux.

Ordre—Coccyges. Coucous et Martins-pêcheurs.

Les zoologistes à système ne s'accordent pas dans la classification de ces oiseaux. Le catalogue de l'Union américaine des Ornithologistes (édition de 1910) les reconnaît comme constituant un ordre complet, et divise ceux du Canada en deux sous-espèces: *Cuculi*, comprenant les coucous américains et les familles qui vivent au delà de leur habitat, et *Alcyones*, les martins-pêcheurs. Les traits distinctifs sont donnés sous les titres de la sous-famille et des diverses espèces.

SOUS-ORDRE—CUCULI. COUCOUS, Etc.

Ce sous-ordre est représenté en Amérique du Nord par une seule famille, les Cuculidés, comprenant les Anis et deux groupes de coucous.

FAMILLE—CUCULIDÆ. COUCOUS D'AMÉRIQUE.

Cette famille est représentée dans l'Amérique du Nord par trois familles dont une seule est représentée au Canada, les Coccyzines, coucous d'Amérique.

Z
dirigé
et poi
celui
T
paires
le bou

cana
chau
incon
tenu
longu
tent

trave
bien
angla
avec

bonne
façon
Son c
auteu
culier

Les de
de «c
calme

Ils on
horlog
mais il
soins r
leurs r

d'autre
font p
rappor
pas ch
mais pl

Vo
d'insec
lièreme
quels l
lues, qu
plus dé
de l'est
et form

387.
12-20. I
Traits
à bec noir
autres ma
que l'on ap

Sous-famille—*Coccyzinæ*. Coucous d'Amérique.

Description générale. Cet oiseau a le pied faible et les doigts conjugués; deux doigts sont dirigés en avant et deux en arrière (figure 37, p. 26). Le bec est plutôt long, légèrement recourbé et pointu. Le plumage est doux et lâche, manque de cohésion et est très soyeux au toucher comme celui de nombreuses espèces des tropiques. La queue est longue, molle et graduée.

Traits distinctifs. On le distingue du pic, qui a également les doigts conjugués, disposés par paires, par la différence entre les becs et les queues. Chez le pic, les becs sont droits, gros, avec le bout en ciseau, et la queue est courte, très rigide, et hérissée à la pointe.

Les coucous habitent principalement les tropiques. Les deux coucous canadiens descendent de la souche principale de l'espèce dans les plus chaudes latitudes. Ils possèdent une grâce sensuelle et une élégance tropicale incompatible avec les climats du nord. C'est ce que l'on constate dans leur tenue souple et sinueuse, leur belle gorge profonde et arrondie, leur queue longue et élégante, et leur plumage mince mais doux et soyeux. Ils fréquentent les jungles d'arbrisseaux chaudes et humides et planent rapidement à travers les espaces déboisés avec un vol silencieux et onduleux qui semble bien en rapport avec leur nature exotique. On trouve dans la littérature anglaise beaucoup d'allusions au coucou, mais qui n'ont que peu de rapport avec le coucou canadien. Ce coucou n'est pas une espèce qui apparaît de bonne heure: elle arrive doucement et silencieusement au printemps, de façon que pendant un certain temps après son arrivée on ignore sa présence. Son cri est aussi tout différent de celui que nous ont maintes fois décrit les auteurs européens. Ils est moins musical mais il possède un charme particulier et un caractère exotique extraordinaire qui s'harmonise avec sa nature. Les deux espèces canadiennes ont à peu près les mêmes cris; son cri saisissant de «caou-caou-acou» est l'un des plus caractéristiques et par un temps calme en été, on peut l'entendre d'un quart de mille ou de plus loin encore. Ils ont un autre cri de «couc-couc-couc» rappelant le bruit d'une grosse horloge qui marque les secondes; celui-ci n'a pas autant de portée que l'autre, mais il s'entend aussi à une distance considérable. En ce qui concerne les soins maternels, nos oiseaux semblent beaucoup mieux se rendre compte de leurs responsabilités que ceux d'Europe. Ils sont légèrement parasites dans leurs habitudes, c'est-à-dire qu'ils déposent parfois leurs oeufs dans les nids d'autres oiseaux auxquels ils confient le soin d'élever leurs petits, mais ils n'en font pas une pratique commune. L'ancien nom anglais de «Cuckols» se rapporte à cette habitude de l'oiseau européen. Quant à l'américain, ce n'est pas chez lui une pratique habituelle comme chez son congénère d'Europe, mais plutôt accidentelle.

Valeur économique. Les coucous se nourrissent presque exclusivement d'insectes mais mangent aussi parfois des fruits sauvages. Ils sont particulièrement précieux en raison de leur préférence pour certains insectes auxquels les autres espèces ne touchent presque jamais. Les chenilles velues, qui, en raison de leur manteau hérissé, sont à l'épreuve des oiseaux les plus dédaigneux sont une proie favorite des coucous. On trouve l'intérieur de l'estomac du coucou tapissé de poils épineux de chenilles fixés aux parois et formant comme une fourrure.

387. Le Coucou à bec jaune. (YELLOW-BILLED CUCKOO). *Coccyzus americanus*. L, 12-20. Planche XVII A.

Traits distinctifs. Le coucou à bec jaune ne peut être confondu qu'avec son congénère le coucou à bec noir. Le jaune sur le bec d'où lui vient son nom est le meilleur signe d'identification. Les autres marques distinctives sont, une grande surface de couleur cannelle répandue sur les ailes, que l'on aperçoit quand l'oiseau vole et beaucoup plus de blanc à l'extrémité des plumes de la queue.

Indications sur le terrain. Le long et flexible profil quand il vole et la coloration générale de cet oiseau le font reconnaître comme un coucou. L'espèce se distingue par sa mandibule inférieure jaunâtre, ses marques couleur cannelle sur l'aile, et la forte quantité de blanc sur sa queue.

Nid. Construit avec des branchettes non loin du sol.

Habitat. Cette espèce habite plus au sud que la suivante, mais les relevés semblent indiquer une augmentation du nombre et une extension de l'habitat durant les trente dernières années. Son habitat dépasse tout juste les frontières méridionales d'Ontario, de Québec et du Nouveau-Brunswick.

SOUS-ESPÈCES. On reconnaît deux races de cette espèce au Canada. Le coucou de l'Est—l'oiseau type—est répandu dans l'Ouest jusqu'aux plaines.

388. **Le Coucou à bec noir.** (BLACK-BILLED CUCKOO). *Coccyzus erythrophthalmus*. L, 11-85. Planche XVIII A.

Traits distinctifs. Se distingue du coucou à bec jaune par son bec tout noir, l'absence de teinte cannelle sur les ailes et la quantité beaucoup moindre de blanc à l'extrémité de la queue.

Indications sur le terrain. Son habitat est plus répandu et plus septentrional que celui du coucou à bec jaune; il fréquente irrégulièrement les parties habitées de la région au sud du golfe Saint-Laurent et à l'ouest de la frontière manitobaine.

Nid. Structure lâche de branchettes non loin du sol.

Habitat. Son habitat est plus vaste et plus septentrional que celui du coucou à bec jaune; fréquente irrégulièrement les parties plus peuplées de la région au sud du golfe St-Laurent et à l'ouest de la frontière du Manitoba.

SOUS-ORDRE—ALCYONES. MARTINS-PÊCHEURS.

Les martins-pêcheurs représentent un groupe bien caractérisé dans presque toutes les parties du monde. Bien qu'évidemment ils s'adaptent bien à la pêche, quelques-uns ont abandonné leurs habitudes ancestrales et le bord des eaux pour aller dans les bois se nourrir d'insectes et de vers de terre. Cependant tous ces types exceptionnels vivent en dehors de leur habitat et principalement aux tropiques; le «Laughing Jackass» d'Australie est un grand martin-pêcheur anormal. Les martins-pêcheurs de l'Amérique du Nord sont tous compris sous une seule famille, des Alcédinidés.

FAMILLE—ALCEDINIDÆ. MARTINS-PÊCHEURS.

Attendu qu'il n'y a qu'une seule espèce de cette famille au Canada la description de cette espèce servira pour la famille entière.

390. **Le Martin-pêcheur.** (BELTED KINGFISHER). *Ceryle alcyon*. L, 13-02. Planche XVII B.

Traits distinctifs. Avec sa grosse touffe hérissée et son dos ardoisé, le martin-pêcheur ne peut guère être confondu avec aucun autre oiseau d'Amérique. Les pieds faibles, les trois doigts en avant avec les deux extérieurs réunis (figure 36, p. 26) sur la moitié de leur longueur, et les surfaces singulièrement grossières des doigts sont des signes distinctifs des martins-pêcheurs.

Indications sur le terrain. Sa huppe hérissée et sa grosse tête, sa coloration générale et son habitude de rester perché sans mouvement au bout d'une perche surplombant la rivière, puis de plonger avec fracas, permettent de reconnaître facilement le martin-pêcheur à l'état vivant.

Nid. Ordinairement sur le sol, à l'extrémité d'un tunnel percé dans le paroi d'un talus.

Habitat. Toute l'Amérique du Nord; couve partout où il se trouve au Canada.

Tous les habitués des eaux canadiennes connaissent le martin-pêcheur. Il s'installe immobile sur une perche qui domine la rivière, afin de guetter le poisson qui peut se trouver au-dessous. Tout-à-coup il s'enlève, reste suspendu un moment dans l'air et se précipite dans l'eau avec grand fracas pour remonter un instant après avec un malheureux poisson dans son large bec et disparaît au tournant du cours d'eau. Dans la région qu'il fréquente journellement le martin-pêcheur connaît toutes les perches ou les branches du haut desquelles il peut avoir une bonne vue sur ses lieux de pêche. Il ne fréquente pas seulement les cours d'eau, on le remarque également au bord des étangs, des lacs et même de la mer. Ces oiseaux pêchent quelquefois à des distances considérables de leurs nids et souvent on les aperçoit

dan
rare
soie
d'un

l'on
dan
cet
sans
vés,
les g
rem
barl
prof
bien
autr
relat
cheu

gard
au p
prim
point
trouv
espèc
nouri
nisme
mone
adult
que d
consi
mettr
se pro
le rés
sera
pêche
dans l
mal se

C
compr
quant
de cet

Desc
quatre d
bés leur p
celui des
termine
longue m

dans des endroits où les talus dont ils ont besoin pour faire leurs nids sont rares. Cependant ils s'adaptent aux conditions qui se présentent, si bizarres soient-elles; ils utiliseront, par exemple, la terre qui s'attache aux racines d'un arbre renversé ou les parois d'un fossé d'égouttement.

Valeur économique. Le martin-pêcheur se nourrit de menu poisson et l'on ne saurait dire sans hésitation si oui ou non cela constitue un grave danger au point de vue économique. Les tout petits poissons que capture cet oiseau dans nos grands cours d'eau, étangs ou lacs, sont certainement sans importance mais lorsqu'il fréquente les petits ruisseaux à truite réservés, il peut parfois commettre des dégâts sérieux. Leur influence sur les grandes rivières où l'on pêche le saumon est moins évidente. Ordinairement le poisson qu'ils prennent se compose de petites perches, ablettes barbeaux et autre frétin qui fréquente les eaux chaudes de surface ou peu profondes. Le nombre de poissons-gibiers qu'ils prennent ne saurait être bien grand. Quant aux eaux réservées à la culture de la truite, c'est une autre question. Les poissons dont ils se nourrissent en ces endroits sont relativement assez gros et, même s'ils ne sont pas très nombreux, le pêcheur à la ligne ne peut pas voir cet oiseau d'un bon œil.

Sur les rivières à saumon les martins-pêcheurs sont très mal vus et les gardes-pêche s'emploient ordinairement à en réduire le nombre par le fusil et au piège, chaque fois que l'occasion s'en présente; ils offrent même des primes pour leurs têtes et leurs nids. On peut se demander jusqu'à quel point ils ont raison. Dans beaucoup de ces cours d'eau les poissons ne trouvent guère d'autre nourriture que les plus petits individus de leur propre espèce. Tous les gros poissons, sauf les reproducteurs du printemps, se nourrissent des petits. Le frétin se nourrit évidemment de micro-organismes et de planctons, de saumoneau, et ainsi de suite. Ce sont les saumoneaux que prend le martin-pêcheur. Or, si le nombre final de saumons adultes dépend des saumoneaux, si le saumoneau constitue la phase critique de la vie du saumon, au delà de laquelle ses chances de survivre sont considérablement augmentées, le martin-pêcheur est susceptible de commettre des dégâts appréciables; mais si, d'autre part, cette phase critique se produit plus tard, pendant la vie marine du poisson, par exemple, le résultat de l'enlèvement de même un nombre considérable de digitales sera sans importance. De toute façon il faudra plusieurs martins-pêcheurs pour faire autant de tort qu'un seul relativement petit poisson dans les eaux fréquentées par le saumon. Il semble donc que le bien et le mal se contre-balaient à peu près dans le cas du martin-pêcheur.

Ordre—Pici. Pics.

Ce groupe répandu par tout le monde est une division plutôt hétérogène comprenant de nombreuses subdivisions et les opinions sont très partagées quant à leurs exactes relations. Il n'existe au Canada qu'une seule famille de cet ordre—*Picidae*, les Pics.

FAMILLE—PICIDE. PICS.

Description générale. Les pics sont des oiseaux faciles à reconnaître. Ils ont soit trois soit quatre doigts, et, comme chez les coucous, deux sont situés en avant et sont armés d'ongles recourbés leur permettant de bien se cramponner après l'écorce rugueuse des arbres. Chez l'un des groupes celui des pics à trois doigts, l'un des doigts postérieurs fait défaut. Le bec est droit, fort et se termine en forme de ciseau (figure 41, p. 27). La queue est bien développée, pas remarquablement longue mais forte et hérissée, usée par le frottement contre les rugosités de l'écorce.

Traits distinctifs. Les particularités des pieds, du bec, et de la queue constituent de bons signes distinctifs.

Indications sur le terrain. Cet oiseau grimpe sur les arbres; vole par une série de coups d'ailes rapides interrompus par de courtes pauses, ce qui donne à son parcours une direction onduleuse formant comme une succession de festons.

Nid. Dans des trous creusés dans les arbres ou dans les souches.

Le pic est très connu par sa faculté de se maintenir avec ses doigts sur des surfaces verticales ou surplombantes. Son fort bec en forme de coin se prête admirablement à la perforation du bois d'où il peut extraire des larves de xylophages ou autres insectes. La langue est modifiée en une longue lance extensible munie d'une pointe aigüe et armée de barbes minuscules lui permettant de retenir sa proie transpercée et l'extraire du bois. Les os hyoïdes sont tellement longs qu'à son état normal de repos, ils s'enroulent par dessus la base de la tête, le long de la couronne, et, chez certaines espèces, pénètrent les narines au-dessous de l'étui du bec et enfin appuient leurs extrémités près de la pointe du bec. Pour leur faciliter le travail la langue est enduite d'une matière visqueuse à laquelle se prennent les petits insectes. Quelques-uns de ces oiseaux, par exemple les «pic maculé» qui ont le bout de la langue élimé de façon à ressembler à une sorte de brosse qui doit servir évidemment à recueillir la sève.

Valeur économique. Il ne peut guère y avoir de doute quant à l'utilité des pics, si l'on excepte le pic maculé. Ils sont presque entièrement insectivores. Ils poursuivent les vers percebois en formant des trous même dans des arbres d'apparence saine et sont ainsi plutôt utiles que nuisibles.

393. **Le Pic chevelu.** (HAIRY WOODPECKER). *Dryobates villosus*. L, 9.40. Presque exactement semblable à l'espèce suivante mais plus gros. Planche XVIII A.

Traits distinctifs. Le pic minule est la seule espèce avec laquelle on peut confondre cet oiseau. C'est surtout par la taille qu'on le reconnaîtra, mais il y a aussi le blanc des plumes extérieures de la queue qui est intact au lieu d'être rayé de noir.

Indications sur le terrain. La coloration blanche maillée de noir caractérise le genre, et c'est par la taille qu'on le distingue du pic minule.

Nid. Dans des trous approfondis dans des arbres sains ou des souches.

Habitat. Le pic chevelu avec ses diverses sous-espèces se trouve dans toutes les régions boisées du Canada et couve partout sauf peut-être dans les parties méridionales de l'Ontario.

SOUS-ESPÈCES. Cette espèce, dans l'est du Canada, comprend deux races géographiques: le pic chevelu de l'Est qui est l'oiseau type, et le pic chevelu du Nord, *D. v. leucomelas*. Ce dernier est ordinairement mais improprement représenté comme l'oiseau du Canada méridional. Il est légèrement plus gros et habite plutôt le nord; il s'avance seulement par occasion dans les régions habitées, en hiver, mais ne se montre peut-être jamais dans la région des grands lacs inférieurs.

Le pic chevelu est nommé d'après ses plumes blanches sur le dos, lesquelles retombent sur les bordures noires d'une manière éparse et lâche de façon à représenter vaguement une touffe de cheveux. C'est l'un des pics communs et il représente bien le type de la famille par ses habitudes. On ne le rencontre pas aussi familièrement autour des habitations et des vergers que le pic minule, car il préfère les bois aux vergers et aux arbres feuillus.

Valeur économique. Le 77 pour cent de la nourriture de cette espèce se compose d'insectes; ce sont en partie des escarbots mais il y a aussi des fourmis, des silphes et des mouches à scie; le 22 pour cent se compose de matière végétale, presque entièrement de fruits sauvages.

394. **Le Pic minule.** (DOWNY WOOD-PECKER). *Dryobates pubescens*. L, 6.83. Planche XVIII A.

Traits distinctifs. Le pic minule se distingue du précédent par sa taille plus petite, et les rayures noires sur les plumes extérieures de la queue.

riq

Can
légè

ma
om
c'es

ces

ser

fer

pou

bien

voy

oub

pic

s'y

en

sont

et e

pyr

9-50

2

1

du C

mâle.

E

men

habi

des l

cons

4

canus

dos e

T

On pe

Si l'on

In

Sc

rencon

tique

sous-

Indications sur le terrain. La taille est la meilleure indication.

Nid. Dans des trous creusés dans des arbres morts et dans des souches.

Habitat. Le pic minule avec ses diverses sous-espèces occupe toute la zone tempérée de l'Amérique et couve au Canada partout où il se trouve.

SOUS-ESPÈCES. Cette espèce comprend plusieurs races géographiques, celle de l'est du Canada—le pic minule du Nord, *D. p. medianus*—ne se distingue de l'oiseau type que par une légère différence de taille.

Le pic minule est notre pic le plus commun. Il vient tout près des maisons et se sent tout à fait à l'aise dans les vergers et au milieu des arbres ombreux des villes et des parcs. Comme il habite le Canada toute l'année, c'est un oiseau particulièrement utile au cultivateur.

Valeur économique. Ce pic étant le moins sauvage de toutes nos espèces et se rapprochant des fermes et des habitations où il rend les plus grands services, est un oiseau extrêmement précieux. En fouillant dans toutes les fentes et crevasses des arbres feuillus et des arbres fruitiers, et en les perforant pour extraire les insectes qui sont plus au fond, cet oiseau complète très bien le travail des mésanges et des sittelles. De fait, ces trois espèces voyagent souvent en compagnie pendant l'hiver et très peu d'insectes sont oubliés quand toutes les trois travaillent ensemble. L'alimentation du pic minule est la même que celle du pic chevelu, mais, comme l'on pourrait s'y attendre en raison de sa plus petite taille et de sa présence plus commune en été, elle comprend un plus grand nombre des plus petits insectes. Ce sont les divers coléoptères qui composent la majeure partie de sa nourriture et elle capture plus de larves de teignes, y compris la teigne des tentes et la pyrale des pommes.

400. Le Pic arctique. (ARCTIC THREE-TOED WOODPECKER). *Picoides arcticus*. L, 9-50. Planche XVIII B.

Traits distinctifs. Ce pic n'a que trois au lieu de quatre doigts et le dos est d'un noir uniforme.

Indication sur le terrain. Si l'on excepte le pic à tête rouge, c'est le seul pic à dos noir de l'est du Canada. On reconnaît l'espèce à son dos noir et le genre à la tache jaune sur la couronne du mâle. (Planche XVIII B).

Habitat. Les forêts de conifères du Nord, et vers l'ouest jusqu'aux provinces des prairies.

C'est un oiseau des forêts de conifères du Nord, qui se présente rarement à la vue d'un observateur ordinaire sauf sur les confins des régions habitées où il apparaît régulièrement.

Valeur économique. Ce pic devient plus important pour la protection des forêts de conifères contre les fléaux d'insectes importés ou autres qui ont considérablement augmenté en ces dernières années.

401. Le Pic d'Amérique. (AMERICAN THREE-TOED WOODPECKER). *Picoides americanus*. L, 8-75. Presque absolument semblable au pic arctique, sauf que le milieu du dos est rayé de blanc.

Traits distinctifs. La couronne jaune chez le mâle est un signe distinctif du pic d'Amérique. On peut distinguer cette espèce de la précédente par son dos rayé de blanc au lieu d'être tout noir. Si l'on excepte le pic à ventre rouge, c'est le seul de l'espèce dans l'est du Canada qui ait le dos rayé.

Indications sur le terrain. La couronne jaune du mâle et les raies blanches au milieu du dos.

SOUS-ESPÈCES. C'est le pic d'Amérique de l'Est—La race type de l'espèce—que l'on rencontre dans l'est du Canada. Dans l'Ouest, il présente d'autres formes.

C'est un oiseau beaucoup plus rare que le précédent mais il lui est identique au point de vue des habitudes et de l'habitat; il y en a cependant des sous-espèces répandues dans les montagnes de l'Ouest.

402. **Le Pic maculé.** (YELLOW BILLED SAPSUCKER). *Sphyrapicus varius*. L, 8-56. Planche XIX A.

Traits distinctifs. La calotte rouge bien caractérisée sur le sommet de la tête permet de distinguer cette espèce. Certaines femelles ont une couronne noire, mais la coloration générale est toujours reconnaissable même chez les jeunes, bien que chez ceux-ci, elle soit voilée et plutôt indiquée que affirmée.

Indications sur le terrain. La calotte rouge chez les deux sexes et la gorge rouge chez le mâle sont les signes les plus apparents. Dans le reste du plumage la large bande blanche qui s'aperçoit au bord de l'aile et la tache rouge au-dessus de la gorge sont des signes distinctifs.

Nid. Dans des trous d'arbres morts.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord depuis les régions cultivées du Nord en allant au sud. Couve partout dans l'est du Canada sauf dans les parties les plus méridionales.

SOUS-ESPÈCES. Le type de l'Est du pic maculé, représente la race type—le pic maculé de l'Est. Une autre sous-espèce se rencontre dans l'extrême Ouest.

Cette espèce semble avoir abandonné ses anciennes habitudes de piquer le bois. Bien qu'elle soit très répandue durant la migration à travers le sud du Canada, elle couve rarement dans la région des grands lacs inférieurs tout en étant commune dans les autres endroits.

Valeur économique. C'est le seul oiseau de cette famille qui semble être nuisible. Il cause des dommages aux arbres fruitiers et autres arbres à écorce lisse en en extrayant le suc dont il se nourrit; pour cela il pratique autour des troncs et des branches des trous carrés régulièrement espacés, en lignes horizontales, pénétrant à la fois l'écorce externe et l'écorce interne jusqu'à l'aubier. Il entreprend ainsi quelquefois plusieurs arbres à la fois et les visite à tour de rôle à mesure que le suc se dégage. Lors même que c'est principalement le suc qu'il recherche il mange également les insectes qu'il rencontre, car bien que la sève des arbres soit son principal aliment, il lui faut aussi une nourriture animale.

Le dommage causé aux arbres qui sont ainsi perforés est loin d'être aussi considérable qu'on pourrait le croire, mais ceux-ci sont parfois endommagés pour toujours et peuvent même mourir. Tous sont affaiblis et deviennent un repaire de végétation fongique et d'insectes. Si, cependant, ils ne sont pas sérieusement et à plusieurs reprises attaqués, la plupart des arbres survivent. Même la végétation forestière est sujette à des dégâts considérables de la part de cet oiseau; de bons arbres à bois de service sont attaqués et les nœuds et les taches qui en résultent dans la fabrication qui sont des marques des anciennes blessures maintenant refermées, faites par le pic maculé, réduisent la valeur marchande des bois de construction. Toute cette question des dégâts occasionnés par le pic maculé a été traitée à fond dans un Bulletin du Service biologique des Etats-Unis, le numéro 39, intitulé: "Woodpeckers in relation to trees and wood products" par W.-L. McAtee. Sous le titre de mesures défensives contre les pics maculés, l'auteur conseille un usage modéré du fusil là où l'espèce cause des dommages appréciables, ou bien l'usage du poison. Si l'on emploie le fusil, il faut prendre bien garde de ne tuer que les pics maculés et, quant au poison, il ne faut pas oublier que les oiseaux-mouches et autres petites espèces, particulièrement les fauvettes, peuvent être également atteints.

405. **Le Pic à huppe écarlate.** (PILEATED WOODPECKER, COCK-OF-THE-WOOD). *Phlæotomus pileatus*. L, 17. Planche XIX B.

Traits distinctifs. Grâce à sa taille, ce pic est facile à reconnaître. Il ne peut être confondu avec aucun autre pic canadien.

Indications sur le terrain. Forte taille, huppe rouge remarquable et taches blanches sur les ailes déployées.

les

éca

éta

pai

wo

coc

et (

un

cha

être

forè

écoi

dans

prot

cieu

le mé

de c

sont

40

lus. 1

Tr

plumag

Ind

naissab

Nic

ou autre

Hal

que par

L

et des

trouve

étudié

en sus

V

autres

encore

fruits, s

bées et

l'accusa

montré

peut-être

409.

9-50. D

de noir et

de la tête

légère tei

Habitat. Autrefois répandu sur tout l'est du Canada, il se cantonne maintenant dans les régions les plus sauvages et incultes du Nord.

SOUS-ESPÈCES. Le pic à huppe écarlate comprend deux sous-espèces, dont le pic à huppe écarlate du Nord, *P. p. abieticola* est la seule qui se rencontre au Canada.

Par suite de la destruction immodérée de ce magnifique oiseau qui était autrefois très répandu, on ne le trouve plus maintenant que dans les parties retirées des forêts du Nord. Le nom vulgaire de "Cock-of-the-woods" qui lui est assigné est devenu par corruption dans le Nord, "Wood-cock" et l'emploi de ce nom pour cette espèce est une source de confusion et de malentendus. Le pic à huppe écarlate n'est pas proprement dit un oiseau gibier; il n'est pas "tenu en arrêt par le chien", ne peut pas être chassé par les méthodes habituelles des chasseurs et il est trop petit pour être servi sur la table, mais il est très précieux pour la conservation des forêts. Il faudrait donc une loi sévère pour le protéger au point de vue tant économique que sentimental.

Valeur économique. Le pic à huppe écarlate se cantonne maintenant dans les régions les plus sauvages. Il est principalement utile pour la protection des arbres forestiers et, par conséquent, c'est un oiseau précieux pour le marchand de bois. Son régime d'alimentation est à peu près le même que celui des autres pics mais il est plus robuste, ce qui lui permet de creuser plus profondément et d'extraire des larves et des insectes qui sont à l'épreuve d'un oiseau moins puissant.

406. **Le Pic à tête rouge.** (RED-HEADED WOODPECKER). *Melanerpes erythrocephalus*. L, 9-75. Planche XX A.

Traits distinctifs. La tête d'un rouge vif et les contrastes de masses blanches et noires dans le plumage du corps sont faciles à reconnaître.

Indications sur le terrain. La coloration remarquable de cette espèce la rend facilement reconnaissable.

Nid. Généralement dans des trous d'arbres morts et parfois dans des poteaux télégraphiques ou autres.

Habitat. Cet oiseau habite plutôt le Sud, ne pénétrant régulièrement et fréquemment au Canada que par la frontière sud le long des grands lacs inférieurs.

Le pic à tête rouge est une des espèces communes autour des vergers et des terres à bois. Il est par conséquent bien connu partout où il se trouve. Il possède un peu moins les habitudes des pics que les espèces déjà étudiées, ou bien il s'est développé chez lui des aptitudes de gobe-mouches en sus de celles qu'il possédait déjà.

Valeur économique. Ce pic détruit moins de larves et de vers que les autres espèces, et des coléoptères plus utiles, les carabes. Toutefois, il est encore plutôt bienfaisant que nuisible, car alors même qu'il mange des fruits, sa nourriture se compose en grande partie de hannetons ou de scarabées et de charançons. On l'a accusé de manger des fruits et, sans doute, l'accusation n'est pas sans fondement, mais une étude approfondie a démontré que ce sont des cas spéciaux se bornant à des régions restreintes et peut-être à de certains individus.

409. **Le Pic de la Caroline.** (RED-BELLIED WOODPECKER). *Centurus carolinus*. L, 9-50. Dos entièrement noir et parties supérieures nettement et régulièrement rayées de noir et de blanc. Tout le dessus du cou jusqu'à l'épaule et, chez le mâle, le sommet de la tête, d'un rouge vif. Tout le reste et les parties inférieures d'un blanc cendré avec légère teinte olivâtre. Abdomen légèrement teinté de rouge.

Traits distinctifs. Les rayures uniformes sur tout le dos et le rouge de la couronne et de la nuque sont faciles à distinguer.

Habitat. Depuis le littoral du golfe jusqu'au nord des Etats-Unis; apparaissant à titre de vagabond jusqu'au nord de la frontière dans le sud de l'Ontario.

Ce pic n'apparaît que rarement et localement au Canada. Sa valeur économique est satisfaisante bien qu'il soit friand de fruits sauvages et que parfois il se nourrisse de variétés cultivées.

412. **Le Pic doré.** (FLICKER, GOLDEN-WINGED WOODPECKER). *Colaptes auratus*. L. 12. Planche XX B.

Traits distinctifs. Un pic de forte taille avec les surfaces inférieures des ailes et la queue d'un jaune brillant.

Indications sur le terrain. Habitudes générales des pics; taille; le dessous des ailes jaunes et le croupion blanc se voient bien quand l'oiseau vole.

Nid. Dans des trous creusés dans les troncs d'arbres morts, ordinairement en plein air et rarement sinon jamais dans les épaisses forêts. Les singulières relations entre des espèces distinctes sont bien mises en évidence par cet oiseau. Les trous, qu'il a approfondis pour lui servir de nid, une fois abandonnés, sont utilisés par beaucoup d'autres espèces incapables de creuser les leurs propres. Par exemple les faucons éperviers, les hirondelles bicolores, les moucherolles huppés et autres espèces utiles sont ainsi directement tributaires du pic, particulièrement du pic doré pour l'établissement de leurs nids. Il existe dans la nature bien d'autres cas semblables de dépendance mutuelle; il y en a qui sont bien en évidence et très connus, d'autres que nous supposons, et il peut s'en trouver d'autres encore que nous ne soupçonnons pas et ne pouvons même pas actuellement soupçonner. Voilà précisément une bonne raison pour agir avec circonspection avant de rien dérange à l'ordre établi de la nature.

Habitat. Les diverses sous-espèces du pic doré sont répandues sur toute la partie est de l'Amérique du Nord en allant au nord jusqu'aux limites des régions boisées. Il couve partout où il se trouve au Canada.

SOUS-ESPÈCE. Le pic doré comprend plusieurs sous-espèces; la variété propre à l'est du Canada est désignée sous le nom de pic doré du Nord, *C. a. luteus*.

C'est celui des pics qui est le plus connu du public en général, ainsi qu'on peut le voir par le grand nombre de désignations populaires qui lui ont été assignées: on l'appelle en anglais: "Golden-winged Woodpecker, Highholder, Yellow-hammer"; et, en français: "Pivart" ou "Poule de bois". Le cri aigu de "Fliquet, fliquet, fliquet," que fait entendre le mâle et le strident "Pi-iu-iou" propre aux deux sexes sont des sons très connus et faciles à reconnaître. Bien que ce soit un pic vrai, le pic doré se nourrit essentiellement sur terre et est particulièrement friand de fourmis, lesquelles composent bien souvent une bonne partie de son alimentation. Il prend plaisir à se cramponner à un tronc d'arbre creux, sonore, et à le frapper à coups de becs rapides et retentissants que l'on entend de très loin. Il semble faire ce bruit pour appeler sa compagne ou alors c'est quelquefois pour donner libre cours à sa bonne humeur. Les facultés de reproduction de cet oiseau sont phénoménales. En enlevant les oeufs à mesure qu'ils sont pondus, on a pu en recueillir trente ou plus en une seule saison. Il semble pouvoir en déposer tant que la série n'est pas complète.

Valeur économique. Près de la moitié de sa nourriture se compose de fourmis. Les autres insectes dont il se nourrit sont des espèces soit utiles soit nuisibles, mais ce sont surtout ces dernières qui l'emportent. Il mange aussi des fruits, du grain et des fruits d'arbres forestiers; mais, dans l'ensemble, on peut le considérer comme utile plutôt que nuisible. Peut-être bien que la plus grave accusation qu'on puisse porter contre cette espèce est de disséminer les graines du chêne et du sumac vénéneux et contribuer ainsi à répandre ces plantes nuisibles.

des
sifi
pro
éta
plu
et
tra

Une
serv

1
ouver
faible
héron
cham
7
ne se

que
chèv
leurs
cette
les p
anim
Ils se
sent
petit
perch
goue

41
sis. I
Tr
longs p
toute le
Ha

N
trouvi
(Nouv
quant

417.
Marbré
a pas d
inférieur
est sem

Ordre—Macrochires. Engoulevents, Martinets et Oiseaux-mouches.

Dans cet ordre sont groupés un certain nombre d'oiseaux qui, après des recherches plus complètes pourront être classés différemment. La classification actuelle de l'Union des Ornithologistes américains, est censée être provisoire et n'est adoptée que jusqu'à ce que l'on puisse s'entendre pour établir un système permanent. Les divers sous-ordres de la division sont plus faciles à reconnaître par leurs différences que par leurs concordances et nous appuierons plutôt, dans les descriptions qui vont suivre, sur les traits qui les différencient.

SOUS-ORDRE—CAPRIMULGI. ENGOULEVENTS.

Ce sous-ordre est profusément répandu et divisé en plusieurs familles. Une description de l'unique famille représentée dans l'Amérique du Nord servira à faire reconnaître l'espèce indigène.

FAMILLE—CAPRIMULGIDAE. ENGOULEVENTS.

Description générale. Les engoulevents ont la tête aplatie, le bec très petit avec une large ouverture qui se prolonge jusqu'au-dessus des yeux (figure 38, p. 26). Les pieds sont petits et très faibles et l'ongle médian est pectiné ou pourvu de dentelures en forme de peigne comme chez les hérons (figure 19, p. 23). Le plumage est d'une texture très molle et coloré de brun cendré de chamois et de gris.

Traits distinctifs. Les traits précités devraient suffire à caractériser cette famille puisqu'ils ne se rapportent à aucun autre oiseau canadien.

Le nom de "Goatsuckets" ou "Tête-chèvre" leur a été attribué parce que l'on croyait autrefois, évidemment à tort, qu'ils suçaient le lait des chèvres dans les prairies au-dessus desquels on les voyait tourner, et leurs immenses bouches de même que leurs gorges roses semblaient appuyer cette croyance populaire. De fait, les oiseaux que l'on voyait ainsi survoler les pâturages étaient en train de chasser au vol les insectes attirés par ces animaux. Les oiseaux de cette famille sont nocturnes ou crépusculaires. Ils se nourrissent exclusivement d'insectes attrapés au vol et n'atterrissent que rarement sauf pour nicher ou se reposer. Leurs pieds sont trop petits et trop faibles pour se fixer fermement à une branche et quand ils perchent ils s'assoient normalement sur de grosses branches, mais en longueur et non pas en largeur comme font la plupart des oiseaux.

416. L'Engoulevent de la Caroline. (CHUCK-WILLS WIDOW) *Antrostomus carolinensis*. L, 12. Un gros engoulevent criard. Voir l'espèce suivante.

Traits distinctifs. Taille; il est de beaucoup plus forte taille que l'engoulevent criard; il a de longs poils autour de la bouche recouverts de petits cheveux à leur base au lieu d'être dénudés sur toute leur longueur.

Habitat. Etats du Sud. Ne se présente qu'accidentellement à l'intérieur de nos frontières.

Nous faisons figurer cet oiseau dans notre ouvrage parce qu'il en a été trouvé un spécimen à la pointe Pelée sur le lac Erié, et un autre à Pictou (Nouvelle-Ecosse). Il est plutôt rare et ressemble à l'engoulevent criard quant à son apparence, ses habitudes et son chant.

417. L'Engoulevent criard. (WHIP-POOR-WILL) *Antrostomus vociferus*. L, 9-75. Marbré de brun cendré et de gris avec légères teintes de roux et d'ocre jaune. Il n'y a pas de tache dominante dans la coloration, mais beaucoup de petits détails. Les parties inférieures ne laissent voir qu'une faible indication de rayures et la coloration de l'ensemble est semblable à celle d'une grosse teigne brune.

Traits distinctifs. Ne saurait être confondu qu'avec l'engoulevent d'Amérique et l'engoulevent de la Caroline. On le distingue du premier de ces oiseaux par les trois signes suivants: la gorge est foncée au lieu de blanche; il y a une étroite bande blanche au bas de la gorge; la moitié extérieure des plumes de la queue, sauf les deux du centre, est blanche chez le mâle et se termine en blanc nuancé de chamois chez la femelle. L'aile déployée ne laisse voir aucune tache blanche.

Nid. Dépose ses œufs à terre ou sur les feuilles mortes.

Habitat. Très répandu sur toute la majeure partie des régions habitées de l'est du Canada; plus rare dans l'extrême Est, et plus commun dans les sections moins fréquentées que dans là où il se fait beaucoup de culture.

SOUS-ESPÈCES. On reconnaît deux espèces d'engoulevent criard dans l'Amérique du Nord dont l'oiseau type—l'engoulevent criard de l'Est—est la seule qui se présente au Canada.

Il n'y a pas dans nos bois canadiens de cri à la fois plus poétique et lugubre que celui si fréquemment entendu de l'engoulevent criard. Il faut ordinairement assez d'imagination pour exprimer par des paroles le chant des oiseaux mais celui-ci semble dire bien distinctement: "Whip poor-will, whip-poor-will" ou encore "Bois pourri." Pour faire entendre ce cri il s'installe sur une perche se détachant d'un tronc d'arbre mort, sur une branche défeuillée, sur un toit de bâtiment ou même un mât de tente. Il fréquente régulièrement ses diverses stations chaque soir et semble y revenir à tour de rôle. Entre ses périodes d'appel, l'oiseau voltige et tournoie au sommet des arbres en formant de grands cercles entrelacés et vient s'abattre parfois vers la terre en un long mouvement de balancier. Dans le jour il cherche un coin de terre tranquille sous la brousse où il passe sa journée au repos. S'il est dérangé par un intrus, il s'enlève d'un vol lâche et maladroit qui ne donne aucune idée de sa merveilleuse maîtrise de l'air en d'autres temps, il voltige à peu de distance au-dessus des broussailles et retombe de nouveau à terre.

L'engoulevent criard est souvent considéré identique à l'engoulevent d'Amérique, ce qui est une erreur très naturelle quand on les voit côte à côte, car ils sont assez semblables pour être confondus.

Valeur économique. Cet oiseau se nourrit principalement de coléoptères nocturnes particulièrement de hannetons et de scarabées.

420. **L'Engoulevent d'Amérique.** (NIGHTHAWK). *Chordeiles virginianus*. L, 10. Planche XXI A.

Traits distinctifs. L'engoulevent d'Amérique et l'engoulevent criard sont souvent pris l'un pour l'autre. Cette espèce peut être distinguée d'avec l'autre cependant par les traits suivants: la gorge est blanche au lieu de foncée, il n'y a pas de bande blanche au-dessous de la gorge, et les longs poils de la bouche font défaut. La queue est légèrement fourchue au lieu d'être arrondie et laisse voir peu ou point de blanc sauf une étroite bande semi-terminale. Les parties inférieures sont distinctement rayées et les ailes ont une tache blanche à la base des primaires au lieu d'être tout à fait noires.

Indications sur le terrain. L'engoulevent d'Amérique voltige en plein jour et à la tombée de la nuit, tandis que l'engoulevent criard ne vole jamais en plein air avant le soir. On aperçoit très distinctement, au vol, une tache blanche à l'aile, qui, vue d'une certaine distance, ressemble à un trou de balle bien tranché. Sa façon de se précipiter comme une flèche vers la terre avec accompagnement de bruit sourd est aussi caractéristique de l'espèce.

Nid. Niche sur le sol en un endroit découvert, ordinairement sur les sommets dénudés de rochers aplatis, en plein air. Il dépose ses œufs par terre avec peu ou point de préparation; il les dépose aussi souvent sur les toits plats de constructions recouverts de graviers.

Habitat. L'Amérique du Nord et du Sud en allant au nord jusqu'aux limites des régions boisées; couve au Canada partout où il se trouve.

SOUS-ESPÈCES. On reconnaît au Canada plusieurs sous-espèces de cet oiseau, mais la seule qui apparaisse dans l'est du Canada est l'oiseau type—l'engoulevent du Canada de l'Est.

Bien qu'on l'appelle "Nighthawk" cette espèce n'a aucun rapport avec les rapaces quant à sa tenue, sa structure ou son apparence extérieure. Les grands yeux dirigés légèrement de front le font quelquefois prendre pour

un l
toit
grac
exéc
long
voit
alors
pieri
sour
teinc
mêm
des r
nisé

bien
presq
que
comr
molle
qu'il
puna
nuisi
seau
s'en
devr
insec
c'est

dans

dont

ment
tude é
mutue
qui s'é

42
Planch
Trai
vers l'au
que les
hérissée

un hibou par un observateur d'occasion. Niche assez souvent sur les toits plats des constructions, recouverts de graviers. On peut voir ces gracieux aéronautes évoluer à la tombée de la nuit, au-dessus des villes et exécuter avec leurs ailes très longues et résistantes des mouvements bizarres, longs, puissants, mais légèrement irréguliers. À un moment donné, on en voit un monter de plus en plus haut dans l'espace en rapides spirales, puis alors se retourner vers la terre et se précipiter verticalement comme une pierre qui tombe. Au moment où il tombe on entend un bourdonnement sourd en trémolo. Juste à l'instant où l'observateur s'attend à le voir atteindre la terre, l'oiseau se ressaisit et remonte en l'air pour recommencer les mêmes évolutions. Son chant n'est pas mélodieux et, cependant, du haut des régions supérieures son cri aigre et perçant nous arrive adouci et harmonisé par la distance.

Valeur économique. Il est peu d'oiseaux dont on peut dire autant de bien et si peu de mal. Il se nourrit exclusivement d'insectes et les prend presque tous au vol dans les hautes régions où ils s'accouplent et à une époque où leur destruction rend le plus de services. On est étonné de voir comme l'oiseau est petit une fois dépouillé de son épais manteau de plumes molles, mais il exige une forte quantité de nourriture. La liste des espèces qu'il capture comprend un grand nombre de fourmis, de scarabées, de punaises de courges, de punaises des bois, de jasses, et autres espèces nuisibles. L'habitude assez commune, par endroits, de se servir de cet oiseau comme point de mire pour s'exercer au tir est inexcusable, et ceux qui s'en rendent coupables devraient être sévèrement punis par la loi. L'on devrait se rendre compte que chaque infraction aux lois qui protègent les insectivores est plus grave qu'une contravention en principe contre l'Etat; c'est une attaque directe contre le bien-être de la communauté.

SOUS-ORDRE—CYPSELI. MARTINETS ET LEURS CONGÉNÈRES.

Un sous-ordre très répandu composé d'une famille dont nous n'avons dans l'est du Canada qu'une seule espèce.

FAMILLE—MICROPODIDÆ. MARTINETS.

Les martinets de l'Amérique du Nord sont divisés en deux sous-familles dont une seule, *Chaturinae* est représentée dans l'est du Canada.

Sous-famille—Chaturinae. Chatures, Martinets à queue épineuse.

Les martinets forment un groupe d'oiseaux ressemblant superficiellement aux hirondelles, mais ils sont d'une structure très différente, la similitude étant occasionnée par des besoins communs et non par des rapports mutuels. Nous donnons, sous le titre spécifique qui suit, une description qui s'applique à la famille entière.

423. **Le Martinet des cheminées.** (CHIMNEY SWIFT). *Chatura pelatica*. L., 5-43. Planche XXI B.

Traits distinctifs. La couleur brun de suie uniforme devenant plus claire à la gorge et plus foncée vers l'anus suffit presque pour faire reconnaître l'oiseau. On le reconnaît aussi tout de suite à ce que les tuyaux des penes de la queue (figure 39, p. 27) dépassent les barbes sous forme d'épines hérissées et aiguës.

Indications sur le terrain. Leurs singulières ailes, longues, étroites, en forme de massue, que l'on remarquera très bien dans l'illustration; le battement rapide et presque continu des ailes; la coloration profondément foncée; et l'habitude de pénétrer dans les cheminées sont des signes distinctifs et caractéristiques.

Nid. Autrefois dans le tronc des arbres creux ou dans une fissure de rochers et, maintenant, sur la majeure partie de son habitat, dans des cheminées abandonnées. Le nid est une solide structure de buchettes cimentées ensemble au moyen d'une glu naturelle sécrétée par les glandes salivaires. Les nids comestibles qui sont si recherchés par les épicuriens chinois se composent d'un ciment produit par un proche parent de ce martinet.

Habitat. L'est de l'Amérique septentrionale en allant au nord jusqu'aux limites des terres cultivées. Couve au Canada partout où il se trouve.

C'est une espèce intéressante, ressemblant à l'hirondelle quant à son apparence extérieure et à sa manière de poursuivre les insectes, mais elle est d'une structure bien distincte de celle de l'hirondelle. C'est un curieux exemple d'un développement parallèle de caractères absolument différents déterminé par des besoins de même nature. Les habitudes de cet oiseau ont complètement changé depuis l'apparition de l'homme blanc, et, après avoir abandonné les arbres creux, il ne compte plus guère maintenant que sur les cheminées pour y établir son nid. On ignore où ce martinet va passer l'hiver. Il ne faut pas cependant exagérer ce mystère, car il y a un grand nombre de martinets dans l'hémisphère occidental qui ressemblent beaucoup à celui-ci et on l'a probablement perdu de vue dans ses refuges d'hiver ou confondu avec des congénères étroitement alliés. Le martinet est la plupart du temps au vol et s'arrête rarement pour se reposer sauf dans une cheminée ou un autre creux. A l'automne, avant la migration, de grands nombres se rassemblent et, vers le soir, viennent s'abriter dans une vaste cheminée pour y passer la nuit. On peut les voir, sur la brune, sillonner l'air en tous sens auprès de la cheminée de leur choix, et, lorsque le soleil se couche, tournoyer jusqu'à ce que, ayant redressé leurs ailes verticalement au-dessus du dos ils se laissent tomber en battant des ailes dans ce refuge de nuit les uns à la suite des autres comme dans un semblant de gouffre en miniature. Ils se cramponnent en masses, par centaines, aux parois verticales de la cheminée comme autant d'amas de suie. Parfois il en est un, mal affermi, qui se détache et tombe de quelques pieds en faisant lâcher prise à d'autres au-dessous de lui. On entend un moment battre des ailes, puis un résonnement de fines brisures qui tombent jusqu'à ce que les oiseaux se cramponnent de nouveau et s'installent pour la nuit.

SOUS-ORDRE—TROCHILI. OISEAUX-MOUCHES.

Ces tout petits oiseaux ressemblent à des insectes, avec leur brillante coloration pareille à celle des fleurs, leur vol différent de celui des autres oiseaux et leur remarquable diversité de formes, constituent un ordre typiquement américain. D'une certaine façon, ils occupent beaucoup la même position dans le nouveau monde que les Souimangas dans l'ancien, mais la ressemblance entre les deux n'est que superficielle et il n'y a aucun lien de parenté. Beaucoup d'espèces sont éminemment spécialisées et laissent voir les formes les plus étranges dans le monde ailé, comprenant aigrettes, fraises, volants, et manchons, queues fantastiques, penes démesurées et becs énormes en formes de sabres ou effilés en forme d'alènes; mais le trait le plus remarquable chez ces oiseaux est la coloration d'un brillant métallique qui recouvre les diverses parties du corps et reluit au soleil. Ils se nourrissent principalement du suc des fleurs. La langue est très longue et extensible

con
me
con
pen
d'a
sem
inse

sou
a ce

dan
van

bris.
7
traits
A
toiles
H

reste
autr
insec
vibra
du d
dame
ailes
et le
d'ap
tion
celui
que c

nuisil
tance
qu'on
comp
et au
ne ser
elle p

I
plus
inférie
ajou

comme chez les pics, avec ses rebords tournés vers le milieu de façon à former un double tube usé à son extrémité comme la pointe d'un pinceau, constituant un excellent organe pour sucer les liquides. Ils absorbent cependant un grand nombre de petits insectes avec le suc des fleurs, lesquels d'après des expériences d'alimentation pratiquées sur des sujets en captivité, semblent être nécessaire à la santé de l'oiseau. Ce sont ordinairement des insectes minuscules qu'ils trouvent sur les fleurs dont ils extraient le suc.

En tant que groupe ces oiseaux fréquentent les régions tropicales et sous-tropicales et sont beaucoup plus nombreux en allant vers le sud; il y a cependant une espèce dans l'Est qui visite le climat du nord.

FAMILLE—TROCHILIDÆ. OISEAUX-MOUCHES.

Comme il n'y a qu'une seule famille d'oiseaux-mouches représentée dans l'est du Canada, on pourra consulter les rubriques précédentes et suivantes pour en trouver la description.

428. **Le Colibri à gorge rubis.** (RUBY-THROATED HUMMINGBIRD). *Archilochus colubris*. L., 3.74. Planche XXII A.

Traits distinctifs. La taille, le bec ténu (figure 40, p. 27) et la coloration métallique sont des traits distinctifs.

Nid. Une petite merveille de construction recouverte avec des parcelles de lichens et des toiles d'araignées, fixée au sommet d'une branche.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord jusqu'aux limites des terres à culture.

Les oiseaux-mouches volent en avant, en arrière, à droite, à gauche ou restent complètement suspendus dans les airs sans le moindre effort—un autre exemple de développement parallèle— un oiseau qui vole comme un insecte et qui possède cependant tout à fait la structure de l'oiseau. La vibration des ailes est tellement rapide qu'on ne peut la mesurer qu'au moyen du diapason employé pour l'étude des insectes. Ce système de vol est fondamentalement différent de celui des autres oiseaux et, par conséquent, les ailes diffèrent du type habituel. Elles sont longues, étroites, non flexibles, et le bréchet du sternum est très considérablement approfondi afin de servir d'appui aux grands muscles qui les mettent en mouvement. En proportion de son envergure l'oiseau-mouche a un bréchet trois fois plus grand que celui du pigeon qui est un oiseau de vol normal, ou quarante fois plus grand que celui de l'albatros.

Valeur économique. Si l'on se rappelle que certains petits insectes nuisibles sont les plus destructifs, on pourra se rendre compte que l'importance économique de l'oiseau-mouche peut être beaucoup plus considérable qu'on ne le soupçonne. A part le suc des fleurs, son régime alimentaire comprend des moucheron, des cousins, de minuscules abeilles, des guêpes et autres insectes qui se posent sur les fleurs et se nourrissent de pollen. Il ne semble pas qu'on puisse accuser cette espèce d'aucun dégât et, par contre, elle peut rendre des services tout à fait hors de proportion avec sa taille.

Ordre—Passeres. Oiseaux Percheurs.

L'ordre des Passereaux ou oiseaux percheurs constitue la division la plus considérable et la plus importante des espèces modernes. Les types inférieurs et plus généralisés d'oiseaux avaient autrefois l'ascendant; mais aujourd'hui se sont les Passereaux aux innombrables espèces qui dominent;

ils constituent à peu près sinon tout à fait la moitié de tous les oiseaux vivants et sont placés en tête de la classification par des savants méthodiques. Ils possèdent un plus grand nombre qu'aucun autre ordre, de traits qui leur sont propres à chacun, mais qui sont spéciaux relativement aux autres ordres, comme par exemple un appareil vocal muni de muscles spéciaux très compliqués, et bien d'autres caractères particuliers. En règle générale on peut assigner un tel oiseau à cet ordre par voie d'élimination, en constatant qu'il ne relève d'aucun des ordres précédents. Les pieds (figure 42 p. 27) ne sont pas palmés, le doigt de derrière est aussi long que celui du milieu, et tout le pied est bien constitué pour que l'oiseau puisse percher. Le bec est dur ou corné sans cire ou membrane de base, et les narines ne communiquent pas entre elles comme dans certains autres ordres. Deux sous-ordres sont représentés au Canada: *Clamatores*, les oiseaux criards, et *Oscines*, les oiseaux chanteurs.

SOUS-ORDRE—CLAMATORES. OISEAUX CRIARDS.

Ce sous-ordre est constitué sur une base de structure anatomique. Le nom anglais "Songless"—on les appelle en français "Criards"—n'implique pas qu'ils sont silencieux, mais que leur chant est moins harmonieux que celui des chanteurs et leur larynx moins spécialement développé. Une seule famille de ce sous-ordre apparaît au Canada, les Tyrannidés ou Moucherolles.

FAMILLE—TYRANNIDÆ. MOUCHEROLLES.

Description générale. Il est très facile, parmi les oiseaux canadiens, de reconnaître les moucherolles à leur bec (figure 42, p. 27) qui est relativement long, un peu aplati et élargi à la base, plus large que haut et légèrement recourbé à son extrémité.

Indications sur le terrain. Facile à reconnaître à l'état vivant par ses habitudes et ses attitudes caractéristiques avec lesquelles un observateur attentif arrive à se familiariser. Quand ils perchent ils se posent ordinairement dans une attitude verticale et restent immobiles sauf à s'ébranler parfois par un coup de queue. S'ils voient passer un insecte ils s'élancent et l'attrapent au vol d'un mouvement et d'un coup de bec rapide.

C'est l'une des familles les plus difficiles à identifier au point de vue de l'espèce. Certains moucherolles sont nettement caractérisés, mais, parmi les plus communs, il y a plusieurs espèces qui se ressemblent au point d'intriguer un ornithologiste expérimenté quand ils sont silencieux ou hors de leur habitat normal. Pour les identifier à l'état vivant il faut bien tenir compte de leur chant. Le chant de l'oiseau et le type d'habitat où on le trouve sont de bonnes indications pour le différencier quand il s'agit des espèces les plus embarrassantes.

Valeur économique. Ils se nourrissent presque entièrement d'insectes capturés au vol, leur large bec se prêtant très bien à ce genre de capture. Comme ils prennent la majeure partie de leur nourriture dans l'air non loin du sol, ils attrapent des variétés d'insectes que ne prennent pas les autres oiseaux. Les espèces trouvées dans leurs estomacs se composent de coléoptères, mouches, guêpes, tipules, fourmis, sauterelles, teignes des tentes et mites. De fait, ils s'attaquent à presque toutes les espèces d'insectes nuisibles et doivent être classés parmi les oiseaux très utiles.

443. **Le Moucherolle à queue en ciseaux.** (SCISSOR-TAILED FLYCATCHER). *Muscivora forficata*. L., 13 (à peu près). (Queue, 9). Ce moucherolle est un visiteur occasionnel à l'intérieur de nos frontières, venant de l'Amérique sous-tropicale. Il est impos-

sible
Caro
mém
profo
se réi
mens
sur l
diffici

4
ranni

T
des m
trem

Is
La coi
être d

N
de tigt
Le fai
beauc

H
partou

autou
niche
des é
de so
la po
si fail
hauts
à ses
côtés

1
mais
lieu à
mou
che à
tion e
sont e
cienne
l'abeil
mise c
sonne
exami
tenaie
et 2 in
compr
et des

452

9-01.

de la q
jaune sc

Trai

l'est du

sible de ne pas reconnaître cet oiseau: il est à peu près de la taille du moucherolle de la Caroline, de couleur cendré clair, avec les ailes plus foncées, la calotte écarlate ou orangée, même couleur sous les ailes, et avec une queue longue de 8 à 9 pouces, fendue à une profondeur de 6 pouces ou davantage, laquelle lorsque l'oiseau est au repos, s'ouvre et se referme comme une paire de ciseaux. Chose assez curieuse, l'un des meilleurs spécimens reconnus authentiques que nous ayons à notre disposition provient de York Factory, sur la baie d'Hudson. En présence d'un pareil spécimen de cette provenance, il est difficile d'affirmer positivement quelle espèce peut ou ne peut pas se trouver au Canada.

444. **Le Moucherolle de la Caroline.** (KINGBIRD, BEE MARTIN). *Tyrannus tyrannus*. L. 8-51. Planche XXII B.

Traits distinctifs. Coloration noire et blanche: la tache orangée de la couronne apparaît dans des moments d'excitation, et la queue noire visiblement terminée de blanc comme si on l'eût trempée dans de la peinture blanche.

Indications sur le terrain. Facile à reconnaître à l'état vivant au moyen des marques précitées. La couronne orangée cependant se voit rarement. A l'état vivant, la tête et la queue semblent être d'un noir mat en opposition vive avec le blanc des parties inférieures.

Nid. Sur les arbres, de 5 à 40 pieds au-dessus du sol; le nid est une jolie structure composée de tiges, d'herbes, et de débris végétaux, tapissée de duvet végétal, de radicelles et de fines herbes. Le fait que cet oiseau vient souvent nicher dans les vergers et non loin des terres à culture est beaucoup en sa faveur.

Habitat. L'Amérique du Nord vers le nord jusqu'aux limites des bois. Couve au Canada partout où il se trouve.

Le moucherolle de la Caroline est une espèce familière que l'on voit autour de nos maisons et de nos vergers, et la présence d'un couple venant nicher dans le voisinage est l'une des meilleures garanties contre les dégâts des éperviers ou des corbeaux. Ces oiseaux ne se montrent pas aux abords de son nid sans être vigoureusement poursuivis. Ce moucherolle se met à la poursuite des intrus avec une énergie qui étonne chez un oiseau si petit et si faible. Il ne peut pas leur faire grand mal, mais il sait les repousser et ses hauts cris annoncent de loin qu'il faut se méfier. Grâce à sa petite taille et à ses mouvements agiles dans l'air il peut attaquer un gros oiseau de tous côtés et se mettre en garde contre tout oiseau plus fort et moins agile.

Valeur économique. Le nom de "Kingbird" s'explique par lui-même, mais celui de "Bee Martin" qu'on lui assigne également donne naturellement lieu à des soupçons sur son régime alimentaire. On l'accuse de capturer les mouches à miel et l'on a des preuves irréfutables qu'il n'est pas sans reproche à cet égard. Le relevé que nous donnons ci-après montre que l'accusation est en partie fondée, mais il fait voir aussi que les abeilles capturées sont en majeure partie des bourdons dont on peut très bien se passer. L'ancienne croyance que le moucherolle étale sa brillante huppe pour amorce l'abeille qui est à sa portée, en lui faisant croire que c'est une fleur, peut être mise de côté comme étant de la pure légende, malgré que beaucoup de personnes y aient ajouté foi. Sur 264 estomacs de moucherolles de la Caroline, examinés en 1911, par le ministère de l'Agriculture des Etats-Unis, 22 contenaient un total de 61 abeilles, dont 51 étaient des bourdons, 8 des ouvrières et 2 indéterminées. Le reste des aliments se composaient d'autres insectes, comprenant de nombreuses espèces nuisibles, puis quelques fruits sauvages et des baies.

452. **Le Moucherolle à huppe.** (CRESTED FLYCATCHER). *Myiarchus crinitus*. L. 9-01. Parties supérieures d'un brun olivâtre tournant au roux sur les barbes internes de la queue. Gorge et haut de la poitrine d'un gris cendré. Parties inférieures d'un jaune soufre.

Traits distinctifs. La coloration précitée est distinctive. Aucun autre moucherolle dans l'est du Canada n'est ainsi coloré.

Indications sur le terrain. La couleur jaune vif des parties inférieures et la longue queue rousse sont les marques les plus frappantes. Son cri aigu, strident et prolongé de «oui-i-i-ip» et celui plus faible de «ouip-ouip-ouip» sont très caractéristiques, bien qu'on les confonde quelquefois avec ceux du moucherolle aux côtés olive.

Nid. Dans des trous abandonnés par les pics. Cet oiseau fait voir une prédilection pour les vieilles peaux de serpents dans la confection de son nid. C'est à peine si l'on trouve un nid appartenant à cette espèce qui n'en contienne une ou plusieurs.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord au Canada, tout le long de la frontière méridionale; couve partout où il se trouve.

C'est un moucherolle du sommet des arbres dans les bois touffus. On entend son cri constamment pendant l'été, mais rarement à une distance quelconque d'une épaisse forêt.

Valeur économique. Son régime alimentaire se compose surtout d'escarbots, sauterelles, fourmis, grillons, mouches et teignes. Il capture plus de guêpes parasites et d'escarbots que la plupart des oiseaux mais pas suffisamment pour contrebalancer ce qu'il détruit d'insectes malfaisants.

456. **Le Moucherolle brun.** (PHOEBE). *Sayornis phoebe*. L, 99. Planche XIII A.

Habitat. Les petits moucherolles verdâtres sont peut-être les plus difficiles des oiseaux américains à discerner. Heureusement chacun a son habitat typique et son chant caractéristique qui permettent de les différencier. Le moucherolle brun est le plus gros de ces petits oiseaux de nature intrigante, et le plus facile à identifier. On est très exposé à le confondre avec le moucherolle verdâtre, mais quand on le tient dans la main, on reconnaît facilement les pattes et les pieds plus gros et plus robustes de cette espèce-ci.

Indications sur le terrain. La tête du moucherolle brun semble un peu plus foncée et présente un contraste plus frappant avec le corps que chez les autres moucherolles. L'extension latérale de la queue est caractéristique et, chez les adultes, le manque de barres sur les ailes. Le cri de "Phébé" cependant, qu'il fait entendre rapidement en accentuant longuement la première syllabe, constitue l'indication la plus facile à reconnaître. Le cri du moucherolle verdâtre est plutôt allongé tandis que celui du petit moucherolle est court et détonnant.

Nid. Une simple construction faite de boue mélangée de mousse et d'herbes, et installée sous les ponts, les parties saillantes des édifices ou des rochers.

Habitat. L'est de l'Amérique en allant vers le nord jusqu'aux limites des régions boisées. Couve au Canada partout où il se trouve.

Ce moucherolle niche de préférence sur les solives de vieux ponts au-dessus de quelque petit ruisseau où il trouve dans l'atmosphère surmontant le cours d'eau une ample provision d'insectes. Dans bien des parties de ce pays il n'y a guère un pont où l'on ne rencontre pas un couple de moucherolles bruns en été. Toutefois, ces nids de boue ne s'aperçoivent pas seulement sous les ponts, car l'on en trouve collés aux moindres saillies sous les gouttières des édifices ou même sous les porches des habitations. C'est un oiseau doux et familier qui s'approche facilement de l'homme quand on l'attire. Malheureusement les grands nids de cette espèce sont souvent des repaires de milliers d'insectes parasites. On s'en débarrasse ordinairement en renversant les nids avec des bâtons et en y jetant de l'eau bouillante. Il vaut mieux encore se servir de poudre insecticide, ce qui fera disparaître les insectes malfaisants tout en conservant auprès des habitations cet oiseau si attrayant et si facile à apprivoiser.

459. **Le Moucherolle aux côtés olive.** (OLIVE-SIDED FLYCATCHER). *Nuttallornis borealis*. L, 7-39. Ressemble beaucoup à un gros moucherolle brun, mais on y remarque moins de vert olive et il présente de grandes taches foncées de chaque côté de la poitrine.

Traits distinctifs. Dans la main, les grandes taches foncées de chaque côté de la soitrine et les ouvertures sous-caudales avec pointes de couleur claire serviront à différencier cette espèce d'avec le moucherolle brun auquel il ressemble. Sur les côtés du dos, on remarque ordinairement cachées sous les ailes fermées, mais parfois étalées au-dessus, des surfaces de plumage fin et soyeux de couleur blanche ou crème. C'est ce qui permettra de distinguer cette espèce d'avec toutes les autres.

Ind
Carolin
taches
distinct
du dos,
d'appel
peu d'a
Hal
frontièr

C
rence
de très
et d'u
vers le
un ém

V
une gr
faisan

461
Très se

Trai
mouche
ment pl

Indic
rolle bru
diane bli
d'appel c
duire par
sante à l

Nid.
recouver

Habi
l'ouest ju

So
des rég
bés da
lancolic

Va
sembla
raison c
à fréqu
pour l

463.
donax fla
couleur,
vert olive

Traits
facile à re

Indica
dication.
Son Bi-uni
accentuée.

Nid.
fines.

Indications sur le terrain. A l'état vivant, ce moucherolle ressemble au moucherolle de la Caroline à poitrine foncée plutôt qu'au moucherolle brun ou à tout autre moucherolle. Les deux taches foncées de la poitrine séparées par une ligne blanche permettent assez facilement de faire la distinction. Lorsque les plumes blanches et soyeuses s'aperçoivent au-dessus des ailes sur les côtés du dos, ainsi qu'il arrive parfois, il est impossible de ne pas bien identifier cette espèce. Son cri d'appel ressemble un peu, quant au timbre et à l'exécution, à ceux du moucherolle à huppe, mais un peu d'attention et d'expérience suffiront pour faire apprécier la différence entre les deux.

Habitat. L'Amérique du Nord. Couve au Canada depuis la limite des forêts jusqu'aux frontières des régions régulièrement cultivées.

C'est un oiseau typique des crêtes brûlées du nord. Il perche de préférence sur le sommet d'un grand arbre mort et solitaire d'où l'on peut entendre de très loin sa voix pénétrante. Dans ses migrations il est plutôt clairsemé et d'une distribution locale; et bien qu'il en passe de grands nombres à travers les régions populeuses du sud, il est ordinairement considéré comme un émigrant peu commun.

Valeur économique. Il est trop rare dans les régions habitées pour avoir une grande valeur économique, mais il est certainement un oiseau bien-faisant.

461. **Le Moucherolle verdâtre** (WOOD PEWEE). *Myiochanes virens*. L., 6-53. Très semblable comme coloration au moucherolle brun, mais plus petit.

Traits distinctifs. Le moucherolle verdâtre peut être différencié d'avec le brun et les autres moucherolles de taille semblable, par son petit tarse et ses longues ailes, lesquelles sont manifestement plus longues que la queue.

Indications sur le terrain. Le moucherolle verdâtre ne joue pas de la queue comme le moucherolle brun. Les côtés de la poitrine sont aussi légèrement plus foncés ce qui donne une ligne médiane blanche plus distincte et plus étroite. On le reconnaîtra cependant plus facilement à son cri d'appel qui ressemble beaucoup à celui du moucherolle brun mais est plus prolongé et peut se traduire par ces notes: *pi-e-oui*, qu'il prononce sans accent appréciable mais avec une inflexion croissante à la fin. Le cri de la femelle varie en ce qu'elle élimine la dernière note, ce qui fait *pi-i-i*.

Nid. Une construction bien façonnée mais légère, faite de plantes fibreuses et de radicelles recouvertes de lichens et fixée sur une branche à une hauteur de 20 à 40 pieds.

Habitat. Il est répandu sur à peu près toute la partie est de l'Amérique du nord en allant vers l'ouest jusqu'aux prairies. Il couve au Canada partout où il se trouve.

Son cri plaintif et prolongé de *pi-e-oui* est une note caractéristique des régions boisées au printemps, et après que les autres oiseaux sont retombés dans le silence au cœur de l'été on entend encore parfois cette note mélancolique.

Valeur économique. Le régime alimentaire de cet oiseau est tout à fait semblable à celui des autres moucherolles mais modifié, bien entendu, en raison de son séjour dans les bois. Comme il n'est pas casanier et se plaît à fréquenter librement les bosquets et les vergers, c'est un oiseau précieux pour l'agriculteur.

463. **Le Moucherolle à ventre jaune.** (YELLOW BELLIED FLYCATCHER). *Empidonax flaviventris*. L., 5-63. Semblable au moucherolle verdâtre et au brun comme couleur, mais de plus petite taille, et avec les taches brunes et olive remplacées par un vert olive distinct et le blanc par un jaune soufre terne.

Traits distinctifs. Grâce à la couleur distinctement jaune de tout l'oiseau, c'est le plus facile à reconnaître parmi les petits moucherolles.

Indications sur le terrain. La couleur jaune particulièrement sur la gorge, est la meilleure indication. Son cri de *Ti-pi-a* est distinctif—trois syllabes, celle du milieu étant la plus accentuée. Son *Bi-voic* ressemble un peu au *Phébé* du moucherolle brun, mais la première syllabe n'est pas accentuée.

Nid. Niche sur le sol; son nid est construit avec de la mousse garnie, à l'intérieur, d'herbes fines.

Habitat. Depuis les grandes plaines en allant à l'est et au nord jusqu'au bout des régions cultivées. Couve au Canada sur la frontière nord de son habitat, et non dans la région inférieure des grands lacs.

C'est encore une moucherolle des bois mais il fréquente moins les grands arbres; il préfère les fourrés qui bordent les forêts.

Valeur économique. Régime alimentaire très semblable à celui des autres petits moucherolles. Son habitude de se tenir sur les bords des forêts qui longent les terres à culture en fait un oiseau précieux pour le cultivateur.

465. **Le Moucherolle d'Acadie.** (ACADIAN FLYCATCHER). *Empidonax virescens*, L, 5-63. Un petit moucherolle à peu près de la même taille que le moucherolle à ventre jaune, le moucherolle des aulnes, et le petit moucherolle; plus petit que le moucherolle verdâtre et beaucoup plus petit que le moucherolle brun. Comme couleur, se rapproche de ce dernier mais est distinctement vert olive dans les parties supérieures et plus jaunâtre dans les parties inférieures. Les bandes des ailes sont plutôt prononcées.

Traits distinctifs. Cette espèce se rapproche tellement, comme taille et coloration, du moucherolle des aulnes et du petit moucherolle qu'il est extrêmement difficile de les différencier. Il n'est pas aussi jaune que le moucherolle à ventre jaune, n'ayant de jaune pur sur aucune de ses parties, mais c'est le plus jaunâtre et le plus verdâtre des autres petits moucherolles. Il est très rare au Canada et on ne peut actuellement accepter son signalement que de la part d'ornithologistes compétents.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord en allant au nord jusqu'aux frontières du Canada le long de l'extrémité ouest du lac Erié.

466. **Le Moucherolle des aulnes.** (TRAILL'S FLYCATCHER). *Empidonax traillii*, L, 6-09. Un petit moucherolle légèrement plus gros que le moucherolle à ventre jaune ou le petit moucherolle et presque de la même coloration que ce dernier et que le moucherolle d'Acadie.

Traits distinctifs. Le dos est plus brun que chez le moucherolle d'Acadie et dépourvu de la teinte verdâtre de ce dernier. Quelquefois on ne peut guère le différencier du petit moucherolle que par sa taille.

Indications sur le terrain. Les détails de couleur ou de taille sont peu utiles sur le terrain pour l'identification de cette espèce ou de la suivante. On peut se fier cependant à l'habitat et au cri d'appel. Il fréquente les bosquets d'aulnes, de saules, ou de framboisiers et les épaisses lisières de marais. Le petit moucherolle est un oiseau des bois; et bien que l'on puisse parfois rencontrer l'un ou l'autre dans d'autres habitats, le voisinage est ordinairement très utile à considérer au point de vue de l'identification. Il y a aussi le cri d'appel que l'on reconnaît facilement; il peut se rendre par: *i-zi-i-opp*, avec l'accent sur la deuxième syllabe, tandis que celui du petit moucherolle est un *tchébec* détonant qu'il répète plusieurs fois avec vivacité.

Nid. Dans une fourche d'arbuste près du sol; il le construit avec de grosses herbes, du duvet végétal et des plantes fibreuses garnies d'herbes fines.

Habitat. Le moucherolle des aulnes en tant qu'espèce, fréquente presque toute l'Amérique du Nord. La sous-espèce typique de l'Est, le moucherolle des aulnes proprement dit, se rencontre depuis la côte orientale de l'est du Canada en allant vers l'Ouest à travers les montagnes.

SOUS-ESPÈCES. Il y a deux sous-espèces de moucherolle des aulnes au Canada. Le type oriental, moucherolle des aulnes, *E. t. alnorum* est le seul qui se rencontre dans le territoire que nous étudions. Le moucherolle des aulnes de l'Ouest, *E. t. traillii* est un type plus méridional et plus occidental.

Valeur économique. Semblable à celle des autres moucherolles. Il se nourrit presque entièrement d'insectes, il détruit surtout les espèces qui fréquentent les terres incultes.

467. **Le Petit Moucherolle.** (LEAST FLYCATCHER). *Empidonax minimus*, L, 5-41. C'est le plus petit de nos moucherolles. Sa coloration est celle du type moucherolle brun et, à cet égard, on ne peut que très difficilement le différencier d'avec les moucherolles d'Acadie et des aulnes.

Traits distinctifs. Plus brun sur le dos et dépourvu de la nuance verdâtre qui distingue le moucherolle d'Acadie, mais presque identique au moucherolle des aulnes comme couleur; on ne peut parfois le différencier d'avec celui-ci que par sa taille. Son habitude de fréquenter les régions boisées plutôt que les broussailles des contrées désertes pourra aider à l'identifier et son cri d'appel est différent de celui de toute autre espèce: c'est un rapide et détonant *tché-bec* qu'il répète souvent plusieurs fois et qui rappelle assez bien une toux intermittente.

N
duvet
H
delà d

tions
des t

de ce
tact j
mum

I
de la
la clas
les rel
établi
mence
comm
gument
n'entr
que le
partic
Les di
les des

Le
Les m
tôt tec
elles se

474
XXIII B

Trait
marques
(figure 66
caractéri
(figure 44
allongées

Indic
tuent des

Nid.
du printe

Habit

SOU
géographi
nombreux
aspects.
c'est l'oise
est l'aloque
problablen
le déboisa

Nid. Ordinairement sur une fourche d'arbre à une hauteur de 15 à 30 pieds; construit avec duvet végétal, plantes fibreuses, radicelles et longs poils.

Habitat. Dans tout le Canada, vers l'Ouest jusqu'aux montagnes et vers le Nord jusqu'au delà des régions cultivées. Couve au Canada partout où il se trouve.

Cet oiseau fréquente les vergers et les arbres au voisinage des habitations, les haies très développées et autres endroits familiers où sa proximité des terres cultivées rend ses services remarquablement avantageux.

Valeur économique. Son régime alimentaire ne diffère pas beaucoup de celui de ses congénères, mais sa familiarité et sa confiance le mettent en tact journalier avec l'homme auprès de qui ses qualités utiles ont un maximum d'influence.

SOUS-ORDRE—OSCINES. OISEAUX CHANTEURS.

Le sous-ordre *Oscines* est une vaste division des oiseaux placés en tête de la liste de ceux qui présentent le plus haut degré de développement dans la classe *Aves*. Il comprend un grand nombre de familles et d'espèces dont les relations exactes d'un très grand nombre n'ont jamais été définitivement établies. Suivant la coutume américaine actuellement, ce sous-ordre commence avec les Alouettes et se termine avec les Grives qui sont considérées comme constituant la famille la plus développée. Les caractères qui distinguent les *Oscines* d'avec les *Clamatores* sont techniques et anatomiques et n'entrent pas dans le cadre d'un ouvrage de vulgarisation. Comme l'indique leur nom, ces oiseaux possèdent des organes et muscles vocaux, très particulièrement développés dont on a tenu compte dans leur classement. Les divers membres de ce sous-ordre se reconnaissent plus facilement d'après les descriptions des familles que d'après ce titre général.

FAMILLE—ALAUDIDÆ. ALOUETTES.

Les alouettes composent une grande famille d'une vaste distribution. Les marques distinctives qui caractérisent cette famille sont d'un ordre plutôt technique et comme nous n'avons qu'une espèce à étudier au Canada, elles seront décrites sous le titre de l'espèce qui va suivre.

474. **L'Alouette ordinaire.** (HORNED LARK). *Otocoris alpestris*. L, 7-75. Planche XXIIIB.

Traits distinctifs. L'ongle du doigt postérieur très allongé (figure 44b, p. 27) est une des marques distinctives des alouettes. On retrouve cependant cette particularité chez la farlouse (figure 60, p. 29) et le plectrophane; ce dernier cependant est un moineau ayant le bec conique qui caractérise les moineaux et qui est très différent de celui des alouettes. L'alouette ordinaire (figure 44a, p. 27) se distingue par sa gorge jaune avec gorgette noire au-dessous, et deux petites touffes allongées en forme de cornes au-dessus des oreilles (figure 44a, p. 27).

Indications sur le terrain. Les taches de couleur sur les parties supérieures et les cornes constituent des indications faciles à reconnaître.

Nid. Sur le sol. Il est fait avec des herbes sèches; on le trouve souvent dans la neige au début du printemps.

Habitat. On trouve cet oiseau sous ses diverses formes dans toute l'Amérique du Nord.

SOUS-ESPÈCES. L'alouette ordinaire comprend un grand nombre de races ou sous-espèces géographiques. Elle est très répandue dans l'Amérique du Nord et comme elle s'adapte à de nombreuses et diverses conditions, elle s'est développée dans différentes parties du pays sous divers aspects. Ainsi dans les contrées désertes elle est petite, grêle et pâle, tandis que, au nord-est où c'est l'oiseau type, elle est forte et vivement colorée. La forme plus commune dans l'est du Canada est l'alouette ordinaire des prairies: *O. a. praticola*. Autrefois lorsque la contrée était boisée c'était probablement l'alouette des prairies et elle ne devait pas se rencontrer dans l'est du Canada. C'est le déboisement, la création de prairies artificielles qui lui a permis de venir s'y établir, et aujourd'hui

elle y couve régulièrement. Dans le nord, à l'est de la baie d'Hudson, on rencontre le type original que nous avons décrit: *O. a. alpestris* lequel n'a pas maintenant de nom vulgaire reconnu que nous appelons l'Alouette ordinaire de l'Est. C'est un grand oiseau avec une forte teinte de jaune sur la face et la ligne des sourcils. Comme la différence moyenne dans la longueur totale est d'environ un demi-pouce et comme toutes les tailles intermédiaires peuvent se présenter, on comprendra qu'il peut être assez difficile de différencier les divers types de cette espèce. On a essayé dans l'illustration, de représenter la différence dans la coloration. L'alouette ordinaire de l'Est n'apparaît dans les districts colonisés de l'est du Canada qu'à titre de migrateur hivernal et rarement, sauf dans les Provinces Maritimes où c'est le type hivernal ordinaire. Une autre race, l'alouette ordinaire de Hoyt, *O. a. hoyti*, est propre au Nord; elle reproduit à l'ouest et au nord-ouest de la baie d'Hudson. Les couvertures des oreilles brunâtres au lieu de grisâtres permettent de l'identifier, mais la différence n'est pas grande. Ce dernier type se rencontre parfois dans la région des grands lacs inférieurs à titre de migrateur hivernal.

La distribution des diverses races et leurs migrations au Canada n'ont pas été complètement déterminées et ce travail comporte de telles difficultés qu'il est inutile d'essayer à déterminer les sous-espèces sans le concours d'un ornithologiste et une bonne collection de spécimens authentiques comme moyen de comparaison.

L'alouette ordinaire est un oiseau de plein air qui fréquente les champs incultes, les grèves et les routes. En hiver elle se nourrit principalement des graines de mauvaises herbes qui percent la neige et il s'en trouve beaucoup sur les routes fréquentées, tant pour manger les herbes qui croissent sur les bords que pour recueillir le grain partiellement digéré dans le crottin laissé par les chevaux. Il en passe quelquefois en hiver de grandes compagnies. C'est dans ces occasions que l'on devrait rechercher les plus rares types migrants.

FAMILLE—CORVIDÆ. GEAIS ET CORNEILLES.

La famille des Corneilles est très grande et très variée; elle comprend beaucoup d'oiseaux magnifiques et aux couleurs très vives; de fait le fameux oiseau de paradis lui est étroitement allié. Le bec (figure 45, p. 28) en est la partie la plus facile à reconnaître. Il est passablement long et fort avec un culmen bien arqué. À la base, sont d'épaisses touffes de soies longues et raides qui recouvrent les narines. Les pics et les mésanges ont quelque chose de semblable mais celles-ci sont toutes petites et ceux-là possèdent d'autres caractères distinctifs. Ce ne sont pas, à proprement parler, des oiseaux chanteurs; leur voix est enrouée et rauque, mais leurs organes vocaux sont extrêmement compliqués et il en est quelques-uns à qui l'on peut faire articuler certains mots. Ils comptent parmi nos espèces les plus intelligentes et certains auteurs les ont classées en tête de la liste de tous les oiseaux.

Sous-famille—*Garrulinae*. Pies et Geais.

Oiseaux de taille moyenne; un bon nombre sont vivement colorés et sont garnis de houppes et de queues flottantes. On peut très facilement les reconnaître d'après la description de chaque espèce.

475. **La Pie d'Amérique.** (MAGPIE) *Pica Pica*. L, 15-20. (Queue, 10). Le corps légèrement plus gros que celui d'un geai, huppé, mais beaucoup plus long en raison de sa queue qui atteint environ 10 pouces. Coloration frappante à cause des contrastes de blanc et de noir. La tête, le cou jusqu'au haut de la poitrine sont noirs; le dos, la queue et une bonne partie des ailes sont noirs et à reflets verdâtres sur les ailes et la queue. Une barre blanche très apparente sur le dos au-dessus des ailes. Barbes internes des primaires, bas de la poitrine et parties inférieures toutes blanches.

Traits distinctifs. Facile à reconnaître à sa longue queue et aux contrastes de blanc et de noir.

I
monc
centr
S
d'une
par d

oise:
et pl
et la
que
port
uns
intro
de p
pour

4
XXIV
T)
In
bleus
sont d
grange
N
H
Couve

par u
appre
reur
des e
l'auto
metti
pas ti

tôt un
tour
pas d
rit rég
autou

48
Planch
Tra
jeunes
noirs.

Ind
Nig
et de pl
qui son
Hal
SOI
légères
le plus
d'Unga

Habitat. Comme espèce, la pie fréquente les régions tempérées de l'ancien et du nouveau monde. Le type américain est plutôt un oiseau de l'Ouest; il fréquente régulièrement les provinces centrales de la Prairie et apparaît parfois plus à l'Est.

SOUS-ESPÈCES. La pie d'Amérique est une sous-espèce connue sous le nom *P. p. hudsonia* d'une espèce commune tant à l'ancien qu'au nouveau monde, et ne diffère de la pie d'Europe que par des détails sans importance. C'est une question à discuter pour les experts.

Ce n'est pas sans quelque hésitation que nous incluons la pie parmi les oiseaux indigènes du Canada. L'espèce est commune dans le Nord-Ouest et plusieurs de ces oiseaux nous ont été signalés dans les Provinces maritimes et la région des grands lacs inférieurs, qui nous semblent aussi authentique que possible sans les spécimens. En 1879, un certain nombre furent importés d'Angleterre et mis en liberté à Lévis en face de Québec. Quelques-uns des signalements se rapportent peut-être à la progéniture de ces oiseaux introduits dans le pays et non à des indigènes. Nous serions très désireux de posséder des spécimens de ces oiseaux de l'Est. L'espèce est trop rare pour l'étudier au point de vue économique.

477. **Le Geai huppé.** (BLUE JAY). *Cyanocitta cristata*. L., 11·74. Planche XXIVA.

Traits distinctifs. La huppe et la coloration sont très caractéristiques.

Indications sur le terrain. La prédominance du bleu dans la coloration d'ensemble, les bordures bleues de la queue, et la huppe. Le vol du geai huppé est facile à reconnaître. Ses nombreux cris sont distinctifs et varient entre le cri rauque de *djé-djé*, son grincement comme celui d'une porte de grange et divers gloussements doux et familiers.

Nid. Composé de branchettes et de racines, de 10 à 20 pieds du sol.

Habitat. L'est de l'Amérique depuis les confins des régions habitées jusqu'au golfe du Mexique. Couve partout où il se trouve au Canada.

Le geai huppé est alerte, curieux et malfaisant. Il est facilement attiré par un bruit étranger dans les bois ou par un être en mouvement et il s'en approche sournoisement; s'il reconnaît un ennemi, il se sauve plein de terreur en poussant des cris perçants. C'est ainsi que des geais ont bien gêné des expéditions de chasse et causé toute sorte d'ennuis aux chasseurs. À l'automne, il est prévoyant et amasse des glands qu'il a la précaution de mettre de côté dans des crevasses d'arbres et autres cachettes. On ne sait pas très bien si jamais il revient chercher ses provisions.

Valeur économique. Au point de vue économique le geai occupe plutôt une place douteuse. Quant à sa nourriture il est carnivore et mange tour à tour insectes, fruits, glands, grain, œufs ou oisillons. Il n'y a pas de doute que, pendant la saison des glands, c'est de ce fruit qu'il se nourrit régulièrement. C'est un oiseau dont il ne faut pas encourager la présence autour des vergers quand les autres oiseaux plus utiles font leur nid.

484. **Le Geai du Canada.** (CANADA JAY, WHISKEY JACK). *Perisoreus canadensis*. Planche XXIVB.

Traits distinctifs. Taille: coloration gris neutre avec calotte noire et front blanc. Les jeunes que l'on aperçoit rarement avec leur plumage primitif ont la tête et le cou uniformément noirs. Tous ont un plumage lâche, duveteux et inégal (ragged).

Indications sur le terrain. Taille, coloration d'un gris uniforme, face et front blancs.

Nid. Construit de petites branchette, de plantes fibreuses, soigneusement garni de fourrure et de plumes de façon à former une construction compacte et profonde servant à protéger les œufs qui sont quelquefois éclos à une température de 30 degrés au-dessous de zéro Fahrenheit.

Habitat. Les bois de conifères du Nord à travers tout le continent.

SOUS-ESPÈCES. Il y a plusieurs sous-espèces de cet oiseau, lesquelles présentent de très légères différences. Dans l'est du Canada, le geai de l'Est du Canada qui est l'oiseau type, est le plus répandu avec le geai du Labrador, *P. c. nigricapillus*, qui habite Terre-Neuve et la péninsule d'Angava.

Le geai du Canada, connu sous le nom vulgaire de pie, possède d'une façon exagérée à peu près toutes les caractéristiques du geai huppé. Tous les villégiateurs dans les forêts du nord connaissent le "Wiskey Jack". Dès que l'on allume un feu de campement, on est sûr de le voir apparaître en quête de déchets de table. Il est très friand des restes de gibier et, à peine s'il a entendu le coup de carabine qu'il est déjà sur les lieux pour attraper quelque lambeau de chair. Son chant présente toute sorte de surprises pour ceux qui ne le connaissent pas bien. De fait, dans son propre habitat, tout chant d'oiseau que l'on ne saurait attribuer à une autre espèce peut être provisoirement assigné au geai du Canada.

Valeur économique. C'est essentiellement un oiseau des forêts sans limites et il ne se rencontre que rarement dans les régions peuplées. Sa valeur économique est très semblable à celle du geai huppé mais il se tient trop à l'écart pour être nuisible au cultivateur.

Sous-famille—Corvinae. Corneilles.

Les corneilles forment une famille bien caractérisée, d'apparence remarquablement semblable. Elles sont répandues à peu près partout et pour leur description il n'y a qu'à se reporter à la planche XXV A. Le freux d'Europe appartient à cette division.

486. **Le Corbeau.** (RAVEN). *Corvus corax*. L, 22. Semblable à la corneille (planche XXV A) mais plus gros.

Traits distinctifs. Le corbeau dans son apparence extérieure est une très grosse corneille. Le caractère le plus saillant est la forme allongée et pointue des plumes de la gorge; elles sont posées distinctement l'une sur l'autre sans être fondues ensemble comme chez la corneille.

Indications sur le terrain. Outre la taille, qui constitue toujours un signe incertain dans une vaste étendue de plein air, la marque la plus certaine est le cri de l'oiseau. Son croassement est rauque et strident et non pas clair et distinct comme le cri de la corneille. Il y a cependant de jeunes corneilles qui croassent presque absolument comme le corbeau et, quand on est en présence des deux espèces, il faut quelquefois avoir recours à d'autres indications. Quand on aperçoit un corbeau on peut facilement s'imaginer ses caractères saillants quant à la forme et au vol, mais nous devons avouer qu'ils sont rarement perceptibles à l'observateur ordinaire avant que l'on ait identifié l'oiseau.

Nid. Ordinairement sur des saillies de rochers, quelquefois sur de grands arbres; le nid se compose de buchettes.

Habitat. Cette espèce se rencontre tant dans l'ancien que dans le nouveau continent jusque dans les régions polaires où sa livrée noire contrastant avec la blancheur de ce milieu semble combattre la tendance trop facile à étendre la théorie de la coloration protectrice à tous les animaux de la création. Il fréquentait autrefois tout le Canada mais il se cantonne maintenant dans les parties les moins habitées au nord et au sud, le long des chaînes de montagnes sur les deux littoraux et pénètre assez loin jusque dans les Etats-Unis.

SOUS-ESPÈCES. Cette espèce se divise en plusieurs races géographiques. Le corbeau européen est l'oiseau type. Nous avons au Canada le corbeau du Nord, *C. c. principalis*. Les divers types présentent en somme peu de différences.

La tradition veut que le corbeau soit un oiseau de mauvais augure. Avec sa couleur sombre, son cri lugubre, ses habitudes sauvages et solitaires, il remplit le même rôle dans le Nord que le vautour dans le Sud. Il se tient à l'écart des endroits fréquentés par l'homme. Au fur et à mesure que la civilisation a progressé dans les vastes contrées primitives, le corbeau, contrairement à son congénère la corneille, s'est éloigné, et il est devenu aujourd'hui ce qu'il était au début, un oiseau des lieux déserts. Si l'on en juge seulement par les nécessités physiques et le régime d'alimentation des deux espèces, on est naturellement porté à croire que le corbeau peut vivre dans

les
s'ac
sou
con
aug
colc

qu'i
de g
proj
et d
pou
app
que

19.30
7
pas si
H
A
H
S
mais

la co
tiers
Il n'
pays
dans
oisea
le Su
dure:

pas s
mais
conce
tôt d
mens
l'Am
l'Agri
grand
surto
nourr
mois
décen
des gl
d'inse
truit,
aussi
même

les régions habitées aussi bien que la corneille. Il est omnivore et peut s'adapter à presque toute sorte de nourriture. Il est robuste et peut vivre sous des climats et dans des conditions qui seraient fatals à son plus faible congénère, et cependant, pour certaines raisons inexplicées, les corneilles augmentent et les corbeaux diminuent en nombre à mesure que le pays se colonise.

Valeur économique. Le corbeau prend une nourriture tant végétale qu'animale, mais préfère de beaucoup cette dernière. Il convoite les restes de gibier laissés par le chasseur ou le gibier lui-même, quand il peut se l'approprier. Il rôde autour des nids des autres oiseaux et s'empare des œufs et des oisillons. Au bord de la mer, il fouille les rivages à la marée basse pour y trouver des crabes et autres crustacés ou tout ce que la mer peut lui apporter de mangeable. Comme il évite plutôt les régions cultivées, il n'a que peu d'influence directe sur les récoltes.

488. La **Corneille d'Amérique**. (AMERICAN CROW). *Corvus brachyrhynchos*. L., 19.30. Planche XXV A.

Traits distinctifs. Peut être confondue avec le corbeau mais l'oiseau est plus petit et n'a pas sur la gorge les plumes lancéolées, longues et pointues de celui-ci.

Indications sur le terrain. Son aspect général que l'on apprend vite à connaître.

Nid. Sur les arbres; construits avec de petites branches.

Habitat. Toute la zone tempérée de l'Amérique du Nord.

SOUS-ESPÈCES. Deux sous-espèces de la corneille de l'Amérique se présentent au Canada; mais nous n'avons dans l'Est que l'oiseau type, la corneille de l'Est.

Alors que le corbeau disparaît en présence des progrès de la civilisation, la corneille augmente en nombre. Elle est omnivore, se nourrissant volontiers de n'importe quoi depuis la chair corrompue jusqu'au maïs germant. Il n'y a pas de doute que la corneille s'est énormément répandue dans le pays depuis la disparition des forêts et il est probable que son avènement dans l'est du Canada date de l'arrivée de l'homme blanc. C'est un oiseau partiellement migrateur. La plupart des corneilles s'en vont dans le Sud en hiver, mais un bon nombre, attirées par les abattoirs et les tas d'ordures ménagères au voisinage des villes, demeurent en permanence au pays.

Valeur économique. La valeur économique de la corneille ne peut pas se résumer en quelques mots. Elle est certainement très bienfaisante mais elle fait aussi beaucoup de dégâts. Seulement, le mal qu'elle fait est concentré et facile à apprécier, tandis que le bien est réparti çà et là, est plutôt difficile à établir. Les résultats détaillés d'environ un millier d'examen d'estomacs et des témoignages provenant de toutes les parties de l'Amérique du Nord ont été publiés dans le Bulletin n° 6 du département de l'Agriculture des Etats-Unis, par W.-A. Barrows et E.-A. Schwarz. Le plus grand reproche qu'on lui fait est de manger les jeunes pousses de céréales, surtout du maïs. On a constaté que le maïs constitue le 29 pour cent de sa nourriture annuelle et, chose assez curieuse, depuis le mois de mai jusqu'au mois d'août, il n'en composait que du 8.4 au 17.7 pour cent et augmentait en décembre jusqu'au 48.2 pour cent, alors que ces grains ne peuvent être que des glanures des champs moissonnés. La corneille mange aussi beaucoup d'insectes et si l'on compare les espèces nuisibles avec les utiles qu'elle détruit, la balance penche évidemment en faveur de l'oiseau. Elle se nourrit aussi considérablement de souris et autres rongeurs et de reptiles; c'est même la nourriture qu'elle préfère à toute autre. Elle recherche avidement

à l'automne les fruits d'arbres forestiers (glands, faïnes, etc). Si alors on en juge seulement par son régime alimentaire, la corneille est un oiseau pré-cieux. Il faut cependant envisager la question autrement, car on ne peut pas ignorer qu'elle fait tout de même des dégâts; il importe peu au cultivateur qu'elle détruise toutes les chenilles dans son champ si elle emporte également tout le grain. D'une façon générale, il ne paraît guère y avoir de bonne raison pour prendre à son égard de nouvelles mesures de précautions; il n'y a d'ailleurs aucun danger qu'elle disparaisse et elle a probablement besoin d'être surveillée.

FAMILLE-ICTERIDÆ. ÉTOURNEAUX D'AMÉRIQUE.

Cette famille comprend les étourneaux, orioles et étourneaux des prés qui représentent sur ce continent les sansonnets ou étourneaux d'Europe. Ils sont étroitement alliés aux moineaux et l'on ne peut pas nettement les différencier dans une description ordinaire. La plupart de ces oiseaux ont un long bec conique et pointu (figures 46, 47, 48, 49, p. 28) et quelques-uns ont le milieu du culmen qui remonte en forme de quille sur le front. Le goglu et l'étourneau ordinaire ont tout à fait des becs de moineaux mais ce sont des becs raccourcis d'ictérinés plutôt que de passereaux. On peut également différencier ces espèces par leurs taches de couleur.

494. **Le Goglu.** (BOBOLINK). *Dolichonyx oryzivorus*. L., 7-25. Planche XXV B.

Traits distinctifs. Le mâle printanier avec son plumage pie se reconnaît immédiatement. La femelle et les oiseaux d'automne de l'un ou l'autre sexe n'ont aucun rapport comme couleur avec le mâle du printemps et sont facilement confondus avec certains moineaux (bec, figure 46, p. 28). A l'automne avec leur nouveau plumage ils sont de couleur chamois, non rayés sur les dessus et fortement rayés en dessous. La femelle printanière, plus fatiguée et fanée et légèrement olivâtre ressemble beaucoup à la femelle du moineau domestique, mais on la reconnaît à son dos et sa couronne fortement rayés et à sa ligne couleur chamois au-dessus de l'œil.

Indications sur le terrain. Le mâle printanier n'exige aucune indication spéciale pour être reconnu; les raies et le jaune des autres plumages et la ligne chamois de l'œil avec les barres sur la couronne sont de bonnes marques d'identification qui devraient avec l'habitat et l'ensemble des caractères empêcher qu'il y ait confusion.

Nid. Sur le sol; construit avec des herbes sèches.

Habitat. L'Amérique du Nord; il hiverne dans l'Amérique du Sud; dans l'est du Canada, le long de la frontière méridionale, couvant partout où il se trouve.

Le goglu, au printemps et en été, est un oiseau qui fréquente les champs de foin et de trèfle. On peut le voir tous les jours d'été, perché sur une clôture du voisinage ou s'élançant dans les airs en frissonnant des ailes et faisant entendre son chant extatique. Plus tard dans la saison, le mâle aux gestes folâtres se dépouille de ses couleurs gaies pour endosser le jaune d'ocre plus terne avec les raies brunâtres de la femelle. Son chant est remplacé par des tintements métalliques et, en compagnie de plusieurs centaines d'autres oiseaux de cette espèce réunis en troupes, il recherche les marais jusqu'à l'automne. Au moment de quitter le Canada pour ses quartiers d'hiver en Amérique du Sud, il s'arrête quelque temps dans les champs de riz des Carolines où il est reconnu non pas comme le goglu, gai chanteur, aimé de tous tant pour des raisons pratiques que sentimentales, mais comme l'ortolan de riz qui s'abat par milliers sur les récoltes et devient le fléau de l'agriculteur. Dans le Sud, on les tue au fusil et on les vend en grand nombre comme nourriture.

Valeur économique. Le goglu, au Canada, est un oiseau irréprochable qui nous charme de son chant harmonieux et auquel nous n'avons pas encore

découvert de mauvaises habitudes. En mai et en juin, le 90 pour cent de son alimentation consiste en insectes nuisibles et le reste en graines de mauvaises herbes et quelques insectes utiles. En juillet et août, il mange un peu de grain. Toutefois on considère cet oiseau comme un fléau dans les Etats du Sud.

495. L'Étourneau ordinaire. (COWBIRD.) *Molothrus ater*. L., 7-92. Planche XXVI A.

Traits distinctifs. Un petit étourneau avec la tête et le cou noir de phoque. La femelle est d'un brun cendré, plus pâle sur la gorge et peut être distinguée d'avec les moineaux auxquels elle ressemble à cause de son bec conique, par sa coloration uniforme et peu prononcée.

Indications sur le terrain. Petit étourneau avec bec court et conique; accents rauques et criards et cri écorchant.

Nid. Dépose ses œufs dans des nids d'autres espèces, ordinairement plus petites, sur le sol ou en des endroits plutôt bas.

Habitat. Dans la majeure partie de l'Amérique du Nord. Au Canada, dans la partie nord jusqu'aux limites de la culture. L'espèce est commune, sauf dans les provinces côtières de l'extrême Est.

L'étourneau ordinaire est notre seul oiseau habituellement parasite. Jamais il ne construit de nids, ni ne couve ni ne s'occupe de ses petits. En l'absence d'un autre oiseau qui couve il profite d'une occasion pour déposer l'un de ses propres œufs dans le nid non gardé. D'habitude, les propriétaires du nid acceptent l'œuf sans protester, mais parfois ils s'y opposent énergiquement puis finalement se résignent. Dans certains cas, le nid est déserté ou un nouveau nid est construit par dessus l'œuf étranger; c'est ainsi que fait quelquefois la fauvette d'Amérique. L'incubation présente un cas intéressant d'adaptation. On remarque que l'œuf de l'étourneau est éclos ordinairement quelques heures avant ceux de l'oiseau nourricier et, par conséquent, l'intrus est déjà fort et développé alors que les premiers occupants du nid ne font que briser leur coquille. Cela lui permet de s'emparer de la nourriture et d'augmenter ainsi son surcroît de vigueur de telle façon qu'il peut finalement rejeter ses concurrents hors du nid et recevoir pour lui seul les soins qui devaient aller à toute la nichée. C'est ainsi que, de fait, la naissance de chaque étourneau signifie la destruction d'au moins une nichée d'une autre espèce, et l'on doit probablement considérer l'étourneau comme l'un des ennemis les plus terribles des espèces qui sont ainsi dupées. Une fois que le père et la mère nourriciers ont accepté l'œuf étranger ils ne font aucune différence entre celui-ci et les leurs propres. Cet oiseau a été appelé "Cowbird" par suite de son habitude de suivre les bêtes à cornes, sans doute dans le but de capturer les mouches et insectes qui s'assemblent autour de ces animaux.

Valeur économique. Si l'on en juge d'après son alimentation, l'étourneau semblerait être simplement un oiseau utile. Il consomme de nombreuses graines de mauvaises herbes et beaucoup d'insectes nuisibles mais une petite quantité seulement de grain ou de fruits; le grain se compose principalement des glanures et les fruits sont des fruits sauvages. Le mal qu'ils font cependant vis-à-vis d'autres oiseaux également utiles donne un tout autre aspect à leur influence économique. On peut dire que chaque étourneau élevé jusqu'à l'état d'oisillon signifie la destruction de toute une nichée d'une autre espèce. Il est possible que l'influence économique des oiseaux substitués compense celle des oiseaux disparus mais cette substitution ne peut tout de même pas être envisagée froidement.

497. **L'Étourneau à tête jaune.** (YELLOW-HEADED BLACKBIRD). *Xanthocephalus tanthrocephalus*. L, 10. Un étourneau avec des taches blanches sur les rémiges primaires, et avec la tête, le cou et la poitrine jaunes. La femelle est semblable mais de couleur brunâtre plutôt que noire; le jaunes est moins brillant et le blanc fait défaut sur les ailes.

Traits distinctifs. Les indications précédentes suffisent à le faire reconnaître.

Habitat. L'ouest de l'Amérique du Nord jusqu'au nord des provinces de la prairie. N'apparaît qu'accidentellement dans l'est du Canada.

498. **L'Étourneau à ailes rouges.** (RED-WINGED BLACKBIRD). *Agelaius phoeniceus*. L, 9-51. Planche XXVI B.

Traits distinctifs. Le plumage du mâle a toujours les épaules au moins tachetées de rouge, bien que parfois, on ne remarque que ça et là des mouchetures d'orange. La femelle se distingue toujours des autres étourneaux par sa coloration nettement rayée.

Indications sur le terrain. Le mâle est distinctement caractérisé par ses épaules rouges et on le reconnaît à toutes les phases de son plumage par ses accents caractéristiques; son cri le plus ordinaire qui n'est propre qu'au mâle, peut se traduire par «O-ki-li» ou «O-ki-ri» avec une inflexion de plus en plus forte à la fin.

Nid. Une construction bien faite avec des joncs et des herbes, attachée à 2 ou 3 pieds au-dessus de l'eau après des roseaux, des massettes ou des arbrisseaux dans des endroits marécageux.

Habitat. Comme espèce, cet étourneau est répandu sur toute l'Amérique du Nord jusqu'aux limites des régions boisées.

SOUS-ESPÈCES. Il y a plusieurs sous-espèces de cet oiseau. La plus commune dans l'est du Canada est l'oiseau type, l'étourneau à ailes rouges de l'Est. Dans l'extrémité ouest de l'Ontario, nous avons probablement celui du Nord, *A. p. arctolegus* qui vient des régions centrales du Nord. Celui-ci est caractérisé par sa taille un peu plus forte mais il n'y a qu'un expert qui puisse faire la distinction exacte.

Il n'y a pas de marais typique au Canada où l'on ne trouve un ou plusieurs couples d'étourneaux aux ailes rouges se poursuivant les uns les autres ou se cramponnant aux roseaux, les mâles étalant leurs ailes et leurs queues et se tortillant en des attitudes forcées pendant qu'ils font entendre leur «O-ki-ri» avec un trille sur la dernière syllable, en présence des femelles. Au printemps, les étourneaux arrivent ordinairement par grandes compagnies d'espèces mélangées qui demeurent ensemble pendant quelques jours et ensuite se séparent. Les étourneaux à ailes rouges se dirigent vers les marais et, avant que les roseaux commencent à pousser, ils s'occupent de leur installation domestique. Lorsqu'ils ont rempli leurs devoirs de famille pour la saison, toutes les espèces d'étourneaux se ressemblent de nouveau en troupes qui obscurcissent le firmament, se perchent ensemble dans les marais lorsque cela est possible et s'éparpillant durant le jour en groupes plus ou moins nombreux pour parcourir les champs de récoltes.

Valeur économique. En raison de son régime alimentaire, cet oiseau est réellement utile. Le 80 pour cent de sa nourriture se compose de graines de mauvaises herbes et d'insectes malfaisants et le grain qu'il mange se monte à environ 15 pour cent. C'est en juillet et août qu'il consomme le plus de grain et, au début de la colonisation, lorsque la superficie des terres à culture était restreinte et que les étourneaux étaient en grand nombre, c'était une sérieuse menace pour la moisson.

501. **L'Étourneau des prés.** (MEADOWLARK), *Sturnella magna*. L, 10-75. Planche XXVII A.

Traits distinctifs. Impossible à confondre avec une autre espèce dans l'est du Canada. (Bec, figure 47, p. 28).

Indications sur le terrain. La poitrine jaune très apparente et un collier noir bien tranché sont des marques sûres. Au vol, les plumes extérieures blanches de la queue et la façon singulière de voler sont de bonnes indications. Le sifflement clair et prolongé de l'étourneau des prés est caractéristique.

Nid. Sur le sol; construit avec des herbes sèches; le nid est ordinairement en forme de four.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord jusqu'aux confins du territoire cultivé.

La voix claire de l'étourneau des prés est souvent la première indication de la venue du printemps. Il arrive en même temps, quelquefois même avant le merle et le rouge-gorge, et fréquente les pâturages élevés; on entend alors de très loin du sommet d'un arbre isolé ou d'un poteau de clôture ses accents doux et sonores.

Valeur économique. L'étourneau des prés est l'un des oiseaux les plus utiles au cultivateur. Comme il se tient près du sol, il s'attaque à la plupart des pires ennemis de la moisson. Son alimentation est répartie comme suit: 75 pour cent d'insectes, 12 pour cent de graines de mauvaises herbes, et 13 pour cent de céréales, presque tout recueilli à la fin de l'automne et au début du printemps, évidemment en raison de la pénurie d'insectes à ces époques. Cet oiseau mérite tout à fait d'être protégé.

506. L'Oriole des vergers. (ORCHARD ORIOLE). *Icterus spurius*. L, 7-32. Un petit étourneau ressemblant à l'oriole de Baltimore (planche XXVII B), l'orangé de cet oiseau étant remplacé par un brun de phoque; sa queue est noire. La femelle est d'un vert terne et uniforme. Le jeune mâle est comme la femelle mais il a la gorge noire.

Traits distinctifs. La coloration brun de phoque et noire du mâle se reconnaît immédiatement. La femelle a une certaine ressemblance avec la femelle du tangara, mais elle est plus petite et d'une forme plus délicate, et son bec est fin, pointu, et non denté. (Comparer les figures 48 et 53, p. 28).

Indications sur le terrain. Couleur, taille et chant à peu près semblables à ceux de l'oriole de Baltimore, mais la voix est plus riche, et il possède certains traits qui lui sont propres.

Nid. Composé d'herbes vertes et suspendu à une enfourchure d'arbre. C'est une jolie construction mais pas aussi bien finie ni aussi profonde que le nid de l'oriole de Baltimore.

Habitat. C'est une espèce plus méridionale que l'oriole de Baltimore; elle apparaît régulièrement au Canada sur les rives du lac Érié et parfois au nord jusqu'à l'extrémité sud du lac Huron.

L'étourneau des vergers ne se rencontre communément que le long des frontières sud de l'Ontario et ses mœurs sont absolument les mêmes que celles du Baltimore.

507. L'Oriole de Baltimore. (BALTIMORE ORIOLE). *Icterus galbula*. L, 7-53. Planche XXVII B.

Traits distinctifs. Coloration.

Indications sur le terrain. Ses taches éclatantes d'orange doré et sa riche voix de contralto sont des marques d'identification certaines. Cette espèce ne peut être confondue qu'avec des individus d'un autre habitat.

Nid. Son nid est l'une des curiosités de la gent ailée. Il a la forme d'un sac tissé avec des plantes fibreuses, du duvet végétal, des crins et des ficelles, le tout artistement enlacé et suspendu à l'extrémité d'une longue branche inclinée vers la terre. Avec son bec pointu comme une aigle la femelle enfonce un filament dans la paroi du nid, puis, l'ayant saisi par en dedans, le tire et l'enlace solidement pour faire un travail serré, et recommence ainsi avec un autre filament jusqu'à ce que le nid une fois terminé se trouve tellement bien tricoté, tissé et feutré que malgré qu'il soit balancé à l'extrémité d'une longue branche flexible au milieu des tempêtes des quatre saisons, il demeure intact pendant plusieurs années.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord en allant au nord jusqu'aux limites des régions bien habitées.

L'oriole de Baltimore fréquente de préférence les régions découvertes, parsemées de bosquets avec ça et là, de grands ormes isolés. Le nom de cet oiseau lui vient de son magnifique plumage orangé et noir, couleurs officielles de lord Baltimore sous le patronage duquel l'État de Maryland fut d'abord colonisé et en l'honneur duquel les premiers colons ont nommé cet oiseau.

Valeur économique. La nourriture de cet oriole se compose surtout d'insectes comprenant par ordre de quantité: chenilles, taupins, dont on connaît les larves pestilentielles, hannetons et sauterelles. Il capture très peu de coléoptères rapineurs. Il consomme peu de matière végétale.

Cet oiseau occupe donc une place très importante comme destructeur d'insectes. On l'a quelquefois accusé de gâter les fruits et aussi de piquer le raisin pour en extraire le jus. Ce n'est pas de ce qu'il en extrait que l'on se plaint mais c'est de la quantité de vigne qu'il gâte car il va d'une grappe à l'autre piquant partout le raisin tout en en consommant très peu. Cette habitude semble cependant être purement locale et peut n'être qu'individuelle; elle n'a d'ailleurs que peu d'importance sauf dans un pays de vigne. Au Canada, l'oriole de Baltimore s'en va peu après la mi-août et avant que la saison des fruits à l'automne soit avancée, de sorte que les raisins sont ordinairement trop verts pour leur faire envie. Par conséquent bien qu'on ne puisse pas entièrement l'exonérer des accusations portées contre lui, les dégâts causés par l'oriole au Canada ont été certainement très exagérés. Les services rendus par cet oiseau sont constants et importants; quant au mal qu'il peut faire, ce n'est que par moments et c'est peu de chose.

509. Le Mainate couleur de rouille. (RUSTY BLACKBIRD, RUSTY GRACKLE). L, 9-55. A peu près de la taille d'un étourneau à ailes rouges, mais tout noir avec reflets verdâtres et des yeux coulés de paille. A l'automne, les plumes sont largement bordées d'un ton rouilleux, plus pâle sur la couronne et sur la tête. La femelle est un oiseau presque uniformément gris foncé avec des traces de marques rouilleuses au printemps, beaucoup plus étendues chez les deux sexes à l'automne, alors qu'elles forment une calotte rougeâtre et une ligne sourcilière bien caractérisée.

Traits distinctifs. Taille petite relativement à celle du mainate bronzé, la seule autre espèce aux yeux clairs; couleur noire ou teinte rouilleuse uniforme passant à une ligne pâle au-dessus de l'œil; les yeux sont d'un jaune paille.

Indications sur le terrain. La taille, la coloration et les yeux jaune paille.

Nid. Sur des conifères ou sur le sol; se compose d'herbes ou de mousse.

Habitat. L'est et le nord de l'Amérique du Nord; couve ordinairement juste au nord des régions cultivées au Canada.

Le mainate couleur de rouille se présente chez nous en grand nombre au printemps et à l'automne; il est mêlé pour une large part aux grandes troupes d'étourneaux que l'on aperçoit aux abords des champs et des marais. Le nom anglais de "Grackle" qui est ordinairement appliqué aux deux étourneaux aux yeux jaunes (presque blancs) provient sans doute de leur cri aigre et pétillant.

511. Le Mainate bronzé. (CROW BLACKBIRD, BRONZED GRACKLE). *Quiscalus quiscula*. L, 12. Planche XXVIII A.

Traits distinctifs. Forte taille, partout d'un noir iridescent; les yeux jaune paille.

Indications sur le terrain. Le corps tout noir, les yeux jaune paille et la taille sont de bonnes indications. Quand on l'aperçoit au vol, sa longue queue est tout étalée avec les côtés tournés en haut de façon à former la lettre «U». C'est un trait bien caractéristique qui se dessine très nettement sur le ciel.

Nid. Ordinairement par groupes sur des conifères; le nid est de structure grossière et composé d'herbe et de boue.

Habitat. Toute la zone tempérée de l'Amérique du Nord à l'est des Montagnes Rocheuses. Le mainate bronzé occupe la section canadienne de l'habitat et empiète sur celui du mainate pourpre, au sud de nos frontières.

SOUS-ESPÈCES. Il y a trois sous-espèces. Le Mainate bronzé, *Q. q. aeneus*, est l'oiseau canadien. L'oiseau type, le Mainate pourpre, est un oiseau plus méridional qui n'a pas encore été capturé au Canada, bien qu'il devrait se trouver sur nos frontières méridionales; on le reconnaît aux plumes du dos qui présentent une iridescence pourprée en demi-cercle, au lieu d'un ton uniforme de cuivre métallique. La troisième sous-espèce apparaît en Floride.

Le mainate bronzé est un oiseau grégaire et se plaît à nicher en compagnie de ses congénères. Il niche de préférence dans les conifères et s'installe souvent dans les haies décoratives des jardins. Avec ses couleurs métalli-

que
Il s
pen

titu
70.
de l
48 l
ses
vés
flue
en l
et c
avoi

FAM

L
à rec
8) po
l'ouve
trait
ainsi
marq
7
est bi
de ce
dente,
couleu
chant;
un gr
autre,

tante
d'ois
ils so
herbe
bloni
près
ports
accep
en in
au pr
famil
quelq
plus
terre
mage
naire,
famill
bees.
d'app
magn
brilla

ques et ses yeux jaunes, c'est un oiseau magnifique et d'un éclat frappant. Il se pavane sur le gazon avec une affectation comique et des gestes bizarres pendant qu'il laisse entendre ses accents plutôt discordants.

Valeur économique. Pendant qu'il habite le Canada, les insectes constituent le 29.7 pour cent de sa nourriture et les matières végétales, le 70.3 pour cent. Les insectes comprennent certaines espèces qui vivent de proie mais pas en grand nombre. La matière végétale comprend environ 48 pour cent de grain et de fruits d'arbres forestiers et graines de mauvaises herbes. Une bonne partie du grain consiste en déchets et les fruits cultivés ne comptent que pour le 2.9 pour cent. D'une façon générale, l'influence du mainate bronzé est bienfaisante mais il ne faudrait pas trop en laisser le nombre s'accroître. C'est un implacable destructeur de nids et comme tel il ne fait pas bon l'avoir autour de la maison si l'on désire avoir des espèces plus attrayantes.

FAMILLE—FRINGILLIDÉS.—MOINEAUX, LINOTTES, PINSONS, OU BRUANTS.

Description générale. Telle que représentée au Canada, cette famille est généralement facile à reconnaître. Elle se compose de petits oiseaux, il n'y a guère d'espèce canadienne de plus de 8½ pouces de longueur, avec bec conique non échancré, se prêtant bien au cassage des graines et l'ouverture de la bouche ordinairement tournée en dessous (figures 50, 51, 52, p. 28). Ce dernier trait n'est pas développé au même degré chez toutes les espèces et certains étourneaux d'Amérique, ainsi que nous l'avons déjà dit (p. 163) le possèdent d'une façon prononcée; mais ils ont d'autres marques distinctives qui permettent de les différencier d'avec les moineaux.

Traits distinctifs. C'est au bec qu'on les reconnaît le mieux; celui du serin domestique est bien nettement du type passereau. Les oiseaux qu'on est le plus porté à confondre avec ceux de cette famille sont le goglu (figure 46, p. 28) et l'étourneau ordinaire (p. 165) de la famille précédente, et les tangaras, de la famille suivante. On peut facilement différencier ceux-ci par leurs couleurs éclatantes (voir à chacun des titres). Les tangaras ont des échancrures aux bords tranchants et à la pointe des mandibules ce qui les rend faciles à reconnaître (figure 53, p. 28). Dans un groupe de Fringillidés, les Bees-croisés, les pointes du bec se croisent (figure 52, p. 28); dans un autre, les Gros-Bees, le bec est très gros et très robuste (figure 50, p. 28).

Les Passereaux (sparrows) constituent la plus grande et la plus importante famille des percheurs et c'est probablement la plus importante famille d'oiseaux du monde entier. On les rencontre partout sauf en Australie et ils sont représentés dans tous les habitats, dans les marais humides, plateaux herbeux et épaisses forêts comme dans les plaines sèches et les régions sablonneuses. Les termes: Moineau, Linotte, Pinson, et Bruant sont à peu près synonymes et s'appliquent à diverses espèces sans égard à leurs rapports mutuels. Le nom de Passereau (sparrow) a par conséquent une acception très vaste et peut s'appliquer à beaucoup d'espèces différentes en importance ou en valeur. Il est fâcheux que certaine espèce introduite au pays ait été cause de la mauvaise réputation attribuée à toute une vaste famille qui comprend beaucoup de magnifiques et de précieux oiseaux, dont quelques-uns nous charment par leur chant délicieux. Le caractère le plus typique de cette famille dans l'esprit populaire est une coloration gris terre uniforme, mais elle comprend aussi des oiseaux au plus éclatant plumage et au lieu du simple pépiement du moineau auquel on s'attend d'ordinaire, on entend parfois le chant le plus agréable. On peut diviser cette famille en espèce terrestre, espèce des arbres, migrants d'hiver et gros-bees. Pour l'observateur superficiel, les oiseaux de la première espèce sont d'apparence terne, mais si on les examine de près, ils présentent souvent de magnifiques harmonies de couleur. L'espèce des arbres est souvent très brillamment colorée. Les migrants d'hiver présentent ordinairement

beaucoup de rouge terne. Les gros-becs que l'on reconnaît tout de suite à leur gros bec robuste (figure 50, p. 28) sont vivement colorés. Il ne s'agit pas ici d'une subdivision scientifique, mais ces oiseaux sont tellement difficiles à distinguer par l'amateur que toute classification pouvant lui servir ne sera pas sans utilité.

514. Le Gros-bec à couronne noire. (EVENING GROSBEAK). *Hesperiphona vespertina*. L, 8. C'est un des plus gros passereaux avec un très grand et puissant bec qui est typique chez les gros-becs (figure 50, p. 28). Sa coloration est par larges masses d'un jaune intense avec les ailes, la queue et la couronne noires et une bande blanche en travers de l'aile. La femelle est toute semblable, mais de couleur plus terne avec des tons cendrés sur tout le corps.

Traits distinctifs. La taille, le bec, et la couleur sont jaunes. La femelle garde assez de jaune mêlé à la couleur cendrée pour être facilement reconnue. Le jaune ou vert-jaunâtre du bec fait reconnaître tous les plumages. Pour la comparaison de la femelle avec le gros-bec des pins, voir cette dernière espèce.

Indications sur le terrain. La taille et la coloration sont jaunes. Comme c'est un hôte de nos hivers seulement, on ne peut pas le confondre avec d'autres oiseaux.

Nid. Sur les arbres; nid fait de petites ramilles, garni d'écorce, de poils et de radicelles. Le nid a rarement été vu.

Habitat. Le centre et l'ouest de l'Amérique du Nord; au sud le long des montagnes. Il est migrateur vers l'Est, mais de façon irrégulière.

SOUS-ESPÈCES. Le gros-bec à couronne noire comprend une sous-espèce de l'Est, et une autre de l'Ouest; c'est la première, la forme type, qui seule se rencontre dans l'est du Canada. Les localités où ce gros-bec de l'Est niche et couve n'ont pas encore été déterminées avec exactitude.

Cet oiseau est seulement un migrateur irrégulier en hiver, dans l'est du Canada. Il s'écoule quelquefois des années sans qu'on voie cet oiseau et puis, tout à coup, il se montre partout. Les causes de ses apparitions irrégulières n'ont pas été expliquées de façon définitive. Est-ce l'absence de nourriture qui a tenu ces oiseaux éloignés de leurs stations d'hiver, ou bien sont-ils attirés vers d'autres régions par une abondance inaccoutumée d'aliments? C'est ce que l'on ne peut dire. La nourriture est probablement la cause déterminante.

Valeur économique. Le gros-bec à couronne noire, qui ne vient qu'en hiver, ne peut faire que très peu de dommage. Sa nourriture de prédilection, c'est la graine de l'érable du Manitoba, qui demeure pendue aux branches de cet arbre, ou encore le fruit du frêne sauvage. Le fait que l'érable du Manitoba a, dans ces dernières années, été planté en quantité dans toutes les parties du Canada, peut avoir influé sur les habitudes migratrices de cet oiseau. Presque tout fruit sec lui est bon et il aime à retirer les pépins des vieilles pommes pourries qui pendent aux arbres en hiver. On l'accuse d'endommager les arbres en arrachant les bourgeons; c'est un peu vrai, mais cela ne saurait être la source de dégâts appréciables.

515. Le Gros-bec des pins. (PINE GROSBEAK). *Pinicola enucleator*. L, 9-08. Planche XXVIII B.

Traits distinctifs. A s'en rapporter aux descriptions, on pourrait confondre les femelles des gros-becs des pins avec celles des gros-becs à couronne noire, car elles sont toutes d'un gris étendu de jaune; mais le jaune chez le gros-bec des pins est plus foncé, surtout sur la tête et le croupion, d'un jaune citron plutôt que clair et qui recouvre la coloration du corps au lieu d'avoir l'air de se laisser deviner en dessous. Le bec foncé de l'espèce est également distinctif.

Indications sur le terrain. La taille, le bec foncé du gros-bec et la coloration rouge des mâles adultes. La plupart des oiseaux qui visitent le Canada ont la livrée terne des femelles, de là vient que l'effet général est celui d'une bande de gros oiseaux, couleur ardoise mate, passant à un jaune chaud sur la tête et le croupion, vu sous une lumière favorable et accompagnée à l'occasion de quelques individus rougeâtres. Les notes ordinaires de cet oiseau sont d'une faiblesse et d'une finesse ridicules pour un gros oiseau, bien qu'on lui connaisse aussi un sifflement clair et retentissant.

boré
rivière
Can

prés
appi
Ils f
les p

forêt
peut
qu'o
miq
des f
raiso
rien

5
che X
T)
des ral
bondu
la taill
Inu
pinson
sur le
Ni
Ha
Canadi
Le long
au nord
SO
du Can

I
coulet
de no
Comm
une fo
verme
s'envo
suite c
viro g
tomne

V
geons
est ins
dans le
confins
son de
l'homn
comme

Nid. Sur les arbres conifères; fait de ramilles et de radicelles.

Habitat. En tant qu'espèce, son territoire se borne aux régions du nord de l'hémisphère boréal. Le gros-bec des pins du Canada couve dans les forêts de conifères du nord, à l'ouest de la rivière Mackenzie; ses migrations vers les régions colonisées n'ont lieu qu'en hiver.

SOUS-ESPÈCES. Il y en a plusieurs au Canada, l'individu de l'Est, le gros-bec des pins du Canada—*Pinicola enucleator leucura*—étant le seul qui puisse figurer dans le cadre du présent ouvrage.

Ces oiseaux sont des hôtes irréguliers venant du nord en hiver. Leur présence chez nous ne peut que rarement être prévue, bien qu'ils puissent apparaître pendant l'hiver dans n'importe quelle localité de l'est du Canada. Ils fréquentent les arbres conifères, mais ont aussi beaucoup de goût pour les petits fruits du frêne sauvage, du sorbier et aussi du sumac.

Valeur économique. Comme le gros-bec des pins passe l'été dans les forêts du Nord et ne visite qu'en hiver les régions colonisées, les dégâts qu'il peut causer se réduisent à fort peu de chose. Il mange du fruit sauvage qu'on laisse perdre et qui pend aux arbres, si bien que son influence économique est absolument négligeable. On l'a accusé de détruire les graines des fruits, mais le mal qu'il fait ainsi est minime. Il y a toutes les meilleures raisons du monde pour protéger cette espèce, qu'on ne peut accuser de rien de sérieux.

517. **Le Pinson pourpré.** (PURPLE FINCH). *Carpodacus purpureus*. L, 6-22. Planché XXIX A.

Traits distinctifs. La taille et la coloration générale du mâle sont distinctives. La femelle a des raies d'un brun olive, mais l'uniformité générale de la teinte olive dans cette coloration et l'abondance des raies en dessous sont tout à fait caractéristiques. Le bec est plutôt plus gros pour la taille de l'oiseau que chez les autres espèces, le gros-bec excepté.

Indications sur le terrain. La taille, la coloration générale; parfois une ressemblance entre ce pinson et le petit gros-bec des pins, et un chant très frappant; telles sont les meilleures indications sur le terrain.

Nid. Dans les arbres conifères; nid fait de brindilles, d'herbes et de radicelles.

Habitat. En tant qu'espèce le pinson pourpré occupe toute l'Amérique entre le Mexique et le Canada. Dans l'est du Canada, il va au nord jusqu'à l'extrême limite de la colonisation établie. Le long des confins méridionaux c'est un hôte régulier d'hiver qui couve là moins souvent que plus au nord.

SOUS-ESPÈCES. Le pinson pourpré est représenté par deux sous-espèces; l'individu de l'est du Canada, le pinson pourpré de l'est, est le type de l'espèce.

Le pinson pourpré, malgré son nom, n'est pas du tout pourpré; la couleur "magenta" (rose violacé) décrirait mieux sa coloration. C'est un de nos meilleurs chanteurs et on le met parfois en cage pour cette raison. Comme ses congénères, le gros-bec des pins, et les becs-croisés d'Amérique, une fois en captivité il perd le beau rouge de son plumage et revêt un jaune vermeil si particulier et caractéristique que des oiseaux qui ont réussi à s'envoler de la cage se reconnaissent à première vue. Le chant est une suite continue et claire de sons mélodieux comme ceux que module le fameux viro gris-olive, mais d'une exécution plus rapide. Le jeune mâle, en automne, chante presque aussi bien que l'adulte.

Valeur économique. Le pinson pourpré se nourrit surtout de bourgeons et de fruits. Le nombre de fruits qu'il mange dans l'est du Canada est insignifiant vu que cette espèce d'oiseaux n'est pas nombreuse en été dans les localités où l'on cultive les arbres fruitiers. Cet oiseau quitte les confins méridionaux et se rend dans les parages moins cultivés dans la saison de la couvaison. Les fruits qu'il prend sont principalement ceux que l'homme a dédaignés et laissés perdre, des fruits sauvages dont il est friand comme ceux du frêne sauvage et du sorbier. Le procès qu'on lui fait à cau-

se des bourgeons qu'il mange est plus sérieux, mais n'a pas été jusqu'ici appuyé par autre chose que des affirmations générales et non par le résultat d'un examen de l'estomac des oiseaux. Il se peut que, parfois, le pinson pourpré fasse des dégâts considérables en certaines localités, en picotant les bourgeons à fruits de l'année suivante; mais il reste à prouver qu'il fait assez de tort de cette façon pour nuire à la récolte des fruits.

520. **Le Moineau domestique.** (HOUSE SPARROW). *Passer domesticus*. L, 6-50. Planche XXIX B.

Traits distinctifs. La bavette noire du mâle est distinctive. Les femelles ont une légère indication de la couleur olive et pourraient se prendre pour la femelle du pinson pourpré, n'était-ce qu'elles n'ont pas de raies en dessous. La femelle, ou les plumages d'automne du goglu, font un peu penser à ce plumage, mais les raies très prononcées en dessus et la couleur jaune générale sont tout à fait caractéristiques du goglu. Un peu d'attention donnée à l'espèce dans nos rues et dans nos cours de fermes suffira à empêcher qu'il y ait de prendre cette espèce pour aucune autre.

Indications sur le terrain. Les notes caractéristiques et le gazouillement du moineau domestique seront toujours la meilleure indication sur le terrain pour le reconnaître.

Habitat. À l'origine son territoire comprenait toute l'Europe et la plus grande partie de l'Asie. Aujourd'hui il est dans toute l'Amérique du Nord jusqu'aux confins des parties colonisées.

Cet oiseau n'est pas originaire d'Amérique, mais c'est un des produits les moins enviables qu'on ait importés d'Europe. Malgré son habitude bien connue de manger du grain il fut introduit en Amérique en qualité de destructeur de chenilles. En effet, à l'instar de la plupart des oiseaux qui quelquefois mangent des chenilles, le moineau en mange, mais à cet égard il n'approche pas de la capacité des espèces qu'il a évincées. Comme c'est un oiseau des villes et des cours de fermes, son activité se donne carrière surtout dans les localités où il y a abondance de nourriture pour les non-insectivores, c'est-à-dire de déchets de cuisines, de grains qu'on laisse perdre, etc. En automne il se livre à des excursions à la campagne et visite les champs en grandes bandes, surtout après les moissons quand il reste beaucoup de grain perdu par terre; quelquefois il arrive avant la moisson et alors il cause de grands dégâts. Son régime d'alimentation est donc nuisible et ne se conforme pas aux circonstances extérieures, si bien que dans un règlement de compte, c'est en faveur de l'oiseau que le bilan s'établirait. Les trois principaux griefs qu'on fait valoir contre le moineau domestique sont les suivants:—il évince des espèces plus utiles que la sienne; il salit les alentours des maisons; on le suspecte de propager les maladies des oiseaux de basse-cour.

Les moineaux domestiques chassent les autres oiseaux de trois façons: en monopolisant les provisions alimentaires; en s'emparant des places pour leurs nids; par leurs mœurs querelleuses et batailleuses. Pendant le temps de la couvaison, quand les petits reçoivent leur becquée, les moineaux et d'autres espèces se font concurrence pour la nourriture à donner à leurs petits, c'est-à-dire pour les mêmes insectes (les petits de tous les passereaux demandent des insectes, bien que ceux de l'espèce présente ne soient pas longtemps purement insectivores). Jusqu'ici peut-être les moineaux pourraient passer pour être aussi utiles que les individus qu'ils évincent, mais la plupart des oiseaux évincés sont de perpétuels chasseurs d'insectes, tandis que le moineau ne l'est que temporairement. Aussitôt que les devoirs de la couvaison sont finis ils retournent aux déchets et aux matières qu'on laisse perdre et leur importance baisse d'autant, tandis que les oiseaux évincés continuent à rendre des services pendant toute la saison. Les moineaux domestiques restent avec nous pendant tout l'hiver, ne montrant aucune

dispo:
printe
(presc
vidus)
leurs
nichoi
querel
native
perpét
Il est
d'oisea
nids s
l'habit
très d
des mo
rables,
des por
des ma
consist
aux mo
finissen
grief, e
cette e
voleter
facilité
encore
bale, c
dindes
sont pr
côtières
s'élève :

Il)
mestiqu
comme
on le de
ce qui
plié au
ses moir
le moine
grosses
Des mes
autre, m
quand l'
De
taines lin
veut en
destructi
bout. I
servir qu
avoir acc

disposition à émigrer, aussi sont-ils sur le terrain dès les premiers jours du printemps et, lorsque arrivent nos hôtes d'été, oiseaux originaires du pays (presque tous plus ou moins migrateurs, soit comme espèces soit comme individus) ils trouvent déjà prises toutes les meilleures places pour y mettre leurs nids. La difficulté qu'on trouve à écarter les moineaux des nichoirs est la meilleure preuve de l'état de choses en question. Ils sont querelleurs, en outre, et quoique, une fois établies, la plupart des espèces natives soient très capables de résister aux agressions, ils n'aiment pas le perpétuel état de guerre où les fait vivre le voisinage du moineau anglais. Il est bien plus facile de l'éviter que de le combattre. De là vient que peu d'oiseaux d'autre espèce se soucient de vivre dans leur voisinage. Les nids sont grands, massifs, des amas malpropres de paille et d'herbe, et l'habitude qu'ont ces oiseaux de boucher les tuyaux de gouttières, les rend très désagréables. Pour ajouter aux inconvénients provenant des nids des moineaux domestiques, la réunion de ces oiseaux en nombres considérables, pendant toute l'année, dans des coins abrités sous des corniches et des porches, entraîne des accumulations d'ordures qui irritent les habitants des maisons. De nos jours un des importants problèmes de l'architecture consiste à imaginer des détails satisfaisants et qui ne fournissent aucun abri aux moineaux dont les saletés défigurent les moulures les plus soignées et finissent par désagréger les matériaux dont l'édifice est composé. Le dernier grief, celui de colporter les maladies, n'est pas le moindre de ceux qu'on fait à cette espèce. Le fait de picoter familièrement avec les poules et celui de voler en liberté d'une basse-cour à l'autre donnent à ces moineaux toute facilité pour être des colporteurs de maladies. La chose, il est vrai, n'a pas encore été absolument démontrée, mais qu'elle soit possible et même probable, cela est assez évident. C'est une circonstance bien instructive que les dindes sont de nos jours sujettes aux ravages de certains boutons qui se sont propagés rapidement dans notre pays, alors que dans certaines îles côtières du Massachusetts, d'où le moineau anglais est absent, le dindon s'élève aussi facilement qu'autrefois.

Il n'est pas douteux que l'introduction en Amérique du moineau domestique a été une erreur. Il était déjà connu dans son pays d'origine comme une espèce peu recommandable, et nullement propre à l'usage auquel on le destinait en l'important en Amérique. Dans ce pays, éloigné de tout ce qui pouvait enrayner ses défauts et le tenir en dépendance, il a multiplié au delà de toute raison et, si ses mœurs les plus critiquables ont empiré, ses moins mauvais côtés ne se sont guère perfectionnés. Quoi qu'il en soit, le moineau domestique est ici pour y rester. On a légiféré contre lui, de grosses sommes ont été dépensées pour le tenir en échec, rien n'y a fait. Des mesures locales ont été prises pour en réduire le nombre, de temps à autre, mais elles n'ont servi qu'à attirer du dehors de nouvelles hordes quand l'effet de ces mesures s'est épuisé.

De constants efforts maintiendront le nombre de ces oiseaux en de certaines limites, mais ces efforts devront s'étendre à tout le continent si l'on veut en finir avec cette malfaisante engeance. Des pièges, du poison, une destruction systématique des nids seront les meilleurs moyens d'en venir à bout. L'effet du poison est certain, mais il faut faire attention de ne s'en servir que dans les saisons et les lieux où aucune autre espèce ne puisse avoir accès. Les pièges faits de fils de fer et toujours en place, prendront

un grand nombre de ces oiseaux à la fois et donneront pleine satisfaction. Un bon modèle de ces pièges a été décrit par la Commission biologique des Etats-Unis, dans le Farmers' Bulletin n° 493.

521. Le Bec-croisé d'Amérique. (CROSSBILL). *Loxia curvirostra*. L, 6-19. C'est un passereau de taille moyenne avec le prolongement des deux bouts du bec qui s'entrecroisent quand le bec se ferme (figure 52, p. 28). Le mâle d'un rouge terne, plus brillant au croupion; les femelles et les jeunes sont semblables avec le rouge remplacé par du verdâtre ou du jaune. Pas de barres sur les ailes.

Traits distinctifs. Ce bec entre-croisé est distinctif de cet oiseau, l'absence de la barre blanche sur l'aile indique l'espèce.

Indications sur le terrain. C'est un petit oiseau d'hiver qui arrive souvent en grandes bandes. Les notes de sa voix sont à peu près semblables à celles des chardonnerets, mais les individus font voir une coloration rouge. Habitudes de grimper à la façon des perroquets.

Nid. Ordinairement dans les arbres conifères; nid fait de brindilles et d'herbes, garni de mousse et de radicelles.

Habitat. Les forêts de conifères dans les deux hémisphères. Le bec croisé d'Amérique couve au nord des lieux colonisés et très peuplés, au sud des montagnes, à l'Est et à l'Ouest. La présence est irrégulière en hiver dans le sud du Canada.

SOUS-ESPÈCES. Le bec-croisé d'Amérique est une sous-espèce du bec-croisé, une espèce de l'ancien comme du nouveau monde, et porte le nom en trois mots de *Loxia curvirostra minor*.

Les becs-croisés sont également des oiseaux qui descendent irrégulièrement du nord vers le sud du Canada, en hiver, reviennent d'habitude pendant plusieurs saisons successives, et puis ne reparissent plus de bien des années.

Valeur économique. Cette espèce se nourrit presque entièrement de graines de conifères:—pins, sapins du Canada, et cèdres; des baies de la douce-amère grimpante et aussi des pépins de pommes pourries qui pendent aux arbres. La vitesse et l'adresse avec lesquelles ces graines sont retirées des cônes de pins nous feraient croire que le bec-croisé est nécessaire pour ce genre d'opération jusqu'au jour où l'on découvre que l'espèce au bec normal peut faire la même chose avec la même facilité.

522. Le bec-croisé à ailes blanches. (WHITE-WINGED CROSSBILL). *Loxia leucop-tera*. L, 6-05. Semblable à l'espèce précédente, mais avec des barres blanches sur les ailes.

Traits distinctifs. D'une coloration peut-être un peu plus brillante que le bec-croisé d'Amérique, mais avec des modifications considérables de teinte et de nuance. Les barres blanches de l'aile et le bec-croisé sont toujours distinctifs.

Cet oiseau est si semblable au précédent par ses mœurs et par ses visites qu'aucune discussion du sujet n'est nécessaire.

GENRE—ACANTHIS.. SIZERINS. L, 5-5.50.

Description générale. Ce sont de petits passereaux au bec court et aiguë; une couronne avec calotte d'un cramoisi mat, une tache d'un noir diffus sur le menton; le dos et les flancs ont des raies brunes, cendrées et blanches. Les mâles adultes ont la poitrine d'un rose pâle, le croupion plus ou moins teinté de rose; une idée de cette teinte se montre en d'autres plumages.

Traits distinctifs. La petite calotte cramoisie est toujours distinctive.

Nid. Dans des buissons plutôt bas; nid fait d'herbes garni de poils, de peau de lapin blanc ou de renard, de plumes ou de duvet végétal.

Habitat. Régions circumpolaires et arctiques pour la couvaison, émigrant vers le Sud assez irrégulièrement en hiver.

Il y a dans l'est du Canada deux espèces de sizerins lesquelles se divisent en cinq sous-espèces, toutes si pareilles les unes aux autres qu'il faut une expérience toute spéciale pour les différencier avec exactitude. La

ligne d
gent e
et qua
taill q
Le
comme

V

527.

L, 5. C

Les adul

à un siz

Trait

reconnait

Habit

Groenlan

sizerin bl

SOU

un individ

Ils se dist

37 et le se

Pa

suivant

ciale n'e

tricts ec

grandes

bres ph

mais il

528.

C'est un

ceptiblem

Traits

Habita

du nord du

Laurent.

sizerin cou

SOU

linaria lin

individu u

de petites

mais à tou

se fait parl

pouces -9, c

e de 3 pouces

convienrai

aucune autr

Ave

abandon

se nourri

qui perch

cette fou

non pas

mot, mai

ment ag

plumes, l

rose parti

ligne de démarcation des espèces est très subtile, les sous-espèces se mélangent et, comme il y a des modifications considérables quant aux individus et quant à l'âge, c'est seulement par une attention donnée aux petits détails qu'on peut les distinguer.

Les traits distinctifs sont donnés plutôt comme des indications que comme des différenciations définitives.

Valeur économique. Voir le sizerin à tête rouge.

527. Le Sizerin de Hornemann. (HORNEMANN'S REDPOLL). *Acanthis hornemanni*. L. 5. Ce sont des sizerins de couleur claire, avec un croupion blanc ou rose et sans tache. Les adultes ont des plumes dont les bords sont clairs si bien qu'un oiseau typique ressemble à un sizerin ordinaire vu à travers un voile blanc.

Traits distinctifs. Le croupion sans tache est le caractère le plus constant et le plus facile à reconnaître.

Habitat. Les régions arctiques et sous-arctiques de l'hémisphère boréal. Le sizerin du Groenland couve dans l'Europe arctique, le Groenland et peut-être dans l'Amérique voisine. Le sizerin blanc couve dans l'Amérique, à l'est vers l'Ungava et dans l'Asie adjacente.

SOUS-ESPÈCES. Le sizerin de Hornemann comprend deux sous-espèces en Amérique: un individu de bonne taille, le sizerin du Groenland, l'individu type; et le sizerin blanc, *A. h. exilipes*. Ils se distinguent très facilement l'un de l'autre par la taille, le premier ayant une aile de 3 pouces 3/4 et le second de 3 seulement.

Par leurs mœurs générales ces oiseaux se rapprochent tant de l'espèce suivante, qui est d'ailleurs beaucoup plus commune, qu'une discussion spéciale n'est pas nécessaire. Cette espèce est en général si rare dans les districts colonisés que toute identification des individus doit se faire avec de grandes précautions. Pendant certains hivers cette espèce arrive en nombres plus ou moins grands, avec de grandes bandes de sizerins ordinaires, mais il n'y a aucune régularité dans leurs visites.

528. Le Sizerin à tête rouge. (REDPOLL LINNET). *Acanthis linaria*. L. 5-5-5. C'est un sizerin plutôt foncé, avec un croupion plus ou moins fortement rayé et imperceptiblement lustré de blanc.

Traits distinctifs. Le croupion rayé est le trait le plus facilement reconnaissable.

Habitat. Le nord de l'hémisphère boréal. Le sizerin commun couve partout dans les régions du nord du continent américain; dans les régions du sud, il couve dans l'est jusqu'au golfe du Saint-Laurent. Le sizerin de Holboll couve en Amérique dans les îles arctiques de l'Ouest, et le grand sizerin couve dans le Groenland.

SOUS-ESPÈCES. L'espèce comprend trois sous-espèces: le sizerin commun, *Acanthis linaria linaria*, qui est le plus commun de fait comme de nom; le sizerin de Holboll, *A. l. holboelli*, individu un peu plus grand; et le grand sizerin, *A. l. rostrata*, le plus grand de l'espèce. Il y a de petites différences, visibles à l'œil du connaisseur, dans les becs et les détails de la coloration, mais à tout prendre, la taille est le meilleur critérium, bien qu'il ne faille pas trop s'y fier, car il se fait parfois des mélanges entre les sous-espèces. L'aile du sizerin commun devrait être de 2 pouces -9, celui du Holboll, de 3 pouces, avec un bec légèrement plus long, et celui du grand sizerin de 3 pouces -5, avec un bec plus court et plus gros. Cependant, quand on identifie des sizerins, il conviendrait de se rappeler que le sizerin commun est le seul qu'on ait quelque chance de rencontrer; aucune autre caractérisation ne devrait se faire qui ne fût pas appuyée de l'opinion d'une autorité.

Avec plus ou moins de régularité nos champs d'hiver et nos terrains abandonnés sont envahis par d'immenses bandes de petits moineaux qui se nourrissent des bouts de mauvaise herbe qui émergent de la neige, ou qui perchent sur les arbres un peu bas et dans les buissons d'alentour. De cette foule s'élève un gazouillement continu sortant de ces petits gosiers, non pas qu'un seul de ces oiseaux produise un chant, au sens propre du mot, mais tous ensemble ils font une musique en sourdine qui est certainement agréable à entendre. Les corps arrondis duvetés et couverts de plumes, la petite calotte richement cramoisie, et parfois quelque rayon rose parti de ces poitrines et du croupion, disent assez que ce sont des size-

rins. Ces petits êtres sont apprivoisés et sans méfiance; si celui qui les observe se fait discret, ils pourront d'aventure se poser autour de lui, même sur lui, avec autant de sang-gêne que s'il était une bûche ou quelque partie inanimée du paysage. Ils demeurent dans la contrée jusqu'à l'heure printanière du départ; alors ils disparaissent jusqu'au retour de l'hiver. Leurs migrations hivernales sont irrégulières et très changeantes.

Valeur économique. Comme ils arrivent en grand nombre, qu'ils cherchent avidement les bouts des mauvaises herbes qui percent la neige, les sizerins doivent être accueillis avec joie par les cultivateurs, non seulement à cause de leurs gentilles manières mais surtout pour le bien qu'ils font en détruisant les semences d'ivraie. Il est impossible de parcourir le terrain où ces oiseaux ont pâturé et de l'examiner de près sans être frappé de la quantité de bon travail qu'ils y ont fait. Leurs traces se voient partout sur la neige et tous les bouts d'herbe semble avoir été examinés au microscope. Vu leur nombre, et qu'ils viennent dans les plus grands froids, il est évident que leur présence doit avoir une influence destructive des mauvaises herbes de la saison suivante.

529. **Le Chardonneret jaune.** (AMERICAN GOLDFINCH). *Astragalinus tristis*. L. 5-10. Planche XXXA.

Traits distinctifs. En été, le mâle avec son corps jaune qui contraste fortement avec le noir des ailes, de la queue et de la calotte est extrêmement caractéristique. En hiver les couleurs sont moins marquées et distinctives, mais il y a toujours un soupçon de jaune vers le cou, la tête et le dos, sinon ailleurs; les ailes et la queue restent absolument noires quoique avec plus ou moins de bordures blanches ou chamois sur les barres de l'aile.

Indications sur le terrain. Par leurs mœurs, leur manière d'être et la qualité générale de leurs notes les chardonnerets d'hiver ressemblent aux chardonnerets des pins ou aux becs-croisés. On peut les distinguer des premiers par l'absence de raies, et des autres par l'absence de coloration rouge, plus claire et du croupion blanc.

Nid. Fait d'herbes, de duvet végétal, et garni de ce même duvet.

Habitat. En tant qu'espèce, tous les Etats-Unis et le sud du Canada, jusqu'aux limites de la colonisation. Le chardonneret de l'Est va à l'Ouest jusqu'au Manitoba inclusivement.

SOUS-ESPÈCES. Le chardonneret jaune comprend trois sous-espèces reconnues, dont une seule, le chardonneret de l'Est, l'individu type, se rencontre dans l'est du Canada.

C'est un des oiseaux d'été les plus gais et qui, parfois, reste en hiver dans les parties les plus méridionales du Canada. C'est un grand amateur du chardon blanc duveté et des graines de pissenlit; on peut souvent le voir picotant le duvet, coupant la partie qui mûrit et laissant la partie la plus légère s'envoler avec le vent. Son chant est aussi agréable que son apparence, quand il est posé sur quelque élévation isolée et chante: "swit-swit-tchewit-tchewit-tchewit" ou qu'il s'envole dans l'air avec une bande joyeuse qui répète son "pertchie-o-pie". Le chardonneret jaune, quoique apparenté à l'oiseau du même nom dans l'ancien monde, est une espèce bien différente qui fut dénommée comme les premiers colons avaient coutume de le faire pour beaucoup d'oiseaux, c'est-à-dire d'après des ressemblances réelles ou imaginaires avec les individus qu'on avait connus dans la mère-patrie.

Valeur économique. C'est un oiseau qui n'a aucune mauvaise habitude et qui en a plusieurs de bonnes. Les semences des mauvaises herbes sont sa nourriture principale, mais il touche rarement au grain. Si les moineaux domestiques ou anglais, n'en ont pas épuisé prématurément le stock, les graines de tournesol sont le meilleur moyen d'attirer les chardonnerets, et si l'on met de ces graines le long des palissades de derrière la maison, ces

oiseaux y
aussi plu
car on ne

533. I
petits oises
mat, quelq
citron et le

Traits d
Indicatio
Nid. D
Habitat.
nisées en hi

C'est
tionne les

Vale
et qu'il a
pèce neut
mage.

534. L
6-88. Plai

Traits di
surtout sur l
raissent peu i
de la colorat

Indicatio
grandes part
Nid. Su
de poils.

Habitat.
terres stérile
SOUS-E
contre dans l

Ces o
têtes de n
mune proj
s'abat sur
son petit
bourrasqu
que le cha

536. Le
L. 6-25. C

mune propri
la couronne
la gorge et
semblables,
de chamois,
sées. L'ong
p. 27).

Traits du
neiges mais le
des traits dist
distinguer ce
sol, et sa venu
neau de mém

Indicatio
de Laponie de
guera de l'alo

oiseaux y seront en permanence pendant l'automne et l'hiver. Ils prennent aussi plus ou moins d'insectes et un peu de fruit, des espèces plutôt sauvages car on ne s'est jamais plaint qu'ils touchassent aux variétés cultivées.

533. **Le chardonneret des pins.** (PINE SISKIN). *Spinus pinus*. L. 5. Ce sont de petits oiseaux, pareils aux chardonnerets, à raies d'un brun olive parfois sur un fond blanc mat, quelquefois légèrement teinté de jaune; plus clair en dessous et avec une tache jaune citron et les ailes légèrement nuancées de cette couleur.

Traits distinctifs. Rayures générales et tache jaune étendue sur l'aile.

Indications sur le terrain. Mœurs et rayures générales, pareilles à celles du chardonneret.

Nid. Dans les arbres conifères; nid fait de ramilles et de racelles, garni et de duvet végétal.

Habitat. Les forêts conifères du nord, à travers tout le continent, émigre vers les régions colonisées en hiver, et y couve par endroits.

C'est un hôte d'hiver des parages méridionaux du Canada. Il affectionne les arbres conifères et leur perpétuelle verdure.

Valeur économique. Comme il ne visite qu'en hiver le Canada colonisé et qu'il a un goût prononcé pour les fruits des conifères, c'est plutôt une espèce neutre ne faisant peut-être aucun bien, mais à coup sûr aucun dommage.

534. **Le Plectrophane des neiges.** (SNOW BUNTING). *Plectrophenax nivalis*. L. 6-88. Planche XXX B.

Traits distinctifs. Le violent contraste du blanc et du noir avec la bordure rouilleuse des plumes, surtout sur la tête, le dos et la bande pectorale. Pendant l'hiver les bordures rouilleuses disparaissent peu à peu, et le plumage noir et blanc de la couvaison succède sans mue. Le motif général de la coloration du plectrophane ne se retrouve chez aucun autre oiseau du Canada.

Indications sur le terrain. Ce sont des moineaux vivant en troupe sur le sol et montrant de grandes parties de blanc sur leurs ailes noires quand ils volent.

Nid. Sur le sol dans la mousse, nid fait d'herbe, de racelles, garni de mousse, de plumes et de poils.

Habitat. Les régions circumpolaires, arctiques. Au Canada, ils couvent depuis la limite des terres stériles dans la direction du nord, d'un bout à l'autre du continent.

SOUS-ESPÈCES. Bien que le plectrophane comprenne plusieurs sous-espèces, on ne rencontre dans l'est du Canada que le type de l'espèce, le plectrophane commun.

Ces oiseaux sont les hôtes d'hiver du sud du Canada, se nourrissant de têtes de mauvaises herbes émergeant de la neige dans les champs de commune propriété et perchant rarement sur les arbres. Une troupe d'oiseaux s'abat sur une neige tachetée de ces têtes d'herbes et la traverse en faisant son petit travail, l'arrière-garde s'élevant de temps à autre comme une bourrasque de neige pour prendre les devants; la chose se répète jusqu'à ce que le champ entier soit parcouru.

536. **Le Plectrophane de Laponie.** (LAPLAND LONGSPUR). *Calcarius lapponicus*. L. 6-25. C'est un moineau d'hiver, vivant en troupe et fréquentant les champs de commune propriété. Les mâles, brun foncé en dessus fortement rayé de chamois jusqu'à la couronne de la tête, avec un col brun rougeâtre en travers de l'arrière-cou; les joues, la gorge et la bavette sont noires. Blanc, en dessous. Les femelles et les jeunes sont semblables, mais le noir de la face et de la gorge est remplacé par un nuage de brun et de chamois, ou bien il ne se montre que vaguement sur les plumes irrégulièrement dispersées. L'ongle du doigt postérieur est très allongé comme dans l'alouette ordinaire (fig. 44, p. 27).

Traits distinctifs. Par ses mœurs ce plectrophane pourrait être pris pour le plectrophane des neiges mais le dos fortement rayé, l'absence de blanc sur l'aile et la griffe de derrière allongée sont des traits distinctifs. L'absence de touffe aux oreilles, de jaune à la gorge, le bec de moineau feront distinguer ce plectrophane de l'alouette ordinaire. Une forte taille, l'habitude de se tenir au sol, et sa venue en hiver en troupe feront distinguer le plectrophane de Laponie de tout autre moineau de même coloration.

Indications sur le terrain. L'absence d'amas blanc sur les ailes fera distinguer le plectrophane de Laponie de celui des neiges, et l'absence de touffes aux oreilles et de jaune à la gorge le distinguera de l'alouette ordinaire, oiseaux avec lesquels on est exposé à le confondre, à l'état vivant.

Habitat. C'est une espèce circumpolaire qui ne descend vers les régions colonisées qu'en hiver. En Amérique il couve sous les hautes latitudes partout dans ce continent.

SOUS-ESPÈCES. Dans l'Est on ne rencontre jamais qu'une sous-espèce de ce plectrophane de Laponie, celui de l'Est, l'individu type. Semblable par ses mœurs au plectrophane des neiges il accompagne souvent des bandes de ces oiseaux et d'alouettes ordinaires.

540. **Le pinson à ailes baies.** (VESPER SPARROW). *Poocetes gramineus.* L., 5-75. Planche XXXI A. Moineau du sol, de couleur terne, délicatement rayé de teintes brunes, en dessus; en dessous, du blanc, avec des raies vaguement indiquées sur les flancs, en travers de la poitrine, et sur les côtés de la gorge. Les épaules sont d'un brun rougeâtre.

Traits distinctifs. Ce pinson peut se distinguer des autres pinsons de couleur terreuse par le brun-rouge des couvertures supérieures de l'aile ou des épaules, et par le blanc sur les plumes extérieures de la queue.

Indications sur le terrain. Le pinson à ailes baies peut facilement être confondu avec le pinson chanteur, à l'état vivant, mais l'absence de la tache pectorale causée par la réunion des raies, et la présence des plumes blanches extérieures de la queue, qui se voient quand l'oiseau vole, sont des marques distinctives. Le pinson niverolle, oiseau d'un gris uniformément foncé, est la seule autre espèce ayant une marque caudale de ce genre, qu'on puisse comparer au pinson à ailes baies.

Nid. Dans l'herbe sur le sol; nid fait d'herbages, de racielles, de poils, et d'herbes plus délicates à l'intérieur.

Habitat. En tant qu'espèce cet oiseau habite toute la partie tempérée de l'Amérique du Nord. Il couve partout où on le rencontre au Canada.

SOUS-ESPÈCES. Bien qu'on reconnaisse des sous-espèces de l'Est et de l'Ouest de ce pinson, celui de l'Est, l'individu type, se rencontre seul dans l'est du Canada.

Le pinson à ailes baies peut se comparer au pinson chanteur par ses mœurs, son chant et son apparence générale. Il est moins un oiseau des buissons, toutefois, et d'habitude il fréquente la lisière des champs, ou les endroits qui offrent un abri, comme le voisinage des fossés ou des routes. Son chant ressemble à celui du pinson chanteur, mais une oreille exercée ne s'y trompera pas et saura l'en distinguer.

Valeur économique. C'est un des plus utiles d'entre tous les passereaux. Il cherche sa nourriture au loin dans les champs, plus loin que la plupart des moineaux ordinaires d'été et prend une plus grande quantité d'insectes et de grandes quantités de semences de mauvaises herbes. On trouve du grain dans son estomac, mais la chose s'explique par le fait que c'est du grain perdu avec l'éteule ou le long du chemin. Le pinson à ailes baies mérite donc d'être protégé de toutes les façons.

541. **Le Pinson d'Ipswich.** (IPSWICK SPARROW). *Passerculus princeps.* L., 6-25. Ressemble à un gros et très pâle pinson des prés (voir l'espèce suivante).

Traits distinctifs. Il se distingue du pinson des prés par une plus grande taille et une coloration claire; en automne également par une absence presque complète de jaune à la courbure de l'aile et en avant de l'œil. Il se distingue du pinson à ailes baies par une coloration claire, l'absence de rouge sur les épaules, et, au printemps, par du jaune à la courbure de l'aile et en avant de l'œil. Il se distingue du pinson chanteur par sa couleur claire et, au printemps, par du jaune, comme ci-dessus.

Indications sur le terrain. Un pinson très pâle, à peu près de la taille du pinson à ailes baies.

Ce pinson a un habitat restreint et isolé. La seule place où il couve c'est l'île du Sable, à environ 60 milles au sud de Cap Breton. En hiver il émigre et descend la côte de l'Atlantique sans jamais aller loin dans l'intérieur. Il a peu de valeur économique.

542. **Le Pinson des prés.** (SAVANNAH SPARROW). *Passerculus sandwichensis.* L., 5-68. C'est un assez petit pinson rayé, en dessus, de brun, de gris cendré et de teintes intermédiaires. En dessous, blanc avec des raies d'un brun tranché sur la poitrine, sur les flancs et, en certains cas, sur la gorge. Du jaune sur la courbure de l'aile et une tache en avant de l'œil. Les oiseaux de l'automne sont lavés d'une teinte chamois, et les marques sont aussi plus légères et plus étendues.

Traits à en avant de forment un sons appare chées sur ur

Indicati au-dessus d insectes et c dues, et le t si ces sons v sauterelles,

Nid. S

Habitat. occupe l'est des prés de

SOUS-I espèce dont géographique

C'est où l'herbe face, soit c herbes cro souris, et j ait pu le b apparence

Valeu vaises her des passer saisis comp sibles. Bi des champ cultivateu

546. **Le narum.** L., 2 de fines et cc mat en dessc de la gorge. courbure de

Traits dist pièce. La poi herbicoles.

Indications sons par sa po partie de celui

Nid. Sur

Habitat. l la frontière car

SOUS-ES forme type se l'Ouest.

Ce pin qu'on y che décidément

Valeur que et en t

Traits distinctifs. Le pinson des prés peut se distinguer du pinson chanteur par les taches jaunes en avant de l'œil et sur la courbure de l'aile, et par l'absence de ces raies jointes ensemble qui forment une tache au milieu de la poitrine du pinson chanteur. Il peut se distinguer d'autres pinsons apparentés, des groupes du pinson des sauterelles et du *Passer herbulus*, par les raies bien tranchées sur un fond blanc en dessous.

Indications sur le terrain. Le pinson des prés peut se reconnaître sur le terrain par la ligne jaune au-dessus de l'œil et par les notes de sa voix. Son chant est une fine modulation, à la façon des insectes et dit: «*tsip-tsip-iou-ri-i-i-i-iou*», les premières notes à peine assez claires pour être entendues, et le tout lancé avec une vigueur qui porte les sons très loin et si fortement qu'on se demande si ces sons viennent de très près ou de très loin. Cela ressemble au chant tout pareil du pinson des sauterelles, mais celui-ci omet la note finale.

Nid. Sur le sol; nid fait d'herbes et garni de matières plus délicates.

Habitat. L'Amérique, du nord des rivages arctiques. Le pinson des prés de l'Est, *P. s. savanna*, occupe l'est de l'Amérique du Nord à l'ouest jusqu'aux prairies, où il est remplacé par le pinson des prés de l'Ouest.

SOUS-ESPÈCES. Notre individu, le pinson des prés de l'Est, *P. s. savanna*, est une sous-espèce dont la forme type se rencontre dans les îles Aléoutiennes. Il y a plusieurs autres races géographiques mais les différences entre elles sont trop légères pour être familières au public.

C'est un oiseau soit des prés humides, des terrains vagues et délaissés, où l'herbe croît en touffes fortes et grossières, et où l'eau est presque à la surface, soit encore des terrains sablonneux et stériles où l'herbe et les mauvaises herbes croissent en touffes éparses. Ce pinson court là comme ferait une souris, et puis s'enlève d'un rapide coup d'aile, souvent avant même qu'on ait pu le bien observer. C'est un oiseau petit, intéressant, mais de si minime apparence que le plus souvent l'observateur d'occasion ne le remarque pas.

Valeur économique. En sus de grandes quantités de graines de mauvaises herbes, le pinson des prés consomme plus d'insectes que la plupart des passereaux et plus d'escarbots qu'aucun autre de son espèce. Les insectes saisis comprennent un grand nombre de charançons et d'autres espèces nuisibles. Bien que ce pinson habite des endroits incultes, il fréquente aussi des champs cultivés, et cela assez souvent pour faire de lui un aide actif du cultivateur.

546. **Le Pinson des sauterelles.** (GRASSHOPPER SPARROW). *Ammodramus savannarum*. L, 5-38. C'est un petit pinson qui vit beaucoup dans l'herbe. Le dos est marqué de fines et courtes raies d'un chamois brun, cendré et clair, d'un dessin indéterminé; blanc mat en dessous, lavé en travers de la poitrine, d'un chamois clair qui se fane sur les côtés de la gorge. Tache jaune en avant de l'œil; les couvertures supérieures de l'aile et la courbure de l'aile sont jaunes ou jaunâtres.

Traits distinctifs. Les couvertures supérieures de l'aile sont jaunâtres et distinctives de l'espèce. La poitrine sans raie et sans tache le fera distinguer de la plupart des autres petits pinsons herbicoles.

Indications sur le terrain. Cette espèce peut être distinguée de la plupart des autres petits pinsons par sa poitrine sans raie et vaguement colorée de chamois. Son chant rappelle la dernière partie de celui du pinson des prés, moins la syllabe finale, et finit peu à peu en bz-bz-bz-bz-z-z-z.

Nid. Sur le sol; nid fait d'herbes et avec un toit arqué.

Habitat. Depuis les Etats-Unis jusque dans l'Amérique du Sud; il traverse régulièrement la frontière canadienne dans le voisinage du lac Érié, et seulement en cet endroit.

SOUS-ESPÈCE. Le pinson des sauterelles de l'Est est une sous-espèce, *A. s. australis*. La forme type se rencontre en dehors des limites du présent oiseau. Une autre espèce se trouve dans l'Ouest.

Ce pinson doit se chercher dans les prairies herbeuses en même temps qu'on y cherche le goglu et l'étourneau des prés; mais son habitat se borne décidément à certains lieux.

Valeur économique. C'est un pinson rare, de minime valeur économique et en tout cas ne causant aucun dommage.

547. **Le Pinson de Henslow.** (HENSLOW'S SPARROW). *Passerherbulus henslowi*. L. 5. C'est un très petit pinson herbicole. La nuque et le bas du cou sont d'un olive jaunâtre; le dos est vinacé, chacune de ces deux couleurs est marquée de courtes lignes de brun. En dessous du blanc finement rayé de brun foncé en travers de la poitrine et sur les flancs. Bec gros pour la taille de l'oiseau, les plumes et la queue sont pointues.

Traits distinctifs. La couleur olive et la vinacée sont les couleurs de fond des parties supérieures; la poitrine a de fines raies.

Indications sur le terrain. C'est un petit oiseau qui court dans l'herbe et qu'il est très difficile de faire s'envoler. Il s'élève d'un vol rapide, bas, en zig-zag et se laisse rechoir dans l'herbe avec une soudaineté inattendue. Le meilleur moyen de l'identifier à l'état vivant c'est d'écouter ses notes, les deux sons *si-slik* très pénétrants d'un si petit volume que d'en être presque difficiles à entendre même de très près, et cependant, assez prononcés pour avoir une force considérable de portée.

Nid. Sur le sol; nid fait d'herbes et extraordinairement bien caché.

Habitat. Le pinson de Henslow de l'Est se rencontre dans l'est du Canada seulement dans le sud de l'Ontario. Une autre sous-espèce se trouve dans l'Ouest.

SOUS-ESPÈCE. La forme de ce pinson de l'Est c'est le pinson de Henslow de l'Est qui est la sous-espèce type de la race.

Il peut arriver qu'on se trouve au milieu même d'une colonie de pinsons de Henslow sans qu'on s'en doute, pour la raison qu'on les voit rarement à moins que leurs notes n'attirent l'attention. Les prés herbeux dont on laisse perdre l'herbe sont leurs séjours de prédilection.

548. **Le Pinson de Leconte.** (LECONTE'S SPARROW). *Passerherbulus lecontei*. L. 5. C'est un très petit pinson herbicole, habile à se jouer de vous. En dessus, couronne brun foncé avec raie médiane d'un chamois clair, la nuque est vinacée avec raies gris chamois, le dos brun foncé avec raies d'un chamois clair bien tranchées. En dessous, blanc lavé d'ocre sur la poitrine, la gorge et les joues.

Traits distinctifs. Le contraste de la raie médiane d'un chamois clair avec la nuque vinacée et le dos brun foncé.

Nid. Sur le sol; nid fait d'herbes fines.

Habitat. Le centre de l'Amérique du Nord. C'est un oiseau de la Prairie qui ne se rencontre qu'accidentellement en dedans du territoire dont s'occupe le présent ouvrage.

Cette espèce n'a été signalée qu'une seule fois dans l'est du Canada, à Toronto. A cause de ses habitudes toutes pareilles à celles des souris, ce pinson est difficile à trouver ou à reconnaître, si on le trouve; il peut donc être plus commun qu'on ne croit.

549. 1. **Le Pinson à queue aiguë.** (NELSON'S SHARP-TAIL). *Passerherbulus nelsoni*. L. 5-9. Un petit pinson herbicole. En dessus, la ligne médiane de la couronne, d'un bleu ardoisé avec bordure brun foncé, et ligne d'ocre au-dessus de l'œil. Une bande vaguement ardoisée et olive en travers de la nuque et des épaules. Dos à raies bien tranchées d'un brun ardent et chamois pâle lavé d'un ton ardoisé clair. En dessous du blanc avec poitrine de couleur ocre qui s'étend plus ou moins aux joues, aux flancs, et pâle sur la gorge. La poitrine est quelquefois marquée de raies indistinctes et plus foncées; les flancs le sont toujours.

Traits distinctifs. La raie médiane de la couronne est de couleur ardoisée; de longues raies sur le dos de même couleur.

Indications sur le terrain. La coloration générale de couleur chamois ou jaune foncé en dessous; la ligne jaune au-dessus de l'œil et les raies un peu vagues sur la poitrine.

Nid. Sur le sol; nid fait d'herbes délicates.

Habitat. L'est de l'Amérique, surtout au nord des Etats-Unis et au sud du Canada. La forme type est limitée aux prairies et l'autre à la côte de l'Atlantique.

SOUS-ESPÈCES. Le pinson à queue aiguë comprend deux sous-espèces, la forme type, le pinson à queue aiguë, race de la Prairie; et le pinson à queue aiguë d'Acadie, *P. n. subvirgatus*, qui est une race de l'extrême Est. Le pinson d'Acadie se cantonne dans les marécages salins de la côte orientale de l'île du Prince-Edouard et au-dessous du golfe St-Laurent. Sa poitrine et sa gorge sont plus claires, couleur chamois plutôt que d'ocre, il est distinctement quoique faiblement rayé sur la poitrine. La coloration du dos est plus effacée et plus étendue; la ligne médiane de teinte ardoisée est plus large et fait moins contraste avec la brune. On ne court guère le risque de les confondre car les races peuvent être réparties géographiquement avec beaucoup de certitude. Le pinson à queue aiguë ne se rencontre que par occasion et par accident dans la région des grands lacs, tandis que le pinson d'Acadie est en réalité confiné dans le voisinage de l'eau salée.

Le
les her
forcés.

552.
C'est un
rayé de b
châtain a
en violen
en traver
l'oreille;
les extrém

Traits
ja face noi

Indicat
à la queue

Nid.
fines, de r

Habita
type, s'éte
autre sous-
ordinaire d

Le
cher dar
des char

553. |
Gros pins
la face, la

Traits
de l'encre

Nid. |
Habitat

riles.

Cet
tario près
où l'on |
London,

554. |
leucophrys.

Traits d
l'espèce sui
sence de la
forme au lie

Indicatio
jaune en avi

Nid. |
de radicelle

Habitat.
pinson à cou

l'Ouest, où

SOUS-
une seule, le

C'es
leurs très
le gris de
aussi est

Les pinsons à queue aiguë sont des oiseaux de marécages, courant dans les herbes, s'y cachant et refusant de s'envoler jusqu'à ce qu'ils y soient forcés.

552. Le Pinson ordinaire. (LARK SPARROW). *Chondestes grammacus*. L, 6-25. C'est un pinson d'apparence frappante et portant des marques bien visibles. En dessus, rayé de brun et de brun chamois, en dessous blanc avec flancs chamois. Couronne brun châtain avec ligne médiane visible et pâle. Les couvertures des oreilles sont brun châtain en violent contraste avec la face blanche; puis, trois lignes noires bien tranchées, l'une en travers de l'autre, une autre depuis la mandibule inférieure jusqu'aux couvertures de l'oreille; une dernière le long des côtés de la gorge. Les plumes extérieures de la queue, les extrémités de toutes les autres, sauf de celles du milieu, sont blanches.

Traits distinctifs. Les couvertures des oreilles d'un brun rougeâtre brillant, contrastant avec la face noire et blanche sont des caractères très distinctifs.

Indications sur le terrain. La tête et la face fortement marquées et la forte quantité de blanc à la queue sont des indications faciles à reconnaître.

Nid. Sur des arbres plutôt bas et dans les buissons; nid fait d'herbes et garni d'herbes plus fines, de radicelles et de poils.

Habitat. De la vallée du Mississippi vers l'Ouest. Le pinson ordinaire de l'Est, la forme type, s'étend depuis les grandes plaines à l'Est et au Nord jusque dans le sud de l'Ontario. Une autre sous-espèce se rencontre dans l'Ouest. La sous-espèce de l'Est de cet oiseau est le pinson ordinaire de l'Est, la forme type de l'espèce.

Le pinson ordinaire est rare dans l'est du Canada. Il faut l'aller chercher dans les terrains à broussailles incultes et le long des lisières boisées des champs.

553. Le Pinson de Harris. (HARRIS' SPARROW). *Zonotrichia querula*. L, 7-50. Gros pinson rayé de brun et de brun cendré en dessus; blanc, en dessous. La couronne, la face, la gorge et le front entièrement noirs, et passant à l'état de raies sur les flancs.

Traits distinctifs. Chez les adultes, la face est noire comme si elle avait été trempée dans de l'encre qui se serait répandue sur la couronne et la gorge.

Nid. Sur le sol; au pied d'un bouleau nain; nid fait d'herbes et rarement découvert.

Habitat. Les régions de la Prairie, en Amérique; au nord jusqu'aux confins des terres stériles.

Cet oiseau peut être plus commun qu'on ne croit dans l'ouest de l'Ontario près de la frontière du Manitoba, mais c'est à coup sûr la seule région où l'on puisse rechercher cette espèce. On a signalé un de ces pinsons à London, Ontario, mais ce n'a été, naturellement, qu'accidentellement.

554. Le Pinson à couronne blanche. (WHITE-CROWNED SPARROW). *Zonotrichia leucophrys*. L, 6-88. Planche XXXI B.

Traits distinctifs. Le seul qu'on puisse probablement confondre avec le pinson à gorge blanche, l'espèce suivante, et il est possible de l'en distinguer, sous quelque plumage que ce soit, par l'absence de la tache jaune en avant de l'œil et, chez l'oiseau adulte, par la gorge d'un gris presque uniforme au lieu de la gorge très blanche de cette espèce.

Indications sur le terrain. La couronne blanche et l'absence de blanc à la gorge ou de la tache jaune en avant de l'œil. À l'état vivant le dos a une couleur plutôt grise que rougeâtre.

Nid. Sur le sol ou dans les buissons un peu bas; nid fait d'herbe et de petites fibres végétales de radicelles, etc.

Habitat. L'Amérique du Nord à partir de la limite des terres dans la direction du sud. Notre pinson à couronne blanche, de l'Est, le type de l'espèce, s'étend vers la province de la Prairie de l'Ouest, où sa place est prise par une sous-espèce, le pinson de Gambel, *Z. i. gambeli*.

SOUS-ESPÈCE. Quoique trois sous-espèces de cette espèce soient reconnues au Canada, une seule, le pinson à couronne blanche de l'Est, la forme type, se rencontre dans l'Est.

C'est l'un des plus beaux pinsons. Lors même qu'il manque de couleurs très brillantes, sa couronne noire et blanche en contraste frappant et le gris de la gorge et du cou lui donnent un air de distinction. Son chant aussi est mélodieux, vu qu'il a cette limpidité qui distingue le chant de

son proche parent le pinson à gorge blanche; malheureusement on ne l'entend surtout à son avantage que dans les parages du nord où a lieu sa couvaison.

Valeur économique. Bien qu'il ne séjourne que pendant deux semaines, au printemps et en automne, dans les régions cultivées, il y fait cependant un utile travail. Les semences de mauvaises herbes forment une partie considérable de ses aliments, la renouée et le chiendent y jouant le principal rôle. Les insectes ne constituent qu'une faible partie de sa nourriture.

558. **Le Pinson à gorge blanche.** (WHITE-THROATED SPARROW) *Zonotrichia albicollis*. L, 6-74. Planche XXXII A.

Traits distinctifs. Quand il revêt sa livrée de l'âge adulte il est facile de le confondre avec le pinson à couronne blanche, précédemment mentionné, mais sa gorge absolument blanche, et la tache jaune en avant de l'œil sont distinctives. Les jeunes oiseaux peuvent être pris pour des pinsons de marais, mais la tache jaune et la coloration plus rouge les feront distinguer toujours l'un de l'autre.

Indications sur le terrain. La gorge blanche, les lores jaunes, et le dos rougeâtre au lieu de grisâtre, feront facilement distinguer les adultes d'avec les pinsons à couronne blanche. Les jeunes sont un peu plus difficiles à identifier et à distinguer de plusieurs autres espèces, mais au cas où ni la tache loreale jaune, ni la gorge vaguement blanche que suggère parfois le pinson des marais, ne seraient reconnaissables, le dos beaucoup plus rouge suffira ordinairement à l'identification des pinsons à gorge blanche.

Nid. Sur le sol ou dans des buissons peu élevés; nid fait d'herbes grossières, de racelles et de mousse, garni d'herbes plus fines.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord jusqu'à la limite des arbres au nord. Il couve partout où on le trouve au Canada sauf dans les régions les plus méridionales.

Nous avons ici le plus fameux chanteur des forêts du nord. Quand il chante de son mieux, sa voix est limpide, flûtée, lentement mesurée pour siffler ce qu'on a cru pouvoir rendre par les mots: *Hard-times-can-a-da-can-a-da-can-a-da*, ou bien *Poor-Bill-Pea-bo-dy-Pea-body-Pea-bo-dy*. Le pinson à gorge blanche est un oiseau des broussailles; les fourrés embroussaillés, les buissons de ronces entassés tout près des champs constituent sa demeure favorite. Dans la plupart des régions cultivées du Canada, cet oiseau n'est qu'un oiseau de passage, et son chant se fait rarement entendre. En automne quand les jeunes oiseaux s'envolent vers le sud, leurs notes se font entendre en des sons adoucis et abrégés.

Valeur économique. Le pinson à gorge blanche est un oiseau de beaucoup de valeur. Il a de l'importance comme destructeur de semences de mauvaises herbes, surtout de renouée; il consomme force insectes et un peu de fruits sauvages. Comme cette espèce arrive en nombre considérable dans les régions fortement cultivées, au commencement de l'automne, son influence sur la masse des semences de la saison suivante ne peut être que très prononcée.

559. **Le Pinson de montagne.** (TREE SPARROW). *Spizella monticola*. L, 6-36. Planche XXXII B.

Traits distinctifs. Ressemble beaucoup au petit pinson à couronne rousse et au pinson des champs mais est plus gros, le bec jaune, à pointe noire, au lieu d'être noir comme chez le précédent ou couleur cannelle comme chez le dernier, et avec une tache foncée à moitié cachée au milieu de la poitrine.

Indications sur le terrain. Calotte brun rouge, barres blanches des ailes en évidence; gorge gris cendré, et tache foncée au milieu de la poitrine sans tache et uniformément colorée.

Nid. Sur le sol ou tout près; nid fait d'herbes, de racelles et de poils.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord. Couve dans l'extrême nord par delà des limites de la civilisation; hiverne dans le nord des Etats-Unis.

SOU
trent au
cupe le

D
quets
printe
méridi
il pass
chant,
l'hiver

V
coup d
vaise h

560
rina. I

Trait
et du pin
d'eux et c
ont la têt
à l'ocasi
rousse, ce

Indic
longé, tra
qu'une tri

Nid.
breuses e
l'origine c

Habit
partout oi

SOU
c'est le pi
l'Ouest.

Le
habitati
maisons
et même
que ne l'
paisibles

Val
grand in
pendant
d'insecte
des espè
La moye
le pinson
matière
vaises h
prédomi
désirable
ment uti

561. I
L, 5-20.

SOUS-ESPÈCES. Les sous-espèces de l'Est et de l'Ouest du pinson de montagne se rencontrent au Canada. La première est la forme type et la seule qui se trouve dans la région dont s'occupe le présent ouvrage.

Dans la foule de pinsons qui se donnent rendez-vous au sein des bouquets d'arbrisseaux, en automne, ou qui y reviennent de bonne heure au printemps, on est sûr de trouver le pinson de montagne. Dans les parties méridionales du Dominion il y reste quelquefois tout l'hiver, mais ailleurs il passe en migrateur. C'est un petit oiseau très propre, dont le modeste chant, au début du printemps, est fort bien accueilli après le long silence de l'hiver.

Valeur économique. Ce pinson est précieux parce qu'il détruit beaucoup de semences de mauvaises herbes et qu'il paraît n'avoir aucune mauvaise habitude.

560. Le Petit Pinson à couronne rousse. (CHIPPING SPARROW). *Spizella passerina*. L, 6-37. Planche XXXIII A.

Traits distinctifs. C'est un oiseau bien connu, à distinguer par la taille du pinson des marais et du pinson de montagne, qui eux aussi, comme lui, ont une calotte rouge; on le distinguera aussi d'eux et du pinson des champs par son bec noir et par la raie noire en travers de l'œil. Les jeunes ont la tête rayée et ressemblent extrêmement au pinson couleur d'argile, oiseau de l'Ouest qui, à l'occasion, peut-être confondu avec eux dans l'extrême ouest de l'Ontario. Le pinson à couronne rousse, cependant, a un croupion couleur d'ardoise au lieu d'être d'un olive chamois.

Indications sur le terrain. C'est un petit oiseau, mince avec une calotte rouge, son chant prolongé, traînant, n'est qu'une suite de gazouillements sans accent, qui se mêlent pour ne former qu'une trille unique, soutenue, fort caractéristique.

Nid. Dans les arbres ou dans les buissons; nid fait d'herbes, de radicelles, et de fibres nombreuses entrelacées avec de longs poils. La quantité de crin de cheval employé dans ce nid est l'origine d'un des noms populaires de cet oiseau.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord jusqu'au nord de la civilisation. Il couve au Canada partout où il se trouve.

SOUS-ESPÈCES. Le type du pinson à couronne rousse qui se rencontre dans l'est du Canada, c'est le pinson à couronne rousse de l'Est, l'individu type. Une autre sous-espèce se rencontre dans l'Ouest.

Le petit pinson à couronne rousse est rarement éloigné du voisinage des habitations de la banlieue ou des villages, car il s'approche volontiers des maisons et fréquente les vergers, les arbres feuillus, la cour devant la maison et même le pas de la porte d'entrée. Il n'a pas peur de l'homme, mais, quoi qu'il en soit, ne l'évitant pas, il ne se fait pas remarquer de lui, par suite de ses mœurs paisibles et modestes.

Valeur économique. Le petit pinson à couronne rousse est un plus grand insectivore qu'aucun autre oiseau de la même famille. En réalité, pendant tout le mois de juin, le 93 pour cent de sa nourriture se compose d'insectes, dont une fraction minime, le 1 pour cent seulement renferme des espèces utiles telles que les coléoptères carnassiers et les guêpes parasites. La moyenne de l'année est de 38 pour cent d'insectes, et pour les mois que le pinson passe au Canada la moyenne doit être beaucoup plus élevée. La matière végétale qu'il consomme se compose de petites semences de mauvaises herbes parmi lesquelles le panic sanguin, le bon-henri et la renouée prédominent. On se convaincra sans peine qu'un oiseau qui a des goûts si désirables et qui survient dans le voisinage immédiat d'un jardin est infiniment utile et mérite d'être protégé de toute façon.

561. Le Pinson couleur d'argile. (CLAY-COLOURED SPARROW). *Spizella pallida*. L, 5-20. C'est un petit pinson dont les parties de dessus sont rayées d'un chamois pâle

et d'un brun foncé jusqu'à la couronne, où se remarque une bande médiane blanchâtre. Un col un peu vague d'une couleur ardoisée étendue vers l'arrière-cou. Les dessous sont blancs, légèrement teintés de chamois sur les flancs.

Traits distinctifs. En raison de sa taille et de ses mœurs, cet oiseau ne saurait être confondu avec aucun autre pinson qu'avec celui à couronne rousse; mais le dos est plus pâle que chez ce dernier, plus couleur d'argile, et le croupion au lieu d'être vaguement ardoisé est quelque peu d'un olive chamois.

Nid. Sur le sol ou dans les buissons; nid fait d'herbes et garni de poils.

Habitat. L'intérieur de l'Amérique. C'est un résident de la Prairie qui va au nord jusqu'aux limites des provinces de la Prairie et qui ne se rencontre que par accident dans l'est du Canada sauf peut-être dans le pays qui touche à la frontière du Manitoba. C'est un oiseau de l'Ouest, qui se montre rarement dans les confins de l'ouest de la région dont s'occupe le présent ouvrage.

563 Le Pinson des champs. (FIELD SPARROW). *Spizella pusilla*. L, 6-68. C'est un petit pinson de la même couleur, en général, que le pinson à couronne rousse, mais dont les couleurs sont atténuées, étendues et fondues ensemble. La couronne rouge est plus foncée et peu manifeste, la ligne noire en travers de l'œil est absente. Le bec est couleur cannelle au lieu de noir.

Traits distinctifs. Les traits qui précèdent suffisent à distinguer l'oiseau.

Indications sur le terrain. Couronne rouge mat; absence de marques faciales autres qu'une pointe rouge aux extrémités des couvertures des oreilles; bec couleur cannelle. Son chant est le trait caractéristique le plus facile à reconnaître, et une fois connu il constitue le meilleur moyen d'identification.

Nid. Sur le sol ou dans des buissons peu élevés; nid fait d'herbes plutôt grossières, tiges d'herbe et radicelles, garni d'herbes plus délicates et de poils.

Habitat. L'est de l'Amérique; le Canada dans les parties les plus colonisées; un habitat cependant plutôt local que générale mais un oiseau étrangement absent de certaines localités comprises dans son territoire.

SOUS-ESPÈCES. Le pinson des champs comprend deux sous-espèces: celle de l'Est et celle de l'Ouest; la première, la forme type, est la seule qui se rencontre dans l'est du Canada.

Le pinson des champs est un oiseau qui n'attire pas les regards et qui, quoique très commun, ressemble tant au pinson à couronne rousse avec son plumage habituel qu'on peut le confondre avec lui. C'est un oiseau des champs et des rangs de clôture, quoiqu'il ne soit ni timide ni extrêmement solitaire, il faut le chercher et l'écouter pour le trouver.

Valeur économique. Très semblable au pinson à couronne rousse par ses habitudes alimentaires; prenant quelques insectes utiles mais cependant pas en si grand nombre qu'il en devienne nuisible.

567. Pinson niverolle. (JUNCO). *Junco hiemalis*. L, 6-27. Planche XXXIII B.

Traits distinctifs. Gris ardoisé foncé sur tout le dessus du corps et la poitrine; contrastant violemment avec les dessous blancs.

Indications sur le terrain. Ligne tranchée de la poitrine foncée contre les dessous blancs, et contre les plumes extérieures de la queue qui se montrent pendant le vol.

Nid. Sur le sol ou tout près; nid fait d'herbes, de mousse, de radicelles et garni d'herbes plus délicates et de longs poils.

Habitat. En tant qu'espèce, toute l'Amérique jusqu'à la limite des arbres. Le pinson niverolle couleur d'ardoise s'étend à l'ouest jusqu'à l'Alberta.

SOUS-ESPÈCES. Les pinsons niverolles comprennent plusieurs sous-espèces, dont une seule, le pinson niverolle ardoisé, la forme type, se rencontre dans l'est du Canada.

Le pinson niverolle avec sa poitrine noire, son bec de couleur claire, sa queue à bordure blanche est remarquable parmi les grandes bandes de pinsons qui sont de passage ou qui séjournent pendant le printemps et l'automne.

Valeur économique. L'influence du pinson niverolle en agriculture est presque entièrement bienfaisante. Pendant son séjour dans les parties les plus populeuses du pays il consomme de grandes quantités de semences de mauvaises herbes. Les insectes qu'il mange sont presque tous nuisibles. On ne peut pas lui en vouloir puisqu'il ne fait de mal ni aux récoltes ni aux fruits.

581. 1
che XXXI

Traits c
rale, mais le
la queue. plu
milieu en un
chanteur de
des autres p

Indicati
blanches ex
la queue plu
chanteur de

Nid. S
de feuilles n

Habitat.
des arbres.

SOUS-1
comprend p
plusieurs au
ginaires des
variées ont l
est celle du j

Il es
qu'occupe
gazouiller
ceux qui
qu'il est d
vit parmi
habituels
bord des
champs de
quelquefo

Valer
leur donne
lyse des a
composé d
nuisibles.
ces de ma
sauvages e
précède qu
recherches
vaisses heri
sommée p
que le pin
du Canada
et par ann
mille carré
total—pou
de ces seme

583. Le
Ressemble a
laquelle est a

Traits dist
avec lesquels i

Indications
fines de l'oiseau

581. **Le Pinson chanteur.** (SONG SPARROW). *Melospiza melodia*. L, 6-30. Planché XXXIV A.

Traits distinctifs. Il ressemble plutôt au pinson à ailes baies par la taille et la coloration générale, mais les tons sont plus foncés et plus accusés; il lui manque les plumes blanches extérieures de la queue. Les raies de la poitrine sont aussi plus tranchées, d'un brun plus foncé, et réunies vers le milieu en une tache bien définie. L'absence de la bande jaune au-dessus de l'œil distingue le pinson chanteur du pinson des prés, et la poitrine aux raies tranchées le distingue de l'un quelconque des autres pinsons de taille et de couleurs analogues.

Indications sur le terrain. Poitrine à bandes tranchées et tache centrale. L'absence des plumes blanches extérieures de la queue empêchera qu'on confonde ce pinson avec son confrère à ailes baies; la queue plus longue, l'absence des lora jaunes, la voix et la tenue générale feront distinguer le pinson chanteur de celui des prés.

Nid. Sur le sol, plus rarement dans les buissons; nid fait d'herbes grossières, de racines, de feuilles mortes, de bandes d'écorce, etc., garni d'herbes délicates et quelquefois de longs poils.

Habitat. En tant qu'espèce, le pinson chanteur habite partout en Amérique jusqu'à la limite des arbres. Notre individu de l'Est s'étend à l'Ouest jusqu'aux provinces centrales de la Prairie.

SOUS-ESPÈCES. Le pinson chanteur est une espèce qui habite un vaste territoire et qui comprend plusieurs sous-espèces, dont une vingtaine sont reconnues dans l'Amérique du Nord et plusieurs autres sont proposées. La plupart de ces sous-espèces sont des formes de l'Ouest, originaires des terres accidentées de la Côte du Pacifique où des colonies isolées et des conditions variées ont favorisé de nombreuses déviations du type. Dans l'Est du Canada, la forme reconnue est celle du pinson chanteur de l'Est, *M. m. melodia*, la race type.

Il est difficile de se faire une idée juste et sans parti pris de la place qu'occupe le pinson chanteur dans l'orchestre ailé. Ce pot-pourri de gazouillements et de trilles donne une certaine durée à un chant qui offre à ceux qui l'écoutent avec plaisir une jovialité, une limpidité et une douceur qu'il est difficile de surpasser. Cet oiseau semble être partout à la fois. Il vit parmi les arbrisseaux qui entourent la maison, et il est l'un des hôtes habituels du jardin. Il fréquente les bosquets à la lisière des bois ou sur le bord des petits cours d'eau ou des ruisselets. Les forêts profondes et les champs découverts sont les seules places d'où il est en général absent, mais quelquefois, là même, il nous surprend par une fanfare de notes limpides.

Valeur économique. Le nombre considérable de ces pinsons chanteurs leur donne une importance très grande aux yeux du cultivateur. Une analyse des aliments de cet oiseau fait voir que le 2 pour cent seulement est composé d'insectes utiles et que le 18 pour cent est formé par des insectes nuisibles. Le grain qu'on laisse perdre constitue le 4 pour cent et les semences de mauvaises herbes le 50 pour cent. Le reste est composé de fruits sauvages et d'autres matières sans importance. On peut voir par ce qui précède que le pinson chanteur a une valeur économique considérable. Des recherches à ce sujet ont montré qu'un quart d'once de semences de mauvaises herbes par jour est une évaluation assez exacte de la quantité consommée par un pinson mangeur de ces semences. Pendant les neuf mois que le pinson chanteur est parmi nous dans une localité moyenne de l'est du Canada, la consommation se monte à quatre livres et quart par individu, et par année. Si nous estimons qu'il peut y avoir 75 pinsons chanteurs par mille carré—chiffre qui est très loin d'être exagéré—nous arrivons à un total—pour les parties cultivées de l'Ontario—de plus de onze mille tonnes de ces semences détruites chaque année par cette espèce, à elle seule.

583. **Le Pinson de Lincoln.** (LINCOLN'S SPARROW). *Melospiza lincolni*. L, 5-75. Ressemble au pinson chanteur mais avec une ceinture chamois en travers de la poitrine, laquelle est aussi parsemée de petites taches très fines.

Traits distinctifs. Les traits précédents distingueront le pinson de Lincoln de tous les autres avec lesquels il pourrait être confondu.

Indications sur le terrain. De bons yeux feront voir la poitrine vaguement chamois et les taches fines de l'oiseau. À cela près, on le distinguera avec peine, à l'état vivant, du pinson chanteur. Le

dos est plutôt plus gris que le pinson chanteur, et de là résulte le soupçon qu'il pourrait s'agir du pinson de Lincoln, soupçon que viendraient confirmer d'autres caractères.

Nid. Semblable à celui du pinson chanteur, sur le sol.

Habitat. L'espèce est répandue par toute l'Amérique, couvant comme elle fait, dans les bois conifères du Nord.

SOUS-ESPÈCES. Les pinsons de Lincoln, soit ceux de l'Est soit ceux de l'extrême Ouest, peuvent être différenciés en deux espèces. Le type qui occupe le territoire ici mentionné est le pinson de Lincoln de l'Est, *M. l. lincolni*, la race type.

Bien qu'il soit rare, ce pinson est fort intéressant, autant qu'aucun oiseau. Il a élevé à la hauteur d'un art le talent de se cacher dans les broussailles. Dès qu'il est dérangé il sautille sur une branche, d'où il peut bien voir ce qui se passe; il regarde un instant l'intrus, et puis plonge dans l'enchevêtrement des broussailles, et puis... ni vu ni connu! La recherche la plus active ne donnera ensuite pas autre chose qu'une vue rapide d'une ombre brune qui disparaîtra dans le plus prochain tas de broussailles. Cette espèce se réduit à un hôte passager, migrateur à travers les parties colonisées du Canada, et se fait rare.

584. **Le Pinson des marais.** (SWAMP SPARROW). *Melospiza georgiana*. L., 5-89. Très semblable au pinson chanteur, mais d'une coloration plus forte et moins fondue, et sans aucune raie ni marque distincte.

Traits distinctifs. Le pinson des marais est difficile à distinguer de plusieurs autres formes de coloration et de taille analogues. On peut le distinguer du pinson chanteur, très facile à confondre avec lui, par la poitrine sans raie et, chez les oiseaux adultes, par la couronne rouge. Les jeunes oiseaux d'automne ressemblent fort aux jeunes pinsons à gorge blanche, mais ils n'ont pas la tache loreale vaguement jaune; ils ne sont pas non plus aussi uniformément rouges sur le dos, et ordinairement ils ont comme l'esquisse d'une barre cendrée en travers des épaules à la base du cou, une teinte cendrée à la couronne, et des lignes sourcilières qui manquent à cette espèce. Il peut se distinguer du pinson de montagne par l'absence de la tache foncée au milieu de la poitrine ou des barres blanches de l'aile.

Indications sur le terrain. Sa ressemblance avec le pinson chanteur mais sans les raies de la poitrine, l'absence de la tache jaune loreale du pinson à gorge blanche, ou des barres de l'aile du pinson de montagne. En été, quand le pinson de montagne n'est pas sur les lieux, la calotte rouge est distinctive.

Nid. Semblable à celui du pinson chanteur, sur le sol, quelquefois dans l'herbe.

Habitat. L'Amérique du Nord à l'est des prairies; il couve dans la plupart des parties inhabitées du Canada.

Comme l'indique son nom, ce pinson fréquente les terres basses et humides et les marais. Les hautes herbes et les bords des marécages sont les parages qu'il affectionne. Vers la fin de l'automne il rejoint les grandes bandes de passereaux de toute sorte dans les buissons et sur les barrières entrecroisées où il se trouve alors dans un plus proche voisinage de l'homme.

Valeur économique. Le genre d'aliments que recherche le pinson des marais ne diffère pas grandement de celui des pinsons qui lui ressemblent. Comme il passe sa vie dans les terrains incultes, son alimentation est sans importance.

585. **Le Pinson fauve.** (FOX SPARROW). *Passerella iliaca*. L., 7-26. C'est un assez gros pinson. En dessus il est d'un brun rougeâtre brillant, entièrement brun à la queue et au croupion, mais avec une teinte ardoisée mate visible à travers le rouge sur l'arrière-cou et la couronne. En dessous, blanc fortement taché et avec des raies rouges comme le dos, sur les côtés de la gorge, en travers de la poitrine et sur les flancs. La gorge est presque dépourvue de marques et les taches tendent à se grouper sur la poitrine en une tache centrale.

Traits distinctifs. La taille plutôt grande et la coloration générale d'un rouge fauve brillant sont distinctives.

Indications
La grive sol

Nid. S
garni d'herb

Habitat.
nord jusqu'
jusqu'au pie

SOUS-E
se prête à de
qui se rencor

Ce pi
jours au p
de nous s
raient éga

Valeu
milieu de
tance aux
jorité des j
cultivés à
sectes et d
qui que ce

587. **Le**
Chez le mâ
la poitrine, o
flancs larges
au vol, et b
mais chez ell

Traits dist
tion, ce pinson
beaucoup l'idé
à peine rayée,
généraux sont

Indications
cette espèce ne
buissons, le noi
et le blanc sur

Nid. Sur
délicates.

Habitat. I
se rencontre au
inférieure des g

SOUS-ES
le pinson aux y

Le pins
res de bois,
aime à se p
entendre so
est dérangé
noire et bla
des plantes
tuel et inqu
une poule, f

593. **Le C**
un grand pins
avec une point

Indications sur le terrain. Coloration d'un rouge intense surtout sur le croupion et la queue. La grive solitaire lui ressemble beaucoup quand elle vole, mais le haut du dos est plus olivacée.

Nid. Sur le sol ou sur des arbres peu élevés et dans les buissons; nid fait d'herbes grossières, garni d'herbes délicates, de poils, de mousse et de plumes.

Habitat. En tant qu'espèce le pinson fauve a pour territoire toute l'Amérique du Nord, au nord jusqu'à la limite des arbres. Le type canadien, le pinson fauve de l'Est, s'étend à l'ouest jusqu'au pied des Montagnes Rocheuses, où sa place est prise par plusieurs autres sous-espèces.

SOUS-ESPÈCES. Le pinson fauve est une espèce qui présente beaucoup de variétés et qui se prête à des formes nouvelles, aussi distingue-t-on plusieurs sous-espèces bien caractérisées. Celle qui se rencontre dans l'est du Canada, c'est le pinson fauve de l'Est, *P. i. iliaca*, la race type.

Ce pinson ne demeure dans les parages civilisés que pendant quelques jours au printemps et en automne. Il lui arrive quelquefois, au printemps, de nous saluer d'une voix pleine et limpide que peu d'autres oiseaux sauraient égaler et qu'aucun, peut-être, ne serait capable de surpasser.

Valeur économique. Ce pinson ne séjourne que trop peu de temps au milieu de nous, et en trop petit nombre, pour y avoir beaucoup d'importance aux yeux du cultivateur. Il mange un peu plus de fruits que la majorité des pinsons, mais dans le temps de ses visites, il n'y a que peu de fruits cultivés à sa disposition. Quant à la partie de son alimentation faite d'insectes et de semences de mauvaises herbes, elle n'est pas de nature à alarmer qui que ce soit.

587. **Le Pinson aux yeux rouges.** (TOWHEE). *Pipilo erythrophthalmus*. L., 8-35. Chez le mâle tous les dessous sont d'un noir pur, y compris la queue, la tête, la gorge et la poitrine, où ce noir se détache en une ligne tranchée sur le blanc clair des dessous. Les flancs larges sont rougeâtres ou bais. Quelques bordures blanches des plumes qui servent au vol, et beaucoup de blanc sur les bords de la queue. La femelle est toute pareille mais chez elle le noir est remplacé par du brun rougeâtre.

Traits distinctifs. Par suite de sa grande taille, de sa longue queue et de sa remarquable coloration, ce pinson ne peut guère être pris pour aucun autre oiseau. Les jeunes oiseaux ne donnent pas beaucoup l'idée de ces couleurs distinctives, car cette coloration est vague, généralement rouilleuse, à peine rayée, et cela encore de façon interrompue; mais la longue queue, la taille et les contours généraux sont d'habitude suffisants à faire reconnaître l'oiseau.

Indications sur le terrain. Si l'on voit bien la tête et le dos ou noirs ou bruns, les flancs rouges, cette espèce ne peut guère être prise pour une autre. Lorsque l'oiseau s'élance dans les dessous des buissons, le noir et le blanc si fortement accusés des ailes et de la queue du mâle, ou le brun rougeâtre et le blanc sur la queue de la femelle sont facilement reconnaissables.

Nid. Sur le sol ou tout près, nid fait de feuilles mortes, de bandes d'écorce et garni d'herbes délicates.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord, depuis le Canada méridional jusqu'au golfe. Il ne se rencontre au Canada que le long de la frontière méridionale et n'est commun que dans la région inférieure des grands lacs.

SOUS-ESPÈCES. Le pinson aux yeux rouges de l'est du Canada, *P. e. erythrophthalmus*, est le pinson aux yeux rouges de l'Est, le représentant typique de la race.

Le pinson aux yeux rouges est un oiseau des broussailles et des lisières de bois, où sa note "*Chi-wi*" ou "*Ti-wi*" est un son bien connu. Il aime à se percher au bout d'une branche isolée dans la broussaille et à faire entendre son petit cri limpide de "*dik-iou-tchidoll, tchiddoll, tchiddoll.*" S'il est dérangé il se laisse choir dans les broussailles du pied de l'arbre, sa livrée noire et blanche y brille un instant, puis il disparaît dans l'enchevêtrement des plantes d'où il se laisse apercevoir et fait entendre son "*Tchi-wi*" habituel et inquisitif. Pour chercher sa nourriture il gratte la surface comme une poule, faisant voler les feuilles mortes tout autour de lui.

593. **Le Cardinal gros-bec.** (CARDINAL) *Cardinalis cardinalis*. L., 8-25. C'est un grand pinson et un gros-bec typique. Le mâle est d'un rouge cardinalice brillant avec une pointe de noir autour de la base du bec et de la gorge. Les deux sexes ont une

huppe très visible et aussi protubérante que celle du geai huppé. La femelle est d'un chamois ardent, comme coloration, presque blanche en dessous et d'un olive-chamois sur le dos; les ailes, la queue, et la huppe ayant presque la couleur rose du mâle. La face et la gorge noires du mâle sont vaguement indiquées.

Traits distinctifs. Impossible de le prendre pour autre chose que ce qu'il est. Le gros-bec des pins peut faire penser au Cardinal, mais le rouge n'est jamais si général ni si brillant, puis il n'a pas la huppe ni la marque noire si frappante de la face. Le tangara écarlate est d'un rouge aussi brillant, mais il n'a ni la huppe ni la marque faciale, puis les ailes et la queue sont noires.

Indications sur le terrain. La coloration rouge de tout l'oiseau, le jet de rouge ardent sur les ailes et la queue de la femelle; la huppe en saillie et le gros bec rouge dans les deux sexes.

Nid. Dans les buissons, nid fait de ramilles, de radicelles et bandes d'écorce, et garni d'herbes et de radicelles.

Habitat. Le cardinal, dans ses diverses sous-espèces, occupe un vaste territoire aux Etats-Unis; la forme type traverse la frontière canadienne, en général le long de l'extrémité ouest du lac Erié. Il se présente ou comme individus séparés ou en groupes isolés soit là soit dans des localités voisines. Le cardinal de l'Est, celui dont il est ici question, est l'individu type de l'espèce.

Le cardinal gros-bec n'habite pas, en général, partout au Canada, mais il est toujours à demeure là où on le rencontre. Sa coloration somptueuse et son sifflet retentissant donnent un charme de plus à la nature. Il peut paraître étrange que cet oiseau du Sud se rencontre parfois au Canada, mais dans quelques parages le long du lac Erié on le voit non seulement de façon régulière mais il y est même commun. Il conviendrait de le protéger de façon étroite et à cause de sa beauté et aussi pour d'autres raisons pratiques.

Valeur économique. Le cardinal se nourrit surtout de sauterelles, de cigales, de doryphores des pommes de terre, des hannetons de rosiers, des insectes de prunes et de cerises, des chenilles, des charançons, et d'autres fléaux destructeurs. En outre il mange les semences des mauvaises herbes en grand nombre et un peu de fruit sauvage. Il n'y a aucune preuve qu'il nuise aux variétés cultivées.

595. **Le Gros-bec à poitrine rose.** (ROSE-BREADED GROSBREAK). *Zamelodia ludoviciana*. L. 8-12. Planché XXXIV B.

Traits distinctifs. Le mâle avec son dos noir et sa bavette rose ne peut se confondre avec aucun autre oiseau. La femelle est dans l'est du Canada le seul gros-bec à raies bien tranchées. Les jeunes mâles d'automne ressemblent beaucoup à la femelle, mais il y a une légère teinte rose qui apparaît au travers du chamois de la poitrine. Ils varient beaucoup, mais on peut ordinairement apercevoir les indices des plumages plus accusés du printemps.

Indications sur le terrain. Une vue complète de l'un ou de l'autre sexe avec la coloration caractéristique de chacun et du gros-bec, est suffisamment distinctive. Le mâle au dos noir avec son croupion blanc et les barres blanches des ailes peut être reconnu au simple coup d'œil, même quand il disparaît dans les broussailles. La femelle, si elle n'est pas nettement aperçue, peut être prise pour la femelle du pinson pourpré, qui est beaucoup plus petite, mais les dessous qui sont sans raie, la tête plus fortement marquée avec la ligne bien manifeste au-dessus de l'œil, et les barres blanches des ailes qui ressortent plus distinctement, servent d'habitude à l'identifier.

Nid. Dans les buissons ou les arbres, entre 5 et 20 pieds au-dessus du sol; nid fait de fines ramilles, de tiges d'herbes et de radicelles.

Habitat. L'est de l'Amérique, au nord bien au delà de la colonisation. L'oiseau couve au Canada, partout où il se rencontre.

Le gros-bec à poitrine rose est un des plus beaux oiseaux et des meilleurs chanteurs. Il préfère les fourrés très enchevêtrés, interrompus par des espaces dégagés et de grands bouquets d'arbres. Il fréquente les fourrés le long des rivières, les lisières de bois qui confinent à des terres défrichées, des palissades recouvertes de végétation et quelquefois des vergers.

Valeur économique. Si le nombre des gros-becs à poitrine rose pouvait se multiplier beaucoup dans les fermes, le fléau des doryphores des pommes de terre ne tarderait pas à disparaître. Cet oiseau est un des rares

spécimens quand ils estomaes la dite espéricieux. poitrine ro de les prot de bons co dont on ne jets de bon soin de lai s'allier réfu damnés à c penser les

597. **Le gros-bec de la** et avec des b

Traits distinctifs. se conformement par la taille et à la poitrine (rc p. 28).

Indications gros-bec bleu e

Habitat. 1 canadienne.

SOUS-ES. le type de l'est

Les cas trop isolés 1 bond accide gions mérid

598. **Le I** un pinson plut formément d'u au mâle, légèr oiseaux d'autoi rouge rouilleux

Traits distinctifs. le seul qui puisse ment d'une coul

Indications si des femelles et d

Nid. Génér nid fait d'herbes et de longs poils.

Habitat. L'

Le pinso recouverts d' ou que des al

Valeur é pinson indigo

spécimens de son espèce qui mange les vers blancs et qui les prend soit quand ils sont adultes, soit à l'état de larves. Un dixième du contenu des estomacs examinés se composait de ces vers blancs de pommes de terre, et la dite espèce est tout aussi active contre d'autres insectes non moins pernicieux. Il pourrait être difficile d'augmenter le nombre des gros-becs à poitrine rose, mais il pourrait l'être moins de conserver ceux que nous avons, de les protéger contre une destruction qui peut s'éviter, et de voir à ce que de bons coins à nid soient ménagés dans ces endroits de la ferme ou du bois dont on ne tire aucun parti. Quand on se met en train d'exécuter des projets de bonnes cultures et d'élimination de places perdues, il faudrait avoir soin de laisser subsister de petites plantations d'arbrisseaux où pourraient s'aller réfugier ces oiseaux qui, privés de ces lieux de refuge, seraient condamnés à disparaître. La conservation de ces oiseaux ferait plus que compenser les pertes minimales qu'ils pourraient occasionner.

597. Le Gros-bec bleu. (BLUE GROSBEAK), *Guiraca coerules*. L. 7. C'est un petit gros-bec de la même coloration que le gros pinson indigo, mais pas tout à fait aussi brillant, et avec des barres d'un brun châtain sur l'aile et sur l'épaule.

Traits distinctifs. Les plumages, dans les changements qui dépendent des saisons et du sexe, se conforment tout à fait à ceux du gros pinson indigo dont on peut distinguer notre gros-bec bleu par la taille et le bec. Dans un plumage mêlé il peut ressembler au rouge-gorge bleu, même quand à la poitrine rougeâtre, mais le bec est absolument différent de celui de ce dernier (voir figure 50, p. 28).

Indications sur le terrain. Les traits qui précèdent pourront tenir lieu de ces indications, mais le gros-bec bleu est trop rare au Canada pour qu'on puisse se fier seulement à la vue pour l'identifier.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord, au nord il s'arrête d'habitude bien avant la frontière canadienne.

SOUS-ESPÈCE. La sous-espèce du gros-bec bleu qu'on peut espérer voir au Canada c'est le type de l'est, le gros-bec bleu de l'Est, la race type de l'espèce.

Les cas que l'on a cités de la présence de cet oiseau au Canada sont trop isolés pour qu'on puisse parler de lui autrement que comme un vagabond accidentel et rare. Il ne faut espérer le rencontrer que dans les régions méridionales et peut-être le long de la côte du sud.

598. Le Pinson indigo. (INDIGO BUNTING), *Passerina cyanea*. L. 5-59. C'est un pinson plutôt petit; le mâle d'un bleu brillant par tout le corps, la femelle presque uniformément d'un chamois rouilleux avec, par occasion, de vagues soupçons du bleu propre au mâle, légèrement blanchâtre en dessous avec de vagues raies assez indistinctes. Les oiseaux d'automne font voir des phases intermédiaires entre la coloration susdite, ou un rouge rouilleux plus accentué.

Traits distinctifs. Le pinson indigo est notre seul oiseau tout bleu. Le rouge-gorge bleu, qui est le seul qui puisse lui être comparé à une poitrine rougeâtre. La couleur uniforme, presque invariablement d'une couleur rouille mate, de la femelle et des jeunes oiseaux les distingue d'autres espèces.

Indications sur le terrain. La couleur absolument bleue du mâle, et celle uniformément rougeâtre des femelles et des jeunes oiseaux.

Nid. Généralement à la fourchure des branches d'un buisson, à 2 ou 3 pieds au-dessus du sol, nid fait d'herbes, de feuilles mortes, de bandes d'écorce, et garni d'herbes délicates, de radiceles et de longs poils.

Habitat. L'Amérique du Nord, à l'est des plaines et au nord assez loin à l'intérieur du Canada.

Le pinson indigo fréquente habituellement des terrains de broussailles recouverts d'une végétation qu'on laisse perdre, ou que le feu a consumée, ou que des abatis ont réduits en clairières. Son chant est agréable.

Valeur économique. Nos renseignements au sujet des aliments du pinson indigo sont incomplets. Ils est hors de doute que ses mœurs alimen-

taires sont ceux de sa famille, et on lui fait honneur des grands services qu'il rend en détruisant les larves de lépidoptères Browntail sur les arbres. Cet oiseau a autant de droit que d'autres de son espèce à être protégé.

604. Le "Dickcissel". (DICKCISSEL). *Spiza Americana*. L, 6. Le dos a des raies brun foncé et chamois rougeâtre qui se changent en un rouge mat sur les couvertures des ailes; l'arrière cou est ardoisé jusqu'à la couronne où il est fortement teinté de jaune; les joues sont grises avec la ligne sourcilière d'un jaune pur; blanc en dessous; la poitrine d'un jaune pur et la gorge avec une tache noire ou bavette de contour très tranchée.

Traits distinctifs. La poitrine jaune, la gorge noire, qui fait songer à l'étourneau des prés, sont distinctives.

Habitat. L'est de l'Amérique, surtout dans les parties de l'intérieur et du centre. Dans l'est du Canada, assez irrégulièrement au delà de nos frontières dans le sud-ouest de l'Ontario.

Cette superbe espèce d'oiseau des champs découverts est rare au Canada. Quelques-uns y sont paru pendant un petit nombre d'années consécutives à l'extrémité ouest du lac Erié, puis ont disparu pour revenir quelques années plus tard.

FAMILLE—TANGARIDÆ. TANGARAS. L, 7.25-7.50.

Description générale. Ce sont des oiseaux aux couleurs brillantes avec un bec qui ressemble à celui des pinsons mais légèrement allongé, avec un culmen uniformément recourbé, une légère échancrure dans la mandibule supérieure en face de la pointe de la mandibule inférieure; en outre, une dent et une échancrure au milieu du bord tranchant d'au-dessus (figure 53, p. 28). Chez quelques espèces l'échancrure est trop petite pour être vue à moins d'une extrême attention.

Traits distinctifs. En sus des caractères précités du bec, l'espèce de l'est du Canada peut être facilement reconnue à sa couleur. Les mâles du printemps sont des oiseaux d'une brillante coloration rouge, les femelles et les oiseaux de l'automne sont d'un jaune ou d'un vert ardent sans marques ni détails bien tranchés et avec peu de variété dans la coloration sauf dans les amas uniformes des ailes et de la queue. Les mâles du printemps ne peuvent se comparer qu'avec le cardinal au point de vue de la couleur; les oiseaux d'automne et les femelles qu'avec les orioles femelles, mais l'absence de huppe chez les tangaras les distinguera facilement d'avec le cardinal, et les caractères du bec les distinguera et du cardinal ou des orioles.

Les tangaras constituent une famille essentiellement américaine qui atteint son plus haut développement sous les tropiques et n'est parfaitement représentée que par une espèce dans l'est du Canada.

En tant que famille les tangaras sont si étroitement alliés aux pinsons que l'on ne connaît pas encore le status de certaines espèces qui dépassent cet habitat.

608. Le Tangara écarlate. (SCARLET TANAGER). *Piranga erythromelas*. L, 7.25. Planche XXXV A.

Traits distinctifs. À part l'espèce suivante, le tangara d'été, le tangara écarlate, ne peut se comparer qu'au cardinal, mais il est facilement reconnaissable à son manque de huppe, son bec plus léger et plus long, au noir de ses ailes et de sa queue. Le vert uniforme de la femelle est distinctif, et il n'est à peu près égalé que chez un petit nombre de fauvettes et d'orioles. Le mâle d'automne est pareil à la femelle, mais avec des ailes et la queue noires.

Indications sur le terrain. Brillante couleur écarlate, avec les ailes et la queue noires chez le mâle, la coloration verte uniforme et la taille chez d'autres plumages.

Nid. D'habitude près de l'extrémité d'une branche, à environ 20 pieds au-dessus du sol; nid fait de feuilles, de bandes d'écorce, etc.

Habitat. L'est de l'Amérique, au nord jusque vers la limite des endroits colonisés.

Le tangara écarlate fait voir de remarquables changements de plumage selon la saison et le sexe. Au printemps les sexes sont si complètement différents l'un de l'autre qu'on s'étonne qu'ils soient de la même espèce, et en été l'écarlate étincelant du mâle prend peu à peu le vert mat de sa compagne.

Le tangara écarlate est un oiseau des terrains plantés de bois clairsemés où des arbres puissants croissent avec des broussailles, légères à l'entour mais au printemps l'oiseau visite à l'occasion les vergers. Quand

il arrive, à mesure apercevoir "chi le découv peu comr pide.

Vale; surtout d tières et détruire c réalité la et quand Le tangar

610. L pareil au ta brun mat b regard du n

Traits di rosé, moins l très chaud, ressemble d'; des ailes sans

Habitat. l'a signalé au qu'au Nouve

Le ta partir du la Nouvell

Descripti pieds petits e 54, p. 29).

Traits dis et d'un diffé minées qu'av

C'est descendant leurs pied des fils tél nourriture sillonner nids; elles tures en co sous des b

Valeu mentation gibier les y ne serait granges, oï blent et pr

il arrive, au printemps, le tangara écarlate attire facilement les regards, mais à mesure que les arbres se revêtent de leurs feuilles l'oiseau ne se laisse apercevoir qu'avec bien des précautions, et si ce n'était sa note si distinctive "*tchîp tchur*", qui attire les regards de son côté, il serait très difficile de le découvrir. Son chant est gai, rythmique et assez bien soutenu, un peu comme celui du rouge-gorge, mais plus lié et pas tout à fait aussi limpide.

Valeur économique. La nourriture du tangara écarlate se compose surtout d'insectes et de fruits. Les insectes sont partout des espèces forestières et il importe aux forestiers et aux cultivateurs d'arbres fruitier de détruire ces insectes. Le fruit qu'ils attaquent est surtout sauvage, en réalité la plupart des oiseaux préfèrent les espèces sauvages aux cultivées, et quand les premières sont abondantes les autres sont rarement attaquées. Le tangara écarlate ne leur fait aucun dommage sérieux.

610. **Le Tangara vermillon.** (SUMMER Tanager). *Piranga rubra*. L, 7-50. Très pareil au tangara écarlate, mais avec la queue rouge au lieu de noire, avec les ailes d'un brun mat bordées et teintées de rouge; les femelles se comportent comme coloration au regard du mâle, comme font celles du tangara écarlate.

Traits distinctifs. Les ailes et la queue diffèrent de celles du tangara écarlate, le rouge est plus rosé, moins brillant et plus clair en dessous que sur le dos. La femelle a des tons vert d'orange très chaud, et d'une bien différente nuance que les verts froids de la femelle apparentée. Elle ressemble d'assez près à la femelle de l'oriole de Baltimore, mais la coloration uniforme du dos et des ailes sans aucune marque et le bec du tangara rendront la distinction facile.

Habitat. Le sud-est des Etats-Unis et le nord jusqu'à la latitude du Ohio méridional. On l'a signalé au Canada près de la frontière du sud le long des rives inférieures des grands lacs, ainsi qu'au Nouveau-Brunswick et dans la Nouvelle-Ecosse.

Le tangara vermillon est un traînard d'occasion dans le Canada, à partir du sud, le long des rives inférieures des grands lacs, ainsi que dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick.

FAMILLE—HIRUNDINIDÆ. HIRONDELLES.

Description générale. Ce sont pour la plupart de petits oiseaux, à ailes longues et pointues; pieds petits et faibles, impropres à la marche; tête aplatie et bec très court et très large (figure 54, p. 29).

Traits distinctifs. Ressemblent superficiellement aux engoulevents, mais beaucoup plus petits et d'un différent type de coloration. Risquent plutôt d'être confondues avec le martinet des cheminées qu'avec aucune autre espèce, mais sans les épines de l'extrémité des plumes de la queue.

C'est une famille répandue dans le monde entier, d'habitudes aériennes, descendant rarement sur le sol sauf pour y chercher de quoi bâtir leur nid. Leurs pieds sont faibles et ne sont bons qu'à se poser sur de petites branches, des fils télégraphiques ou de semblables perchoirs. Elles saisissent leur nourriture au vol et on les voit souvent glisser au-dessus des étangs et en sillonner la surface tout en s'abreuvant. Ce sont d'habiles bâtisseurs de nids; elles construisent une remarquable variété de formes depuis des structures en cou de bouteille faits de boue pétrie jusqu'à des trous en tunnel sous des banes de terre.

Valeur économique. Les insectes ailés constituent presque toute l'alimentation des hirondelles. Volant haut ou bas dans l'air, selon que leur gibier les y invite, les hirondelles attaquent maint insecte ailé qui autrement ne serait pas inquiété. Au-dessus des champs de céréales, autour des granges, où il se trouve peu d'oiseaux insectivores, les hirondelles s'assemblent et prêtent un secours efficace au cultivateur. Elles sont parfois mal-

propres quand elles nichent en grand nombre sous les chéneaux ou autres places analogues, mais au lieu d'abattre simplement les nids on devrait donner à ces oiseaux des endroits favorables autour des bâtiments de la ferme, où ils se rassembleront et se nicheront au besoin sans causer de désagréments. Une grande compagnie d'hirondelles autour de la cour d'une ferme est de grande utilité pour le fermier.

611. L'Hirondelle pourprée. (PURPLE MARTIN). *Progne subis*. L, 8. Planche XXXV B.

Traits distinctifs. C'est la plus grande de nos hirondelles. La taille et la coloration noir bleu irisée du mâle devrait suffire pour distinguer les espèces.

Indications sur le terrain. La taille, la couleur, le vol, presque pareil à celui du faucon, et la voix sont des indications parfaites.

Nid. A l'origine, dans le creux d'un arbre. Dans l'état civilisé, des nichoirs artificiels pour oiseaux, des cavités sous les corniches des maisons, etc. Ce sont des nicheuses sociables et qui préfèrent bâtir parmi des compagnies de leur espèce.

Habitat. L'Amérique du nord. Une sous-espèce occidentale occupe la côte du Pacifique. L'espèce orientale—qui est la race type—fréquente la plupart des établissements agricoles de l'est du Canada.

SOUS-ESPÈCE. La sous-espèce de l'hirondelle pourprée qui se rencontre dans l'est du Canada est celle de l'hirondelle pourprée de l'Est *P. s. subis*, la forme type.

Pendant le jour ces oiseaux se répandent dans la contrée, revenant à de fréquents intervalles, avec de la nourriture pour leurs petits. Le soir ils reviennent tous à la maison qu'ils occupent et s'y mettent à l'abri pour la nuit. Les petits restent très longtemps dans le nid et même après la première sortie en l'air les parents et les jeunes reviennent ensemble au nid. Les hirondelles pourprées sont domestiques et sociables et se saluent mutuellement par des gazouillis et un babillage de bienvenue. Chaque hirondelle s'intéresse aux affaires des autres et il se fait un continuel échange de visites entre voisins. Elles se disputent bien rarement entre elles mais se liguent contre l'ennemi commun qui n'est autre que le moineau anglais. Une colonie d'hirondelles peut fort bien maintenir ses positions contre cette engeance, lorsqu'elles se sont bien installées. Une maisonnette pour cette hirondelle devrait renfermer plusieurs chambres de 8 pouces sur 8, à l'abri du mauvais temps et des courants d'air tout autour sauf à la porte qui devrait avoir 2 pouces de diamètre et être à 1 pouce et demi au-dessus du plancher. La dite maisonnette devrait être à 15 ou 20 pieds au-dessus du sol, placée en plein air et de façon à pouvoir se descendre pour être nettoyée.

Il y a des faits qui prouvent que l'hirondelle pourprée se fait plus rare. D'anciennes colonies se démembrent de temps en temps et il ne s'en crée que peu de nouvelles pour les remplacer. Les hirondelles pourprées reviennent à leurs quartiers d'été de très bonne heure au printemps et parfois elles souffrent beaucoup des gels tardifs et des pluies froides qui arrêtent le vol des insectes et privent l'oiseau de la grande et régulière quantité de nourriture qui lui est si nécessaire.

Valeur économique. L'hirondelle pourprée, comme les autres hirondelles, est un oiseau qui n'a pas de mauvaises habitudes et qui en a tant de bonnes qu'on devrait tout tenter pour en multiplier le nombre.

612. L'Hirondelle à front blanc. (CLIFF SWALLOW). *Petrochelidon lunifrons*. L, 6-01. Semblable par la coloration générale à l'hirondelle des granges (planche XXXVI A) mais différente dans les détails et sans la queue longue et grandement fourchue.

Traits distinctifs. La gorge de couleur plus riche et d'un brun plus rougeâtre que celle de l'hirondelle des granges; la couleur brune, qui s'étend en une bande étroite en travers de la partie de

derrière d
brisée en l
contraste l

*Indica
tions.* J
jeunes qui

Nid.

et sur les j
sous les et
puis faucon
achevée.

prenne la f

Habita

SOUS

partie de l
lunifrons, l

Cet
nom ang
que touj
plutôt di
nichent l

613. I
6-95.—Pla

*Traits c
gêtré; cro
l'espèce.*

*Indicati
sûres; en ou
queue.*

Nid. I
blanc. Il e
sur un suppo
comme un p
engager à la
nids tout à
causer aucu

Habitat.

C'est
de la mai
mais elle j
d'hironde
canadien

614. L
che XXXV

*Traits di
blancheur in*

*Indicatio
constitue une
des dessus es
mais tout cel
de rivage.*

Nid. Se
ou dans des r
Habitat.

Bien
mortes au
nicher dar
et la grâce

derrière du cou et avec une tache noire au milieu de la gorge inférieure au lieu d'une barre noire brisée en travers de la poitrine. Le front qui est d'un blanc crémeux au lieu de rougeâtre fait un contraste frappant. Les dessous sont d'un blanc terne. La queue est presque carrée.

Indications sur le terrain. Le front blanc et le croupion rougeâtre sont les meilleures indications. La queue carrée la distinguera de toutes les hirondelles des granges, sauf des toutes jeunes qui n'ont pas encore la fourche.

Nid. Le nid typique est fait entièrement de terre gâchée portée en petites boules dans le bec et sur les pieds. La terre est mélangée avec de la salive et appliquée boule à boule contre le mur sous les chéneaux de quelque bâtiment. Le nid est d'abord une tablette construite sur le mur, puis façonnée en soucoupe, puis en tasse, et sous l'une ou l'autre de ces formes elle est regardée comme achevée. Dans les meilleurs exemples de ces nids les côtés sont continués jusqu'à ce que le nid prenne la forme d'une bouteille avec son cou recourbé et dirigé vers l'extérieur.

Habitat. L'Amérique. Dans l'est du Canada jusqu'au nord des parages civilisés.

SOUS-ESPÈCE. La sous-espèce de l'hirondelle au front blanc qui occupe la plus grande partie de l'Amérique du Nord et tout le Canada, c'est l'hirondelle au front blanc de l'Est, *P. l. lunifrons*, la forme typique de l'espèce.

Cette hirondelle habitait à l'origine les falaises, comme l'indique son nom anglais, mais au sein de la civilisation elle fait maintenant son nid presque toujours dans des granges et autres bâtiments. Les groupements sont plutôt distribués par localités vu que les différentes colonies d'hirondelles nichent bien souvent dans des fermes fort éloignées les unes des autres.

613. **L'Hirondelle des granges.** (BARN SWALLOW) *Hirundo erythrogastra*. L, 6-95.—Planche XXXVI A.

Traits distinctifs. Une barre noire brisée en travers de la poitrine, au-dessous de la gorge rougeâtre; croupion noir et, chez l'adulte, queue longue et fourchue, tels sont les traits distinctifs de l'espèce.

Indications sur le terrain. Teintes brun rougeâtre en dessous et croupion noir sont des indications sûres; en outre, chez l'adulte la queue longue et fourchue, et chez les tout jeunes le blanc dans la queue.

Nid. Le nid est loin de ressembler à la belle architecture de celui que bâtit l'hirondelle à front blanc. Il est surtout fait de boue mélangée avec des herbes, garni d'herbes et de plumes, et planté sur un support comme une poutre ou une traverse; mais souvent la plus petite projection sera utilisée comme un point d'appui pour y bâtir. Il arrive que des cultivateurs, pour attirer ces oiseaux et les engager à faire leurs nids là où on les verra volontiers, leur fournissent de petits supports pour leurs nids tout à côté et sous les chéneaux de leurs granges, où en dedans là où ils seront protégés sans causer aucun dommage.

Habitat. L'Amérique. Probablement ne va pas aussi au nord que les espèces précédentes.

C'est l'hirondelle qui d'habitude niche dans les granges et les annexes de la maison de ferme. Non seulement elle bâtit son nid sous les chéneaux mais elle pénètre dans le bâtiment et se loge à l'intérieur. Sa longue "queue d'hirondelle" en fait peut-être la plus gracieuse de toutes les hirondelles canadiennes.

614. **L'Hirondelle bicolore.** (TREE SWALLOW). *Iridoprocne bicolor*. L, 5-90. Planche XXXVII B.

Traits distinctifs. Le noir uniforme avec des reflets d'acier très prononcés dans les dessus, la blancheur immaculée des dessous sont bien distinctifs.

Indications sur le terrain. La blancheur parfaite, sans marque aucune des parties de dessous constitue une indication facilement reconnaissable sur le terrain. Chez les jeunes oiseaux le noir des dessus est remplacé par du brun mat et un soupçon de brun étendu sur les côtés de la poitrine, mais tout cela ne forme jamais une bande continue en travers de la poitrine comme chez l'hirondelle de rivage.

Nid. Se fait dans les trous laissés par les pics, dans des souches mortes, dans des arbres croux ou dans des nichoirs. Le nid est garni d'herbes et de plumes.

Habitat. L'Amérique, dans le nord jusque vers la limite des bois.

Bien qu'ordinairement elle profite des trous de pics, dans les souches mortes au-dessus de l'eau, l'hirondelle bicolore se laisse facilement aller à nicher dans des boîtes dans un jardin. La beauté de sa brillante irisation et la grâce de son vol vaut largement la peine qu'on prendra de leur pré-

parer un abri, même si sa présence n'était pas à elle seule une importante protection contre les insectes dans le jardin. La permanence de l'espèce est menacée par la rareté toujours plus grande des places favorables à sa nidification, à moins qu'un effort ne soit tenté pour créer des nids artificiels.

616. **L'Hirondelle de rivage.** (BANK SWALLOW). *Riparia riparia*. L, 5-20. Planché XXXVII A.

Traits distinctifs. Un brun mat au lieu d'une coloration irisée du dos; les dessous blancs avec une bande pectorale distincte et noire sont des traits de ce genre. La bande est toujours pleine et complète et le blanc très pur. La bande pectorale complète fera distinguer l'hirondelle de rivage de la jeune hirondelle bicolore, et aussi de l'hirondelle à ailes hérissées chez laquelle le blanc n'est pas pur et chez qui la poitrine et la gorge sont uniformément étendues d'un brun cendré.

Indications sur le terrain. Les dessous blancs sont traversés par une barre foncée très visible. C'est la meilleure indication sur le terrain.

Nid. Presque tout le monde a vu combien vite les côtés en vue d'une excavation de sable ou de gravier sont creusés de petits trous à nids par les hirondelles. Trop souvent les petits gamins fouillent ces trous et en font sortir les oiseaux. C'est là une action à la fois dangereuse pour l'enfant, parce que l'excavation peut s'effronder, et méchante en elle-même parce que c'est un coup droit porté à l'existence d'un des meilleurs amis du fermier.

617. **L'Hirondelle à ailes hérissées.** (ROUGH-WINGED SWALLOW). *Stelgidopteryx serripennis*. L, 5-75. Très semblable à l'hirondelle de rivage par la coloration générale mais avec la poitrine et la gorge teintées d'un brun cendré pâle au lieu d'être traversée par une bande brune bien tranchée.

Traits distinctifs. La susdite différence, jointe à l'absence de beaucoup de blanc pur en dessous et d'un blanc quelconque sur la gorge, est très indicative. Les oiseaux de croissance achevée ont la petite membrane externe des primaires extérieures convertie en une série de petits crochets presque imperceptibles à l'œil nu mais que le doigt peut sentir quand on le passe le long du bord jusqu'à la pointe. Sur les jeunes oiseaux cela ne se voit pas bien, quelquefois pas du tout, et les différentes étapes de ce développement se font remarquer. On remarque la chose en quelque degré chez tous les spécimens du printemps.

Indications sur le terrain. La meilleure indication de ce genre pour distinguer l'hirondelle à ailes hérissées de l'hirondelle de rivage c'est la poitrine uniformément étendue de la même teinte au lieu de la poitrine blanche avec une large barre noire. Quand on porte son attention sur une compagnie un peu mêlée d'oiseaux, l'hirondelle à ailes hérissées peut être ordinairement distinguée grâce à son dos un peu plus rouge ou de couleur rouille qui ressort beaucoup plus dans la vie ordinaire que dans la main.

Nid. À cet égard cette hirondelle ressemble à celle de rivage mais elle est plus solitaire et peut être plus disposée à nicher dans les crevasses de roches superposées, de falaises ou de bâtisses.

Habitat. L'Amérique. À partir du nord à travers la frontière canadienne jusqu'à la région inférieure des grands lacs.

Les hirondelles à ailes hérissées appartiennent à une espèce très dispersée dans le monde; elles montrent toute la forme spéciale de l'aile qu'on ne peut expliquer dans l'état actuel de nos connaissances.

FAMILLE—BOMBYCILLIDÆ. LES JASEURS.

Les jaseurs sont des oiseaux extraordinaires, distribués à travers les parties septentrionales des deux mondes. Ils sont représentés en Amérique par deux espèces si bien caractérisées pour la forme et la couleur et si pareilles l'une à l'autre que toute description ici est inutile. Ils offrent très peu de variations par rapport soit aux saisons soit aux sexes, et la planche XXXVII B comme la figure 55, page 29, les désigne très distinctement. Les tuyaux des secondaires et quelquefois ceux de la queue s'élargissent vers les bouts en des appendices de brillantes couleurs qui ressemblent à des morceaux de cire à cacheter.

618. **Le Jaseur de Bohême.** (BOHEMIAN WAXWING). *Bombycilla garrulus*. L, 8. Il est presque tout à fait semblable par la forme et la couleur au jaseur du cèdre, mais plus grand; les secondaires ont à leurs extrémités un peu de blanc; la plupart des primaires

ont du bla
couverture

Traits d
espèce avec

Indicatio
les jaseurs.
indications

Nid. Si

Habitat.
nord, au nor
ment.

Leur
oiseaux
"errants"
l'occasion
fait le gr
valeur éc
chés qui r

619. Le
Planche XX

Traits di
avec aucune
espèce. Ce ja
ment rencont

Indication
sont des indi
reconnue. V

Nid. Sou
d'écorce, de f
plus fines de r

Habitat.
par delà.

Le ja
niche en é
nage des ce
ces de vieu
tendre, ha
lui donner
semble être
et jamais e
quelques les
cheter roug
en son gen
un cachet c

Valeur
formé d'ins
Ces fruits s
même un f
sauvages au
sent avant
est considér
bre d'arbres
se concentre
la perte se f

ont du blanc ou du jaune, ou l'un et l'autre; il y a aussi une petite barre à l'aile. Les couvertures sous-caudales sont marron et l'abdomen est grisâtre sans être étendu de jaune.

Traits distinctifs. Aucun autre de ces traits n'est nécessaire; le jaseur du cèdre est la seule espèce avec laquelle on pourrait le confondre.

Indications sur le terrain. Leurs figures propres et leurs crêtes si frappantes font reconnaître les jaseurs. Le blanc ou le jaune sur les ailes, le marron des couvertures sous-caudales sont les indications les plus déterminantes sur le terrain.

Nid. Sur les arbres, composé de ramilles, de racines, de mousse, etc.

Habitat. Les sections boréales de l'hémisphère nord. En Amérique, couve dans l'extrême nord, au nord-ouest de la baie d'Hudson, et visite les districts colonisés en hiver, mais irrégulièrement.

Leur habitudes irrégulières et errantes en hiver ont fait donner à ces oiseaux le nom de "bohémiens" lequel, en ce sens, est synonyme de "errants". Ce sont des oiseaux du nord-ouest, mais qui descendent à l'occasion dans les régions cultivées du Canada oriental, en hiver, comme fait le gros-bec à couronne noire. Ils sont trop rares pour avoir aucune valeur économique. Leur nourriture favorite se compose des fruits desséchés qui restent pendus aux arbres pendant l'hiver.

619. **Le Jaseur du cèdre.** (CEDAR WAXWING). *Bombycilla cedrorum*. L., 7-19. Planche XXXVII B.

Traits distinctifs. Avec l'aide de la gravure le jaseur du cèdre ne peut guère être confondu avec aucune autre espèce sauf avec le jaseur de Bohême. Pour les traits distinctifs voir cette espèce. Ce jaseur-là est le seul qu'on rencontre dans l'est du Canada, en été, et qu'on peut probablement rencontrer en hiver dans les districts méridionaux.

Indications sur le terrain. La forme et le port gracieux ainsi que la huppe droite si apparente sont des indications faciles à reconnaître. La voix, un sifflement aigu, est caractéristique et vite reconnue. Voir la précédente espèce.

Nid. Souvent placé sur des arbres fruitiers ou ombreux, c'est un assemblage massif de morceaux d'écorce, de feuilles, d'herbes, de ramilles, de petites racines, de mousse etc., garni de matières plus fines de même nature.

Habitat. L'Amérique, au nord dans le Canada jusqu'aux limites des régions cultivées et même par delà.

Le jaseur du cèdre est un des oiseaux qui fréquentent nos vergers. Il niche en été dans les arbres fruitiers et n'est que trop connu dans le voisinage des cerises à maturité précoce. En hiver il recherche les diverses espèces de vieux fruits desséchés qui pendent aux branches. La coloration est tendre, harmonieuse avec tout juste assez de contraste de couleurs pour lui donner du caractère. Le tissu bizarrement lisse et soyeux du plumage semble être cause que les plumes sont pour ainsi dire collées, l'une à l'autre et jamais en désordre. La façon dont les tuyaux des secondaires et quelquefois les plumes de la queue se terminent comme des bouts de cire à cacheter rouge, façon commune à ce jaseur et à celui de Bohême, est unique en son genre, parmi les oiseaux d'Amérique et donne à ces deux individus un cachet de plus d'individualité.

Valeur économique. Environ le treize pour cent de leurs aliments est formé d'insectes nuisibles, le reste se compose en majeure partie de fruits. Ces fruits sont surtout d'espèce sauvage et sans valeur économique; c'est même un fait que la plupart des oiseaux préfèrent de beaucoup les fruits sauvages aux fruits cultivés. Néanmoins, quand les cerises précoces mûrissent avant les cerises sauvages le dommage que les jaseurs peuvent faire est considérable. La même quantité de ce fruit répartie sur un grand nombre d'arbres plus tardifs pourrait passer inaperçue, mais lorsque le dommage se concentre sur la partie la plus précoce et la plus précieuse de la récolte, la perte se fait vivement sentir. La protection du fruit précoce contre les

dégâts causés par cette espèce d'oiseaux et quelques autres de même mœurs est une affaire qui a demandé une attention considérable. Quant à tuer à coups de fusil tous les oiseaux qui visitent le verger, ce serait évidemment une solution du problème, mais qui ne laisserait pas d'être piteuse. La protection du fruit ne serait qu'incomplète et devrait se répéter à chaque saison; car tant qu'il reste de ces oiseaux dans le voisinage, leur multiplication annuelle viendrait annuler les résultats des entreprises précédentes. En outre, le village entier serait privé de l'utile secours d'un certain nombre d'espèces à la seule fin de protéger une quantité donnée de fruit. Un filet qu'on étendrait sur le fruit reviendrait d'ordinaire à meilleur marché que la fusillade en question. Comme les oiseaux préfèrent le fruit sauvage au fruit cultivé mûr de bonne heure, des arbres à fruits sauvages plantés dans des coins inutilisés et le long des palissades donneraient une protection à bon marché. Le mûrier russe et le sorbier, plus tard le cassis, l'alisier, le framboisier, le sumac, l'aune, la vigne sauvage, la douce-amère, la morelle noire, la symphorine, le sureau, sont tous des fruits sauvages qui rempliront l'office voulu.

FAMILLE—LANIIDÆ—L. 9-10.32. GRIÈCHES, PIES-GRIÈCHES.

Description générale. Les pies-grièches sont des oiseaux du genre passereau, de taille moyenne et de caractère rapace. On les reconnaît facilement à leur bec qui est distinctement crochu à l'extrémité et pourvu d'une entaille et d'une dent près du bout de la mandibule supérieure (figure 56, p. 29). Les deux espèces qui se rencontrent au Canada sont très semblables par la coloration et ne diffèrent que par de menus détails seulement (planche XXXVIII A).

Les pies-grièches sont d'intéressants exemples d'oiseaux du genre passereau vivant de graines et d'insectes et faits pour une vie de rapaces. Les vrais rapaces, les éperviers, etc., qui font leur proie d'êtres plus élevés qu'eux dans l'échelle animale, ont des pieds puissants avec lesquels ils tiennent leur proie tandis qu'ils la déchiquettent. Les pies-grièches n'ont pas ces membres faits pour saisir et tenir, car leurs pieds ne sont pas plus forts que ceux d'un moineau ou d'un merle de même taille. De là vient qu'elles saisissent leur proie avec leur bec et que pour la tenir tout en la mangeant, elles ont pris l'habitude de l'empaler sur de fortes épines; c'est cette habitude qui leur a fait donner le nom d'oiseaux-bouchers. Les pies-grièches sont hardies, courageuses et montrent autant d'audace et de savoir-faire, toute proportion gardée, qu'aucun des véritables oiseaux de proie. C'est une famille très nombreuse et fort répandue. Un seul genre est représenté en Amérique et il y en a deux espèces dans l'Amérique du Nord.

621. **La Pie-grièche boréale.** (NORTHERN SHRIKE). *Lanius borealis*. L. 10-32. Elle est semblable à la pie-grièche migratrice, (planche XXXVIII A) mais est plus grande et avec une série de lignes fines, ondulées ou vermiculées vaguement marquées en travers des dessous.

Traits distinctifs. La coloration générale et le bec encoché feront reconnaître la pie-grièche. La taille et les vermiculures bien marquées en dessous la caractériseront comme étant la pie-grièche boréale.

Indications sur le terrain. Le contraste très accusé du noir et du blanc sur les ailes et la queue, les dessus gris et la bande noire en travers de l'œil. Toute pie-grièche aperçue dans l'est du Canada en hiver, d'octobre à mars, appartient à cette espèce.

Nid. Dans les arbres un peu bas ou dans les buissons; nids faits de branchettes, d'herbes, etc.
Habitat. L'Amérique du Nord; l'oiseau couvant au delà de la colonisation et à travers le continent, au sud en hiver.

La pie-grièche boréale est la plus hardie et la plus vigoureuse des deux espèces. Elle couve dans le nord et ne se rencontre que dans les régions

cultivée
a monté
poursuit
d'encou
cadavre
de fer l
ordinaire

Val
la pie-gr
beaucoup
petits ce
oiseaux c
que la g
entrepris

622. I
nius ludovi

Traits d
boréale, et
cultures de l
un oiseau d'

Indicati
et la queue;
grièches. J

Nid. F
bien ajustées

Habitat.
nord. La p
du Mexique

SOUS-I
très vaste, c
chaque part
la pie-grièch
Etats du suc
et de proport

La p
découvert
tondus p
endroits f
on peut c
comme la
œil perçar
une habit
précédent
manier se
que très r
cette espè
traces de
dieux et ag

Valeu
aux alimer
différence
oiseau d'é
prend moi

cultivées, en hiver, où elle suit les bandes de sizerins à tête rouge, etc. Elle a montré quelque disposition à pénétrer dans les villes et les villages à la poursuite du moineau domestique ou anglais; intention qu'il conviendrait d'encourager de toute façon. Des souris et des oiseaux desséchés, petits cadavres, sont quelquefois trouvés cloués à des épines, à des clôtures de fils de fer barbelés, ou pendus à la fourche étroite de deux branchettes, c'est ordinairement l'ouvrage de cette espèce.

Valeur économique. Bien que de sa nature elle soit rapace à tous crins, la pie-grièche boréale ne peut cependant point être regardée comme faisant beaucoup de dommage. Elle n'est pas suffisamment commune dans ces petits centres nouveaux pour être un facteur important dans la vie des oiseaux des champs. Elle attrape beaucoup de souris et il est probable que la guerre qu'elle leur fait ainsi qu'au moineau anglais fera pardonner ses entreprises sur les oiseaux mangeurs de grains.

622. **La Pie-grièche migratrice.** (LOGGERHEAD SHRIKE, MIGRANT SHRIKE). *Lanius ludovicianus*. L, 9. (Planche XXXVIII A.)

Traits distinctifs. Cette espèce ne peut guère être confondue avec autre chose qu'une pie-grièche boréale, et elle est beaucoup plus petite que cette dernière. L'oiseau adulte n'a pas les fines vermiculaires de la poitrine et, chez les toutes jeunes, elles ne sont qu'à peine indiquées. C'est, au Canada, un oiseau d'été et non d'hiver.

Indications sur le terrain. Le blanc clair et le gris pâle du plumage de leur corps, les ailes noires et la queue fortement marquée de blanc, enfin, la bande noire sur la face, sont particuliers aux pie-grièches. Toute pie-grièche d'été au sein des régions cultivées sera de cette espèce.

Nid. Fait de morceaux d'écorce, de ramilles, de fibres végétales, et garni de laine et de plumes bien ajustées.

Habitat. En tant qu'espèce, l'Amérique du Nord, jusqu'à la limite des terres cultivées, au nord. La pie-grièche migratrice occupe l'est de l'Amérique du Nord, au nord des Etats du golfe du Mexique et à l'ouest jusqu'aux provinces de la Prairie.

SOUS-ESPÈCE. La pie-grièche migratrice, comme bien d'autres espèces dont le territoire est très vaste, développe différents caractères selon les localités des parties du territoire où elle vit, chaque partie donnant lieu à une sous-espèce reconnue. La pie-grièche de l'est du Canada, sera la pie-grièche migratrice: *Lanius ludovicianus migrans* qu'on distinguera de la sous-espèce type des Etats du sud, appelée pie-grièche au croupion blanc de l'Ouest, par de légères différences de couleur et de proportions seulement.

La pie-grièche migratrice est un oiseau des pâturages et des coteaux découverts et broussailleux. Les arbres appelés stramoines, émondés et tondus par le bétail jusqu'à en devenir ramassés et repoussants sont les endroits favorisés que l'oiseau recherche pour y nicher, et dans ce voisinage on peut ordinairement l'apercevoir sur quelque observatoire haut placé, comme la pointe d'un plançon mort ou un fil de télégraphe, qui scrute d'un œil perçant la contrée environnante. L'empalement de sa proie n'est pas une habitude aussi fortement développée dans cette espèce que dans la précédente, probablement parce qu'elle est plus insectivore et qu'elle peut manier ses plus petites victimes sans les empaler. En tout cas on ne voit que très rarement des restes plantés sur des épines dans les retraites où cette espèce est commune et où l'on s'attendrait à trouver beaucoup de traces de cette coutume. Le chant de la pie-grièche migratrice est mélodieux et agréable, mais son cri d'appel est dur et discordant.

Valeur économique. Les habitudes de cette pie-grièche par rapport aux aliments sont semblables à celles de la pie-grièche boréale avec la seule différence qu'on peut attendre d'un oiseau plus petit et plus faible, d'un oiseau d'été plutôt que d'hiver. C'est ainsi que nous trouvons qu'elle prend moins d'oiseaux et de mammifères et plus d'insectes; quand la saison

des insectes bat son plein on voit même qu'ils constituent presque toute la nourriture de la pie-grièche. Au commencement de la saison, des quantités d'escarbots sont mangés, qu'ils soient utiles ou nuisibles, il s'en mange autant des uns que des autres. Plus tard ce sont les sauterelles et les criquets qui forment une grande proportion de la nourriture, mais une forte quantité de chenilles, dont plusieurs sont velues, des larves, des guêpes, des araignées et d'autres formes d'insectes servent de nourriture à la pie-grièche. L'alimentation de cet oiseau, pendant l'année, rend service, selon la commission biologique des Etats-Unis, dans la proportion de 4 à 1.

FAMILLE—VIREONIDÆ. LES VIREOS. L. 4.75 6.23.

Description générale. Des oiseaux petits, pareils aux fauvettes, avec du vert et du blanc comme coloration, et plus ou moins de jaune en masses délicatement étendues, et sans marques bien distinctes. Le bec est visiblement encoché et recourbé à son bout, comme celui de la pie-grièche (figure 56, p. 29) mais de proportions beaucoup plus petites et plus légères.

Traits distinctifs. Les vireos peuvent facilement être pris pour des fauvettes auxquelles ils ressemblent par le port, la taille et la coloration générale. Toutefois leur bec est plus gros, plus fortement arqué au sommet, plus élevé eu égard à sa largeur et plus visiblement recourbé et encoché au bout. L'ictérie à poitrine jaune a un bec qui pourrait répondre à cette description dans ses grandes lignes, mais il n'est pas recourbé et n'a rien qui ressemble à une encoche à son extrémité.

Indications sur le terrain. En sus des marques spécifiques qui constituent le meilleur guide pour reconnaître l'espèce, les vireos peuvent se reconnaître à leurs habitudes d'oiseaux chanteurs et à leurs mouvements plus lents et plus paresseux, quand ils vous regardent fixement de dessous les feuilles et grappillent nonchalamment sur les branches et les ramilles.

Les vireos forment une petite famille spéciale à l'Amérique. Il y en a trois genres au Canada, représentés par six espèces.

Valeur économique. Au point de vue économique, les vireos peuvent être traités dans le même paragraphe car ils ont les mêmes habitudes quant à leur alimentation. Celle-ci se compose pour le 91 pour cent d'insectes et de fruits qui restent sur les arbres et qui appartiennent presque tous aux variétés sauvages. Les insectes poursuivis sont parmi les plus nuisibles, et comprennent les cicindèles et autres espèces apparentées qu'aucun autre oiseau que les vigilants vireos, à la vue perçante, ne recherche généralement. Les vireos sont parmi nos oiseaux les plus utiles.

624. **Le Vireo aux yeux rouges.** (RED-EYED VIREO). *Vireosylva olivacea*. L, 6-23. Planche XXXVIII B.

Traits distinctifs. Ce vireo peut être distingué des autres vireos grâce à sa taille plus grande, à l'absence de jaune, au gris restreint à la couronne, et à la ligne blanche du sourcil bordée de noir soit au-dessus ou au-dessous. L'iris est rouge, mais ceci ne peut se remarquer que vu de très près.

Indications sur le terrain. Les marques sur la face de ce vireo constituent la meilleure indication sur le terrain. Le sourcil blanc bordé de noir et la ligne inférieure en travers de l'œil peuvent ordinairement se voir quand l'œil braque ses yeux à travers le feuillage sur l'importun visiteur.

Nid. Suspendu après la fourche d'une petite branche de 5 à 15 pieds au dessus du sol, ce nid ou cette coupe suspendue, et tressée avec des morceaux d'écorce, des fibres de bois mort, du papier, du duvet végétal ou de l'écorce de bouleau garni de matières fines.

Habitat. L'Amérique du Nord jusqu'à la limite des arbres.

Le vireo aux yeux rouges est un des hôtes les plus familiers de nos bocages et de nos bois. Son chant, répétition agrémentée de petites variations de la même phrase, avec des pauses entre-deux, et continuées *ad libitum*, peut être entendu au sommet des arbres à peu près partout au Canada, et a valu à cette espèce le nom d'oiseau précheur.

626. **Le Vireo de Philadelphie.** (PHILADELPHIA VIREO). *Vireosylva philadelphia*. L, 4-75. Presque tout à fait semblable comme coloration au vireo gris-olive (planche XXXIX A) mais d'un jaune plus complètement diffus sur la poitrine, les flancs et en dessous.

Traits
par la lon
longue qu
et n'a qu'

Indica
trine et le

Nid.
et d'écorce

Habit
que celui
Ce vireo
par l'obse

627.
che XXX

Traits
ce vireo d

devant et
de l'espèc
de pouce a

Indica
vireo de P
la petite t

Nid.
du sol; le

Habit
s'étend à l

SOUS
Le vireo g
Canada.

Le
plus sou
vireo au
entrecot

628.
L, 5-95.
doise; la p
distinctes.

Traits
vireo à têt

Dans le pr
barres sont
des pins, n
se répanda
ligne de la

Indicati
naissables
à celle du y
secondes d
de celles d

Nid.
branche fo
cates et co

Habitat
dans les pa

C'es
téristiqu
laire assc

629. I
Dos verdâ
une tache
avec du ja

Traits distinctifs. Le viro de Philadelphie peut toujours être distingué du viro gris olive par la longueur de la première des plumes primaires. Dans cette espèce-ci elle est presque aussi longue que la seconde, tandis que chez le viro gris olive elle est réduite à un état rudimentaire et n'a qu'à peine trois quarts de pouce de long.

Indications sur le terrain. A l'état vivant ce viro ressemble au viro gris olive avec une poitrine et les dessous exceptionnellement jaunes.

Nid. Suspendu à une branche qui est à environ 8 pieds au-dessus du sol; ce nid est fait de fibres et d'écorce de bouleau.

Habitat. L'Amérique orientale. Ce viro couve au sein d'un territoire qui est plus boréal que celui du viro gris olive; il n'est que migrateur dans la plupart des régions colonisées du Canada. Ce viro est généralement assez rare et trop peu remarquable pour être souvent aperçu et reconnu par l'observateur ordinaire.

627. **Le Viro gris olive.** (WARBLING VIREO). *Vireosylva gilva*. L., 5-80. Planche XXXIX A.

Traits distinctifs. Sa coloration uniforme sans marque spéciale et sa petite taille distingueront ce viro de tout autre sauf du viro de Philadelphie. L'absence de couleur jaune répandue sur le devant et les dessous servira ordinairement de marque indicatrice. Mais la preuve déterminante de l'espèce sera l'état rudimentaire de la première primaire qui est à peine longue de trois quarts de pouce au lieu d'être d'un pouce trois quarts.

Indications sur le terrain. Les dessous d'un blanc presque pur au lieu de la diffusion jaune du viro de Philadelphie constituent la meilleure façon de les distinguer l'un de l'autre, de même que la petite taille et la coloration terne uniforme fait distinguer le présent viro de tous les autres.

Nid. Suspendu dans la fourche d'une petite branche à une hauteur de 15 à 50 pieds au-dessus du sol; le nid est fait de bandes d'écorce très fines et de fibres végétales.

Habitat. En tant qu'espèce ce viro occupe toute l'Amérique tempérée; le viro oriental s'étend à l'ouest jusqu'aux provinces de la Prairie.

SOUS-ESPÈCES. Le viro gris olive forme deux sous-espèces celle de l'Est et celle de l'Ouest. Le viro gris olive de l'Est, *V. g. gilva*, le type de l'espèce, est le seul qu'on rencontre dans l'Est du Canada.

Le viro gris olive, caché dans les sommets feuillus d'un arbre est plus souvent entendu que vu. Son chant est très différent de celui du viro aux yeux rouges, puisqu'il est continu et non composé de phrase entrecoupées.

628. **Le Viro à front jaune.** (YELLOWTHROATED VIREO). *Lanius flavifrons*. L., 5-95. La tête, les joues et le dos sont verdâtres; le croupion et la queue couleur d'ardoise; la poitrine et la gorge jaune clair; les dessous blancs; les ailes ont deux barres blanches distinctes.

Traits distinctifs. La poitrine jaune claire et la gorge de cette espèce sont distinctives. Le viro à tête bleue et le viro aux yeux blancs sont les seuls autres viros avec des barres blanches. Dans le premier de ces deux les barres sont blanches comme sur la poitrine; dans le second les barres sont jaunâtres. Comme coloration, le viro à front jaune est très semblable à la fauvette des pins, mais il y a beaucoup moins de blanc dans les dessous de cette dernière espèce, le jaune se répandant pour en couvrir la plus grande partie au lieu de s'arrêter presque brusquement à la ligne de la poitrine.

Indications sur le terrain. La gorge et la poitrine d'un jaune brillant sont parfaitement reconnaissables et empêchent qu'on prenne ce viro pour aucun autre viro indigène. La voix, semblable à celle du viro aux yeux rouges, mais avec des phrases qui se suivent moins rapidement, à 2 ou 3 secondes d'intervalle au lieu d'une par seconde, le fera distinguer d'autres oiseaux de sa famille ou de celles des fauvettes.

Nid. Dans un nid fait de bandes d'écorce, de fibres végétales, l'oiseau est suspendu à une branche fourchue, à une hauteur de 10 à 80 pieds au-dessus du sol. Le nid est garni d'herbes délicates et couvert à l'intérieur de lichens, de toiles d'araignée, etc.

Habitat. L'Est de l'Amérique du Nord. Ce viro n'est commun dans l'est du Canada que dans les parties méridionales de la région inférieure des grands lacs.

C'est un oiseau des pays boisés et des vergers. À part son chant caractéristique cet oiseau fait entendre bien des sons bizarres, et il a un vocabulaire assez étendu.

629. **Le Viro à tête bleue.** (BLUE-HEADED VIREO) *Lanius solitarius*. L., 5-61. Dos verdâtre tirant sur un bleu cendré sur la tête et sur les portions contiguës des joues; une tache loreale blanche et un anneau blanc, autour de l'œil; tous les dessous sont blancs avec du jaune disséminé sur les flancs; les ailes avec deux barres blanchâtres.

Traits distinctifs. La tête bleu cendré avec des lores blancs très marqués comme l'anneau autour de l'œil sont distinctifs.

Indications sur le terrain. La tête bleuâtre avec l'anneau blanc autour de l'œil, les lores bien visibles, et la gorge d'un blanc pur sont des indications très en évidence.

Nid. Dans un nid fait de fibres ligneuses, de bandes d'écorce, d'aiguilles de pin, de duvet végétal, l'oiseau est suspendu entre les fourches d'une petite branche à une hauteur de 5 à 10 pieds au-dessus du sol.

Habitat. En tant qu'espèce le vireo à tête bleue se trouve dans toute l'étendue des Etats-Unis et du Canada boréal jusqu'aux limites extrêmes de la colonisation. Le vireo à tête bleue, représentant de l'espèce à l'est, va jusqu'au centre de l'Alberta à l'Ouest.

SOUS-ESPÈCE. Le vireo solitaire forme plusieurs sous-espèces, dont une seule, le vireo à tête bleue, *L. s. solitarius*, la forme type, se rencontre dans l'est du Canada.

C'est un joli petit vireo et un habitant ordinaire des terres boisées et des vergers pendant les migrations. Le chant est semblable à celui du vireo aux yeux rouges, mais une oreille exercée saura saisir la différence.

631. **Le Vireo aux yeux blancs.** (WHITE-EYED VIREO). *Vireo griseus*. L. 5-27. C'est un petit vireo comme le vireo gris olive, mais d'un vert beaucoup plus riche sur le dos, et avec une marque loreale et un anneau oculaire jaunes; l'iris est blanc. La gorge et les dessous presque d'un blanc pur, jaune foncé sur les flancs; les ailes ont deux barres jaunâtres.

Traits distinctifs. Iris blanc, anneau oculaire et marque loreale jaunes, jaune foncé sur les flancs, poitrine et abdomen blancs.

Indications sur le terrain. Cette espèce est trop rare dans le Canada et trop semblable à d'autres espèces pour qu'on puisse en parler après ne l'avoir vue que de loin.

Nid. Généralement semblable à celui du vireo aux yeux rouges.

Habitat. Tous les individus de cette espèce sont du midi. Le vireo aux yeux blancs qui est de l'Est se rencontre dans les Etats-Unis de l'Est, au nord des Etats de New York et de Massachusetts, et n'est qu'accidentellement rencontré au Canada.

SOUS-ESPÈCES. Le vireo aux yeux blancs est représenté par plusieurs sous-espèces, l'individu type, le vireo aux yeux blancs du Nord *V. g. griseus* étant le seul qui se rencontre au Canada.

C'est un oiseau du sud noté pour sa voix remarquable. Il n'est question de cette espèce dans notre travail que sur la foi de quelques signalements rassemblés le long des frontières méridionales du Canada.

FAMILLE—MNIOTILTIDÆ. FAUVETTES DES BOIS. L. 4.25—7.44.

Description générale. Ce sont de petits oiseaux, une seule espèce canadienne ayant plus de 6 pouces .75. Ce sont généralement des oiseaux aux couleurs voyantes des régions boisées et on les voit perchés au sommet des arbres, lors même qu'il en est quelques-uns qui habitent à terre et dans l'herbe. Ils sont, en tant que famille, difficiles à définir, et les genres peuvent être plus facilement reconnus à leurs becs (figures 57, 58, et 59, p. 29) bien qu'il faille une connaissance très grande de l'espèce pour en reconnaître les caractères généraux.

Indications sur le terrain. On ne peut donner aucune de ces indications-là s'appliquant à toute la famille. Toutefois, avec quelque expérience de la chose, leur petite taille, leurs couleurs vives, leurs mouvements animés sont vite reconnaissables. On pourra très probablement les confondre avec les vireos.

Nid. Les habitudes de cette famille par rapport au nid qu'elle se fait sont assez variées: quelquefois c'est sur les arbres, depuis le bas près du sol jusqu'au sommet des arbres les plus élevés, d'autres fois c'est sur le sol ou dans l'herbe ou encore dans les trous de troncs morts, etc.

Habitat. La plupart des fauvettes couvent dans les forêts de sapin du Nord, au delà des limites de la colonisation générale. Quelques-unes font leur nid dans les régions plus cultivées, d'autres n'hésitent pas à franchir la frontière internationale. Tous ces oiseaux sont migrateurs et passent l'hiver, selon l'espèce, depuis le nord des Etats-Unis jusqu'au sud le long du fleuve des Amazones, dans l'Amérique du Sud.

Les fauvettes des bois forment une nombreuse famille particulière aux deux Amériques. De fait elles partagent cet honneur—celui du nombre—avec les moineaux. Les fauvettes font les délices de l'amateur ornithologiste. Elles sont si petites que peu de gens, si ce n'est les plus passionnés pour cette étude, les aperçoivent jamais; mais elles sont en même

temps si
voir, le e
grand int
change bi
nombre d
de les ide
paraît d'a
ques disti
tifs, il dev
les femelle
téristique
qu'on ne
rassants s
s'agit d'or
cir en don
on s'appli
d'abord se
l'espèce co
très carac
de peine, v
de leur co
assez parf
difficile. I
printaniers
vettes can
par une seu
et trois au
riques des
particuliers

Bien q
devrait qu
ne sont qu
comme ils
cette étude
mencent le
nouvelle ou
qui détourn
risquait de]

Valeur
Quelques-ur
presque tou
un membre
faisante.]
puis l'aisse
sol; et com
et des œufs
bien cachés]

636. La F
varia. L 5-30.

Traits distin
branches comm

temps si nombreuses et de couleurs si brillantes, que, rien qu'à les apercevoir, le commençant voit s'ouvrir devant lui tout un monde nouveau, d'un grand intérêt. Les sexes sont d'habitude dissemblables et le plumage change beaucoup avec les saisons. Ce fait, compliqué encore par le grand nombre des espèces, rend presque sans espoir pour le commençant la tâche de les identifier toutes. Cela n'est cependant pas aussi difficile qu'il y paraît d'abord. Les mâles du printemps portent ordinairement des marques distinctes, et comme beaucoup d'entre eux portent des noms descriptifs, il devient relativement aisé de les différencier. Comme, d'autre part, les femelles et les oiseaux d'automne gardent des traces des marques caractéristiques des mâles du printemps, la difficulté est réellement moindre qu'on ne s'y attendait d'ordinaire. Sans doute, des spécimens embarrassants se rencontrent pour intriguer un peu les connaisseurs, mais il s'agit d'ordinaire d'une alternative entre deux espèces qu'on finit par éclaircir en donnant plus d'attention à un ou à plusieurs petits détails. Quand on s'applique à l'étude des fauvettes, l'observateur est averti qu'il devra d'abord se familiariser avec les mâles printaniers. Dès que les mâles de l'espèce commune sont connus, chose relativement aisée, grâce à des formes très caractérisées, la plupart des femelles sont reconnues sans trop de peine, vu qu'elles portent des vestiges atténués du dessin vivement coloré de leur conjoint. En automne la plupart des jeunes oiseaux ressemblent assez parfaitement aux femelles pour rendre la reconnaissance assez peu difficile. Il n'y a donc, relativement que peu de plumages, à part les mâles printaniers, qu'il faille apprendre à connaître individuellement. Les fauvettes canadiennes représentent douze genres dont sept sont représentés par une seule espèce. Le genre *Dendroica* a seize espèces, le *Vermivora* cinq, et trois autres sont représentés chacun par trois espèces. Les détails généraux des plus importants de ces genres seront éucidés sous des titres particuliers.

Bien qu'on les dénomme "Modulateurs" (Warblers) leur chant ne devrait guère être honoré de ce titre. À peu d'exceptions près ces chants ne sont que d'insignifiantes petites notes sans grande continuité, mais comme ils servent souvent à distinguer les espèces, quiconque s'applique à cette étude est invité à y apporter une attention soutenue car, lorsque commencent les grandes migrations des fauvettes, la présence d'une espèce nouvelle ou rare est souvent révélée par une seule modulation peu connue qui détourne l'attention qui se portait sur la masse vers la fauvette qui risquait de passer inaperçue.

Valeur économique. Les fauvettes sont éminemment insectivores. Quelques-unes prennent plus ou moins de grain et un peu de fruit qui est presque toujours sauvage, et aucune plainte ne s'est jamais élevée contre un membre de cette famille. Leur action est donc, en somme, assez bien-faisante. Elles atteignent toutes les sortes d'habitat des insectes, depuis l'aisselle des feuilles les plus élevées jusqu'aux brins d'herbe sur le sol; et comme ces oiseaux sont petits, ils se contentent des insectes et des œufs de ces insectes qui sont de trop peu d'importance ou trop bien cachés pour attirer l'attention d'oiseaux bien plus gros.

636. **La Fauvette noire et blanche.** (BLACK AND WHITE WARBLER). *Mniotilta varia*. L 5-30. Planche XXXIXB. Le plumage varie peu.

Traits distinctifs. C'est une fauvette noire et blanche qui se glisse autour des trous et des branches comme un pivert. En automne les couleurs du jeune oiseau sont semblables à celles de

l'adulte mais légèrement voilées avec une petite dissémination de chamois et moins de noir sur la gorge. Au printemps on ne peut la confondre qu'avec la fauvette rayée, mais la raie blanche médiane sur la couronne, au lieu d'être toute noire, peut la distinguer de cette espèce.

Indications sur le terrain. Son habitude de ramper, sa coloration noire foncée et blanche avec la raie médiane sur la couronne. En automne c'est la seule fauvette toute noire et blanche qu'on rencontre dans le Canada oriental.

Nid. Sur le sol au pied d'un tronc, d'une bûche, ou d'une grosse pierre dans un nid fait de bandes d'écorce, d'herbes etc., garni de radicelles et de longs poils.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord; couve dans presque tout le Canada au nord bien au delà de la partie colonisée.

C'est une des fauvettes qui arrivent le plus tôt au printemps et une de celles qu'il est le plus facile d'identifier en tout temps vu qu'elle a toujours des marques bien reconnaissables et qu'il y a peu de différence dans la coloration soit saisonnière soit sexuelle.

637. La Fauvette protonotaire. (PROTHONOTARY WARBLER). *Protonotaria citrea*, L., 5-50. C'est une fauvette jaune d'or, un chrome riche et brillant ou doré sur la tête et sur presque tous les dessous, avec ailes, croupion et queue grisâtres. Il y a peu de variation de plumage.

Traits distinctifs. C'est la seule fauvette avec une intense couleur d'or sur la tête, le cou et la tête, le cou et la poitrine, sans barres sur les ailes. La fauvette des pins et la fauvette de Wilson ont une couronne verte ou noire; la fauvette jaune n'a ni les ailes ni la queue grises, elle est jaune citron plutôt qu'orange ou or.

Indications sur le terrain. La fauvette protonotaire est une espèce trop rare au Canada pour la signaler d'après des spécimens vivants.

Nid. Dans un trou, ou un tronc, ou une souche; son nid est fait de radicelles, de fines ramilles, de mousse, de duvet végétal ou de plumes.

Habitat. La vallée du Mississipi; au nord à peine jusqu'à la frontière canadienne, qu'elle passe accidentellement dans la région inférieure des grands lacs.

Cet oiseau n'est compris dans la liste canadienne que par suite de quelques rencontres qu'on en a faites dans la région inférieure des grands lacs. C'est un oiseau des terrains submergés et des buissons qu'entourent des eaux stagnantes.

GENRE—VERMIVORA. FAUVETTES VERMIVORES.

Le genre *Vermivora* est un groupe de petites fauvettes de charpente délicate et chez lesquelles les caractères suivants sont très facilement discernés. Le bec est petit, très pointu, presque pareil à une épine, et la ligne du culmen est droite ou presque concave plutôt que convexe ou légèrement arquée (figure 57, p. 39). Les queues sont fortement colorées et sans taches blanches.

639. La Fauvette vermivore. (WORM-EATING WARBLER). *Helminthos vermivorus*, L., 5-51. Olive mat en dessus; la tête chamois avec des lignes brun foncé, qui forment un contraste marqué, en travers de l'œil et de la couronne en bordure. Peu de variété dans le plumage.

Traits distinctifs. C'est la seule fauvette avec cette marque distinctive foncée et chamois à la tête. Le bec est plutôt massif pour une fauvette de cette espèce.

Indications sur le terrain. Oiseau trop rare au Canada, pour qu'on puisse se fier à un simple coup d'œil pour l'identifier.

Nid. Sur le sol; nid de radicelles, de feuilles et d'écorce.

Habitat. L'est des États-Unis; un seul signalement mentionné au Canada, dans le sud de l'Ontario.

C'est un oiseau des plateaux boisés ou des taillis marécageux; se nourrit près du sol.

641. I
L., 4-80.
de la mêm
Deux barr
dans le plu

Traits d
bleu avec bi

Indicatio
indications c

Nid. E
et de feuilles

Habitat.
et ne la trav

Bien
intéressar
ailes doré
temps reg
Lawrence

642. La
sopetra. L.
en dessous,
sur l'aile; jo
brillante et l
dans le plum

Traits dis
autour de l'œ

Indicatio
en vie. La g
tout à fait à l

Nid. Sur
à celui de la fi

Habitat.
tario le long c

Cet o
d'arbrissea
s'attendre

645. La
L., 4-77. C'
plus ou moïn
mages seulem
bonnet. Ch
des plumes, c

Traits dist
queue, mais si
sont encore les
marqués, ma
dos. Quand
fauvette à cou

Indications

Nid. Sur
faits d'herbes

Habitat. I
nisées. La fau

SOUS-ES
pique, V. r. rul

Cette f
et dans les]

641. La Fauvette aux ailes bleues. (BLUE-WINGED WARBLER). *Vermivora pinus*. L., 4-80. C'est une fauvette verte avec un front jaune, la gorge, la poitrine et les dessous de la même couleur; une ligne noire fine en travers de l'œil, les ailes et la queue gris bleu. Deux barres blanches aux ailes, La femelle semblable mais plus terne. Peu de variété dans le plumage.

Traits distinctifs. La face et les dessous jaune clair, avec une raie noire à l'œil, les ailes gris bleu avec barres blanches, tout cela est distinctif.

Indications sur le terrain. Cet oiseau est trop rare au Canada pour qu'on se puisse fier à des indications de ce genre pour l'identifier.

Nid. D'ordinaire sur le sol au milieu ou tout près des secondes récoltes dans un nid d'écorce et de feuilles garni de fines bandes d'écorce et de vrilles, solidement entourées de feuilles.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord; s'arrête régulièrement au sud de la frontière canadienne et ne la traversant qu'accidentellement dans le sud de l'Ontario.

Bien qu'elle n'ait été prise qu'une seule fois au Canada, c'est une très intéressante espèce car elle s'accouple avec l'espèce suivante, la fauvette à ailes dorées, procréant des sujets hybrides déconcertants qui furent longtemps regardés comme des espèces séparées sous les noms de fauvettes de Lawrence et de Brewster.

642. La Fauvette à ailes dorées. (GOLDEN-WINGED WARBLER). *Vermivora chrysoptera*. L., 5-10. C'est une fauvette gris bleu; le mâle a du blanc ou du gris très clair en dessous, qui devient foncé sur les flancs, avec bonnet jaune et plaque de même couleur sur l'aile; joues et gorge noires. La femelle est semblable au mâle, mais un peu moins brillante et les surfaces noires sont représentées par du gris foncé. Il y a peu de variation dans le plumage selon l'âge et la saison.

Traits distinctifs. Son corps gris bleu, la tache jaune de l'aile, la gorge et les taches noires autour de l'œil sont distinctives.

Indications sur le terrain. Les indications susdites sont facilement reconnaissables chez l'oiseau en vie. La gorge noire rappelle un peu la mésange à tête noire mais les autres marques suffisent tout à fait à l'en distinguer.

Nid. Sur le sol ou dans les champs à buissons ou de seconde récolte; c'est un nid assez pareil à celui de la fauvette aux ailes bleues.

Habitat. L'est des États-Unis; elle traverse nos frontières régulièrement dans le sud de l'Ontario le long du lac Érié et dans l'angle inférieur du lac Huron.

Cet oiseau est ordinairement trouvé dans les terres incultes chargées d'arbrisseaux ou le long des lisières buissonneuses des forêts. On ne peut s'attendre à le voir que dans l'Ontario méridional.

645. La Fauvette de Nashville. (NASHVILLE WARBLER). *Vermivora rubricapilla*. L., 4-77. C'est une fauvette jaune et verte avec une tête grisâtre et une tache marron plus ou moins dissimulée sur la couronne. Le sexe, la saison et l'âge font varier les plumages seulement quant à l'intensité du jaune et à la quantité de couleur marron sur le bonnet. Chez les femelles le bonnet peut être entièrement dissimulé par les bords gris des plumes, et même il peut être tout à fait absent.

Traits distinctifs. C'est le vert indistinct au-dessus, et le jaune de tous les dessous jusqu'à la queue, mais surtout brillant sur la gorge et la poitrine; la tête et les joues ou grises ou grisâtres sont encore les traits distinctifs. Cette tête grisâtre et le derrière du cou peuvent n'être pas bien marqués, mais on les voit toujours comme formant une légère différenciation d'avec le vert du dos. Quand elle est présente la couronne marron (non point orange-rougâtre comme chez la fauvette à couronne orangée) est un caractère spécifique qui ne peut pas tromper.

Indications sur le terrain. Les dessous d'un jaune brillant, sans raie, tête et joues gris.

Nid. Sur le sol dans des terrains en partie défrichés ou des pâturages boisés; dans des nids faits d'herbes et de mousse garnie d'herbes plus fines et de fines radicelles.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord. Au Canada, dans le nord au delà des régions colonisées. La fauvette de Nashville, de l'Est, s'étend à l'Ouest jusque vers les montagnes.

SOUS-ESPÈCES. La fauvette de Nashville comprend celle de l'Est, qui est la forme pique, *V. r. rubricapilla*, et celle de l'extrême Ouest qui s'appelle la fauvette de Calaveras.

Cette fauvette se rencontrera surtout dans les plantations d'arbustes et dans les haies qui bordent les chemins de campagne.

646. La Fauvette à couronne orangée. (ORANGE-CROWNED WARBLER). *Vermivora celata*. L, 5. C'est une fauvette d'un jaune mat, gris vert, avec une tache orange-rougeâtre dissimulée sur la couronne. Très peu de différence sexuelle. Les toutes jeunes n'ont pas la tache sur la couronne et l'éclat du jaune des dessous est ramené presque à la couleur du dos.

Traits distinctifs. Cette fauvette est semblable à celle de Nashville, mais sans le gris ou le grisâtre sur la tête. La tache sur la couronne, quand elle existe, est encore plus dissimulée que celle de la fauvette de Nashville; elle est même tout à fait cachée jusqu'à ce que les plumes soient séparées pour laisser voir la couleur de leurs bases. La gorge jaune est plus terne que dans la fauvette de Nashville. L'oiseau très jeune est presque d'un vert grisâtre uniforme avec de vagues soupçons cendrés et assez semblable à la très jeune fauvette du Tennessee, mais sans la ligne claire et vague du sourcil; elle est plus uniformément colorée et sans indication quelconque de blanc dans les dessous.

Indications sur le terrain. Pareille à une fauvette de Nashville de couleurs très ternes, ou à une jeune fauvette du Tennessee sans la ligne vague du sourcil.

Nid. Sur le sol ou tout près, nid fait de feuilles et d'herbes fines.

Habitat. Le centre et l'ouest de l'Amérique. Celle à couronne orangée de l'intérieur couve depuis l'Alaska jusqu'au Manitoba et n'est que migratrice à travers le Canada oriental.

SOUS-ESPÈCES. L'espèce comprend trois sous-espèces. La fauvette à couronne orangée de l'intérieur *V. c. celata*—la forme type—avance à l'ouest jusqu'aux montagnes.

C'est une des plus rares parmi les fauvettes particulières au Canada oriental. Il ne suffit pas de l'avoir simplement aperçue pour en garantir la présence dans le Canada oriental.

647. La Fauvette du Tennessee. (TENNESSEE WARBLER). *Vermivora peregrina*. L, 5. Le dos du mâle est vert; les dessous sont presque d'un blanc pur. La tête et l'arrière du cou d'un gris cendré, disséminé sur les joues. La ligne du sourcil est blanche avec une apparence de ligne noire en travers de l'œil. Chez les femelles et les toutes jeunes fauvettes le gris de la tête et de l'arrière-cou est remplacé par le vert du dos qui s'étend plus ou moins en un jaune mat ou un jaune verdâtre sur la poitrine et les dessous. La ligne sourcilière est toujours visible comme une coloration plus claire du vert.

Traits distinctifs. La coloration générale verte et blanche, et la ligne claire du sourcil sont les meilleurs de ces traits dans tout plumage.

Indications sur le terrain. La coloration générale comme ci-dessus, avec la ligne claire du sourcil et sans les barres blanches de l'aile, les taches à la queue ou la tache blanchâtre à la base des primaires de la fauvette bleue à gorge noire.

Nid. Dans la mousse sur le sol parmi la végétation petite et compacte des conifères; le nid fait d'herbes ténues, de radicelles et de longs poils.

Habitat. L'est de l'Amérique, probablement jusque vers la limite nord des forêts. D'habitude cet oiseau est rarement migrateur à travers nos régions colonisées, mais il est commun dans nombre de localités.

Cette fauvette est plutôt rare dans presque toutes les parties du Canada oriental. Dans le temps de la migration on la trouve vers le sommet des arbres.

648. La Fauvette d'Amérique. (PARULA WARBLER). *Compothlypis americana*. L, 4-73. Les dessus et les côtés de la face et du cou sont bleus, un bleu presque brillant, avec du jaune étendu sur le milieu du dos. Les dessous sont blancs, la gorge et la poitrine jaune clair avec une bande vaguement noire (ou noir bleuâtre) et rougeâtre en travers de la poitrine. Les femelles et les tout jeunes oiseaux sont plus ternes, sans la bande pectorale, et avec le jaune plus ou moins disséminé sur tous les dessous, mais très foncé au milieu du dos. Des barres blanches sur les ailes dans tous les plumages.

Traits distinctifs. Le dos bleu, ou pur ou mélangé de jaune; les barres des ailes, la poitrine et la gorge jaunes sont toujours distinctifs.

Indications sur le terrain. Voir le numéro précédent.

Nid. Dans des touffes pendantes d'usnée (barbe de vieillard) ou d'autres lichens pendants.

Habitat. Principalement l'est de l'Amérique. La fauvette d'Amérique du Nord occupe le nord de ce territoire particulier, jusqu'aux limites de la colonisation actuelle; elle ne couve pas dans la région des grands lacs inférieurs.

SOUS-ESPÈCES. La fauvette d'Amérique comprend deux sous-espèces, celle du Nord et celle du Sud. L'individu canadien, la fauvette du Nord, (Northern Parula) *C. a. usneae*, est ainsi nommée d'après le lichen dans lequel elle bâtit son nid.

Le ge
buste que
siblement
jaune, a b

650. La
Le mâle: la g
de la gorge, c
fortement su
allongées sur
blanche. La
jaune répand
Le croupion c
ment distinct
le mâle n'a p
jaune au cro
tendres et fon

Traits disti
Les femelles ac
Les jeunes fem
de jaune dans l
légère teinte se
est dans la mai

Indications
toutes jeunes fe
sur un fond légé
du cou, comme

Nid. Sur l
nid est en parti
et garnies avec

Habitat. L.
colonisées.

Cette fa
comme rare
espèce qui a
voit souvent

652. La F
XL A.

Traits disti
ces. Sa queue,
les autres espèce

Indications s
pas tromper. Q
la queue jaune, le
facilement recon

Nid. Il est
il est fait de fibr
et quelquefois d

La fauvette
neau. Au lieu de
ensevelit avec de
fondements de la

Habitat. Pre
Canada, à l'exc

SOUS-ESPÈ
l'Est. *D. aestiva* c

Cette fau
Elle partage

GENRE—DENDROICA. FAUVETTES DES RÉGIONS BOISÉES.

Le genre *Dendroica* est composé de fauvettes d'une charpente plus robuste que celle du genre *Vermivora*. Le bec est plus long et le culmen sensiblement plus arqué (figure 58, p. 29). La queue, sauf celle de la fauvette jaune, a beaucoup de blanc.

650. La Fauvette du cap May. (CAPE MAY WARBLER). *Dendroica trigrina*. L. 5. Le mâle: la gorge, la poitrine et presque tous les dessous jaune brillant rayé de noir au bas de la gorge, de la poitrine et des flancs. Une tache marron au milieu de la joue se détache fortement sur le jaune. Le sommet de la tête d'un noir qui continue sous forme de taches allongées sur le vert jaune du dos. Le croupion est jaune et l'aile a une grande tache blanche. La femelle: les dessus gris olive; les dessous d'un blanc sale réchauffé par du jaune répandu en travers de la poitrine, laquelle est vaguement rayée de jaune foncé. Le croupion est jaunâtre et la tache blanche de l'aile est remplacée par des barres vaguement distinctes. Les jeunes: semblables aux oiseaux de printemps, mais moins brillants; le mâle n'a pas les joues marron. Les femelles: gris olive uniforme et terne, légèrement jaune au croupion; un blanc terne légèrement olive en dessous, vaguement rayé de lignes tendres et foncées, et quelques vagues touches d'olive jaunâtre sur la poitrine et les flancs.

Traits distinctifs. Les mâles sont reconnaissables à leurs couleurs tigrées d'un jaune rayé de noir. Les femelles adultes laissent voir assez du dessin propre au mâle pour qu'on puisse les reconnaître. Les jeunes femelles sont plus difficiles à reconnaître. Toutefois, toutes font voir au moins assez de jaune dans les parties internes des plumes sur les côtés du cou juste derrière les oreilles. Cette légère teinte se montre quelquefois, chez l'oiseau vivant, quand il tourne la tête, mais si l'oiseau est dans la main, il faut séparer les plumes pour apercevoir cette teinte.

Indications sur le terrain. Les adultes et les tout jeunes mâles sont faciles à distinguer. Les toutes jeunes femelles peuvent se reconnaître à la raie très fine et obscure de la poitrine qui ressort sur un fond légèrement chamois, gris olive clair, ou encore à la tache jaune, dissimulée sur les côtés du cou, comme c'est décrit plus haut.

Nid. Sur les branches basses des petits arbres dans les pâturages ou les terrains boisés; le nid est en partie suspendu et fait de ramilles et d'herbes réunies ensemble par des fils d'araignée et garnies avec du erin de cheval.

Habitat. L'est de l'Amérique, à l'ouest jusqu'à la Prairie, au nord jusqu'au delà des régions colonisées.

Cette fauvette est une des plus belles; elle est considérée ordinairement comme rare, mais devenue plus commune selon les localités. C'est une espèce qui aime le sommet des arbres dans les régions boisées, mais qu'on voit souvent dans les vergers et dans les arbres feuillus.

652. La Fauvette jaune. (YELLOW WARBLER). *Dendroica aestiva*. L. 5-10. Planche XL A.

Traits distinctifs. La fauvette jaune peut facilement être confondue avec quelques autres espèces. Sa queue, avec du jaune sur les barbes intérieures des plumes, la fera distinguer de toutes les autres espèces uniformément jaunes ou vertes.

Indications sur le terrain. Le jaune brillant égal et uniforme des oiseaux de printemps ne peut pas tromper. Quelques femelles ternes sont plus vertes que jaunes, mais les ailes à bords verts, la queue jaune, les contrastes dus à l'absence de couleur, la taille et les mouvements de l'oiseau sont facilement reconnaissables.

Nid. Il est placé dans une fourche droite de branches, dans les buissons et les petits arbres; il est fait de fibres délicates et d'une bonne quantité de duvet végétal; garni avec ce même duvet et quelquefois de longs poils.

La fauvette jaune est une des rares espèces qui parfois refusent de couvrir des œufs d'étourneau. Au lieu de jeter dehors l'œuf intrus, elle bâtit un nouveau nid au-dessus de l'ancien qu'elle ensevelit avec tout son contenu, y compris, souvent, quelques-uns de ses propres œufs dans les fondements de la nouvelle construction, au sein de laquelle une nouvelle série d'œufs est déposée.

Habitat. Presque toute l'Amérique du Nord. La fauvette jaune de l'Est habite tout le Canada, à l'exception du versant du Pacifique.

SOUS-ESPÈCES. La fauvette jaune comprend quatre sous-espèces; la fauvette jaune de l'Est, *D. aestiva* qui occupe la plus grande partie du Canada, est le type de l'espèce.

Cette fauvette est la couveuse la plus commune dans le sud du Canada. Elle partage avec le chardonneret le nom populaire de "Canari sauvage".

mais l'absence de noir la fera reconnaître au premier coup d'œil. On la rencontre dans les lieux buissonneux en pleine campagne ou le long des cours d'eau et sur le bord des marais. C'est une visiteuse habituelle des jardins où son petit chant jovial fait plaisir à entendre. En automne la fauvette jaune est une des premières espèces à partir. Un peu après le mois de juillet elle disparaît, et vers la mi-août il ne reste plus que quelques traîneurs. Elle part avant que maint observateur ait commencé à penser aux migrations d'automne, c'est ainsi que le détail de ses mouvements d'automne est difficile à suivre.

654. La Fauvette bleue à gorge noire. (BLACK-THROATED BLUE WARBLER). *Dendroica caerulescens*. L., 5-28. Planche XL B.

Traits distinctifs. Le mâle, dont le nom est si descriptif et qui est si fortement caractérisé, est très facile à reconnaître. La femelle, cependant, l'est beaucoup moins, surtout en automne; elle peut ressembler soit au jeune oiseau du Tennessee, soit à la fauvette rayée de l'automne, soit à la fauvette à poitrine baie. Le dos rayé et les barres de l'aile, cependant, des deux dernières sont absentes. Elles sont plus foncées et plus vert-grisâtre que l'oiseau du Tennessee, en dessus, et plus chamois en dessous. Une tache blanche ou claire, indistincte et en partie dissimulée à la base des primaires fait toujours reconnaître les femelles de cette espèce.

Indications sur le terrain. Le mâle est facile à distinguer. La femelle sous quelque plumage que ce soit peut ordinairement être distinguée de toutes les fauvettes de couleur uniforme vert mat, grâce à une tache parfois très vague et claire à la base des primaires, tache qui se voit bien plus à l'état vivant qu'on ne s'y attendrait.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord, couvant dans le nord, mais au sud des régions colonisées.

SOUS-ESPÈCES. La fauvette bleue à gorge noire comprend deux sous-espèces dont une seule se trouve au Canada, la forme typique *D. c. caerulescens*, la gorge noire du Nord, quoique parfois, des spécimens se rapprochent beaucoup de la variété méridionale, la fauvette de Cairn *D. c. cairnsi*, par le fait qu'elles ont comme un soupçon de taches noires sur le dos.

655. La Fauvette à croupion jaune. (MYRTLE WARBLER). *Dendroica coronata*. L., 5-65. Planche XLI A.

Traits distinctifs. C'est une espèce très facilement reconnaissable. Tous les plumages ont au moins des soupçons du jaune de la couronne, du croupion et des marques latérales. Les tout jeunes sont principalement brun rouilleux en dessus, et ont plus ou moins d'une nuance de cette même couleur en travers de la poitrine avec des raies très faiblement indiquées.

Indications sur le terrain. Le croupion jaune est toujours distinct et voyant, formant l'indication la plus visible sur le terrain. Sa présence et les marques de même couleur du flanc et de la couronne, toujours présentes quoique parfois indistinctes, en automne, constituent des guides sûrs pour l'identification à l'état vivant.

Nid. Dans les arbres conifères entre 5 et 10 pieds au-dessus du sol; le nid est fait de fibres végétales et garni d'herbages.

Habitat. Presque toute l'Amérique du Nord jusqu'à la limite des arbres. Elle couve juste au delà de la colonisation populeuse.

C'est une fauvette qui arrive de bonne heure au printemps et qui est la dernière à repartir en automne. Parfois, en cette dernière saison, les lieux buissonneux, les bords des routes, et les clôtures que la végétation recouvre, sont pleins de fauvettes à croupion jaune, chacune montrant, comme elle s'envole, son croupion bien reconnaissable en preuve de son identité.

657. La Fauvette à tête cendrée. (MAGNOLIA WARBLER). *Dendroica magnolia*. L., 5-12. Planche XLI B.

Traits distinctifs. La poitrine d'un jaune voyant et les dessous fortement rayés de noir, les joues noires, les dessus grisâtres sont parfaitement reconnaissables au printemps. Les oiseaux d'automne ont des restes bien reconnaissables du plumage adulte, mais les marques de la poitrine sont absentes et celles des flancs sont très amoindries. La tête et les joues sont uniformément grisâtres et le dos est grisâtre et ombré de vert jusqu'au croupion qui est étendu de jaune.

Indications sur le terrain. Le jaune en dessous et au croupion fera distinguer la fauvette à tête cendrée de toutes les autres sauf de la fauvette du Cap May. La poitrine jaune de cette dernière est nettement et plus uniformément rayée de noir et elle a la tache marron à l'oreille. Un examen très attentif de la fauvette à tête cendrée, dans son plumage d'automne, fait toujours apercevoir une barre vague, cendrée en travers du haut de la poitrine. La queue est aussi un bon moyen

d'identification
pointe et son
blanche avec

Nid. E.
fait de ramil

Habitat.
surtout au no

Cette
tion a lieu
couleurs si

658. La
mâle; bleu d
et sur les c
et des rates
un bleu verd
soupçons de

*Traits dis
teinte bleuâtr
téristique.* L.
fauvette du T
les taches à la

*Indications
ment il ressen
queue.*

Nid. Dau
des toiles d'ar
rière.

Habitat. l
de la frontière
à la rencontrer

659. La
sylvanica. L.
jaunâtre; en
aux ailes, ou
forme; en de
cette couleur

*Traits disti
faire confondre
Les oiseaux de
les oiseaux d'at
ailes sont facile*

Indications.
dessus sont des
ne se laissent pr

Nid. Dans
tiges de feuilles

Habitat. L.
au delà des limi
Canada, sauf da

La fau
buissonneux
boises.

660. La F
nea. L., 5-63.
sont blancs; le
(marron rougê
du cou. La fe
ment reconnai
toutefois, sont

d'identification. Les marques blanches si caractéristiques de la queue se trouvent en arrière de la pointe et sont assez étendues, donnant quand on les regarde de dessous l'impression d'une queue blanche avec une large bande de noir.

Nid. Est placé sur les arbres conifères à une hauteur de 3 à 6 pieds au-dessus du sol; il est fait de ramilles fines, de tiges de feuilles et garni de radicelles ressemblant à des poils.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord, dans le nord jusqu'à la limite des arbres; elle couve surtout au nord des régions cultivées.

Cette fauvette est une des plus belles de son espèce; quand la migration a lieu, elle se loge dans les arbres feuillus et dans les vergers où ses belles couleurs se marient de façon charmante aux arbres en fleurs.

658. **La Fauvette bleue.** (CERULEAN WARBLER). *Dendroica cerulea*. L, 4-50. Le mâle: bleu de ciel et blanc. En dessus, tout bleu avec de fines marques noires sur le dos et sur les côtés de la couronne. Au-dessous, blanc pur avec une bande pectorale bleue et des raies bleues aux flancs; les barres des ailes sont blanches. La femelle: en dessus un bleu verdâtre uniformément terne; blanc en dessous, plus ou moins taché de quelques soupçons de vert et de jaune. Les tout jeunes sont semblables, mais plus jaunes partout.

Traits distinctifs. Le mâle ne peut donner lieu à aucune erreur. D'autres plumages ont une teinte bleuâtre singulière au lieu d'olive ou de jaunâtre; le vert des dessus est tout à fait caractéristique. Le tout jeune avec ses dessous verdâtres et jaunâtres est assez semblable à la jeune fauvette du Tennessee, puisqu'elle a la même raie au sourcil, mais ses barres blanches à l'aile et les taches à la queue l'en distingueront assez.

Indications sur le terrain. Le bleu de l'adulte et l'éclat bleuâtre d'autres plumages. Autrement il ressemble à la jeune fauvette du Tennessee, mais avec les barres de l'aile et le blanc sur la queue.

Nid. Dans un arbre, entre 20 et 60 pieds au-dessus du sol; un nid fait de fibres fines liées avec des toiles d'araignées, garni de bandes de fibres d'écorce et de quelques lichens à la surface extérieure.

Habitat. L'est des Etats-Unis, sauf la côte, au nord le long du lac Erié jusqu'à un peu au delà de la frontière canadienne. Cette fauvette est trop rare au Canada pour qu'on puisse s'attendre à la rencontrer sauf dans une région limitée du sud de l'Ontario.

659. **La Fauvette de Pensylvanie.** (CHESTNUT-SIDED WARBLER). *Dendroica pensylvanica*. L, 5-4. Le mâle: couronne jaune; dos noir et gris, en raies, étendu d'un vert jaunâtre; en dessous du blanc avec des bandes marron le long des flancs, deux barres aux ailes, ou blanches ou jaunâtres. Les jeunes: en dessus un vert jaunâtre presque uniforme; en dessous du blanc, les joues sont grises; ordinairement avec des soupçons de cette couleur marron que le mâle a aux flancs.

Traits distinctifs. Une attention superficielle apportée à la description qui précède pourrait faire confondre cette espèce avec la fauvette à poitrine baie, mais la gorge blanche est distinctive. Les oiseaux de printemps avec leur bonnet jaune, leurs flancs marron et leurs dessous blancs; et les oiseaux d'automne blancs en dessous, vert-jaunâtre en dessus, et avec les barres jaunâtres aux ailes sont facilement reconnaissables.

Indications sur le terrain. Les parties de dessous blanches et le vert singulièrement citron des dessus sont des indications excellentes même dans les plumages où les marques caractéristiques ne se laissent pas voir.

Nid. Dans les buissons à quelque trois pieds au-dessus du sol; nid fait de bandes d'écorce, de tiges de feuilles, etc., garni de vrilles et de radicelles.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord, à l'ouest jusqu'aux provinces de la Prairie, au nord au delà des limites de la colonisation. Les nids sont dans les localités où on la trouve dans l'est du Canada, sauf dans la partie d'extrême sud.

La fauvette de Pensylvanie est ordinairement trouvée dans les lieux buissonneux et secs, dans les secondes récoltes et dans les arbustes à framboises.

660. **La Fauvette à poitrine baie.** (BAY-BREASTED WARBLER). *Dendroica castanea*. L, 5-63. Le mâle: finement rayé d'ocre-olive mat et de noir en dessus; les dessous sont blancs; le haut de la tête, la gorge, l'avant-cou et les flancs sont de couleur baie (marron rougeâtre); le front et les joues sont noirs; il y a une tache d'ocre pâle sur le côté du cou. La femelle a toutes ces marques caractéristiques très propres à la faire facilement reconnaître, quoique voilées et vaguement indiquées. Les oiseaux d'automne, toutefois, sont absolument différents; en dessous un vert-jaunâtre vaguement rayé de noir

en dessous un blanc plus ou moins teinté d'un vert-jaunâtre ou chamois; la couleur baie des côtés est souvent indiquée par un rouge un peu plus chaud ou par des plumes individuelles entièrement colorées.

Traits distinctifs. Les oiseaux de printemps sont bien faciles à distinguer. Les individus d'automne ressemblent à la fauvette rayée de façon si étroite que souvent on ne peut les en distinguer qu'avec peine, même quand on en tient dans la main. La fauvette à poitrine baie a presque toujours une certaine quantité d'ocre de tons très chauds sur les flancs, ce que n'a pas la fauvette rayée, et les couvertures sous-caudales sont crème au lieu d'un blanc pur. La présence de barres aux ailes fera distinguer ces deux espèces de toute autre fauvette simplement verte.

Indications sur le terrain. Le mâle adulte est reconnaissable à la couleur. La femelle de printemps fait toujours voir assez de sa poitrine baie pour qu'on la reconnaisse. Les oiseaux d'automne adultes ont aussi d'ordinaire une trace de bai sur les flancs et les chauds tons ocreux de ces parties peuvent d'ordinaire se voir sur les jeunes. Mais lorsque ces caractères manquent pour distinguer l'espèce, une attention marquée fera voir que la couleur de la poitrine est parfaitement uniforme, et avec des yeux perçants ou des verres grossissants on apercevra d'ordinaire des raies vaguement foncées qui se montrent sur les côtés de la poitrine de la fauvette rayée. Aucune de ces indications, cependant, ne se verra sinon dans les circonstances les plus favorables, mais dans les troupes mélangées on peut habituellement dire la proportion de chaque espèce avec passablement d'exactitude.

Nid. Dans des arbres conifères, de 5 à 20 pieds au-dessus du sol, dans un nid fait d'herbes et de plantes fibreuses, avec du duvet de ces plantes et de long poils.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord, à l'ouest jusqu'à l'autre côté de la Prairie; au nord jusqu'à la limite des forêts. Elle couve au delà des régions habituellement cultivées.

La fauvette à poitrine baie pendant la migration du printemps préfère les broussailles dans les localités sablonneuses, et le bord des chemins, etc., cependant elle se risque près des maisons dans les arbres feuillus et les vergers. La ressemblance entre la fauvette à poitrine baie et la fauvette rayée d'automne, oiseau d'un plumage complet tout à fait différent, est un des phénomènes très intéressants de la coloration des oiseaux. Les plumages d'automne de ces deux oiseaux n'étaient jadis nullement distingués l'un de l'autre, mais confondus sous le nom de fauvette d'automne.

661. La Fauvette rayée. (BLACK-POLL WARBLER). *Dendroica striata*. L. 5-56.

Le mâle: raies noires et blanches avec une couronne entièrement noire; des lignes fines de noir et de blanc sur le dos; les dessous tout blancs avec du noir, depuis la base du bec jusqu'aux côtés du cou, qui se divise en raies sur les flancs; joues blanches. La femelle, les dessous verdâtres; le blanc des dessous est étendu de vert sur la gorge et la poitrine mais avec suffisamment de raies noires, plus ou moins visibles, pour qu'on reconnaisse l'oiseau comme étant la femelle du précédent. Les oiseaux d'automne ne peuvent presque pas se distinguer de la fauvette à poitrine baie (voir ci-dessus).

Traits distinctifs. Les mâles de printemps avec leurs marques blanches et noires très distinctes ne peuvent être confondus qu'avec le grimpeau blanc et noir, mais leurs habitudes n'étant pas grimpances, et leur couronne qui est entièrement noire, au lieu d'avoir une large raie médiane blanche, les feront aisément distinguer. La rayure de la femelle est bien distinctive. Les oiseaux d'automne peuvent se distinguer de la fauvette à poitrine baie par l'absence de couleur ocreuse, baie ou chamois sur les flancs et par les couvertures sous-caudales absolument blanches.

Indications sur le terrain. La fauvette rayée se montre sous trois différents plumages: le mâle est noir et blanc; la femelle est verdâtre; les dessous sont blancs et plus ou moins rayés de noir. Les oiseaux d'automne, comme les fauvettes à poitrine baie avec de vagues raies, visibles seulement pour des yeux perçants ou avec de bonnes loupes, se montrent dans les flancs jaunâtres.

Nid. Généralement dans les sapins à 6 pieds environ au-dessus du sol; nid fait de branchettes, de mousses, de radicelles etc., garni d'herbes fines et de vrilles.

Habitat. Presque le même que celui des espèces précédentes.

La fauvette rayée est une des dernières de cette famille à arriver au printemps, d'habitude après que la plupart des autres bandes migratrices sont parties au nord.

662. La Fauvette de Blackburn. (BLACKBURNIAN WARBLER). *Dendroica fusca*. L. 5-25. Planche XLIIA. Les parties de dessus qui sont noires, et l'orangé éclatant de la gorge, sont des marques distinctes dans le cas du mâle adulte. Chez la femelle la couleur orange de la gorge, quoique indistincte, est cependant reconnaissable. Les jeunes en automne sont comme la femelle adulte, lors même que les jeunes femelles aient des couleurs plus ternes, la gorge et la poitrine ayant retenu, seules, une coloration jaune assez vague.

Traits c
erreur possi
les fauvette
grisâtre en
des traits d

Indicati
la poitrine,
tituent les 1

Nid. I
d'herbes, gs

Habitat.
au nord des

Le n
attribue
contrées
au somm

667. L
droica viren

Traits di
marqué avec
absent ou se
plus fortes si
les côtés de
couronne son

Indicatio
Pour les adu

Nid. Su
mousse, garr

Habitat.
l'est du Can
gions très n

C'est
mais aussi

670. F:
Gris bleu et
Tous les de
de la poitrin
ternes, les r

Traits di
plus grande;
ler un collier
au lieu d'être
fauvette à têt
à tête cendré

Indication
simple vue.

Nid. Su
d'herbe; et g

Habitat.
trouve dans u
inférieure de
chaque fois c
péninsule Bru

En hi
l'océan et
cation ano
jamais, da
que ne peu

Traits distinctifs. Les mâles adultes et de l'automne sont absolument reconnaissables, sans erreur possible. Les femelles de l'automne peuvent être confondues avec les fauvettes rayées et les fauvettes à poitrine baie de l'automne, mais le jaune plus clair de la gorge, l'absence de tinte grisâtre en dessous, et les couvertures sombres de l'oreille avec la ligne chamois des sourcils sont des traits distinctifs caractéristiques.

Indications sur le terrain. Le brillant orangé, ou le jaune à tons chauds bornés à la gorge et à la poitrine, et la raie jaune-orangé ou chamois des sourcils, en contraste avec les joues foncées constituent les meilleures indications sur le terrain.

Nid. Dans les sapins, de 10 à 14 pieds au-dessus du sol. Nid fait de fines branchettes et d'herbes, garni d'herbes et de vrilles.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord, à l'Ouest des provinces de la Prairie; elle couve surtout au nord des établissements à population serrée.

Le mâle de la fauvette de Blackburn possède ce plumage brillant qu'on attribue communément au climat des tropiques plutôt qu'à celui de nos contrées plus froides. L'espèce s'associe avec beaucoup d'autres fauvettes au sommet des arbres de forêts ou de vergers.

667. **La Fauvette à poitrine noire.** (BLACK-THROATED GREEN WARBLER). *Dendroica virens*. L, 5-10. Planche XLII B.

Traits distinctifs. C'est une fauvette verdâtre avec des joues d'un jaune brillant et en contraste marqué avec le noir de la gorge et de la poitrine. Chez les femelles et les jeunes le noir est presque absent ou seulement indiqué par de vagues diffusions de noir, parfois interrompues, mais surtout plus fortes sur la poitrine. Chez les jeunes femelles le noir se réduit à de petits nuages ternes sur les côtés de la poitrine et des flancs. Dans tous les plumages les dessous sont blancs, le dos et la couronne sont clairs, même verts. Le jaune brillant prédomine sur les joues.

Indications sur le terrain. Pour les tout jeunes, le dos vert, les joues jaunes, et les dessous blancs. Pour les adultes, la gorge et la poitrine noires contrastant avec la face jaune et les dessous blancs.

Nid. Sur les sapins entre 5 et 30 pieds au-dessus du sol, un nid fait de petites branchettes et de mousse, garni de radicelles, d'herbes ténues et de vrilles.

Habitat. L'Amérique du Nord, à l'ouest jusqu'aux montagnes. La couvaison a lieu dans l'est du Canada, partout où le cèdre ou les haliiers toujours verts se rencontrent sauf dans les régions très méridionales.

C'est un oiseau très frappant, ami des arbustes toujours verts et chétifs, mais aussi des vergers et de la sommité des arbres à feuilles décidues.

670. **Fauvette de Kirtland.** (KIRTLAND'S WARBLER). *Dendroica kirtlandi*. L, 5-75. Gris bleu en dessus fortement rayé de noir sur le dos, et finement rayé sur la couronne. Tous les dessous, sauf sous la queue, sont jaune pâle avec des raies noires sur les côtés de la poitrine et sur les flancs. Les femelles et les tout jeunes sont semblables mais plus ternes, les raies de la poitrine sont brisées et forment des taches.

Traits distinctifs. La fauvette de Kirtland ressemble à la fauvette du Canada, mais elle est plus grande; le jaune est plus pâle et les raies noires sont sur les flancs et ne servent pas à simuler un collier suspendu aux oreilles, comme dans cette espèce en outre, le dos est marqué de noir au lieu d'être gris clair. La seule autre fauvette qui pourrait être confondue avec celle-là, c'est la fauvette à tête cendrée, mais le noir ne traverse pas la poitrine comme c'est le cas pour les fauvettes à tête cendrée adultes, et il n'y a ni jaune ni vert sur le dos ou sur le erouppion.

Indications sur le terrain. Cette espèce est trop rare pour qu'on accepte l'identification sur une simple vue.

Nid. Sur le sol au pied d'un chêne; nid fait d'écorce tendre, de bandes fibreuses végétales, d'herbe; et garni d'herbes ténues, d'aiguilles de pins et de poils.

Habitat. Pendant l'hiver, aux îles Bahama. La seule station connue pour la couvaison se trouve dans une région limitée des plaines de pin gris (jack-pine) dans la partie nord de la péninsule inférieure de l'Etat de Michigan. Cette espèce n'a encore été prise que deux fois au Canada, et chaque fois ce fut dans la région des grands lacs inférieurs. Son nid doit être cherché dans la péninsule Bruce de l'Ontario et autour des grands lacs à l'ouest de la région du lac Supérieur.

En hiver cette espèce est confinée en dedans d'un habitat insulaire de l'océan et constitue un exemple des difficultés que rencontre une multiplication anormale d'une espèce indigène. Il est évident que nous n'aurons jamais, dans le nord, une plus grande quantité de fauvettes de Kirtland que ne peuvent en nourrir en hiver les îles Bahama.

671. **La Fauvette des pins.** (PINE WARBLER). *Dendroica vigorsii*. L. 5-52. C'est une fauvette d'un vert mat, le vert se changeant en jaune sur la gorge et la poitrine avec des ailes et la queue grises ou brunes, et d'indistinctes barres aux ailes. Quand le plumage est le plus beau, le jaune de la gorge et de la poitrine devient rarement assez brillant. Peu de changement soit en raison du sexe ou de la saison.

Traits distinctifs. Très semblable au vireo à front jaune, mais de couleur plus verte et avec le jaune des dessous plus foncé et plus étendu. L'abdomen blanc n'attire pas les regards. Le bec est léger, pareil à celui de la fauvette au lieu d'être fort, crochu et du type vireo. Cette fauvette peut se distinguer de la fauvette jaune par sa couleur plus terne et par le contraste entre ses ailes, la queue et le corps. Son goût pour les pins fait à tout le moins deviner son identité.

Indications sur le terrain. C'est une fauvette d'un vert mat, jaune sur la poitrine avec des ailes d'un brun grisâtre, des barres blanches aux ailes. Les spécimens canadiens ont d'habitude une apparence sale et crottée. On la trouve presque toujours dans les pins.

Nid. Dans les pins, de 10 à 80 pieds au-dessus du sol; nid fait de bandes d'écorce, de feuilles, de fibres végétales.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord, à l'ouest jusqu'aux prairies et au nord jusqu'aux limites des bois de pins; la couvaison, au Canada, se fait surtout au delà de la colonisation.

La préférence marquée pour les pins que manifeste cette fauvette est frappante. On la trouve rarement, peut-être même jamais, loin de ces arbres, elle est par conséquent exposée à avoir son plumage plus ou moins sali par la poix, ce qui lui donne un air terne et usé. Il est rare de trouver chez nous des oiseaux de cette espèce qui soient propres et brillants.

672. **La Fauvette à couronne rousse.** (PALM WARBLER). *Dendroica palmarum*. L. 5-25. C'est une fauvette de couleur mate ou verdâtre. Le mâle: tous les dessous sont brillants ou étendus de jaune; la calotte est marron rougeâtre. La poitrine et les flancs sont rayés plus ou moins de brun rougeâtre, et une ligne jaune aux sourcils contraste avec les joues foncées et la calotte rouge. Les femelles sont pareilles mais leur couleur est plus pâle. Les tout jeunes et les oiseaux d'automne sont brun grisâtre en dessus, chamois en dessous avec des raies pâles, presque blanches sur la gorge et étendues d'un jaune assez distinct qui devient très pur sur les couvertures caudales. Dans tous les plumages il y a une tache au croupion d'un jaune fondu dans la couleur générale.

Traits distinctifs. Les dessous jaunes et la calotte rouge ne peuvent prêter à aucune erreur chez les oiseaux du printemps. En automne les dessous vaguement rayés, le dos brun et les couvertures sous-caudales sont bien distinctives.

Indications sur le terrain. Les mouvements habituels et saccadés de la queue, pareils à ceux de la maubèche feront distinguer cette fauvette de toutes les autres avec des dessous jaunes, sauf de celle dite «de prairie». Le jaune brillant restreint aux couvertures sous-caudales, la gorge claire et la poitrine vaguement rayée de chamois des jeunes oiseaux permettront de distinguer cette espèce d'autres formes qui peuvent lui être comparées.

Nid. Sur le sol, ou tout près, dans un terrain marécageux, ou dans des mousses stériles; un nid fait d'herbes grossières, garni de plumes appropriées.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord, vers l'ouest, jusqu'aux prairies et au nord jusqu'à la limite des forêts; couvant la plupart du temps au delà des limites de la civilisation. La fauvette jaune à couronne rousse a un habitat de l'est, et va vers l'ouest jusqu'à la frontière est de l'Ontario. La fauvette à couronne rousse de l'intérieur occupe le reste du Canada oriental.

SOUS-ESPÈCES. La fauvette à couronne rousse comprend deux sous-espèces, la forme typique: la fauvette à couronne rousse de l'intérieur, *Dendroica palmarum, palmarum* qui se distingue de la suivante par le plumage printanier de l'oiseau adulte; et la fauvette jaune à couronne rousse, *Dendroica palmarum hypochrysea* qui se distingue par la moindre quantité de jaune et le moindre éclat brillant des dessous, qui sont légèrement teintés de grisâtre. Toutefois les deux formes sont trop semblables pour qu'on puisse les distinguer sans un spécimen de chaque sous-espèce pour faire la comparaison.

C'est un oiseau qui vit habituellement à terre. Au temps de la migration il faut le chercher dans des terrains bas, à végétation chétive, sablonneux et d'aucun usage; au temps de la couvaison, dans les marécages mous-

673. **La Fauvette des prés.** (PRAIRIE WARBLER). *Dendroica discolor*. L. 4-75. C'est une fauvette verte et jaune. La gorge, les joues et tous les dessous du mâle sont d'un jaune brillant; une ligne noire en travers de l'œil, un coin noir au-dessous des couvertures des oreilles, et une succession de lignes noires le long des côtés de la poitrine et des flancs.

Le milieu
quelques
jeunes soi
brillantes,
ne sont qu

Traits
longement
tinguent le
trine plutô
l'être au m

Indicat
à moins qu

Nid.
de radicell

Habitat
certaines pl

La f
neux, où
présence
nage de l

G

Les
fauvettes
dorée" et
en réalité
marchent
de couleu
poitrine f
les voie
tères spéc

674. L
XLIII A.

Traits di
brun, servi

Indicatio
cette fauvett
dessous où n
taches d'un

Nid. Su
de radicelles
nom anglais.

Habitat.
nord par deli
oiseau.

C'est
où des arl
Son chant
très fort e

675. La
sis. L. 6-0
raies foncée
ligne fondue
e. travers d

Traits dis
uniformes, ph

Le milieu du dos a une selle de taches rougeâtres. La femelle est semblable, mais quelquefois elle n'a pas du tout ou presque pas cette couleur rougeâtre sur le dos. Les tout jeunes sont pareils, mais les couleurs sont atténuées et voilées, les dessous sont jaunes, brillantes, sur la poitrine et les lignes noires de la face, des côtés de la poitrine et des flancs ne sont qu'indiquées.

Traits distinctifs. Les marques faciales fines et noires tout à côté d'un jaune brillant, leur prolongement très accentué le long des flancs, et les taches rougeâtres du dos sont les traits qui distinguent le mieux les adultes. Chez les jeunes oiseaux, les dessous sont surtout brillants sur la poitrine plutôt que sur la gorge ou ailleurs et les barres simplement indiquées sur les côtés au lieu de l'être au milieu de la poitrine constituent les meilleurs moyens de reconnaître cette fauvette.

Indications sur le terrain. Elle est trop rare au Canada pour être distinguée à la simple vue, à moins que l'observateur n'ait acquis une grande expérience du sujet.

Nid. Dans les buissons de ronces, le nid est fait de fibres végétales et de duvet végétal garni de radicelles et de longs poils.

Habitat. L'est des Etats-Unis, rarement au nord. L'oiseau est peut-être régulièrement en certaines places au delà de la frontière canadienne dans la région intérieure des grands lacs.

La fauvette de prairie préfère les terrains abandonnés, secs, et sablonneux, où de seconde végétation. D'après les données qu'on a touchant sa présence au Canada, il faudrait la chercher quand elle niche dans le voisinage de l'extrémité inférieure du lac Huron.

GENRE SEIURUS—FAUVETTES HOCHÉQUEUES. L, 6.04-6.17.

Les oiseaux du genre *Seiurus* ressemblent plus à des grives qu'à des fauvettes, comme on l'indique par les noms populaires de "à couronne dorée" et de "grives d'eau" qu'on leur donne quelquefois. Mais ce sont, en réalité, de véritables grives de mœurs forestières; oiseaux du sol qui marchent au lieu de sautiller; de taille plutôt grande pour des fauvettes; de couleur brune où d'un olive foncé en-dessus, les dessous blancs avec la poitrine fortement rayée. On peut les prendre pour des grives, soit qu'on les voie en liberté ou dans la main; mais en faisant attention aux caractères spécifiques, on pourra les distinguer facilement.

674. **La Grive couronnée.** (OVENBIRD). *Seiurus aurocapillus*. L, 6-17. Planche XLIII A.

Traits distinctifs. La tache qui simule une couronne d'un or mat en partie cachée, bordée de brun, servira toujours à déterminer l'espèce.

Indications sur le terrain. Bien que très semblable à la grive, il n'est pas du tout probable que cette fauvette puisse être prise pour une grive. La gorge d'un blanc pur, comme son avant cou, les dessous où ne se voit que peu ou point du tout d'autre couleur, enfin des raies plutôt que des taches d'un si frappant, contraste sur la poitrine rendent la distinction très facile.

Nid. Sur le sol dans une construction massive d'herbes grossières, de pétioles, de feuilles et de radicelles; recouvert de feuilles avec une entrée sur un côté, comme un four, d'où lui vient son nom anglais.

Habitat. Les parties boisées de l'Amérique du Nord, à l'est des Montagnes Rocheuses, au nord par delà les localités colonisées. La couvaison se fait au Canada partout où se rencontre cet oiseau.

C'est un oiseau des régions boisées, ordinairement commun partout où des arbres d'accès facile se trouvent mêlés à ceux plus serrés d'une forêt. Son chant habituel *Titche-titche-titche*, d'abord un peu sourd et finissant très fort est un son bien connu dans les forêts et qu'on n'oublie pas.

675. **La Grive des ruisseaux.** (NORTHERN WATER-THRUSH). *Seiurus noveboracensis*. L, 6-04. D'un brun olive foncé en dessus, d'un blanc jaunâtre finement strié de raies foncées en dessous; des lignes séparées sur la gorge, la poitrine et les flancs. Une ligne foncée, couleur chamois, au-dessus de l'œil, et une autre fine, accentuée et foncée e. travers de l'œil.

Traits distinctifs. Facile à distinguer de la grive couronnée grâce aux rayures plus fines, plus uniformes, plus foncées, et aux dessous jaunâtres, grâce aussi à l'absence de la tache qui forme la

couronne. Cette grive peut se distinguer de la grive des ruisseaux de la Louisiane par la ligne chamois au lieu de blanche au-dessus de l'œil, par les dessous jaunâtres au lieu de chamois ou crème et par la présence de taches sur la gorge.

Indications sur le terrain. Les grives des ruisseaux peuvent être reconnues dans la vie ordinaire par les coups saccadés, habituels de la queue quand elles marchent ou se tiennent debout, mouvements très semblables à ceux de la maubèche tachetée commune. Ces deux grives des ruisseaux peuvent être distinguées par la différence des détails de coloration donnés plus haut.

Nid. Sur un banc de mousse ou dans les racines d'un arbre déterré, habituellement près ou au-dessus de quelque eau; dans un nid garni de mousse de vrilles et de fines radicelles.

Habitat. Dans le nord de l'Amérique du Nord jusqu'aux limites de la colonisation. Couvée au Canada partout où on la rencontre dans les régions les plus méridionales.

SOUS-ESPÈCES. La grive comprend deux sous-espèces: une de l'Est et l'autre de l'Ouest. La grive de l'Est, *C. n. noveboracensis*, forme typique, occupe un territoire vers l'ouest jusqu'à l'Ontario méridional, où elle se mêle avec la grive des ruisseaux de Grinnell. *S. n. notabilis* qui occupe la contrée vers l'ouest. Le domaine favori de la grive des ruisseaux est dans les marécages du cèdre.

676. Grive de la Louisiane. (LOUISIANA WATER-TRUSH). *Seiurus motacilla*. L. 6-28. D'un brun olive foncé en dessus, d'un blanc, en dessous, finement rayé de lignes brisées noires bien tranchées, allant du haut du cou à la poitrine et aux flancs. Une ligne blanche, très tranchée au-dessus de l'œil et une ligne assez fine d'un noir ondu en travers.

Traits distinctifs. Facile à distinguer de la grive couronnée par l'absence de la raie colorée formant couronne; très semblable à la grive des ruisseaux, mais s'en distinguant par sa taille un peu plus grande, par des dessous chamois plutôt que jaunâtres, et par la blancheur des marques de la face.

Indications sur le terrain. La grive des ruisseaux de la Louisiane a l'habitude des saccades de la queue dont la grive des ruisseaux est coutumière, et ne peut se distinguer de celle-ci, dans la vie ordinaire qu'en faisant attention aux différences notées ci-dessus.

Nid. Semblable à celui de la grive.

Habitat. L'est des Etats-Unis et ne se montrant au Canada que dans le sud-ouest de l'Ontario.

Cette grive est très semblable à la grive des ruisseaux par ses habitudes aussi bien que par la couleur et la forme. C'est cependant un oiseau d'un habitat plus méridional que l'autre et qui n'est que rarement aperçu au Canada.

GENRES—OPORORNIS ET GEOTHLYPIS. FAUVETTES TERRESTRES. L, 5.40—5.59.

Les fauvettes dites terrestres sont plutôt plus grandes que les fauvettes des bois mais beaucoup plus petites que les fauvettes hochequeues et avec de grosses pattes et de courtes ailes. Leur coloration est généralement verte et d'un jaune brillant. Elles habitent des buissons plutôt bas et sont rarement vues fort au-dessus du sol.

677. La Fauvette du Kentucky. (KENTUCKY WARBLER). *Oporornis formosus*. L. 5-40. Verdâtre en dessus; tous les dessous sont jaune clair; le front est noir et devient plus clair au milieu de la couronne; ligne sourcilière jaune brillant encerclant l'œil. Une tache noire bien tranchée s'étend de la base du bec entourant les lores et la plupart des couvertures auriculaires, jusqu'au côté du cou. La femelle et les oiseaux de l'automne sont semblables mais plus ternes, la marque noire de la face étant plus ou moins voilée quoique toujours visible.

Traits distinctifs. De coloration très semblable à celle de la fauvette de prairie, mais le noir ne laissant qu'une étroite ligne sourcilière en avant de l'œil au lieu d'une joue presque toute jaune et sans les raies latérales. Assez semblable à la fauvette canadienne mais avec le dos verdâtre au lieu de gris et sans marque quelconque sur la poitrine.

Indications sur le terrain. Trop rare au Canada pour qu'on puisse les reconnaître à première vue dans la vie ordinaire.

Nid. Sur le sol ou tout près, dans un nid massif fait de branchettes et de radicelles bien enveloppées de plusieurs épaisseurs de feuilles et garni de fines radicelles.

Habitat. L'est des Etats-Unis et n'atteignant pas la frontière canadienne à moins que l'oiseau ne soit un traînard par accident.

C
On ne
plus m

678.
L, 5-40.
la face e
cercle bl
les tout
du dos.

Trait
il est diff
autour de
Les femel
l'olive du
le cercle
delphie d
pas de pr
au lieu d'

Nid.
Habit
limite de
tions ne sc

La
d'habitu
qu'on le
à cet ég
on n'y
tout prè

679.
phia. L,
la tête, le
poitrine e
nom angl:
les marqu
tient. La
et le jaun
claires et

Traits
sur la poitr
cle autour
les espèces

Indicat
les adultes
les dessous

Nid.
garni de po

Habitat
des frontièr
rie.

Cett
des plus
vateurs
sans être
ces fauv
presque

681. I
5-33. Pla

Cette espèce n'a été prise au Canada que dans très peu d'occasions. On ne peut raisonnablement s'attendre à la trouver que dans les sections les plus méridionales de la région des grands lacs inférieurs.

678. La Fauvette du Connecticut. (CONNECTICUT WARBLER). *Oporornis agilis*. L, 5-40. C'est une fauvette verdâtre. Le mâle est, en dessous, d'un jaune clair de citron, la face et la gorge jusqu'au haut de la poitrine, d'un gris bleuâtre uniforme avec un joli cercle blanc autour des yeux. La femelle est semblable mais d'un gris plus pâle. Chez les tout jeunes le gris est remplacé par une teinte chamois plus claire de la coloration du dos.

Traits distinctifs. Cette espèce ressemble tellement à la fauvette de Philadelphie que parfois il est difficile de les distinguer l'une de l'autre. Les mâles adultes qui ont un cercle très visible autour des yeux, la gorge et la poitrine parfaitement uniformes, sont assez faciles à reconnaître. Les femelles se reconnaissent par le cercle autour des yeux et par le fait qu'au sommet de la tête l'olive du dos est fortement étendu, et qu'il n'y a pas de gris clair. Les tout jeunes, quand ils ont le cercle autour des yeux, sont d'habitude bien reconnaissables, bien que les fauvettes de Philadelphie du même âge en ont comme une apparence. Quand le cercle autour des yeux ne fournit pas de preuve concluante, la différence de couleur de la gorge et de la poitrine, un olive chamois au lieu d'un jaune pur uniformément clair et gris dans les dessous, est un bon guide.

Nid. Sur le sol et formé d'herbe sèche.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord à l'ouest des Alléghanies. Elle paraît couvrir sur la limite de la colonisation, au Canada, mais nous manquons de renseignements positifs. Ses migrations ne sont régulières que dans des localités le long des rives du lac Erié et du lac Ontario.

La fauvette du Connecticut est une des plus rares parmi les fauvettes d'habitudes régulières. Elle arrive tard au printemps et vit tellement isolée qu'on la voit rarement en automne. Nous n'avons pas assez de faits précis à cet égard pour dire si le champ de sa migration est purement local, ou si on n'y a pas assez fait attention. Il convient d'aller chercher cet oiseau tout près du sol dans des broussailles perdues.

679. La Fauvette de Philadelphie. (MOURNING WARBLER). *Oporornis philadelphia*. L, 5-63. C'est une fauvette verdâtre. Le mâle a les dessous jaune citron; toute la tête, le cou et la poitrine et la gorge gris bleuâtre avec taches à demi cachées sur la poitrine et la gorge, où l'imagination voit quelque ressemblance avec du crêpe, d'où son nom anglais de fauvette en deuil. La femelle est pareille, mais le gris est plus clair et sans les marques de crêpe sur la poitrine, ressemblent ainsi au mâle de la fauvette du Connecticut. Les tout jeunes ont le gris de la couronne remplacé par la couleur verte du corps et le jaune des dessous s'étend du cou à la poitrine légèrement modifié par des teintes plus claires et grisâtres.

Traits distinctifs. La fauvette de Philadelphie peut, d'ordinaire, se distinguer par le crêpe sur la poitrine ou par un soupçon de la chose, par la couleur grise de la couronne et l'absence du cercle autour des yeux, quoique les jeunes aient quelquefois et très vaguement les dits cercles. Voir les espèces précédentes.

Indications sur le terrain. Le crêpe noir de la poitrine, l'absence du cercle autour des yeux chez les adultes, et chez les tout jeunes, l'absence de distinction tranchée entre la poitrine, la gorge et les dessous jaunes.

Nid. Sur le sol ou tout près, nid fait de bandes d'écorce et d'autres matières fibreuses et garni de poils.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord surtout à l'ouest des Alléghanies. Elle couvre le long des frontières nord de la colonisation à l'ouest à travers les parties boisées des provinces de la Prairie.

Cette fauvette est une des plus tardives à arriver au printemps et une des plus tôt reparties, en automne, traversant le pays avant que des observateurs aient guetté les fauvettes migratrices, et par conséquent qui filent sans être observées. C'est dans la seconde moitié d'août qu'il faut guetter ces fauvettes de Philadelphie. Dès le premier jour septembre elles sont presque toutes parties.

681. La Fauvette trichas. (MARYLAND YELLOW-THROAT). *Geothlypis trichas*. L, 5-33. Planche XLIII B.

Traits distinctifs. Le mâle adulte avec son masque noir est facilement reconnaissable et n'exige pas d'être autrement caractérisé. Les jeunes mâles montrent suffisamment d'indices du masque en question pour être vite reconnus. Les femelles adultes et les toutes jeunes sont très semblables. On peut les reconnaître à leur coloration uniforme en dessus, leur gorge d'un jaune ardent, leurs dessous blanc chamois lavés d'un jaune plus foncé sur les flancs, et les couvertures sous-caudales jaunâtres. On les confondra très probablement avec les fauvettes de Philadelphie ou du Connecticut, mais la séparation tranchée entre les couleurs de la gorge et celles des joues, le brillant de la gorge et la teinte jaune généralement plus chaude servira à les distinguer. On les a confondues avec la fauvette de Nashville et la fauvette du Tennessee, mais on pourrait facilement arriver à les distinguer grâce à la tête et à la couronne gris clair plutôt que chamois ou d'un olive vermeil chez l'oiseau de Nashville et à la poitrine presque blanche au lieu de jaune très distinct chez la fauvette du Tennessee.

Indications sur le terrain. En sus de la coloration, l'habitat marécageux, les habitudes clandestines et les mouvements caractéristiques de la fauvette trichas deviennent vite familiers à l'observateur. Sa note grondeuse, qui rappelle celle du roitelet, est aisément reconnaissable.

Nid. Sur le sol ou tout près, il est massif, fait de bandes d'écorce d'herbage grossier, de feuilles mortes, garni d'herbes fines, de vrilles et de racelles.

Habitat. Dans l'Amérique du Nord, au nord, jusqu'aux limites de la colonisation. La fauvette trichas du Nord, notre sous-espèce canadienne de l'Est, qui est la forme type, couve dans l'ouest jusqu'à la Prairie, et au sud jusqu'en Virginie, étant remplacée dans les deux directions par d'autres sous-espèces.

SOUS-ESPÈCES. La fauvette trichas comprend plusieurs sous-espèces dont une seule, la fauvette trichas du Nord, *G. t. trichas*, la forme type, se rencontre dans l'est du Canada.

Les lieux spécialement fréquentés par la fauvette trichas sont les marécages humides où le pâturin est long et épais.

Elle considère le voisinage immédiat de son nid comme sa propriété particulière et s'indigne avec colère qu'on ose mettre le pied chez elle. Le chant ordinaire de cette fauvette trichas est caractéristique des prairies humides. On l'a traduit poétiquement dans les sons *Witcheri-witcheri-witcheri*, qui se rapproche tout à fait de la réalité phonétique.

683. La Fauvette à poitrine jaune. (YELLOW-BREADED CHAT). *Icteria virens*. C'est la plus grande de cette famille et la moins semblable aux fauvettes. Tous les dessus et les joues sont verts, les lores sont noirs, bordés en dessus et en dessous de blanc; de la gorge à la poitrine, jaune clair; les dessous sont blancs; le bec relativement plus court et plus gros que celui des autres fauvettes.

Traits distinctifs. Sa taille suffit à faire distinguer cette fauvette en tout temps, mais ses couleurs ne sont pas moins caractéristiques.

Indications sur le terrain. Sa grande taille, l'avant-corps jaune clair, lores noirs bordés en dessus et dessous de blanc, sont des indications frappantes.

Nid. Dans une fourche de branches près du sol, nid plutôt massif d'herbes grossières, de feuilles et de bandes d'écorce, garni d'herbes plus fines.

Habitat. L'est des États-Unis et de l'autre côté de la frontière canadienne dans l'Ontario méridional le long du lac Érié.

Cette fauvette fréquente les fourrés épais et les terrains perdus et embroussaillés; elle arrive et s'en va sans être vue mais on l'entend fort bien. C'est un oiseau rare au Canada et qu'on trouve ordinairement dans le comté d'Essex (Ontario) seulement le long des rives du lac Érié.

GENRE—WILSONIA. FAUVETTES MUSCUIORES. L, 5.0—5.67.

Ce sont de petites fauvettes, presque toujours de couleur jaune. Le bec est légèrement aplati ou élargi à la base, et fait penser à celui des attrape-mouches; il a des poils bien développés autour de la bouche. À cet égard ces fauvettes ressemblent à celle dite à queue rousse, mais pas de façon si excessive. La fauvette à queue rousse, cependant, n'a que peu ou point du tout de jaune clair et peut être facilement reconnue.

684. Fauvette mitrée. (HOODED WARBLER), *Wilsonia citrina*. L, 5-67. Le mâle: vert en dessus et jaune brillant en dessous; toute la tête et le cou sont noirs avec un masque

jaune bi
n'a pas
délicate

Trait
confusion
naissable

La
relatio

685.
C'est un
un capu
quelques
parfait q

Traits
des adult
jaune est

Indica
capuchon
manque.

Nid.
très conca

Habit
s'étend à l
jusqu'à la

SOUS
se rencont
type, se re

C'e
des saul

686.
Le mâle:
les dessou
la ligne pr
le long de
poitrine la
sont attén
naissable c
effacé et n

Traits
noir et ses

Indicati
Nid. 8
morceaux d

Habitat
jusqu'à la l
sud du Can
lisière des r

C'es
mouches,
mais on l

687. L
L, 5-41. I

Traits d
autre fauve
la première
sur la queue
tacheture de
ressemblent
sur la gorge.

jaune brillant de forme semblable à celui tout noir de la fauvette trichas. La femelle n'a pas de noir, sauf une tache un peu vague derrière la tête et le masque jaune passe délicatement à la teinte jaune de la gorge et des parties de dessous.

Traits distinctifs. Le mâle adulte de cette espèce est trop bien précisé pour prêter à aucune confusion. La face jaune de la femelle avec la couronne foncée de derrière est aussi facilement reconnaissable.

La fauvette mitrée est comprise dans cette liste sur la foi de quelques relations canadiennes dans la région du lac Erié du sud de l'Ontario.

685. La Fauvette de Wilson. (BLACK-CAPPED WARBLER). *Wilsonia pusilla*. L., 5. C'est une petite fauvette verte. Le mâle est d'un jaune brillant partout en dessous, avec un capuchon d'un noir bien tranché sur la couronne. Les sexes se ressemblent mais quelques femelles manquent tout à fait du capuchon; chez d'autres il existe mais moins parfait que chez les adultes.

Traits distinctifs. Le capuchon noir et la coloration entièrement verte et jaune sont distinctifs des adultes et des jeunes mâles. Quand le capuchon est absent la ligne sourcilière vaguement jaune est caractéristique.

Indications sur le terrain. La petite taille, le corps entier d'un jaune et vert brillants, avec le capuchon noir, ou seulement des traces de ce capuchon, ou la ligne sourcilière jaune si le capuchon manque.

Nid. Sur le sol, au nid fait presque en entier d'herbages fins et garni de quelques poils; nid très concave et solide pour une fauvette.

Habitat. L'Amérique du Nord. La sous-espèce dite fauvette de Wilson se rencontre au Canada, s'étend à l'ouest vers la région centrale de la prairie, et couve à partir de la colonisation dans le nord jusqu'à la limite des forêts.

SOUS-ESPÈCES. Les fauvettes de Wilson se répartissent en trois sous-espèces qui toutes se rencontrent au Canada, bien qu'une seule, la fauvette de Wilson, *Wilsonia pusilla pusilla*, la forme type, se rencontre dans l'Est.

C'est une très jolie petite fauvette qui ordinairement se rencontre près des saules ou d'autres arbres semblables et dans les buissons près de l'eau.

686. La Fauvette du Canada. (CANADA WARBLER). *Wilsonia canadensis*. L., 5-61. Le mâle: en dessus d'un gris uniforme légèrement marqué de noir sur la couronne; tous les dessous sont d'un jaune brillant, sauf les couvertures sous-caudales qui sont blanches, la ligne prélorale et le cercle autour des yeux qui sont jaunes; les lores noirs se prolongent le long des côtés du cou et forment un collier d'étroites raies en travers du haut de la poitrine laissant la gorge d'un jaune clair. La femelle est pareille, mais le collier et le cou sont atténués, quoique assez fortement marqués pour maintenir le caractère très reconnaissable de l'espèce. Les tout jeunes ressemblent à la femelle, mais le collier est presque effacé et ne se montre que sous forme de nuages vagues, disséminés et fragmentaires.

Traits distinctifs. Le gris uniforme en dessus sans marques, et le jaune dessous avec le collier noir et ses marques ou bien tranchées ou vagues ou seulement suggérées.

Indications sur le terrain. Voir les traits distinctifs.

Nid. Sur les bancs de mousse, ou sous des racines; nid fait de bandes d'écorce et de menus morceaux de bois mort enveloppés dans des feuilles, et garni de fines radicelles.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord, vers l'ouest près du pied des collines et vers le nord, jusqu'à la limite des gros arbres; couvant à l'occasion et seulement dans certaines localités du sud du Canada, sauf dans les parties les plus méridionales, et toujours vers le nord à partir de la lisière des régions colonisées.

C'est une fauvette gaie et vive avec quelque penchant à attraper les mouches. Son habitat typique est semblable à celui de la fauvette Wilson, mais on la trouve plus souvent en haut des arbres.

687. La Fauvette à queue rousse. (AMERICAN REDSTART). *Setophaga ruticilla*. L., 5-41. Planche XLIV A.

Traits distinctifs. C'est un oiseau tout à fait caractéristique sous tous ses plumages. Aucune autre fauvette n'a quoi que ce soit qui ressemble à cette combinaison de rouge-orange et de noir, la première de ces couleurs faisant place chez la femelle à des plaques analogues jaunes ou blanches sur la queue et les ailes. Les tout jeunes ont un peu de jaune répandu sur la poitrine et n'ont pas la tacheture de l'aile, mais celle de la queue y est toujours. Quelques jeunes mâles, au printemps, ressemblent à des femelles, mais avec les taches irrégulières du parfait plumage mâle paraissent sur la gorge.

Indications sur le terrain. La couleur est la marque distinctive la plus facile à remarquer, mais même une silhouette noire permet de voir distinctement et de rendre familière à l'observateur la façon dont la longue queue est jetée de droite et de gauche.

Nid. Dans la fourche de deux branches d'un jeune arbre; nid fait de fines bandes d'écorce, de fibres, de duvet végétal avec vrilles et radicelles, et presque toujours recouvert extérieurement de bandes d'écorce argentée.

Habitat. Le nord de l'Amérique du Nord jusqu'à la limite des grands arbres. Sa couvaison a lieu au Canada où l'on trouve la fauvette en question.

L'éclat brillant d'une fauvette à queue rousse dont le riche plumage se détache sur le vert sombre des arbres est une perpétuelle source de plaisir pour les yeux de l'observateur même le plus blasé, un spectacle qui ne perd jamais de son charme. Les mouvements si vifs de cet oiseau, son voltige incessant, le déploiement de ses ailes et de sa queue témoignent d'une vivacité qui n'appartient qu'à peu d'autres espèces. Ainsi que cela est arrivé à d'autres oiseaux d'Amérique, le terme de Redstart fut donné à cette fauvette par les premiers colons en souvenir d'un oiseau de l'ancien monde qui ne lui ressemblait cependant que de loin.

FAMILLE—MOTACILLIDÆ. HOCHÉQUEUES OU PIPITS.

Il n'y a qu'une seule espèce de cette famille dans l'est du Canada, et pour les caractères de cette famille, le lecteur doit s'en rapporter à la description suivante de la dite espèce.

697. **La Farlouse d'Amérique.** (AMERICAN PIPIT). *Anthus rubescens*. L., 6-38. C'est un oiseau couleur de terre et qui affectionne le sol; le bec est tout à fait celui des fauvettes; la griffe de derrière est allongée comme celle du plectrophane et de l'alouette ordinaire (figure 60, p. 29, comparez avec figure 44, p. 27). Le mâle adulte du printemps est grisâtre en dessus, d'un gris très pur sur la tête, qui devient légèrement olive au croupion; le dos est vaguement bigarré de plumes noirâtres au centre; rose chamois en dessous avec de fines raies d'un gris brunâtre éparées sur la poitrine et qui tendent à former un collier en travers de la poitrine et à se prolonger le long des côtés; les ailes sont brunes avec des plumes d'un brun fané sur les bords. Les oiseaux de l'automne et les femelles du printemps sont d'un olive mat légèrement pommelé en dessus, d'un blanc chamois en dessous avec des taches répandues plus ou moins rassemblées et qui descendant sur les côtés de la gorge se prolongent en travers de la poitrine et le long des flanes.

Traits distinctifs. Le joli bec de la fauvette ajouté à la longue griffe de derrière le pied sont des traits distinctifs. Les seuls autres oiseaux ayant pareille griffe sont l'alouette ordinaire et le plectrophane de Laponie, mais la griffe de l'un et le bec de moineau de l'autre (figure 51, p. 28) rendent la différenciation facile.

Indication sur le terrain. C'est un oiseau de couleur terreuse qu'on voit en plein air dans les parties colonisées du Canada au printemps et en automne, souvent par grandes bandes dispersées, comme le plectrophane des neiges et l'alouette ordinaire. La coloration uniforme, son habitude constante de baisser sa queue, et la blancheur frappante des plumes extérieures de la queue sont de bonnes indications.

Nid. Sur le sol, nid composé d'herbages.

Habitat. L'Amérique du Nord; elle couve dans les hautes latitudes au delà de la limite des forêts.

C'est un oiseau migrateur au printemps et vers la fin de l'automne, qui se rencontre quelquefois en grandes bandes, qui trouve sa nourriture dans les prés, dans les champs cultivés, ou sur des hauteurs sèches et sablonneuses, aussi sur les rivages. Dans les terres où il couve il a la coutume de l'alouette de monter et de chanter à des grandes hauteurs dans l'air, puis de redescendre par une chute perpendiculaire, comme celle d'une pierre.

Valeur économique. Arrivant, comme elle fait, alors que les champs sont dénudés et s'en retournant après les moissons, la farlouse doit se contenter des graines d'herbages et des insectes soit du printemps soit de l'automne. Son rôle est donc utile.

F
La
de la fa
d'oiseau
bien de
un lang
grands,
grive de
Pierre et
dessous
dinaires
moqueu
entende
ils sont
qu'ils n'
rien ou
tredire c
chanteur

703. I
ressemble
sont presq
Traits
chat ou gri
elle n'a pas
Indicati
queue avec
Nid. I
et de bouts
Habitat.
C'est la seu
quelques co
SOUS-
ouest; le pri
qu'on puisse

Cett
de la Car
encore pl
grive de l
chanteur

704. L
L., 8-94. F
Traits di
glotte; la ca
queue, ou en
Indicati
ment le «mi
Nid. Di
de feuilles et
Habitat.
plus peuplées

Quoic
meilleurs
même que

La faculté d'imitation de l'oiseau moqueur, d'où est venu le nom même de la famille, a beaucoup de représentants dans le Canada. Cette famille d'oiseaux est particulièrement propre à l'Amérique et, comme c'est le cas de bien des subdivisions de l'ordre des passereaux, très difficile à distinguer en un langage autre que purement technique. Ce sont des oiseaux plutôt grands, ainsi que le démontrent les mesurages susdits. Le merle-chat ou grive de la Caroline et la grive polyglotte ont des teintes uniformes gris de pierre et la grive rousse est d'un brun rougeâtre brillant en dessus avec des dessous fortement tachés de blanc ou de jaune crème et une queue extraordinairement longue et abondante. Ces oiseaux sont tous d'excellents moqueurs et savent varier leur chant par des imitations de tous les sons qu'ils entendent autour d'eux, y compris les chants ou les cris d'autres oiseaux; ils sont même capables de produire de tels effets en ce genre qu'on a pu dire qu'ils n'étaient égalés que rarement par les plus célèbres chanteurs de l'ancien ou du nouveau monde. L'une quelconque de ces espèces suffit à contredire de façon complète et écrasante l'assertion qu'il n'y a pas d'oiseau chanteur en Amérique.

703. La Grive polyglotte. (MOCKINGBIRD). *Mimus polyglottos*. L, 10-50. Elle ressemble à un merle-chat mais sans la calotte noire ni le rouge sous la queue; les dessous sont presque blancs et il y a considérablement de blanc dans l'aile et dans la queue.

Traits distinctifs. Les caractères susdits serviront à distinguer la grive polyglotte du merle chat ou grive de la Caroline. Elle ressemble de très près aux pies-grièches par la coloration, mais elle n'a pas la tache noire si visible en travers des yeux.

Indications sur le terrain. La couleur grise assez générale, et les taches blanches sur l'aile et la queue avec l'absence du masque noir de la face.

Nid. Dans les fourrés de branches grossières et de tiges herbacées, nid garni de radicelles et de bouts de coton.

Habitat. Les Etats-Unis du sud et au nord jusqu'au Canada, à l'extrémité ouest du lac Erié. C'est la seule localité où cette espèce ait pris pied de façon permanente au Canada. On a vu quelques couples y passer l'été en ces dix dernières années.

SOUS-ESPÈCES. La grive polyglotte forme deux groupes, celui du sud-est et celui du sud-ouest; le premier, c'est la grive polyglotte commune, la race type de l'espèce, la seule sous-espèce qu'on puisse s'attendre à trouver au Canada.

Cette espèce est rare au Canada. Elle ressemble beaucoup à la grive de la Caroline et presque tout ce qui est dit de cette dernière s'applique avec encore plus de force à la grive polyglotte, qui n'est, à bien des égards, qu'une grive de la Caroline plus célébrée et qui est probablement le plus fameux chanteur natif de l'Amérique.

704. La Grive de la Caroline. MERLE-CHAT. (CATBIRD). *Dumetella carolinensis*. L, 8-94. Planche XLIV B.

Traits distinctifs. Cet oiseau d'un gris uniforme ne peut être confondu qu'avec la grive polyglotte; la calotte noire, les couvertures rouges sous-caudales, l'absence de blanc sur l'aile, sur la queue, ou en dessous, sont autant de traits distinctifs.

Indications sur le terrain. Couleur grise uniforme; calotte noire et notes d'appel, tout spécialement le « miaou » du chat qui a fait donner à l'oiseau son nom anglais.

Nid. Dans les fourrés ou dans les buissons à feuillage épais; nid fait de branchettes d'herbes, de feuilles et garni de radicelles.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord; au Canada en y comprenant la plupart des régions plus peuplées.

Quoique inférieure à la grive polyglotte, la grive de la Caroline, par ses meilleurs représentants, occupe un rang élevé comme oiseau chanteur, lors même que l'excellence de ses talents varie beaucoup selon l'individu. Sa

note d'appel, qui ressemble au miaulement du chat, et que l'oiseau émet dans le buisson tandis qu'il examine avec curiosité l'intrus qui envahit son domaine, est bien connue de la plupart de ceux qui fréquentent la campagne et, fait bizarre, a provoqué la critique d'une psychologie dévoyée.

Cet oiseau hante les fourrés et, comme pour bien d'autres espèces qui fréquentent des habitats analogues, où l'observation très serrée peut se faire d'objets dangereux, sans trop de risque pour l'observateur caché, la curiosité de cette grive est bien aiguësée. Perchée sur quelque haute ramille qui émerge du fourré, on la voit en plein soleil, la queue basse et le corps penché sur la branche, qui lance tous les sons variés d'un véritable pot pourri. Les phrases mélodieuses se succèdent rapidement et des fragments de tous les chants d'oiseaux du voisinage sont entre-mêlés de sons plus durs et mécaniques que la dite grive exécute avec autant de brio que les sons les plus mélodieux. La grive de la Caroline est un voisin tout à fait désirable.

Valeur économique. La grive de la caroline se nourrit surtout des fruits de la saison dont un tiers peut-être peuvent passer pour fruits cultivés; mais elle prend aussi beaucoup d'insectes. Les fruits sont petits, des variétés molles, et il est très rare qu'un dommage sensible en résulte.

705. **La Grive rousse.** (BROWN THRASHER). *Toxostoma rufum*. L, 11-42. Plaque XLV A.

Traits distinctifs. La grive rousse, avec son dos brun rouge, sa poitrine à raies bien tranchées, a toute l'apparence extérieure d'une grive, mais sa forte taille, l'incarnat de sa couleur brune et sa longue queue sont fort distinctifs.

Indications sur le terrain. Son dos brun rouge brillant, sa poitrine à raies tranchées, sa longue queue, son maintien et ses mœurs en général.

Nid. Dans des fourrés ou sur le sol; nids faits de ramilles, de radicelles grossières et de feuilles, garnis de fines radicelles.

Habitat. L'est des États-Unis, le sud du Canada, sauf la côte de l'Atlantique, au nord les régions de la colonisation la plus dense.

La grive rousse est probablement le meilleur oiseau chanteur ordinaire du Canada. Son chant est très semblable à celui de la grive chanteuse d'Europe. C'est une succession de phrases comme celles de la grive de la Caroline, mais sans les fausses notes accidentelles, un timbre plus doux et plus moelleux. Les notes sont très rapprochées et se prolongent pendant plusieurs minutes, parfois avec une grande variété. Thoreau les a représentées comme disant: "drop-it-drop-it-couver-it-up-couver-it-up-pull-it-up-pull-it-up." La répétition de chaque variation est une des singularités du chant de la grive rousse, au moyen de laquelle on peut la distinguer de la grive de la Caroline.

C'est aussi un oiseau des fourrés, qui habite les bosquets, les buissons dans les prés, les lisières de forêts et des clôtures. La grive rousse aime moins l'isolement que celle de la Caroline, elle se laisse aussi moins facilement attirer près des habitations.

Valeur économique. C'est tout à fait un oiseau utile, car plus de la moitié de sa nourriture se compose d'insectes nuisibles, de scarabées, de chenilles, de sauterelles, etc. Le reste est composé surtout de fruits dont une petite partie est formée de fruits cultivés, surtout de framboises. En somme il fait peu de mal et beaucoup de bien.

Les
Quoique
ou ne d
naître à
souvent
épais bui
oiseaux.
dans le n
l'ancien.
très secs
fondes.
vient de l

718. R
5-50. Le p
la grive rou

Fruits d
claire, sont c

Indication
Le roitelet d
générale et l'

Nid. De
fait d'herbag

Habitat.
l'ouest du lac
dans l'île Pelé

SOUS-ES
du nord de la

Le roi
chant n'est
frappante l
de façon ré

Valeur
économique

719. Le
blable au troi
grande et évi

Traits disti
et pareil à celu

Nid. Tout

Habitat. I
bond dans le st

SOUS-ESI
la race type de

Ce roite
rarement si
mention que

Valeur
intérêt écon

Les roitelets sont de petits oiseaux bruns qui vivent tout près du sol. Quoique de taille minime ils sont très actifs et, à moins qu'ils ne couvent ou ne dorment, ils se tiennent rarement tranquilles. On peut les reconnaître à leur petite taille, à leur couleur brune, à leur petite queue ramassée, souvent rejetée sur le dos, leurs manières agitées, entrant dans les plus épais buissons ou en ressortant plutôt à la façon des souris qu'à celle des oiseaux. Les roitelets constituent une nombreuse famille bien distribuée dans le monde mais mieux représentée dans le nouveau monde que dans l'ancien. Leur habitat varie entre des marécages inondés et des plateaux très secs ou entre des fourrés en pays ouvert et des forêts épaisses et profondes. Ce nom de Troglodytes, qui veut dire habitants des cavernes, vient de leur habitude de loger leurs nids dans des trous.

718. Roitelet de la Caroline. (CAROLINA WREN). *Thryothorus ludovicianus*. L, 5-50. Le plus gros de nos roitelets et le plus rouge; le dos se rapprochant du rouge de la grive rousse, d'une teinte plus claire mais visiblement chaude dans les dessous.

Traits distinctifs. La taille, l'incarnat relatif du dos, et la ligne sourcilière parfaitement claire, sont distinctifs de cette espèce.

Indications sur le terrain. Les traits susdits constituent les plus sûres indications sur le terrain. Le roitelet des marais à long bec à une ligne sourcilière toute semblable, mais la taille, la couleur générale et l'habitat empêcheront qu'on ne les confonde l'un avec l'autre.

Nid. Dans des trous d'arbre, de tronc d'arbre, dans des creux et des lézardes de mur; nid fait d'herbages, de plumes, de feuilles, etc., garni d'herbes délicates, de longs poils, etc.

Habitat. L'est des Etats-Unis, au nord de façon intermittente au Canada dans la section de l'ouest du lac Érié. Pendant nombre d'années l'espèce était fort commune à la Pointe Pelée et dans l'île Pelée, mais depuis 1913 elle semble être devenue plus rare.

SOUS-ESPÈCES. Des trois sous-espèces du roitelet de la Caroline, une seule, le roitelet du nord de la Caroline, la race type, peut se rencontrer au Canada.

Le roitelet de la Caroline est le plus beau chanteur de son espèce, son chant n'est ni prolongé ni long, mais il a une qualité flûtée de douceur et de frappante beauté. L'espèce est rare au Canada, et son chant n'est entendu de façon régulière ou par occasion que dans peu de localités.

Valeur économique. Trop rare au Canada pour y avoir aucune influence économique.

719. Le Roitelet de Bewick. (BEWICK'S WREN). *Thryomanes bewicki*. L, 5. Semblable au troglodyte aëdon, mais plus blanc en dessous, avec une queue plus longue, plus grande et évidemment grisâtre. Il a une légère ligne sourcilière.

Traits distinctifs. Les signes caractéristiques donnés plus haut serviront à identifier l'espèce.

Indications sur le terrain. C'est un troglodyte aëdon avec une longue queue et un chant fort et pareil à celui du moineau.

Nid. Tout semblable à celui du troglodyte aëdon.

Habitat. L'est des Etats-Unis et sans aller jusqu'à la frontière du Canada, sauf comme vagabond dans le sud de l'Ontario.

SOUS-ESPÈCE. L'individu de l'est du Canada n'est que le roitelet de Bewick de l'Est, la race type de l'espèce.

Ce roitelet n'est qu'un rare visiteur venant du sud, et n'a été que bien rarement signalé dans l'est du Canada. Il conviendrait de n'en faire mention que sur des témoignages absolument dignes de confiance.

Valeur économique. Espèce trop rare au Canada pour y être d'aucun intérêt économique.

721. **Le Troglodyte aëdon.** (HOUSE WREN). *Troglodyte aëdon*. L, 5. Planche XLV B.

Traits distinctifs. C'est le roitelet le plus commun dans l'est du Canada. Le dos d'un brun ligneux uniforme, la gorge et la poitrine teintées d'un brun clair; les dessous presque blanches, et les raies restreintes aux flancs, le distingueront des autres roitelets indigènes.

Indications sur le terrain. Les dessous clairs et la queue plus longue distingueront le troglodyte d'hiver, et la couleur brune uniforme du dos, tout autant que l'habitat, les distinguera tous deux du troglodyte des marais.

Nid. Dans un trou d'arbre, ou une boîte à oiseau, ou dans des places analogues; nid fait de branchettes, garni d'herbes et de plumes, etc. Le troglodyte aëdon se mettra volontiers dans toute espèce de boîte à moineau avantageusement placée. Le moineau anglais peut être tenu à distance en faisant très petit le trou de l'entrée de la boîte; un trou fait avec une tarière d'un pouce suffit à laisser passer le troglodyte et à évincer tout à fait les moineaux.

Habitat. Comme espèce, le troglodyte est partout aux Etats-Unis et au Canada, au nord jusqu'aux limites des parties colonisées. L'individu de l'Est, qui est l'individu type, le troglodyte aëdon de l'Est, habite les contrées à l'est des grands lacs.

SOUS-ESPÈCES. Le troglodyte aëdon comprend deux sous-espèces: celle de l'Est et celle de l'Ouest; celle de l'Est constitue la forme type.

Le troglodyte aëdon est un oiseau tout à fait attrayant dans un jardin; il se faufile partout, sur ou sous tout ce qui se rencontre; pas de fissure, pas de lézarde dans une palissade qui n'attire son petit bec investigateur; c'est à peine si une tige de feuille n'a pas été soigneusement inspectée une fois pour les insectes qui s'y trouvent. On l'a accusé de percer et de détruire les œufs d'autres espèces qui nichent dans son voisinage immédiat; il n'est pas douteux que cela n'arrive parfois, mais le dommage ainsi causé vient probablement d'une habitude particulière à tel troglodyte et n'est peut-être pas suffisant pour justifier des mesures préventives contre l'espèce entière.

Valeur économique. Comme la nourriture du troglodyte aëdon se compose presque entièrement d'insectes, il n'y a rien à lui reprocher à cet égard. Sa taille minime l'oblige à ne s'occuper que d'insectes minuscules qui échappent à l'attention de plus gros oiseaux, et c'est ainsi que le troglodyte se rend maître d'animalcules nuisibles avant qu'ils soient de taille à causer du dommage ou à attirer d'autres oiseaux.

722. **Le Troglodyte d'hiver.** (WINTER WREN). *Tannus hiemalis*. L, 4-06. De structure et de coloration absolument typique du troglodyte. Il ressemble beaucoup au troglodyte aëdon, mais est plus petit et plus foncé en dessous, aussi plus ou moins finement rayé en travers de l'abdomen.

Traits distinctifs. Les raies qui couvrent les dessous sont distinctives de cette espèce.

Indications sur le terrain. C'est un petit troglodyte très foncé, avec une queue courte; on le trouve dans les forêts épaisses.

Nid. Dans les racines d'un arbre, ou dans un tas de broussailles, ou encore dans le flanc d'une bûche moussue; nid fait de petites branchettes et de mousse, garni de plumes.

Habitat. En qualité d'espèce il est partout dans l'Amérique du Nord jusqu'à la limite des arbres; il couve partout au Canada dans les bois de conifères, sauf dans les parties plus méridionales.

SOUS-ESPÈCES. Le troglodyte d'hiver, distribué à travers presque tout le continent, comprend un bon nombre de races que distingue la géographie, ou de sous-espèces dont l'individu type, le troglodyte d'hiver de l'Est est le seul qui rentre dans nos limites géographiques.

Cet oiseau, qui n'est que migrateur dans le plupart des régions plus méridionales du Canada, couve ordinairement dans les forêts profondes et froides. Son chant, qui ressemble assez par sa verve et son caractère à celui du troglodyte aëdon pour qu'on reconnaisse leur affinité, est cependant d'une qualité plus sonore et plus riche, d'un ton plus pur. Entendu dans le silence de la paisible forêt, ce chant a la beauté sauvage des bois qu'aucune espèce indigène ne possède.

boisés
qu'on c

724.
tohorus
petit et p

Trait
nada qui
couronne

Indic
peut-être
lance son
le foncon

Nid.
bouquets

Habit
la contrée

Le
peu rég
d'après
humide
tude à c

725.
dyles palu
noir qui
brun roug
couleur q

Traits
de tous les
au lieu de

Indicat
et de mass
légère lign

Nid.

sous l'eau;
rente de bi
dimension.
être un ou
téressant d
qu'il occup
qu'on pouv

Habitat
des marais

SOUS-
roitelet de
du Canada

Les
par le ve

Le n
décrit pa
grimpe à
arbres de
relativem

Valeur économique. Cet oiseau étant un hôte habituel des contrées boisées ne s'approche de l'homme que de loin en loin, mais son action, autant qu'on en peut parler, est tout à fait utile.

724. Le Roitelet de marais au bec court. (SHORT BILLED MARSH WREN). *Cisothorus stellaris*. L, 4. Très semblable au roitelet des marais à long bec, mais plus petit et plus finement rayé.

Traits distinctifs. Les deux roitelets de marais sont les seuls roitelets indigènes dans le Canada qui aient des raies très tranchées en dessus. Le roitelet à bec court est le seul qui ait une couronne rayée.

Indications sur le terrain. C'est un petit roitelet de marais avec une faible teinte incarnate, peut-être même point du tout, dans sa coloration brune et avec une tête rayée. Les sons qu'il lance sont très différents de ceux du roitelet à long bec, avec lequel on risquera probablement de le confondre.

Nid. Sur le sol humide, un nid qui est une boule d'herbe verte tressée près du sommet de bouquets d'herbes, avec un trou circulaire sur le côté comme entrée du nid.

Habitat. L'est des Etats-Unis jusque dans le Canada, à l'est tout le long du lac Erié, et dans la contrée environnante, mais l'oiseau est plus commun dans les provinces de la Prairie.

Le roitelet des marais à bec court occupe un territoire plutôt local et peu régulier; une année il se trouvera dans telle localité et n'y sera plus l'an d'après; on sait peu de chose de son habitat. Il fréquente les marécages humides, herbeux plutôt que des marécages submergés, et se réunit d'habitude à d'autres pour former de petites colonies.

725. Le Roitelet de marais à long bec. (LONG BILLED MARSH WREN). *Telmato-dyles palustris*. L, 5-2. C'est un roitelet d'une riche coloration avec un manteau presque noir qui tombe de l'arrière-cou sur les épaules où il est rayé de blanc; tout le reste est brun rougeâtre en dessus, d'un blanc crème en dessous avec les flancs lavés de la même couleur que le dos.

Traits distinctifs. La variété et les couleurs du dos distingueront les deux roitelets de marais de tous les autres; le brun uniforme ou n'ayant seulement qu'une raie médiane d'un brun étendu, au lieu de plusieurs courtes et fines raies le distingueront du roitelet à bec court.

Indications sur le terrain. La localité qu'il fréquente—marécages couverts d'eau, de roseaux et de massettes—suffit d'habitude à l'identifier, mais la couronne foncée en contraste avec la légère ligne sourcilière est toujours une preuve spécifique.

Nid. Est placé près du sommet des roseaux ou des joncs dans de vastes terrains marécageux sous l'eau; c'est une boule de feuilles mortes de massettes, d'herbages ou de roseaux. Très différente de bien d'autres hôtes des marécages cette espèce n'est pas attirée par des marais de petite dimension. Un étang marécageux de quelques yards de large attire l'étourneau rouge et peut-être un ou deux râles, mais le roitelet de marais à long bec exige une vaste étendue. Un trait intéressant du roitelet de marais c'est son habitude de construire plusieurs faux nids à côté de celui qu'il occupe. L'usage auquel servent ces nids n'est pas connu, mais on en a vu parfois huit ou neuf qu'on pouvait avec raison attribuer au travail d'un seul couple.

Habitat. En tant qu'espèce c'est les Etats-Unis et le Canada méridional. Notre roitelet des marais de l'Est, le type de la sous-espèce se rencontre à l'ouest de la région des grands lacs.

SOUS-ESPÈCES. Le roitelet de marais à long bec comprend plusieurs sous-espèces; le roitelet de marais de l'Est, le seul individu auquel nous nous intéressions directement dans l'est du Canada, constitue la forme typique de l'espèce.

Les vastes étangs marécageux et les marais pleins de massettes agitées par le vent ou de roseaux sont les lieux fréquentés par ce roitelet.

FAMILLE—CERTHIIDÆ. GRIMPÉREAUX.

Le nom du seul grimpéreau de l'est du Canada, le grimpéreau brun décrit parfaitement cet oiseau. C'est un petit oiseau brun qui rampe ou grimpe à la façon du pic vert sur les troncs et les plus grosses branches des arbres de forêt. Il est plus petit que tout pivert du Canada et son bec relativement long, léger, délicatement appointé et en forme de faucille (fig.

64, p. 30) très propre à extraire les menus insectes et leurs œufs des étroites cavités mais non à ciseler le bois même le plus mou ou l'écorce pour les atteindre. La queue est plutôt longue et raide, et les griffes sont très longues et bien recourbées.

726. **Le Grimpereau d'Amérique.** (BROWN CREEPER). *Certhia familiaris*. L., 5-66. XLVI A.

Traits distinctifs. Les raies brunes et blanches, où ne ressort aucun dessin; le bec finement délicat, en forme de faucille et les longues plumes raides de la queue, usées au bout, sont des marques distinctives de l'espèce et facilement reconnaissables.

Indications sur le terrain. C'est notre seul petit oiseau brun avec les habitudes prononcées d'un grimpeur.

Nid. Derrière l'écorce à demi-détachée des arbres, nid fait de branchettes, de bandes d'écorce, de menus morceaux de bois mort, de mousse, etc.

Habitat. En tant qu'espèce qui occupe la plus grande partie de l'hémisphère nord, on le trouve dans l'est de l'hémisphère boréal. Dans l'est de l'Amérique du Nord, le grimpeur de l'Est est la sous-espèce indigène; au Canada, il va vers l'ouest jusqu'aux provinces de la Prairie et vers le Nord au delà des limites de la colonisation.

SOUS-ESPÈCES. Le grimpeur brun se rencontre dans l'ancien monde aussi bien que dans le nouveau. L'espèce se divise en plusieurs sous-espèces, en Amérique, dont une seule, le grimpeur brun de l'Est, *Certhia familiaris americana* se rencontre dans l'est du Canada.

Pressé étroitement contre le tronc d'un arbre de la forêt, le grimpeur brun peut être aperçu grimpeur en spirale le long du tronc perpendiculaire et retirant avec ardeur quelque insecte de chaque fissure et de chaque lézarde. Arrivé à cette partie de l'arbre où les branches commencent à s'amincir et l'écorce à devenir lisse il se laisse choir à la base d'un arbre voisin et recommence son travail ascensionnel, toujours se dépêchant, jamais ne s'arrêtant, emplissant son estomac de petits escarbots, de larves et d'œufs d'insectes. L'adresse avec laquelle cet oiseau peut s'accrocher à des surfaces lisses est remarquable. L'auteur a vu un jour un grimpeur brun grimper le côté poli d'une bibliothèque en noyer noir, et le faire sans plus d'inquiétude que si cela avait été l'écorce la plus rugueuse d'un chêne des bois.

Valeur économique. Le grimpeur brun est purement insectivore et l'attention continuelle et microscopique qu'il donne au moindre tout petit trou dans une écorce rugueuse ne s'explique que par la présence du fléau d'innombrables insectes. La majeure partie de son activité se dépense dans les bois, mais comme ce petit oiseau se montre souvent dans les vergers et sur des arbres feuillus ou servant à embellir les alentours des villes et des maisons, l'espèce a certainement une très grande et très heureuse influence.

FAMILLE—SITTIDÆ. SITTELLES.

Les sittelles sont de petits oiseaux semblables aux piverts quant aux mœurs générales, mais leurs doigts sont du type ordinaire de ceux des passeurs, les trois doigts de devant et un doigt de derrière au lieu des deux doigts antérieurs et postérieurs caractéristiques des piverts. Le bec est assez semblable à celui du pivert comme contour, mais sans la pointe en forme de ciseau; il forme un léger angle avec la tête, ce qui lui donne l'air retroussé (fig. 65, p. 30, comparez avec fig. 41, p. 27). Les couleurs de cette espèce sont caractéristiques. Le nom anglais de "Nuthatch" vient de leur habitude de faire entrer de force des noisettes, ou quelque aliment dur, dans des fentes, et de les ébrécher jusqu'à ce qu'elles soient dedans. Bien que ces oiseaux soient capables de creuser le bois ou l'écorce ils n'emploient pas

cette
d'écorce
les ca

72
6-07.

Tra
être con
ait du r
couleur
au lieu c
sont tou
faiteme

Indi
sittelles
telle de

Nid
etc.

Hab
l'Améri
avance à
forêts.

SOL
dont une

Le
mervei
dieulai
comme
cri d'aj
petits i

Vo
soit très
les arbr
qui insj
la rech
maleule

728.
4-02. S
les dess
blanche s

Traits
de tout au
Indicu
avec une l

Nid.
Habita
trice dans
l'Amériq

C'e
fourrage
à fait le

Les
l'hémisp

cette force à faire des trous profonds dans les arbres, mais ils se contentent d'éliminer les parcelles écailleuses qui se détachent de l'écorce et de fouiller les cavités et les jointures.

727. **La Sittelle de la Caroline.** (CAROLINA NUTHATCH). *Sitta carolinensis*. L., 6-07. Planche XLVI B.

Traits distinctifs. Au moyen de la gravure et de la description de la famille cette espèce ne peut être confondue qu'avec la sittelle du Canada. C'est, toutefois, un plus gros oiseau, et bien qu'il y ait du marron sur le bas-ventre et sur les couvertures sous-caudales, et même quelquefois cette couleur légèrement lavée sur les flancs, la poitrine et presque tous les dessous sont d'un blanc pur au lieu d'être uniformément étendus d'une couleur brun rouge ou rouilleuse. Les côtés de la face sont tout à fait blancs au lieu d'avoir les couvertures de l'oreille noires et les raies sourcilières parfaitement noires.

Indications sur le terrain. Le dos d'un gris bleu uniforme et la couronne noire caractérisent les sittelles; la pureté du blanc en dessus et l'absence de la ligne blanche sourcilière distinguent la sittelle de la Caroline de celle du Canada.

Nid. Dans un trou d'arbre ou dans quelque cavité naturelle; nid fait de plumes, de feuilles, etc.

Habitat. En tant qu'espèce, la sittelle de la Caroline, habite toutes les parties tempérées de l'Amérique du Nord. Notre sous-espèce de l'Est, la sittelle de la Caroline, le type de l'espèce, avance à l'ouest jusqu'aux provinces de prairie au Canada, et au nord jusqu'aux limites des grandes forêts.

SOUS-ESPÈCES. La sittelle de la Caroline comprend géographiquement plusieurs races dont une seule, la sittelle à poitrine blanche, la forme typique, se rencontre dans l'est du Canada.

Le talent qu'ont les sittelles de monter et de grimper aux arbres est merveilleux. Elles voyagent en haut, en bas, en avant, en arrière, perpendiculairement ou horizontalement, se cramponnant en dessous des branches comme des mouches au plafond, et avec une aise toute semblable. Leur cri d'appel est un rauque *coin coin*; elles voyagent souvent en couples et en petits groupes de compagnie avec les mésanges et les grimpereaux.

Valeur économique. C'est un des oiseaux les plus utiles. Bien qu'il soit très attaché aux arbres forestiers il fréquente souvent les vergers et les arbres au riche feuillage, et en qualité de membre de la susdite compagnie qui inspecte d'un œil microscopique toutes les parties des troncs d'arbres, à la recherche des insectes, il consomme de grandes quantités de ces animaux pernicieux, soit à l'état adulte ou d'œufs ou de larves.

728. **La Sittelle du Canada.** (RED-BREASTED NUTHATCH). *Sitta canadensis*. L., 4-62. Semblable à la sittelle de la Caroline (Planche XLVI B), mais plus petite et avec les dessous lavés de brun rougeâtre; les couvertures des oreilles sont noires avec une raie blanche sourcilière.

Traits distinctifs. La taille et les différences de couleur en dessus distingueront cette espèce de tout autre oiseau.

Indications sur le terrain. C'est une sittelle évidemment plus petite que l'espèce précédente et avec une ligne blanche sourcilière très marquée; tous les dessous sont visiblement rougeâtres.

Nid. Dans un trou d'arbre ou de souche; nid fait avec des herbes.

Habitat. La couvaison a lieu plus au nord que celle de la sittelle précédente. Elle est migratrice dans la plupart des parties cultivées du Canada. Son territoire comprend presque toute l'Amérique du Nord et au nord, jusqu'à la limite des arbres.

C'est un oiseau un peu plus actif que le précédent et plus pressé de fourrager à l'extrémité des branches. À cela près ses habitudes sont tout à fait les mêmes.

FAMILLE—PARIDÆ. MÉSANGES

Les mésanges sont des oiseaux répandus sur un vaste territoire dans l'hémisphère nord, et aussi connus des habitants de l'Europe que de nous-

mêmes. Ce sont de petits oiseaux avec un bec plutôt court, mais relativement très arqué (fig. 66, p. 30). Leur plumage a certains caractères facilement reconnaissables.

731. La Mésange huppée. (TUFTED TITMOUSE). *Baeolophus bicolor*. L, 6. La plus grande de nos mésanges et qui n'a pas la coloration caractéristique des mésanges à tête noire. En dessus, une couleur uniforme gris-pierre; en dessous, blanc légèrement lavé de brun rougâtre sur les flancs. Une huppe bien distincte d'un bleu de gai.

Traits distinctifs. Le gris uni et la coloration sans marque quelconque, avec une huppe assez frappante, ce sont là des traits distinctifs et des indications sur le terrain auxquels on ne peut pas se tromper. Son cri ordinaire, fort et distinct: *Pittle-pittle pittle* est très caractéristique mais ressemble beaucoup à l'une des phrases de l'oriole des vergers.

Nid. Dans de vieux trous de pivert, dans les trous d'arbres, etc; nid fait de feuilles, de mousse, de bandes d'écorce, de plumes, etc.

Habitat. Le sud et l'est des États-Unis, au nord, jusqu'aux frontières du Canada dans la région inférieure des grands lacs.

Les seules mentions canadiennes faites de cette mésange huppée sont les deux de Pointe Pelée au sud de l'Ontario, dans la contrée à l'ouest du lac Érié. Cet oiseau est assez commun du côté Michigan de la rivière Détroit et même dans la grosse île au milieu du courant; on le trouverait probablement aussi du côté canadien de la rivière qu'oique, jusqu'ici, il n'y ait été fait aucune mention de sa présence.

735. La Mésange à tête noire. (BLACK-CAPPED CHICKADEE) *Penthestes atricapillus*. L, 5-27. Planche XLVII A.

Traits distinctifs. Cette espèce ne peut guère être confondue, dans l'est du Canada, qu'avec la mésange du Canada, mais c'est une espèce bien plus commune et plus largement distribuée.

Indications sur le terrain. Tout dans cette mésange à tête noire peut servir d'indication sur le terrain. Sa forme: un paquet tout rond de plumes avec une queue et presque pas de cou, la vivacité de ses allures, son penchant à se renverser la tête en bas tandis qu'elle inspecte le bout des branches, ses couleurs, une calotte noire et la gorge de même, des joues blanches, un dos d'un gris tendre, enfin son cri: *Tchick-a-di-die*, qui prononce si distinctement son nom; tout en un mot, annonce et proclame immédiatement son espèce.

Nid. Dans de vieux troncs d'arbre, ou dans des trous d'arbre, etc.; nid fait de mousse, d'herbes, de plumes et de duvet végétal.

Habitat. En tant qu'espèce elle s'étend du centre, environ, des États-Unis jusqu'à la limite des bois, au nord. La mésange à tête noire se rencontre à partir du sud de la frontière canadienne vers le nord, s'étendant à l'ouest vers les provinces de la Prairie où sa place est occupée par des sous espèces apparentées.

SOUS-ESPÈCES. A l'instar d'autres espèces très nombreuses et répandues au loin, la mésange à tête noire, sous l'influence de conditions variées dans ce continent est représentée dans l'Amérique du Nord, au point de vue géographique, par diverses races ou sous-espèces faciles à reconnaître. Dans l'est du Canada il n'y en a qu'une seule forme: le type de l'espèce, la mésange de l'Est. Au sud on trouve la mésange de la Caroline: *P. carolinensis*, espèce étroitement apparentée quoique distincte et qu'on peut considérer comme accidentelle dans la région inférieure des grands lacs et qui a passé dans le Michigan par dessus la frontière toute voisine. Les distinctions spécifiques cependant, sont trop subtiles pour pouvoir être exactement définies ici, et on ne peut en parler que sur la vue du spécimens.

De tous les oiseaux des champs ou des bois la mésange est le plus gai et le plus joyeux. La mésange est souvent le centre d'une petite société d'espèces mélangées de fauvettes, de vireos, de roitelets, de sittelles, et parfois d'un pie duveté et d'un grimpeur d'Amérique. Quand les migrants sont partis pour l'hiver, les plus robustes restent en arrière ensemble jusqu'à ce que la couvaison du printemps ne disperse cette aimable petite société. La mésange a un autre cri composé de seulement deux notes d'un registre naturel assez élevé, clair et qui ressemble à un coup de sifflet. La première note est prolongée, la seconde plus courte est de deux tons plus bas et a été traduite en anglais comme "*Spring's here.*"

Va
mésang
passe t
insectes
oiseau
utile à
deux gr
Les hab
le grim
coup d'i
ciables
rares
doit être
relative
la petit
La
cent vé
chrysal
pires flé
surtout
jamais j
sanges j
les cajo
la perso
tronc d'
répétées

740.
cus. L, é
calotte bi
mais voil
Traits
de contras
Indicat
manquant
blable à ce
Nid.
Habita
SOUS
du Canada
à l'est de
que légère

La
noire qu

FAMII

C'e
petit ne
qu'il ne
dans l'es
et les go

Valeur économique. Peu d'oiseaux sont plus utiles aux hommes que la mésange. Bien que petite elle est constamment au travail et, comme elle passe tout l'hiver parmi nous, son travail continue toute l'année. Les insectes sont tous très minuscules dans les tout premiers temps, aussi le petit oiseau qui dévore d'un seul coup tout un paquet d'œufs peut être aussi utile à l'agriculture qu'un plus gros oiseau qui fait son repas d'une ou de deux grosses chenilles ou d'insectes adultes, mais qui fait fi des plus minimes. Les habitudes fouilleuses de la mésange et de ses compagnons: la sittelle et le grimpeur, et leur inspection diligente des plus petites fentes, où beaucoup d'insectes se cachent ou passent l'hiver, rendent leurs services inappréciables au cultivateur, surtout en hiver quand les ennemis des insectes sont rares. La masse d'insectes pris de la sorte pendant l'année par ces oiseaux doit être très grande. Ces petits oiseaux si actifs exigent des quantités relativement considérables de nourriture pour résister à un froid intense, et la petitesse de leur gibier nécessite l'absorption d'innombrables individus.

La nourriture de la mésange est de 68 pour cent animale et de 32 pour cent végétale. La première sorte comprend des œufs, des larves, des chrysalides, de petits insectes, beaucoup de charançons et quelques-uns des pires fléaux de nos vergers et de nos récoltes. La nourriture végétale est surtout composée de petites semences et de fruits sauvages. On ne s'est jamais plaint que ces oiseaux fissent du tort aux fruits cultivés. Les mésanges peuvent être facilement attirées autour de nos fermes en hiver, et en les cajolant un peu elles deviendront assez apprivoisées pour se poser sur la personne et manger dans sa main. Un morceau de graisse attaché à un tronc d'arbre ne manque jamais de les attirer et nous assure de leurs visites répétées.

740. La Mésange du Canada. (BROWN-HEADED CHICKADEE). *Penthestes hudsonicus*. L. 5.12. Semblable à la mésange à tête noire mais de couleur plus terne et foncée; calotte brun grisâtre d'à peu près la même couleur que le dos; tache à la gorge visible mais voilée; les flancs teintés de brun rougeâtre.

Traits distinctifs. La calotte et le dos brunâtres, la coloration générale plus terne et avec moins de contraste.

Indications sur le terrain. Une mésange très foncée avec une coloration étendue et d'un dessin manquant de précision. Le cri caractéristique de «chik-a-di» est rauque, mais, à cela près, semblable à celui de la mésange ordinaire.

Nid. Dans des trous d'arbres ou de souche; nid fait de mousse et feutré de poils.

Habitat. L'Amérique du Nord à partir des régions colonisées jusqu'à la limite des forêts.

SOUS-ESPÈCES. La mésange du Canada est représentée par deux sous-espèces dans l'est du Canada. La forme type, la mésange de la baie d'Hudson, s'étend jusqu'au centre de l'Ontario; à l'est de cette région elle est remplacée par la mésange acadienne *P. h. littoralis* qui n'en diffère que légèrement par la taille et la couleur.

La mésange du Canada est si semblable de mœurs à la mésange à tête noire qu'une description plus longue ne serait guère qu'une répétition.

FAMILLE—SYLVIIDÆ. FAUVETTES, ROITELETS ET GOBE-MOUCHES DE L'ANCIEN MONDE.

C'est une famille de l'ancien monde représentée en Amérique par un petit nombre d'espèces. De celles-là, les fauvettes de l'ancien monde, qu'il ne faut pas confondre avec nos fauvettes des bois, ne se montrent pas dans l'est du Canada; les roitelets sont représentés par deux sous-espèces, et les gobe-mouches par une seule.

Sous-famille—Regulinae. *Roitelets*, L. 4. 7-4.41.

Description générale. Les roitelets sont les plus petits des oiseaux canadiens, le colibri excepté. Ils ressemblent au troglodyte par leur petit corps tout rond, mais encore plus aux mésanges par leurs mœurs et leurs actions. Leurs couleurs sont d'un olive verdâtre mat, plus clair en dessous, et ils ont à la couronne de petites taches brillantes de rouge, d'orange ou de jaune. Le bec est petit et droit semblable, quoique moins gros, à celui de la mésange (voir fig. 67, p. 31).

Traits distinctifs. Les roitelets pourraient être pris pour quelques-unes des fauvettes de couleur mate et uniforme, mais comme tous les plumages des roitelets, sauf ceux de la femelle et du tout jeune roitelet à couronne rubis, ont des taches brillantes à la couronne, cette circonstance préviendra généralement une confusion de ce genre que la taille seule, d'ailleurs, suffirait à prévenir.

Indications sur le terrain. Coloration verdâtre et mate, agitation pareille à celle des mésanges; habitude de se suspendre, la tête en bas, à des branchettes pendantes, telles sont les indications caractéristiques. Leurs petits cris, *tsi-tsi-tsi* deviennent bientôt familiers et sont facilement reconnaissables.

748. **Le Roitelet huppé.** (GOLDEN-CROWNED KINGLET). *Regulus satrapa*. L, 4-07. Planche XLVII B.

Traits distinctifs. Les roitelets, si semblables les uns aux autres par la coloration générale, peuvent être facilement distingués par leurs couronnes. Le roitelet huppé a une ligne noire au-dessus de l'œil laquelle n'existe pas chez le roitelet à couronne rubis, et la tache à la couronne est orange et jaune chez le mâle, ou simplement jaune chez la femelle au lieu de rouge rubis ou olive uniforme comme chez le roitelet à couronne rubis.

Indications sur le terrain. La couleur de la couronne et les sourcils de couleur claire sont les meilleures indications sur le terrain, mais, vu la petitesse de l'oiseau, il faut parfois une très grande somme de patience pour distinguer ces indications quand l'oiseau est sans cesse en mouvement à une hauteur considérable dans les grands sapins.

Nid. En général parmi les conifères. Nid suspendu, fait de mousse verte avec de fines bandes intérieures d'écorce tendre, de minces radicelles noires et de plumes.

Habitat. En tant qu'espèce, c'est l'Amérique du Nord. Le roitelet huppé de l'Est habite un territoire qui s'étend à l'Ouest jusque près des montagnes; l'oiseau couve dans la zone des conifères et au Nord, au delà des régions colonisées.

SOUS-ESPÈCES. Le roitelet huppé comprend deux sous-espèces: une de l'Est et une de l'Ouest. Celle de l'Est, qui est la forme type, est la seule qui se rencontre dans l'Est du Canada.

On se trouve souvent environné d'une grande multitude de ces petits oiseaux qui voltigent autour d'un épais feuillage pour y entrer ou s'en échapper, s'élançant ici et là, sans s'inquiéter de la présence d'un intrus, et de mouvements si rapides qu'il est difficile de remarquer les caractères spécifiques de ces oiseaux. Les uns se suspendent la tête en bas, à une touffe de branchettes, les autres sont tout à leur travail sur les branches et les ramilles, échangeant avec d'autres leur cri aigu de *tsi-tsi-tsi*. Le roitelet huppé reste au Canada presque tout l'hiver, quelquefois même l'hiver entier. Il aime les arbres toujours verts et souvent hante les conifères qui ornent les alentours des villes et des maisons. Il n'a peur de rien, est très confiant, mais ne s'approvoise pas comme fait la mésange.

Valeur économique. Les roitelets sont tellement insectivores qu'on peut à bon droit les considérer comme très utiles. Ils sont petits, il est vrai, mais leur quantité, quand ils se trouvent là, supplée à ce qui manque à leur taille; ce qui a été dit des mésanges, à cet égard, s'applique également aux roitelets.

749. **Le Roitelet à couronne rubis.** *Regulus calendula*. L, 4-41. Planche XLVII B.

Traits distinctifs. Le roitelet à couronne rubis peut probablement être pris pour les espèces précédentes seulement, mais l'absence de raies noires sur la tête est toujours distinctive.

Indications sur le terrain. En égard à la rapidité des mouvements de troupes d'oiseaux si vifs et à l'ombre épaisse que projettent des conifères très rapprochés, il est parfois difficile de saisir les marques distinctives de la tête des roitelets. On remarquera, cependant, que le roitelet à couronne rubis a l'habitude d'agiter ses ailes, à l'occasion, par quelques courts et rapides mouvements vibratoires, pendant certains repos momentanés en sautillant de droite et de gauche mais sans voler. Tout cela évoquera souvent chez l'observateur l'idée de la susdite espèce, bien que cela ne puisse cependant pas être regardé comme une preuve d'identité.

Nid.
cées, et ga

Habitat
le nord au

SOUS-
celle de l'E

Cet
étudier

roitelet

est fort,

il porte

la premi

être les n

C'es

l'Amériq

est d'une

et presqu

comme c'

cet oiseau

751. G

L, 4-05. I

plumes blai

une ligne ne

Traits di
primaire de l

Indication
d'arbres très

et étroite que

plutôt rauque

Nid. Fa

recouvertes à

avec côtés to

Habitat.

lac Érié et la

SOUS-E.

Une sous-espè

C'est

et fait son

façon régu

du lac Éri

il faut le c

Valeu

sagé à ce p

FA

C'est

non sans di

individus d

pour être

qu'une seul

Nid. Dans les conifères; nid fait de mousse et de fines bandes d'écorce proprement entrelacées, et garni de plumes; le nid est ordinairement à moitié suspendu.

Habitat. Le nord de l'Amérique du Nord. Dans l'est du Canada la couvaison se fait dans le nord au delà de la région colonisée, et plus au nord que le roitelet huppé.

SOUS-ESPÈCES. Le roitelet à couronne rubis comprend trois sous-espèces dont une seule, celle de l'Est, la forme type, se rencontre dans l'est du Canada.

Cette espèce ressemble tant au roitelet huppé qu'il n'y a pas lieu d'en étudier davantage ni les mœurs ni la valeur économique. Le chant du roitelet à couronne rubis est, toutefois, une des surprises de la nature. Il est fort, clair, de plein gosier et peut s'entendre à une distance surprenante; il porte aussi loin que celui du pinson pourpré. Quand on l'entend pour la première fois on l'attribue presque toujours à l'un des pinsons qu'on sait être les meilleurs chanteurs plutôt qu'à ce minuscule oiselet.

Sous-famille—Poliptilinae. Gobe-mouches. L. 4.05.

C'est une petite famille composée d'un seul genre et particulière à l'Amérique. La couleur est un bleu-cendré tendre avec du blanc. Le bec est d'une fauvette, à la surface, mais la première primaire de l'aile est petite et presque abortive, étant de plus de la moitié moins longue que sa voisine, comme c'est le cas chez le viréo gris-olive. Il n'y a qu'une seule espèce de cet oiseau au Canada.

751. **Gobe-mouches gris-bleu** (BLUE-GREY GNATCATCHER). *Poliptila caerulea*. L. 4.05. Les dessus sont d'un gris bleu uniforme; les ailes foncées, la queue noire, les plumes blanches du dehors de la queue; les dessous et la face tout blancs. Le mâle a une ligne noire en travers du front et au-dessus de l'œil.

Traits distinctifs. La petite taille, la coloration uniforme bleu et blanc et la très courte plume primaire de l'aile, tout cela est distinctif.

Indications sur le terrain. Les couleurs d'un petit oiseau qui habite les plus hautes branches d'arbres très élevés, sont habituellement malaisées à distinguer, cependant les contours, la longue et étroite queue balancée comme celle de la fauvette à queue rousse, et ses notes caractéristiques, plutôt rauques, sont d'excellentes indications.

Nid. Fait de vrilles, de fines bandes d'écorce, d'herbes délicates, solidement entrelacées et recouvertes à l'extérieur de fils d'araignée et de lichens. Il a la forme d'une cheminée, haut avec côtés tout droits. C'est un des plus beaux nids d'oiseau américain.

Habitat. Le sud-est des Etats-Unis allant au nord jusqu'à la frontière canadienne le long du lac Érié et la rivière Détroit.

SOUS-ESPÈCES. La sous-espèce de l'Est, le gobe-mouches de l'Est, est la forme type. Une sous-espèce de l'Ouest se rencontre dans les états du Sud-Ouest.

C'est un oiseau des forêts de grands arbres, où il habite à l'ordinaire et fait son nid parmi les cimes des arbres. Comme on ne le trouve de façon régulière que dans le sud de l'Ontario, le long des rives de l'ouest du lac Érié, et qu'on ne l'a rencontré ailleurs que par occasion au Canada, il faut le considérer comme un oiseau rare dans ce pays.

Valeur économique.—Trop rare au Canada pour pouvoir être envisagé à ce point de vue.

FAMILLE—TURDIDAE. GRIVES ET OISEAUX APPARENTÉS.

C'est ici un groupe presque cosmopolite systématiquement séparé, non sans difficulté, de la dernière famille mentionnée, lors même que les individus décrits dans les pages qui suivent sont assez fortement marqués pour être facilement reconnaissables. Dans l'est du Canada il n'y a qu'une seule sous-famille qui soit représentée.

Sous-famille.—*Turdinæ*. Les grives vraies. L. 6.25-10.

La plupart des grives canadiennes sont faciles à reconnaître comme telles. Au point de vue systématique elles sont clairement indiquées par le nombre des primaires et par leurs pieds squameux. Comme ces détails sont plutôt difficiles à distinguer pour un amateur, il sera peut-être plus facile de différencier ces oiseaux au moyen d'autres caractères plus frappants et qui s'appliquent aux représentants de ce groupe dans l'est du Canada. Dans ce but, on peut distinguer d'un côté les grives proprement dites, et de l'autre le merle d'Amérique, le rouge-gorge bleu et le torquet motteux, ce dernier très rare et les deux autres si bien caractérisés que d'être aisément reconnus. Les grives proprement dites sont des oiseaux de taille moyenne, bruns en dessus et blancs en dessous, avec la poitrine plus ou moins tachée, sauf une espèce, la grive de Wilson, où elle est très visiblement tachée. Tout oiseau canadien de cette description, entre 6.25 et 8 pouces 30 de long, avec la première primaire très petite et amoindrie, appartient à ce groupe. Les grives sont toutes des oiseaux qui se tiennent au sol et habituellement plus ou moins solitaires. Leur principale nourriture se compose d'insectes et de fruits tendres. Les espèces des contrées boisées sont de minime importance immédiate, bien que leur influence soit bienfaisante. Toutes les grives de ce groupe sont d'aimables chanteurs.

755. **La Grive des bois.** (WOOD THRUSH). *Hyllocichla mustelina*. L. 8.29. Plaque XLVIII A.

Traits distinctifs. Cette grive est facilement reconnue pour telle, bien qu'elle ait un peu la couleur générale de la grive rousse. La courte queue, le bec tout droit, l'œil foncé au lieu de clair, sont de bons traits distinctifs. Elle peut se distinguer des autres membres de l'espèce par sa plus grande taille, la blancheur absolue de la poitrine, la délimitation plus tranchée des taches rondes et par la teinte jaunâtre plutôt que rougeâtre ou d'olive du dos, teinte très brillante sur la tête.

Indications sur le terrain. Les taches bien tranchées sur une poitrine toute blanche, la teinte basané du dos, sont les meilleurs indications sur le terrain.

Nid. Sur de jeunes arbres à environ 8 pieds au-dessus du sol; nid fait de feuilles, de radicelles, de fines ramilles, de tiges d'herbes solidement entrelacées, et garni de boue et de fines radicelles.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord; du nord au sud de l'Ontario; se trouve par occasion ou de passage dans les régions voisines. La grive des bois est un oiseau des contrées boisées plutôt méridionales; elle est commune au Canada seulement dans les parties plus méridionales.

La grive des bois est un oiseau des contrées boisées plutôt méridionales; elle est commune au Canada seulement dans les parties plus méridionales.

756. **La Grive de Wilson.** (WILSON'S THRUSH, VEERY). *Hyllocichla fuscescens*. L. 7.52. Plaque XLVIII B.

Traits distinctifs. Chez cette grive le brun est presque aussi basané que chez les grives des bois mais le dos est de couleur uniforme et nullement plus brillant sur la tête et la queue qu'il ne l'est ailleurs. Les taches de la poitrine se réduisent à une vague série de taches plus foncées sur les côtés du cou et sur une région teintée en travers de la poitrine supérieure.

Indications sur le terrain. La coloration uniforme, claire du dos et la couleur claire pour ainsi dire saupoudrée, des taches de la poitrine.

Nid. Sur le sol ou tout auprès; nid fait de bandes d'écorce, de radicelles, de feuilles enveloppées d'autres feuilles, et garni de radicelles.

Habitat. Le nord de l'Amérique du Nord jusqu'aux limites de la colonisation.

SOUS-ESPÈCES. Au Canada, la grive de Wilson est représentée par deux sous-espèces, la présente qui est la forme type et la grive des saules qui habite l'ouest, avançant vers l'est jusqu'au Manitoba et ne se rencontrant que par occasion dans l'est du Canada.

La grive de Wilson occupe un vaste territoire dans les régions colonisées. Au delà du territoire occupé par la grive des bois et avant que les

autres grives
et les noires
des, au co
entendre.

757. *L. alicia*. L. 7.53

Traits distinctifs. La suivante—la deux peuvent leur poitrine. Chez la grive et froid au lieu

Indication colorés feront sence de tons ce soit seuler certitude; au très passagers

SOUS-ESPÈCES. celle d'Alice, reléguée dans deux formes.

Habitat. régions colonisées

758a. L. 7.17. Plaque

Traits distinctifs. sur la queue, et autres sauf de reniera de ce

Indications facile qui la plus favorable

Nid. Dar d'herbes gross d'herbe.

Habitat. au Canada, de son existe dans

SOUS-ESPÈCES. La race type, s grive de l'Est, du Canada.

Au pri nombrables vont à leur proportion

759. La XLIX B.

Traits distinctifs. traste avec le b

Indications. une grive. La l'espèce.

Nid. Sur l d'aiguilles de pi

Habitat. E de l'Est va ver elle couve d'hal nos limites mé

autres grives ne soient devenues plus nombreuses cette espèce est commune, et les notes qu'elle lance, semblables à celles des cloches, tombant en cassades, au coucher du soleil, dans les sombres buissons, sont très agréables à entendre.

757. La Grive d'Alice. (ALICE'S THRUSH OU GREY-CHEEKED THRUSH). *Hylocichla alicia*. L, 7-58. Planche XLIX A.

Traits distinctifs. Tout en étant une espèce distincte, cette grive ressemble tellement à la suivante—la grive de Swainson au dos olive—qu'il est assez difficile de l'en distinguer. Toutes deux peuvent être distinguées d'avec d'autres grives par leur dos d'un olive foncé uniforme et par leur poitrine fortement mouchetée de taches fondues ensemble par places et n'en faisant qu'une. Chez la grive d'Alice les côtés de la face et les taches de la poitrine sont parsemés d'un gris terne et froid au lieu de l'être d'un chamois de tons chauds.

Indications sur le terrain. La poitrine fortement tachetée, le dos et la queue uniformément colorés feront distinguer cette grive d'avec toutes les autres, sauf de la grive de Swainson. L'absence de tons chamois sur le côté de la face, la différenciera de cette espèce, bien que, sur le terrain, ce soit seulement dans les plus favorables conditions que ce caractère pourra être discerné avec certitude; aussi bien, des spécimens aperçus dans l'obscurité des bois ou à la faveur d'instantanés très passagers, consacrés à ces observations, resteront non identifiés.

SOUS-ESPÈCES. La grive d'Alice comprend deux races au point de vue géographique: celle d'Alice, le type, et la grive de Bicknell *H. A. bicknelli*. Cette dernière, au Canada, se trouve reléguée dans les Provinces Maritimes au-dessous du golfe du Saint-Laurent, mais l'habitat des deux formes, dans l'est du Canada, n'est pas bien précisé.

Habitat. Le nord de l'Amérique du Nord; la couvaison se fait surtout au Canada à partir des régions colonisées dans la direction du nord.

758a. La Grive de Swainson. (OLIVE-BACKED THRUSH) *Hylocichla ustulata*. L, 7-17. Planche XLIX A.

Traits distinctifs. Le dos uniformément coloré sans différence de couleur soit sur la tête soit sur la queue, et la poitrine fortement mouchetée de taches distingueront cette grive de toutes les autres sauf de la grive d'Alice. La nuance chamois au lieu d'un gris froid dans les joues, la différenciera de cette dernière espèce.

Indications sur le terrain. Le dos et la poitrine caractérisés comme ci-dessus. La coloration faciale qui la distingue d'avec celle d'Alice ne peut être aperçue que dans les circonstances les plus favorables et il y a bien des individus qu'on n'a jamais pu identifier.

Nid. Dans les buissons ou sur de petits arbres à environ 4 pieds au-dessus du sol; nid fait d'herbes grossières, de mousse, de radicales, de feuilles et d'écorce; garni de radicales et d'herbe.

Habitat. En tant qu'espèce, toute l'Amérique du Nord; la couvaison a lieu principalement au Canada, depuis les limites des régions cultivées dans la direction du Nord. La grive de Swainson existe dans l'Ouest jusqu'aux Montagnes Rocheuses.

SOUS-ESPÈCES. La grive, à dos olive, dite de Swainson, comprend deux sous-espèces. La race type, sous le nom de grive au dos brun rougeâtre est un oiseau de la côte du Pacifique. La grive de l'Est, dite à dos olive ou de Swainson, *H. u. swainsoni*, est la seule de son espèce dans l'est du Canada.

Au printemps et à l'automne, les bois peu épais sont envahis par d'innombrables grives de couleur uniforme, à poitrine tachetée qui ou bien vont à leur couvée ou en reviennent. Elles sont plutôt circumspectes et la proportion numérique de chaque espèce peut en général se supputer.

759. La Grive solitaire. (HERMIT THRUSH). *Hylocichla guttata*. L, 7-17. Planche XLIX B.

Traits distinctifs. Très semblables aux deux dernières, mais la queue brun rougeâtre fait contraste avec le brun olive du dos.

Indications sur le terrain. Le dos brun, la poitrine d'un blanc tacheté la fait reconnaître comme une grive. La coloration rougeâtre de la queue, qui contraste avec le dos olive, sert à identifier l'espèce.

Nid. Sur le sol, nid fait de mousse, d'herbes grossières et de feuilles, garni de radicales et d'aiguilles de pin.

Habitat. En tant qu'espèce, c'est tout le nord de l'Amérique du Nord. La grive solitaire de l'Est va vers l'Ouest jusque près des montagnes et vers le Nord jusqu'à la limite des arbres; elle couve d'habitude tout juste au delà les régions cultivées, mais assez irrégulièrement près de nos limites méridionales.

naître comme indiquées par ces détails peut-être plus res plus frappés l'est du Canada proprement et le torquet isés que d'être scaux de taille itrine plus ou t très visible ntre 6.25 et 8 indrie, appari- le nourriture ntrées boisées e soit bienfa- eurs.

L, 8-29. Plan-

elle ait un peu la cé au lieu de clair, espèce par sa plus des taches rondes e sur la tête.

blanche, la teinte

illes, de radicales, le fines radicales. rouve par occasion rées boisées plutôt ridionales.

utôt méridio- es plus méri-

a fuscescens. L,

les grives des bois ueue qu'il ne l'est us foncées sur les

ir claire pour ainsi

euilles enveloppées

deux sous-espèces.

ant vers l'est jus-

égions coloni- avant que les

SOUS-ESPÈCES. La grive solitaire est une espèce d'humeur aimable et qui se pille aux circonstances. La forme typique est une race de l'Alaska. Le Canada de l'Est n'a qu'une seule sous-espèce, la grive solitaire de l'Est, *H. g. pallasi*.

La grive solitaire est un de nos plus fameux chanteurs. Malheureusement il est ordinairement muet quand il traverse le sud du Canada; il ne se fait entendre à son avantage que dans les bois de conifères du nord.

761. Le Merle d'Amérique. (AMERICAN ROBIN). *Planesticus migratorius*. L. 10
Planche L A.

Traits distinctifs. Le merle est un oiseau trop parfaitement caractérisé et connu pour demander une description spéciale.

Indications sur le terrain. Le merle est aisément reconnu, par ceux qui connaissent l'espèce, même à de grandes distances quand aucune couleur n'est visible, et cela grâce à sa silhouette, à sa façon de se tenir et aussi de voler.

Nid. Fréquemment sur des arbres fruitiers ou très feuillus; près des maisons, nid fait d'herbes grossières, de feuilles, de racinelles, etc., avec une séparation intérieure faite de boue; garni d'herbes fines.

Habitat. C'est dans toute l'Amérique du Nord que se rencontre cette espèce et vers le nord jusqu'à la limite des forêts. Le merle de l'Est habite partout au Canada coïncidemment avec celui de l'Ouest sur la côte du Pacifique.

SOUS-ESPÈCE. Le merle comprend trois sous-espèces desquelles celui de l'Est, l'individu type, est le seul représentant dans l'est du Canada.

Le merle a plus que tout autre oiseau des relations étroites avec l'homme. Sa voix joviale annonce le printemps. Son chant est le premier à se faire entendre le matin, et le dernier, vers le soir; en automne, quand il a dépouillé le sorbier de ses dernières baies et qu'il a disparu, on sait que l'hiver est aux portes. Bien qu'il soit appelé d'après le fameux oiseau de l'Ancien monde, il ne ressemble que de très loin au rouge-gorge d'Angleterre. Les seuls points de ressemblance entre eux sont la poitrine rouge et les mœurs familières.

Le pire ennemi des merles est probablement le chat domestique. Comme ils nichent à des endroits très accessibles, les jeunes merles sont exposés à bien des dangers; ils quittent souvent le nid avant d'être capables de se défendre tout seuls, et sont ainsi la proie du chat. La poitrine tachetée du jeune merle montre qu'il descend d'un ancêtre tacheté et qu'il est apparenté aux grives de l'espèce précédente. De fait, les jeunes de la plupart des oiseaux de cette famille ont la poitrine tachetée.

Valeur économique. Bien que le merle soit un aide très utile au cultivateur, son goût pour les fruits lui occasionne parfois des désagréments de la part du cultivateur qui élève des arbres fruitiers. Le 42 pour cent de sa nourriture fait de cet oiseau un insectivore, le reste se compose de baies et d'autres petits fruits tendres dont un peu plus du 4 pour cent consiste en du fruit cultivé.

765. Le Traquet motteux. (WHEATEAR) *Saxicola aenanthe*. L. 7-01. Oiseau qui ressemble au befigue, gris clair en dessus, blanc dessous, un chamois aux tons chauds à la gorge; un ruban noir en travers de l'œil et un croupion blanc. La femelle et le tout jeune sont semblables, mais plus ternes et d'un chamois plus uniforme.

Traits distinctifs. Le croupion blanc très large et visible avec la coloration générale indiquée plus haut sont caractéristiques.

Indications sur le terrain. Avec son croupion blanc si évident l'oiseau ressemble à un befigue partiellement albinos.

SOUS-ESPÈCES. La sous-espèce du traquet motteux qui se rencontre dans l'est du Canada c'est le traquet du Groenland, *S. o. leucorhoa*.

Nous dans le Gt mais seule

766. Le

Traits dis
bleu avec une
Les femelles
tachetées de b

Indication
trine.

Nid. Da
oiseaux: nid f

Habitat.
presque jusqu

SOUS-ES
race type, le r

L'oise

que le mer

construisait

poteaux de

pies. Son

pour peu q

à oiseaux d

brillante co

Valeur

et par cons

forment ur

tendre, ma

l'oiseau bleu

Albinism

ou tout à fait

des espèces q

causée par un

Axillaire

l'espace entre

étendue pour

Barres.

lignes tirées et

raies).

Cire. M

supérieure de

Cou. Es

et les épaules.

bien claire (fig

Couronn

crâne.

Couvert

qui servent au

de l'aile; com

en dessus de l

mères formen

et leur ressemblent

Nous avons ici un oiseau européen qui se rencontre assez régulièrement dans le Groenland et peut-être aussi dans les régions voisines de l'Ungava, mais seulement par occasion ou accidentellement ailleurs au Canada.

766. **Le Rouge-gorge bleu.** (BLUEBIRD). *Sialia sialis*. L, 7-01. Planche L B.

Traits distinctifs. C'est le seul oiseau parmi les espèces canadiennes qui soit complètement bleu avec une poitrine rougeâtre. L'oiseau indigo est bleu mais il lui manque la poitrine rouge. Les femelles et les tout jeunes sont plus ternes de couleur et les poitrines des jeunes oiseaux sont tachetées de brun, mais tous ont le dos d'un bleu très caractéristique.

Indications sur le terrain. La brillante coloration bleue du dos et le rouge terreux de la poitrine.

Nid. Dans des arbres creux, ou sur des poteaux ou des souches, aussi dans les maisons à oiseaux: nid fait d'herbes.

Habitat. L'est de l'Amérique du Nord, à l'ouest jusqu'aux provinces de la Prairie, et au nord, presque jusqu'aux limites de la colonisation.

SOUS-ESPÈCES. La sous-espèce de rouge-gorge bleu qui se rencontre au Canada c'est la race type, le rouge-gorge bleu de l'Est.

L'oiseau bleu arrive aux premiers jours du printemps en même temps que le merle et l'étourneau des prés. C'est un oiseau plein de confiance, construisant son nid dans les creux de vieux pommiers, dans les trous des poteaux de clôtures, dans les nichoirs, ou dans les nids abandonnés des pies. Son caractère c'est d'être essentiellement un oiseau de verger et, pour peu qu'il y soit encouragé, il construira son nid dans les maisonnettes à oiseaux d'un jardin où ses jolies manières, ses susurrements aimables et sa brillante coloration le feront regarder comme une précieuse acquisition.

Valeur économique. Le rouge-gorge bleu se nourrit surtout d'insectes et par conséquent se trouve être infiniment utile. Les semences d'herbes forment une partie importante de sa nourriture; il mange aussi du fruit tendre, mais, en fait, d'aucun fruit cultivé. De tout cela il résulte que l'oiseau bleu peut être considéré à juste titre comme éminemment utile.

GLOSSAIRE.

Albinisme. La présence ou fortuite ou purement capricieuse de spécimens blancs, ou tout à fait ou à peu près blancs, soit sur tout le corps soit par taches irrégulières, chez des espèces qui ne sont pas d'habitude blanches. Ce n'est là qu'une fantaisie de la nature causée par un manque de matière colorante dans le plumage (p. 7).

Axillaires. Un groupe de plumes en forme d'éventail sous l'aile et qui bouchent l'espace entre les plumes les plus internes, qui servent au vol, et le corps quand l'aile est étendue pour voler.

Barres. Dans les descriptions de la coloration des oiseaux, les barres désignent les lignes tirées en travers du corps et qui ne sont pas parallèles aux tuyaux des plumes (voir: raies).

Cire. Membrane qui a l'apparence de la cire et qui recouvre la base de la mandibule supérieure de certains oiseaux, surtout des éperviers (voir figure 33a et b, page 25).

Cou. Espace compris devant entre la gorge et la poitrine et derrière, entre l'occiput et les épaules. Il se compose d'un avant-cou et d'un arrière-cou, dont la signification est bien claire (fig. 1, p. 20).

Couronne. Le sommet de la tête depuis le front jusqu'à tout près de la base du crâne.

Couvertures. Ce sont des plumes qui recouvrent les bases des plumes plus grandes qui servent au vol et des plumes de la queue. Il y a les couvertures en dessus et en dessous de l'aile; comme il y a les couvertures sus-caudales et sous-caudales. Les couvertures en dessus de l'aile se divisent en grandes couvertures et en petites couvertures, les premières forment la plus grande ligne succédant tout à fait aux tuyaux qui servent au vol et leur ressemblent en quelque mesure au point de vue de la texture (figure 1, p. 20).

Crépusculaire. Qui se rapporte au demi-jour, qui précède la nuit.

Croupion. Le bas du dos et qui précède la racine de la queue (fig. 1, p. 20).

Culmen. Le culmen peut s'appeler la ligne de faite du bec. Vue de côté cette ligne dessine le tracé du haut du bec à partir de la naissance des premières plumes du front jusqu'à la pointe du bec. On le mesure en ligne droite comme avec le compas, sans suivre les courbes comme avec un yard à ruban (fig. 1, p. 20).

Dichromatisme. C'est la présence normale de deux colorations différentes dans la même espèce, et qui ne sont dues ni au sexe, ni à la saison ni à l'âge, et ne sont que partiellement héréditaires. Les deux colorations peuvent se présenter dans la même couvée bien que la tendance soit que la même espèce n'engendre que l'espèce semblable, et un individu peut prédominer dans une localité donnée quelconque (voir p. 8).

Emarginé. Quand ce mot est employé à propos de la forme des plumes, il indique qu'une membrane a été plus ou moins coupée comme si on l'avait ébarbée avec un couteau de poche.

Espèce. En classification zoologique c'est le plus petit groupe permanent. C'est le synonyme du mot "sorte" dont on se sert dans le langage ordinaire. Ainsi le chat domestique est une espèce, que ce chat soit maltais, moucheté ou angora; de même pour le chien, qu'il soit lévrier ou épagneul, et pour le cheval, qu'il soit shetlandais ou arabe (voir p. 5).

Famille. Dans la classification zoologique, la famille constitue l'un des grands groupes d'animaux qui sont assez semblables un à l'autre pour être classés ensemble à l'exclusion de tout autre individu. C'est le groupe que, par la grandeur, précède le "genre" et qui par ses limitations vient de suite après l'ordre ou le sous-ordre. Par exemple, tous les canards, oies et cygnes appartiennent à la même famille: Anatidae (voir p. 5).

Flancs. Les côtés du corps, plus bas que l'aile, sous l'aile. Ils sont souvent recouverts par un faisceau de plumes détachées qui peuvent être placées à volonté ou sur ou sous les tuyaux de l'aile refermée (fig. 1, p. 20).

Genre. Dans la classification zoologique le genre est un des plus petits groupes d'animaux qui ont assez de ressemblance entre eux pour être classés ensemble et à part de tous les autres groupes du même rang. C'est une sous-division d'une famille ou sous-famille et qui précède l'espèce. Un genre est donc un groupe d'espèces, et un groupe de genres est une famille.

Hors des limites. Quand on décrit l'habitat des oiseaux on dit d'un individu qui se rencontre au delà des confins de la région en question qu'il est hors des limites.

Hybride. Signifie qui est né de deux espèces différentes; soit une race croisée.

Iris. Partie colorée de l'œil. La pupille, sauf dans le cas d'albinisme, est toujours noire, et le cercle de couleur qui l'entoure s'appelle l'iris.

Lancéolé. Signifie: qui a la forme d'un fer de lance, c'est-à-dire longue, étroite, avec des bords parallèles ou se terminant graduellement en pointe.

Longueur. On abrège ce mot par l'initiale L et on la donne en pouces et dixièmes de pouce. La longueur est prise en ligne droite, comme avec le compas, depuis la pointe du bec jusqu'au bout de la plus longue plume de la queue, l'oiseau étant mis à plat sur son dos et suffisamment étiré pour rendre droites les courbes du cou.

Lores. Petite tache entre l'œil et la base du bec (fig. 1, p. 20).

Mandibules. Les deux pièces qui forment le bec; il y a la mandibule supérieure et la mandibule inférieure.

Manteau. Terme qui comprend la région dorsale, les épaules, les couvertures de dessus de l'aile et les secondaires. Ce terme s'applique plus spécialement aux mouettes chez lesquelles la couleur uniforme de ces parties fait penser à un manteau qui recouvre la portion supérieure du corps et les ailes refermées.

Méla
irrégulier,
normalem
l'albinisme
le mélanis
est d'habit
preuve de
mélanistiq

Miroi
la surface
constitue t
canards.

Nuqu
p. 20).

Ordre
qui se ress
groupes. (d'
oiseaux q

Pectin
ce terme s'
de cette fo

Pélagi

Poche
rieure, entr
qu'une sim
des espèces

Prima
c'est-à-dire
p. 20).

Race.
c'est tout gr
qui le diffé

Raies.
la longueur

Second
c'est-à-dire à

Sous-es
ou de varié
avec des cor
en ce qu'elle
Si nous pren
l'arabe, le Cl
du sujet).

Sternu
quille, auque

Suspen
fications forn
pour support

Tarse.
nous appelon
depuis la join

Mélanisme. C'est le contraire de l'Albinisme. C'est le phénomène plus ou moins irrégulier, d'individus très foncés ou même noirs quoique appartenant à une espèce qui normalement est de couleur claire. D'habitude ce phénomène est moins fréquent que l'albinisme, lors même que certaines espèces y sont plus exposées; dans quelques cas le mélanisme devient peu à peu et imperceptiblement du dichromatisme. L'albinisme est d'habitude le signe d'un manque de virilité. Le mélanisme ne semble pas être une preuve de faiblesse vitale, de là vient qu'il a plus de chance de se perpétuer. Un animal mélanistique s'appelle, dit-on, un mélano (voir p. 8).

Miroir. Partie brillante, rectangulaire formant pas sa couleur tache au centre de la surface supérieure de l'aile. Cette tache offre souvent une irisation métallique et constitue un caractère commun de coloration dans certaines familles, comme celle des canards.

Nuque. Petite place derrière le cou, juste au-dessous de la base du crâne (fig. 1, p. 20).

Ordre. Dans la classification zoologique on appelle ainsi un groupe de familles qui se ressemblent assez l'une l'autre pour qu'on puisse les distinguer de tous les autres groupes. C'est le groupe le plus grand avant la famille et la plus grande subdivision d'oiseaux que nous ayons à décrire au Canada (voir page 8).

Pectiné. Pourvu de dents ayant la forme des dents d'un peigne. En ornithologie ce terme s'applique surtout aux griffes de certaines espèces qui sont pourvues de dents de cette forme (voir fig. 19, p. 23).

Pélagique. Se dit des oiseaux qui fréquentent la haute mer.

Poche oésophagienne. Poche membraneuse qui dépend de la mandibule inférieure, entre ses bras en forme de Y et qui la relie au cou. Certaines espèces n'en ont qu'une simple trace; d'autres l'ont extrêmement développée, bien que dans la plupart des espèces elle soit entièrement absente.

Primaires. Les grandes plumes ou penes insérées à la première partie de l'aile, c'est-à-dire à la main, depuis le poignet jusqu'à l'extrémité (voir secondaires) (voir fig. 1 p. 20).

Race. Dans l'acception ordinaire, ce mot est synonyme de sous-espèce. En général, c'est tout groupe dans une espèce qui fait voir des caractères communs, reconnaissables, et qui le différencient d'autres groupes de la même espèce.

Raies. Dans les descriptions ornithologiques les raies suivent toujours le sens de la longueur de l'oiseau; si ces lignes sont en travers de leur corps, on les appelle des barres.

Secondaires. Les grandes plumes ou penes insérées à la seconde partie de l'aile c'est-à-dire à l'avant-bras depuis le poignet jusqu'au coude (voir Primaires) (fig. 1, p. 20).

Sous-espèce. Dans la classification ornithologique ce mot est synonyme de race ou de variété géographique; il indique une division de l'espèce ordinairement en rapport avec des conditions géographiques. La sous-espèce diffère essentiellement de l'espèce en ce qu'elle offre des états intermédiaires qui la relie à des races alliées du même rang. Si nous prenons le cheval comme représentant une espèce, les différentes races comme l'arabe, le Clydesdale ou Shetland, etc., sont des sous-espèces (voir p. 6, pour la discussion du sujet).

Sternum. C'est l'os pectoral. Chez l'oiseau c'est un creux profond en forme de quille, auquel viennent s'attacher les muscles de l'aile.

Suspendu. Se dit des nids quand ils pendent comme un sac entre les deux ramifications formant fourchette d'une branche, ou d'un autre point d'appui sans rien dessous pour supporter le nid.

Tarse. Les os métatarsiens du pied se fusionnent en un seul os. C'est là ce que nous appelons communément la patte de l'oiseau, mais qui n'en est que le pied, s'étendant depuis la jointure des doigts jusqu'au bout de la cuisse. Une comparaison avec les arti-

culations de la jambe de l'homme fera vite voir que le genou se trouve entre la cuisse et la "seconde articulation" de la volaille, et que la première articulation externe chez l'oiseau correspond à notre talon, les "pieds" n'étant que les doigts proprement dits.

Type. Dans la nomenclature zoologique la "forme type" est la forme parfaitement décrite et dénommée, et le spécimen d'après lequel la description a été faite est le spécimen type. Cela ne veut cependant pas dire que la forme soit typique dans le sens ordinaire du mot, bien que, pour la commodité du sujet on admette que les choses sont ainsi (p. 8).

Vermiculures. Dans les descriptions du plumage, le mot vermiculures se rapporte à des raies sinueuses imitant celles que produisent d'innombrables petits vers dans le bois.


Vinacé. Qui a la couleur du vin. C'est une teinte rose pourprée qu'indique la coloration de quelques oiseaux.



A. Le Grèbe au bec bigarré (p. 43).

Jeune

Adulte



B. Le Plongeon à collier, Huard (p. 44).

Adulte

Jeune



A. Le Goéland argenté (p. 52).

Adulte

Jeune



B. La Sterne commune (p. 55).

St Pierre,
 sur la forme
 de, only. "acc"

St Pierre,
 "le français"



*solitaire.
 dans les forêts de son lac.
 li, n'y. "acc- scie"*

A. Le Harle à poitrine rousse (p. 65).

Mâle

Femelle



*le plus,
 le plus*

B. Le Canard ordinaire (p. 66).

Mâle

Femelle



A. Le Canard noir (p. 66).




B. La Sarcelle à ailes vertes (p. 67).

Mâle

Femelle

St Pierre :
le brachin



*St Pierre :
le branchu*

A. Le Canard huppé (p. 68).
Mâle Femelle



B. La Bernache du Canada (p. 77).



A. Le Butor d'Amérique (p. 82).



B. Le Grand Héron bleu (p. 83).

Jeune

Adulte

de "Cet" et
son cas.



le "Cak" à cause
son cri.

A. Le Râle de la Caroline (p. 90).



B. La Bécasse d'Amérique (p. 95).



A. La Bécassine de Wilson (p. 96).



B. La Mauribèche tachetée (p. 104).

Adulte

Jeune

Melospiza phaeica



oiseau des yeux

A. Le pluvier kildir (p. 107).



B. La Caille (p. 110).

Mâle Jeune



A. Le Tétrás du Canada (p. 112).

Femelle

Mâle



B. Le Gelinotte à fraise (p. 112).

Phase rouge

Phase grise

no. maugum de



A. La Tourterelle de la Caroline et le Pigeon voyageur (p. 116 et 117).



90: "maugon de pules"

B. Le Busard des marais (p. 121).

Adulte

Jeune



A. L'Épervier brun (p. 122).

Jeune femelle Mâle adulte



B. L'Autour à tête noire (p. 124).

Jeune Adulte



A. La Buse à queue rousse (p. 125).



B. La Buse à manteau roux (p. 126).

Adulte

Jeune



A. Le Faucon pèlerin (p. 131).
 Adulte Jeune



B. Le Faucon épervier (p. 132).
 Femelle Mâle



A. L'Orfraie d'Amérique (p. 133).



B. La Chouette du Canada (p. 136).



A. Le Hibou maculé (p. 138).

Phase rouge Phase grise



B. Le Duc de Virginie (p. 139).



A. Le Coucou à bec noir (p. 142).
Le Coucou à bec jaune (p. 142).



B. Le Martin-pêcheur (p. 142).
Femelle Mâle



A. Le Pic minule (p. 144).

Mâle

Femelle



B. Le Pic arctique (p. 145).


Femelle

Mâle




A. Le Pic maculé (p. 146).

Femelle Mâle



B. Le Pic à huppe écarlate (p. 146).



A. Le Pie à tête rouge (p. 147).

Jeune

Adulte



B. Le Pie doré (p. 148).

Mâle

Femelle

o: nallongeur d
 pubescens

o: 2 Anas non cur
 de chromis



A. L'Engoulevent d'Amérique (p. 150).

Engoulevent de l'Amérique



B. Le Martinet des cheminées (p. 151).

Martinets des cheminées


sp. "pic-e-ami" = moucherolle verdâtre

E XXII.



le phobé

A. Le Moucherolle brun (p. 156).



B. L'Alouette ordinaire (p. 159).

L'Alouette ordinaire de l'Est.

L'Alouette ordinaire des Prairies.



A. Le Geai huppé (p. 161).



B. Le Geai du Canada (p. 161).



A. La Corneille d'Amérique (p. 163).



B. Le Goglu (p. 164).

Mâle Femelle




bulgo: étourneau
à robes

A. L'Étourneau ordinaire (p. 165).

Femelle

Mâle



bulgo: étourneau de lac

B. L'Étourneau à ailes rouges (p. 166).

Jeune

Mâle

Femelle

bulgo: étourneau



A. L'Étourneau des prés (p. 167)



B. L'Oriole de Baltimore (p. 167).

Mâle

Femelle

la. 1870



belgo: etourneau

A. La Mainate bronzé (p. 168).



B. Le Gros-bec des pins (p. 170).

Femelle

Mâle



A. Le Pinson pourpré (p. 171).

Mâle

Femelle



B. Le Moineau domestique (p. 172).

Mâle

Femelle



A. Le Chardonneret jaune (p. 176).


Jeune Femelle Mâle

*bulgo: visula de neige*

B. Le Plectropane des neiges (p. 177).



A. Le Pinson à ailes baies (p. 178).



B. Le Pinson à couronne blanche (p. 181).

Adulte

Jeune



*vulgo. petit Fréobine
 & cause de la similitude
 au, sous articulé.*


A. Le Pinson à gorge blanche (p. 182).

Adulte

Jeune




B. Le Pinson de montagne (p. 182).



A. Le Petit Pinson à couronne rousse (p. 183).

Jeune

Adulte



B. Le Pinson niverolle (p. 184).

Femelle

Mâle



A. Le Pinson chanteur (p. 185).


vilgo: variegat




B. Le Gros-bee à poitrine rose (p. 188).

Mâle

Femelles



A. Le Tangara écarlate (p. 190).
Le mâle change son plumage à l'automne
Mâle Femelle



B. L'Hirondelle pourprée (p. 192).
Mâle Jeune



A. L'Hirondelle des granges (p. 193).



B. L'Hirondelle bicolore (p. 193).



A. L'Hirondelle de rivage (p. 194).



B. Le Jaseur du cèdre (p. 195).

Adulte

Jeune



A. La Pie-grièche à croupion blanc (p. 197).



B. Le Virco aux yeux rouges (p. 198).

PLANCHE XXXIX.



A. Le Viréo gris olive (p. 199).



B. La Fauvette noire et blanche (p. 201).
Plumage du printemps Plumage d'automne



A. La Fauvette jaune (p. 205).

Mâle

Femelle



B. La Fauvette bleue à gorge noire (p. 206).

Mâle

Femelle



A. La Fauvette de Blackburn (p. 208).

Mâle

Femelle




B. La Fauvette à poitrine noire (p. 209).

Mâle

Femelle




A. La Grive couronnée (p. 211).




B. La Fauvette trichas (p. 213).

Mâle

Femelle



A. La Grive rousse (p. 218).



B. Le Troglodyte acdon (p. 220).

troglodyte



A. Le Grimpereau d'Amérique (p. 222).



B. La Sittelle du Canada (p. 223).



A. La Mésange (p. 224).



B. Le Roitelet huppé.
Mâle Femelle

Le Roitelet à couronne rubis (p. 226).
Mâle Femelle



A. La Grive des bois (p. 228).




B. La Grive de Wilson (p. 228).



A. La Grive d'Alice (p. 229).
La Grive de Swainson (p. 229).



B. La Grive solitaire (p. 229).




A. Le Merle d'Amérique (p. 230).

Adulte

Jeune

bulg.: mado-clat



B. Le Rouge-gorge bleu (p. 231).

Mâle

Femelle

bulg.: l'oiseau bleu

Acant

Accipi

Accipi

Actitis

Aegiali

Agelai

Aigle à

de

Aigles.

Aigles

Aigret

Aigret

Aix spo

Alaudid

Albinis

Alca tor

Alcedini

Alcidae.

Alyone

Alle alle

Alouette

Alouette

Aluco pr

Aluconid

Ammodr

Anas plat

rubr

Anatidae.

Anatina.

Anser alb

Anseres.

Anserinae.

Anthus ru

Antroston

Aphrizida

Aquila...

chr

Archibute

Archilochu

Ardea herc

Ardeidae.

Ardeinae.

Arenaria ir

Arquatella

Asio flamm

wilson

Astragalinu

INDEX.

A.

	Pages.
Acanthis.....	174
hornemanni.....	175
linaria.....	175
Accipiter.....	122
cooperi.....	124
velox.....	122
Accipitres.....	122
Actitis macularia.....	104
Aegialitis meloda.....	108
semipalmata.....	107
Agelaius phoeniceus.....	166
Aigle à tête blanche.....	129
doré.....	128
Aigles.....	120, 128
Aigles pêcheurs.....	133
Aigrette blanche d'Amérique.....	85
Aigrettes.....	83
Aix sponsa.....	68
Alaudidae.....	159
Albinisme.....	7
Alca torda.....	47
Alcedinidae.....	142
Alcidae.....	45
Aleyones.....	142
Alle alle.....	48
Alouette à branle-queue.....	104
ordinaire.....	159
Alouettes.....	159
Aluco pratincola.....	135
Aluconidae.....	134
Ammodramus savannarum.....	179
Anas platyrhynchos.....	66
rubripes.....	66
Anatidae.....	64
Anatina.....	66
Anser albifrons.....	77
Anseres.....	63
Anserinae.....	76
Anthus rubescens.....	216
Antrostomus carolinensis.....	149
vociferus.....	149
Aphriza.....	108
Aquila.....	128
chrysaetos.....	128
Archibuteo.....	125
lagopus sancti-johannis.....	127
Archilochus colubris.....	153
Ardea herodias.....	84
Ardeidae.....	81
Ardeinae.....	83
Arenaria interpres.....	108
Arquatella maritima.....	97
Asio flammeus.....	136
wilsonianus.....	136
Astragalinus tristis.....	176

	Pages.
Astur.....	122
atricapillus.....	124
Auk, Great.....	47
Razor-billed.....	47
Australe, région.....	8
Autour à tête noire.....	124
Avocet, American.....	94
Avocette d'Amérique.....	94
Avocettes.....	94

B.

Bæolophus bicolor.....	224
Balbusard d'Amérique.....	133
Balbusards.....	133
Bald pate.....	67
Barge de la baie d'Hudson.....	101
marbrée.....	100
Bartramia longicauda.....	103
Bec-croisé à ailes blanches.....	174
d'Amérique.....	174
Bec-scie.....	65
Becs-scie.....	64
Bécasse d'Amérique.....	95
Bécasses.....	92
de mer. <i>Voir</i> Phalaropes.	
Bécassine.....	95
de Wilson.....	96
rousse.....	96
Bernache commune.....	78
du Canada, Outarde.....	77
Bittern, American.....	82
Least.....	83
Blackbird, Crow.....	168
Red-winged.....	166
Rusty.....	168
Yellow-headed.....	166
Bluebill, Greater or Lake. <i>Voir</i> Duck, Greater Scaup.	
Little or Marsh. <i>Voir</i> Duck, Lesser Scaup.	
Bluebird.....	231
Bob-white.....	110
Bobolink.....	164
Bombycilla cedrorum.....	195
garrula.....	194
Bombycillidæ.....	194
Bonasa umbellus.....	112
Boréale, région.....	10
Botaurinæ.....	82
Botaurus lentiginosus.....	82
Brant.....	78
Branta bernicla.....	78
canadensis.....	77
Broad-bill. <i>Voir</i> Duck, Greater Scaup.	
River. <i>Voir</i> Duck, Lesser Scaup.	
Bruants.....	169
Bubo virginianus.....	139
Bucéphale d'Amérique.....	71
d'Islande.....	72
petit.....	72
Buffle-head.....	72
Bunting, Indigo.....	189
Snow.....	177
Busard des marais.....	121

Pages.

Busc

Busc

Busc

Busc

Bute

Buto

Buto

Buto

Buto

Butte

Butte

Buzzz

Caille

Calca

Calidr

Canac

Canar

Canar

Canard

Canvas

Caprim

Caprim

Caracur

Cardina

Cardina

Carpods

Catbird

Catharis

Cathart

Catharti

Catoptri

Centuru

Cepphus

Certhia 1

Certhiids

Ceryle al

Chatura

Chaturin

Chapmar

Charadri

Charadri

Pages.

122	Busards.....	119, 120, 121
124	Buse à manteau roux.....	126
47	Buse à queue rousse.....	125
47	de Pensylvanie.....	127
8	de Swainson.....	127
124	pattue d'Amérique.....	127
94	Buses.....	120
94	vraies.....	125
94	Buteo.....	125
	lineatus.....	126
	platypterus.....	127
	swainsoni.....	127
	Butonide.....	120
	Butor d'Amérique.....	82
	Butorides virescens.....	86
	Butors.....	81, 82
	Butterball. <i>Voir</i> Buffle-head.	
	Buzzard, Turkey. <i>Voir</i> Vulture, Turkey.	

Pages.

	C.	
	Caille d'Amérique.....	110
	Calcarius lapponicus.....	177
	Calidris leucophæa.....	100
	Canachites canadensis.....	112
	Canard à longue queue.....	72
	chipeau.....	67
	d'Amérique.....	67
	histrion.....	73
	huppé.....	68
	noir.....	66
	ordinaire.....	66
	pilet.....	68
	roux.....	76
	souchet.....	68
	Canards.....	68
	de baie, de mer, ou plongeurs.....	69
	d'étangs.....	66
	de rivières et d'étangs.....	66
	pêcheurs.....	64
	Canvas-back.....	70
	Caprimulgi.....	149
	Caprimulgidae.....	149
	Caracaras.....	130
	Cardinal.....	187
	gros-bec.....	187
	Cardinalis cardinalis.....	187
	Cardodacus purpureus.....	171
	Catbird.....	217
	Catharista urubu.....	120
	Cathartes aura.....	120
	Cathartide.....	119
	Catoptrophorus semipalmatus.....	102
	Centurus carolinus.....	147
	Cephus grylle.....	46
	Certhia familiaris.....	222
	Certhiidae.....	221
	Ceryle alcyon.....	142
	Chaetura pelatica.....	151
	Chaeturinae.....	151
	Chapman, Frank.....	5
	Charadriide.....	106
	Charadrius dominicus.....	106

	Pages.
Chardonneret des pins.....	177
jaune.....	176
Charittonetta albeola.....	72
Chat, Yellow-breasted.....	214
Chaulelasmus streperus.....	67
Chen œrulescens.....	77
Chen hyperboreus.....	77
Chevalier aux pattes jaunes.....	101
Chevalier à pieds jaunes, grand.....	101
petit.....	102
semipalmé.....	102
solitaire.....	102
Chikadee, Black-capped.....	224
Brown-headed.....	225
Chicken, Prairie.....	114
Chœtures.....	151
Chondestes grammacus.....	181
Chordeiles virginianus.....	150
Chouette cendrée.....	137
du Canada.....	136
épervière d'Amérique.....	140
Chuck-will's Widow.....	149
Circus.....	121
hudsonius.....	121
Cistothorus stellaris.....	221
Clamatores.....	154
Clangula Clangula.....	71
islandica.....	72
Classification.....	5
Coccyges.....	140
Coccyzinæ.....	141
Coccyzus americanus.....	141
erythrophthalmus.....	142
Cock-of-the-wood. <i>Voir</i> Woodpecker, Pileated.	
Cockawee. <i>Voir</i> Old Squaw.	
Colaptes auratus.....	148
Colibri à gorge rubis.....	153
Colinus virginianus.....	110
Colombes.....	115
Columbæ.....	115
Columbidæ.....	115
Colymbidæ.....	42
Colymbus auritus.....	43
holboelli.....	42
Comsothlypis americana.....	204
Coot, American.....	92
Coucous.....	140
d'Amérique.....	146
Corbeau.....	162
Corbigeau.....	105
des Esquimaux.....	106
Cormoran à aigrettes.....	61
ordinaire.....	61
Cormorans.....	61
Cormorant, Common.....	61
Double-crested.....	61
Corneille d'Amérique.....	163
Corneilles.....	162
Corvidæ.....	160
Corvinæ.....	162
Corvus brachyrhynchos.....	163
corax.....	162
Coturnicops noveboracensis.....	90

C
Cou
Cou
Cow
Cow
Cra
Cree
Cros
Crov
Cry
Cuck
Cucu
Cucu
Curl
Cyan
Cyn
Cyn
Cyn
Cyp
Dend
Dichr
Dickc
Dindor
Discus
Distinc
Distrib
Diver,
Dolich
Dove,
Doveki
Dowite
Dryoba

	Pages.
Due de Virginie.....	139
Duck, Black.....	66
Dusky.....	66
Eider. <i>Voir</i> Eider Duck.	
Greater Scaup.....	70
Harlequin.....	73
King. <i>Voir</i> Eider, King.	
Lesser Scaup.....	71
Ring-billed.....	71
Ring-necked.....	71
Rock.....	73
Ruddy.....	76
Spirit. <i>Voir</i> Buffle-head.	
Summer.....	68
Wood.....	68
Dumetella carolinensis.....	217
Dunlin.....	99

E.

Eagle, Bald.....	129
Golden.....	123
Echasses.....	94
Echassiers d'eau profonde.....	80
Echassiers hérodiens.....	81
Economique, valeur.....	4
Ectopistes, migratorius.....	115
Efraies.....	135
Efraie d'Amérique.....	134
Egret, American.....	85
Eider Américain.....	74
d'Amérique.....	74
Duck.....	74
King.....	75
remarquable.....	75
Eiders.....	73
Elanoides.....	121
forficatus.....	121
Empidonax flaviventris.....	157
minimus.....	159
trailli.....	158
virescens.....	158
Engoulevent criard.....	149
d'Amérique.....	150
de la Caroline.....	149
Engoulevents.....	149
Épervier brun.....	122
de Cooper.....	123
Éperviers.....	120, 121
Éperviers aux courtes ailes.....	123
Ereunetes pusillus.....	100
Erismatura jamaicensis.....	76
Erolia ferruginea.....	99
Esterlette, grand.....	54
Étourneau à ailes rouges.....	166
tête jaune.....	166
des prés.....	167
ordinaire.....	165
Étourneaux d'Amérique.....	164
Euphagus carolinus.....	168

Falco

Falco

Falco

Falco

Falco

Fauco

Fauco

Fauco

Fauco

Fauvet

Finch,

Fishing

Fleminj

Flicker

Florida

Flycate

F.

Pages.

139
66
66
70
73
71
71
71
73
76
68
68
217
99
129
123
94
80
81
4
115
135
134
85
74
74
74
75
75
73
121
121
157
159
158
158
149
150
149
149
122
123
121
123
100
76
99
54
166
166
167
165
164
168

	Pages.
Falco columbarius.....	132
islandus.....	131
peregrinus.....	131
rusticolus.....	131
sparverius.....	132
Falcon, Peregrine.....	131
Falcones.....	120
Falconidæ.....	130
Falconinae.....	130
Farlouse d'Amérique.....	216
Faucon blanc.....	131
des pigeons.....	132
épervier.....	132
noir.....	131
pèlerin.....	131
Faucons.....	130
vrais.....	130
Fauvette à ailes dorées.....	203
couronne orangée.....	204
rousse.....	210
croupion jaune.....	206
queue rousse.....	215
poitrine baie.....	207
jaune.....	214
noire.....	209
tête cendrée.....	206
bleue.....	207
bleue à gorge noire.....	206
d'Amérique.....	204
de Blackburn.....	208
Kirtland.....	209
Nashville.....	203
Pennsylvanie.....	207
Philadelphie.....	213
Wilson.....	215
des pins.....	209
prés.....	210
du Canada.....	205
Cap May.....	205
Connecticut.....	213
Kentucky.....	212
Tennessee.....	204
jaune.....	205
mitrée.....	214
rayée.....	208
trichas.....	213
vermivore.....	202
Fauvettes de l'ancien monde.....	225
des bois.....	200
des régions boisées.....	205
hochequeues.....	211
mucivores.....	214
vermivores.....	200
terrestres.....	212
Finch, Purple.....	171
Fishing Ducks. Voir Harles, Canards pêcheurs.	
Fleming, J. H.....	5
Flicker.....	148
Florida œulea.....	85
Flycatcher, Acadian.....	158
Chebec.....	159

	Pages.
Flycatcher, Crested.....	155
Least.....	159
Olive-sided.....	156
Scissor-tailed.....	154
Traill's.....	158
Yellow-bellied.....	151
Foulques.....	92
Fou de Bassan.....	60
Fous.....	60
de Bassan.....	60
Foulque d'Amérique.....	92
Fowls, True.....	109
Fratercula arctica.....	45
Fringillidæ.....	169
Fulica americana.....	92
Fulicinæ.....	92
Fuligininæ.....	69
Fulmar.....	58
Fulmars.....	57
Fulmarus glacialis.....	58
G.	
Galdwall.....	67
Gallinacés.....	109
Gallinæ.....	109
Gallinago delicata.....	96
Gallinula galeata.....	91
Gallinule de la Floride.....	91
Martinique.....	91
Florida.....	91
Purple.....	91
Gallinules.....	91
Gallinulinæ.....	91
Gannet.....	60
Garulina.....	160
Gavia immer.....	44
stellata.....	45
Gaviidæ.....	44
Geai du Canada.....	161
huppé.....	161
Geais.....	160
Gélinotte à fraise.....	112
queue aiguë.....	114
Glossaire.....	231
Gnatcatcher, Blue-grey.....	225
Gobe-mouches.....	225, 227
gris bleu.....	227
Godd or Gudd.....	47
Godwit, Hudsonian.....	101
Marbles.....	100
Goéland à ailes blanches.....	51
manteau glauque.....	51
noir.....	52
argente.....	52
de Bonaparte.....	53
Delaware.....	53
Goglu.....	164
Golden-eye.....	71
Barrow's.....	72
Goldfinch, American.....	177
Goosander. <i>Voir</i> Merganser, American.	

Goo

Gosl
GracGrea
GrèbGrèb
Greer
Grèci
Grim
Grim
Grive

Grives

Grosb

Gros-b

Gros g
GrouseGrues
Grue d
Gruidæ
Grus m
Guillen
Guillen

Guiraca

Pages.		Pages.
155	Goose, Blue.....	77
159	Canada.....	77
156	Snow.....	77
154	Wavey.....	77
158	White-fronted.....	77
151	Wild.....	77
92	Goshawk, American.....	124
60	Grackle, Bronzed. <i>Voir</i> Crow, Blackbird.	
60	Rusty, <i>Voir</i> Blackbird, Rusty.	
60	Great Head. <i>Voir</i> Golden-eye.	
92	Grèbe à bec bigarré.....	43
109	cou rouge.....	42
45	cornu.....	43
169	Holboell's.....	42
92	Horned.....	43
92	Pied-billed.....	43
69	Red-necked.....	42
58	Grèbe.....	43
57	Green-head. <i>Voir</i> Mallard.	
58	Greenlets. <i>Voir</i> Vireos.	
	Grèches.....	196
	Grimpereau d'Amérique.....	222
	Grimpereaux.....	221
	Grive couronnée.....	211
67	d'Alice.....	229
109	de la Caroline.....	217
109	Louisiane.....	212
96	Swainson.....	229
91	Wilson.....	228
91	des bois.....	228
91	ruisseaux.....	211
91	polygotte.....	217
91	rousse.....	218
91	solitaire.....	219
91	Grives et congénères.....	227
60	vrais.....	228
160	Grosbeak, Blue.....	189
44	Evening.....	170
45	Pine.....	170
44	Rose-breasted.....	189
161	Gros-bec à couronne noire.....	178
161	poitrine rose.....	189
160	bleu.....	189
112	des pins.....	170
114	Gros goéland.....	51
231	Grouse, Canada.....	112
225	Pinnated. <i>Voir</i> Chicken, Prairie.	
225, 227	Ruffed.....	112
227	Sharp-tailed.....	114
47	Spruce.....	112
101	Willow.....	114
100	Grues.....	87
51	Grue du Mexique.....	87
51	Gruide.....	87
52	Grus mexicana.....	87
52	Guillemots.....	45
53	Guillemot, Black.....	46
53	de Brunnich.....	47
164	noir.....	46
71	ordinaire.....	46
72	Thick-billed.....	47
177	Guiraca caerulea.....	189

	Pages.
Gull, Bonaparte's.....	54
Glaucous.....	51
Great Black-backed.....	52
Herring.....	52
Iceland.....	51
Ring-billed.....	53
Gyrfalcon.....	131
White.....	131
H.	
Haematopodidæ.....	109
Haliaeetus.....	128
leucocephalus.....	129
Harelda hyemalis.....	72
Harfang.....	139
Harle à poitrine rousse.....	65
d'Amérique.....	64
petit.....	65
Harles.....	64
Hawk, American Sparrow.....	132
Broad-winged.....	127
Chicken.....	126
Cooper's.....	123
Duck. <i>Voir</i> Falcon, peregrine.	
Marsh.....	122
Pigeon.....	132
Red-shouldered.....	126
Red-tailed.....	125
Sharp-shinned.....	122
Swainson's.....	127
Hell-diver. <i>Voir</i> Grebe, Pied-billed.	
Helodromas, solitarius.....	102
Haematopus Palliatus.....	109
Hen, Marsh. <i>Voir</i> Bittern, American.	
Hennessey, Frank.....	5
Herodias egretta.....	85
Herodii.....	81
Herodiones.....	80
Heron, Black-crowned Night.....	86
Héron bleu, grand.....	83
petit.....	85
de nuit.....	86
Great Blue.....	83
Græn.....	86
Little Blue.....	85
vert.....	86
Hérons.....	81
blancs.....	84
vrais.....	83
Hesperiphona vespertina.....	170
Hibou à oreilles courtes.....	135
longues.....	135
maculé.....	138
Hiboux.....	134
à aigrettes.....	135
Hirondelle bicoloré.....	193
à front blanc.....	192
de rivage.....	194
des granges.....	193
pourprée.....	192
Hirondelles.....	191
Hirundinidæ.....	191

Hirun
Histri
Hoche
Huard
Hultri
Humn
Hybri
Hydro
Hyloc

Ibides
Ibidid
Ibis...
 Gl
Ieteria
Ieterid
Ieterus
Ieterus
Index
Ionorn
Iridopr

Jaeger,

Jaseur

Jaseurs
Jay, Bl
 C
J. Cart
Johnso
Junco
Junco l

Kingbi
Kingfis
Kinglet
Kinglet
Kite, S
Knot..

Labbes
Labbe i
 I
 I
Lagopè
Lagopè
Lagopu

	Pages.
Laniens. <i>Voir</i> Grièches.	
Laniidae.....	196
Lanius borealis.....	196
ludovicianus.....	197
Lanivireo flavifrons.....	199
solitarius.....	199
Laridae.....	50
Larinae.....	50
Lark, Horned.....	159
Larus argentatus.....	52
delawarensis.....	53
hyperboreus.....	51
leucopterus.....	51
marinus.....	52
philadelphia.....	53
Limicolæ.....	92
Limosa fedoa.....	100
hæmastica.....	101
Linnet, Redpoll.....	175
Linottes.....	169
Littérature ornithologique.....	15
Lobipes lobatus.....	94
Longipennes.....	48
Longspur, Lapland.....	177
Loon, Common.....	44
Red-throated.....	45
Lophodytes cucullatus.....	65
Loxia curvirostra.....	174
Leucoptera.....	174
M.	
Macareux.....	45
arctique.....	45
Macoun, James M.....	5
John.....	5
Macreuse à large bec.....	76
d'Amérique.....	75
veloutée.....	75
Macreuses.....	73
Macrochires.....	149
Macrorhamphus griseus.....	96
Magpie.....	160
Maimate bronzé.....	168
couleur de rouille.....	168
Mallard.....	66
Black. <i>Voir</i> Duck, Black.	
Margot.....	60
Marica americana.....	67
Marila affinis.....	71
americana.....	69
collaris.....	71
marila.....	70
valisineria.....	70
Marmette.....	46
Martin, Bec. <i>Voir</i> Kingbird.	
pêcheur.....	143
Purple.....	192
Martins-pêcheurs.....	140, 142
Martinet des cheminées.....	151
Martinets.....	149, 151
Maubèche à croupion blanc.....	98
dos roux.....	99

Maubè

Maubèc
Mauve.
Meadow
Melane
Mélanis
Meleagr
Meleagr
Melospi

Mergule
Mergan

Mergina
Mergus

Merle d'
Merles.
Mésange
Mésange

Mésange
Micropa
Micropo
Migratio
Milan à
Milans.
Milouin

Mimidae
Mimus p
Mniotilti
Mocking
Moineau
Moineau
Moqueur
Morillon

Motacilli
Moucher

Pages.		Pages.
	Maubèche à longs pieds.....	97
196	longue queue.....	103
196	poitrine cendrée.....	98
197	poitrine jaunâtre.....	103
199	poitrine rousse.....	97
199	courlis.....	99
50	de Baird.....	98
50	de Wilson.....	99
159	pourprée.....	96
52	semipalmée.....	100
53	tachetée.....	104
51	Maubèches.....	9, 95
51	Mauve.....	53
52	Meadowlark.....	167
53	Melanerpes erythrocephalus.....	147
92	Mélanisme.....	8
100	Meleagridae.....	115
101	Meleagris gallopavo.....	115
175	Melospiza georgiana.....	186
169	lincolni.....	185
15	melodia.....	185
94	Mergule nain.....	48
48	Merganser, American.....	64
177	Hooded.....	65
44	Red-breasted.....	65
45	Merginae.....	64
65	Mergus americanus.....	64
174	serrator.....	65
174	Merle d'Amérique.....	230
	Merles.....	217
	Mésanges.....	224
	Mésange à tête noire.....	224
	du Canada.....	225
45	huppée.....	224
45	Mésanges.....	224
5	Micropalma himantopus.....	97
5	Micropodidae.....	151
76	Migration.....	11
75	Milan à queue d'aronde.....	121
75	Milans.....	120, 121
73	Milouin à tête rousse.....	69
149	aux yeux rouges.....	70
96	Mimidae.....	217
160	Mimus polyglottos.....	217
168	Mniotiltidae.....	200
168	Mockingbird.....	217
66	Moineau domestique.....	172
	Moineaux.....	169
60	Moqueurs.....	217
67	Morillon à collier.....	71
71	tête noire.....	70
69	petit.....	71
71	Motacillidae.....	216
70	Moucherolle à huppe.....	155
70	ventre jaune.....	157
46	queue en ciseaux.....	154
	aux côtés olive.....	156
143	brun.....	156
192	d'Acadie.....	158
140, 142	de la Caroline.....	155
151	des aulnes.....	158
149, 151	petit.....	159
98	verdâtre.....	157
99		

	Pages.
Moucherolles.....	154
Mouette à trois doigts.....	51
Mouettes.....	50
Moyak.....	74
Muscivora forficata.....	154
Myiarchus crinitus.....	155
Myiochanes virens.....	157

N.

Nageurs à longues ailes.....	48
à narines tubulaires.....	57
avec bec en crible.....	63
lamelirostres.....	63
petits, à narines tubulaires.....	57
totipalmés.....	60
Nannus hiemalis.....	220
Nettion carolinense.....	67
Nighthawk.....	150
Numenius.....	104
americanus.....	105
borealis.....	105
hudsonicus.....	105
Nuthatch, Carolina.....	223
Red-breasted.....	223
Nuttallornis borealis.....	156
Nyctale d'Acadie.....	137
de Richardson.....	137
Nyctea.....	139
Nycticorax nycticorax.....	86

O.

Oceanites.....	59
oceanicus.....	59
Oceanodroma.....	59
leucorhoa.....	59
Odontophoridae.....	110
Oidemia.....	73
americana.....	75
deglandi.....	75
perspicillata.....	76
Oie à front blanc.....	77
blanche.....	77
bleue.....	77
Oies.....	64, 76
Oiseaux chanteurs.....	159
criards.....	154
de marais.....	87
petits.....	88
proie.....	117
diurnes.....	120
nocturnes.....	134
rivage.....	92
mouches.....	149, 152, 153
percheurs.....	153
plongeurs.....	41
du type bécassine.....	95
râle.....	88
Old-Squaw.....	72
Old-wife Voir Old-Squaw.....	
Olor buccinator.....	80
columbianus.....	79

Opor

Orfra
Oriole

Oscin

Ospre

Otoco

Otus

Ovenl

Owl, J

J

I

C

C

C

C

S

S

S

S

Oxyeh

Oyster

Pandic

Pandic

Palmip

Paludi

Parida

Parioq

Passer

Passer

Passer

Passer

Passerl

Passeri

Pediæ

Peep, C

Pelecar

Pélican

Pelidns

Penthe

Perison

Perroq

Petits r

Pétrél c

Pétréls

Pages.
154
51
50
74
154
155
157

Oporornis.....	Pages.	212
agilis.....		213
formosus.....		212
philadelphia.....		213
Orfraie d'Amérique.....		133
Oriole, Baltimore.....		167
de Baltimore.....		167
des vergers.....		167
Orchard.....		167
Oscines.....		159
Osprey.....		133
Otocoris alpestris.....		159
Otus asio.....		138
Ovenbird.....		211
Owl, Acadian.....		137
American Barn.....		134
Long-eared.....		135
Short-eared.....		137
Arctic Saw-whet.....		137
Barred.....		136
Cinereous.....		137
Great Grey.....		137
Great Horned.....		139
Hawk.....		140
Saw-whet.....		137
Screech.....		138
Snowy.....		139
Oxychus vociferous.....		107
Oyster-catcher, American.....		109

P.

Pandion haliaetus carolinensis.....	133
Pandionidae.....	133
Palmipèdes totipalmés.....	60
Paludicola.....	87
Paridae.....	223
Paroquet. Voir Puffin.	
Passer domesticus.....	172
Passereaux.....	169
Passerculus princeps.....	178
sandwichensis.....	178
Passerella iliaca.....	186
Passercus.....	153
Passerherbulus henslowi.....	180
lecontei.....	180
nelsoni.....	180
Passerina cyanea.....	190
Pediæcetes phasianellus.....	114
Peep, Green-legged. Voir Sandpiper, Least.	
Pelecanidae.....	62
Pélicans.....	62
Pelidna alpina.....	99
Penthestes atricapillus.....	224
hudsonicus.....	225
Perisoreus canadensis.....	161
Perroquet.....	45
Petits nageurs à narines tubulaires.....	57
Pétrel de Leach.....	59
Wilson.....	59
Leach's.....	59
Wilson's.....	59
Pétrels.....	57, 58, 59

48
57
63
63
57
60
220
67
150
104
105
105
105
223
223
156
137
137
139
86

59
59
59
59
110
73
75
75
76
77
77
77
64, 76
159
154
87
88
117
120
134
92
149, 152, 153
153
41
95
88
72
80
79

	Pages.
Petrochelidon lunifrons.....	192
Pewee, Wood.....	157
Phalacrocoracidae.....	61
Phalacrocorax auritus.....	61
carbo.....	61
Phalarope de Wilson.....	94
Grey.....	94
hyperboréen.....	94
Northern.....	94
Red.....	94
Phalarope roux.....	94
Phalaropes.....	93
Phalaropodidae.....	93
Phalaropus fulicarius.....	94
Phasiani.....	109
Philohela minor.....	95
Phlœotomus pileatus.....	146
Phœbe.....	156
Pie à huppe écarlate.....	146
à tête rouge.....	147
arctique.....	145
chevelu.....	144
d'Amérique.....	145
de la Caroline.....	147
doré.....	148
maculé.....	146
minule.....	144
Pica Pica.....	160
Pici.....	143
Picidae.....	143
Picoides americanus.....	146
arcticus.....	144
Pies.....	143
Pie d'Amérique.....	160
Pie-grièche boréale.....	196
migratrice.....	197
Pies.....	160
Pies-grièches.....	196
Pigeon, Passenger.....	115
Pigeon voyageur.....	115
Pigeons.....	115
vrais.....	115
Pingouin commun.....	47
grand.....	47
Pingouins.....	45
Pinicola enucleator.....	171
Pinson à couronne blanche.....	181
rousse, petit.....	183
ailes baies.....	178
gorge blanche.....	182
queue aiguë.....	180
aux yeux rouges.....	187
chanteur.....	185
couleur d'argile.....	183
de Henslow.....	180
d'Ipswich.....	178
de Leconte.....	180
Lincoln.....	185
montagne.....	182
des champs.....	184
marais.....	186
prés.....	178
sauterelles.....	179

Pin

Pins
PintPipi
Pipi
Pira

Piso

Plan
Plau
PlectPlect
Pleg
PlongPlong
Plong
Plove

Pluvi

Pluvi

Poac

Podily

Poliop

Poliop

Porza

Poulet

Procel

Progn

Protec

Protot

Ptarm

Puffin

Puffin

Puffin

Pygop

Quail

A

Querqu

Quiscu

Pages.		Pages.
192	Pinson fauve.....	186
157	indigo.....	189
61	pourpré.....	171
61	Pinsons.....	169
61	Pintail.....	68
94	Springtail.....	68
94	Pipilo erythrophthalmus.....	187
94	Pipits.....	216
94	Piranga erythromelas.....	190
94	rubra.....	191
94	Pisobia bairdi.....	98
93	fuscicollis.....	98
93	maculata.....	98
94	minutilla.....	99
109	Planesticus migratorius.....	230
95	Plautus impennis.....	47
146	Plectrophane de Laponie.....	177
156	des neiges.....	178
146	Plectrophenax nivalis.....	177
147	Plegadis autumnalis.....	81
145	Plongeon à collier.....	44
144	gorge rousse.....	45
145	Plongeurs.....	44
147	Plongeur.....	71
148	Plover, American Golden.....	106
146	Black-bellied.....	106
144	Kildeer.....	107
160	Piping.....	108
143	Red-breasted. <i>Voir</i> Knot.	
143	Semi-palmated.....	107
146	Upland.....	103
144	Pluvier.....	106
143	à ventre noir.....	106
160	criard.....	108
196	doré d'Amérique.....	106
197	kildir.....	107
160	semipalmé.....	107
196	Pluviers.....	92, 106
115	Poaecetes gramineus.....	178
115	Podilymbus podiceps.....	43
115	Polioptila caerulea.....	227
115	Poliptilinae.....	227
47	Porzana carolina.....	90
47	Poules d'eau.....	91
45	Procellariidae.....	57
171	Progne subis.....	192
181	Protection.....	13
183	Protonotaria citrea.....	202
178	Ptarmigan, Rock.....	114
182	Willow. <i>Voir</i> Grouse, Willow.	
180	Puffin.....	45
187	grand.....	58
185	Puffins.....	57, 58
183	Puffinus.....	58
180	gravis.....	58
178	griseus.....	58
180	Pygopodes.....	41
185		
182		
184		
186		
178		
179		
	Q.	
	Quail.....	109
	American. <i>Voir</i> Bob-white.	
	Querquedula discors.....	67
	Quiscalus quiscula.....	168

	Pages.
R.	
Rail, King.....	89
Sora.....	90
Virginia.....	89
Rail Yellow.....	90
Râle de la Caroline.....	90
Virginia.....	89
élégant.....	89
jaune.....	90
Râles vrais.....	88
Ralli.....	88
Rallidæ.....	88
Rallus.....	88
elegans.....	89
virginianus.....	89
Raptores.....	117
Raven.....	162
Recurvirostra americana.....	94
Recurvirostridæ.....	94
Red-back. <i>Voir</i> Dunlin.	
Redhead.....	69
Redpoll, Hornemann's.....	175
Redstart, American.....	215
Regulinæ.....	226
Regulus calendula.....	226
satrapa.....	226
Ring-neck. <i>Voir</i> Killdeer.	
Riparia riparia.....	194
Rissa tridactyla.....	51
Robin, American.....	230
Roitelet à couronne rubis.....	226
de Bewick.....	219
la Caroline.....	219
marais au bec court.....	221
huppé.....	226
Roitelets.....	219, 225, 226
Rouge-gorge bleu.....	231

S.

Sanderling.....	100
Sandpiper, Baird's.....	98
Buff-breasted.....	103
Curlew.....	99
Least.....	99
Pectoral.....	98
Purple.....	97
Semipalmated.....	100
Solitary.....	102
Spotted.....	104
Stilt.....	97
White-rumped.....	98
Sapsucker, Yello-bellied.....	146
Sarcelle à ailes bleues.....	67
vertes.....	67
Sarcorhamphi.....	119
Saunders, W. E.....	5
Saw-bill. <i>Voir</i> Harle, Harle d'Amérique, Harle à poitrine rousse.	
Saxicola cinanthe.....	230
Sayornis phœbe.....	156
Scaup, American. <i>Voir</i> Duck, Greater Scaup.	
Scelopacidae.....	95

Pages.		Pages.
89	Scoter, American.....	75
90	Surf.....	76
89	White-winged.....	75
90	Scotiaptex nebulosa.....	137
90	Seiurus.....	211
89	aurocapillus.....	211
89	motacilla.....	212
90	noveboracensis.....	211
88	Setophaga ruticilla.....	215
88	Sharp-tail, Nelson's.....	180
88	Shearwater, Greater.....	58
88	Sooty.....	58, 59
88	Shoveller.....	68
89	Shrike, Loggerhead.....	197
89	Migrant.....	197
117	Northern.....	196
162	Shrikes.....	196
94	Sialia sialis.....	231
94	Siskin, Pine.....	177
69	Sitta canadensis.....	223
175	carolinensis.....	223
215	Sittelle de la Caroline.....	223
226	du Canada.....	223
226	Sittelles.....	222
226	Sittidae.....	222
194	Sizerin de Hornemann.....	175
51	Sizerins.....	174
230	Snipe.....	96
226	Red-breasted. <i>Voir</i> Dowitcher.	
219	Wilson's.....	96
219	Somateria.....	73
221	dresseri.....	74
226	mollissima.....	74
226	spectabilis.....	75
219, 225,	South-southerly. <i>Voir</i> Old-Squaw.	
231	Sparrow, Chipping.....	183
100	Clay-coloured.....	183
98	Field.....	184
103	Fox.....	186
99	Grasshopper.....	179
99	Harris.....	180
98	Henslow's.....	180
97	House.....	172
100	Ipswich.....	178
102	Lark.....	181
104	Leconte's.....	180
97	Lincoln's.....	185
98	House.....	172
146	Savannah.....	178
67	Song.....	185
67	Swamp.....	186
119	Tree.....	182
5	Vesper.....	178
100	White-crowned.....	181
98	White-throated.....	182
146	Spatula clypeata.....	68
67	Sphyrapicus varius.....	146
119	Spinus pinus.....	177
5	Spiza americana.....	190
230	Spizella monticola.....	182
156	pallida.....	183
95	passerina.....	183
	pusilla.....	184
	Spoonbill. <i>Voir</i> Shoveller.	

	Pages.
Squatarola squatarola.....	106
Steganopodes.....	60
Steganopus tricolor.....	94
Stelgidopteryx serripennis.....	194
Stercoraires.....	48
Stercorariidae.....	48
Stercorarius longicaudus.....	49
parasiticus.....	49
pomarinus.....	49
Sterna capsia.....	54
forsteri.....	55
hirundo.....	55
paradisaea.....	56
Sternes.....	50, 54
Sterne arctique.....	56
caspienne.....	54
commune.....	55
de Forster.....	55
noire.....	56
Sterninae.....	54
Striges.....	134
Strigidae.....	135
Strix varia.....	136
Sturnella magna.....	167
Sula bassana.....	61
Sulidae.....	60
Surnia ulula.....	140
Swallow, Bank.....	194
Barn.....	192
Cliff.....	192
Rough-winged.....	194
Tree.....	193
Swan, Trumpeter.....	80
Whistling.....	79
Swift, Chimney.....	151
Spine-tailed.....	151
Swimmers, Voir Nageurs.....	
Sylviidae.....	225

T,

Tanager, Scarlet.....	190
Summer.....	191
Tangara écarlate.....	190
vermillon.....	191
Tangaras.....	190
Tangaridae.....	190
Teal, Blue-Winged.....	67
Green-Winged.....	67
Telmatodytes palustris.....	221
Tern, Arctic.....	56
Black.....	56
Caspian.....	54
Common.....	55
Forster's.....	55
Tetraonidae.....	111
Tétras.....	111
du Canada.....	112
Thrasher, Brown.....	218
Thrush, Alice's.....	229
Grey-cheeked.....	229
Hermit.....	229

Thrus
Thryoi
Tiekle
Titmor
Totan
Tourn
Tourte
Towhe
Toxost
Traque
Tringa
Trochi
Trogl
Troglor
Tropic
Tryngi
Tubina
Turdid
Turdin
Turkey
Turnst
Tympa
Tyrann
Tyrann
Uria lo
tr
Vannea
Vautou
Vautou
Veery.
Verniv
Virco à
à
a
E
d
g
g
P
R
S
V
V
Y

Pages.		Pages.
106	Thrush, Olive-backed.....	229
60	Wilson's.....	228
94	Wood.....	228
194	Thryomanes bewicki.....	219
48	Thryothorus ludovicianus.....	219
48	Tickler, Kittiwake.....	51
49	Titmouse, Tufted.....	224
49	Totanus flavipes.....	102
49	melanoleucus.....	101
54	Tourne-pierre.....	108
55	à poitrine noire.....	108
55	Tourterelle de la Caroline.....	116
56	Towhee.....	187
50, 54	Toxostoma rufum.....	218
56	Traquet motteux.....	230
54	Tringa canutus.....	97
54	Trochili.....	152
55	Troglodyte ædon.....	220
55	d'hiver.....	220
56	des marais.....	221
54	Troglodytidae.....	219
134	Tropicale, zone.....	9
135	Tryngites subruficollis.....	103
136	Tubinares.....	57
167	Turdidæ.....	227
61	Turdina.....	228
60	Turkey, Wild.....	115
140	Turnstone.....	108
194	Tympanuchus americanus.....	114
192	Tyrannidæ.....	154
192	Tyrannus tyrannus.....	155
194		
193		
80		
79		
151		
151		
225		
	U.	
	Uria lomvia.....	47
	troille.....	46
	V.	
	Vanneau gris.....	106
	Vautour aura.....	120
	noir.....	120
	Vautours d'Amérique.....	119
	Veery. <i>Voir</i> Thrush, Wilson's.	
	Vermivora.....	202
	celata.....	204
	chryoptera.....	203
	peregrina.....	204
	pinus.....	203
	rubricapilla.....	203
	Vireo à front jaune.....	199
	à tête bleue.....	199
	aux yeux blancs.....	200
	yeux rouges.....	198
	Blue-headed.....	199
	de Philadelphie.....	198
	gris-olive.....	199
	griseus.....	200
	Philadelphie.....	198
	Red-eyed.....	198
	Solitary. <i>Voir</i> Blue-headed Vireo.	
	Warbling.....	199
	White-eyed.....	200
	Yellow-throated.....	199

	Pages.
Vireonidae.....	198
Vireos.....	198
Vireosylva gilva.....	199
olivacea.....	198
philadelphica.....	198
Vulture, Black.....	120
Turkey.....	120

W.

Warbler, Bay-breasted.....	207
Blackburnian.....	208
Black-capped.....	215
Black-poll.....	208
Black-throated, Blue.....	206
Green.....	209
Blue-winged.....	203
Canada.....	215
Cape May.....	205
Cerulean.....	207
Chestnut-sided.....	207
Connecticut.....	213
Golden-winged.....	203
Hooded.....	214
Kentucky.....	212
Kirtland's.....	209
Magnolia.....	206
Mourning.....	213
Myrtle.....	206
Nashville.....	203
Orange-crowned.....	204
Palm.....	210
Parula.....	204
Pine.....	209
Prairie.....	210
Prothonotary.....	202
Tennessee.....	204
Wilson's Black-capped.....	215
Yellow.....	205
Water-thrush, Louisiana.....	212
Northern.....	211
Water-witch. <i>Voir Grèbe, Pied-billed.</i>	
Wheatear.....	230
Whip-poor-will.....	149
Whiskey Jack. <i>Voir Jay, Canada.</i>	
Whistle-wing. <i>Voir Golden-eye.</i>	
Whistler. <i>Voir Golden-eye.</i>	
Widgeon, American.....	67
Willet.....	102
Wilsonia.....	214
canadensis.....	215
citrina.....	214
pusilla.....	215
Woodcock, American.....	95
Woodpecker, American Three-toed.....	145
Arctic Three-toed.....	145
Downy.....	144
Golden-winged. <i>Voir Flocker.</i>	
Hairy.....	144
Pileated.....	146
Red-bellied.....	147
Red-headed.....	147

Wren, I
C
I
S
V

Xantho

Yellow-

Yellow-

Zameloc
Zenaidu
Zonotric

Pages.		Pages.
198	Wren, Bewick's.....	219
198	Carolina.....	219
199	House.....	220
198	Long-billed Marsh.....	221
198	Short-billed Marsh.....	221
120	Winter.....	220
120		

X.

	Xanthocephalus tanthocephalus.....	166
--	------------------------------------	-----

Y.

	Yellow-legs, Greater.....	101
	Lesser.....	102
	Yellow-throat, Maryland.....	214

Z.

	Zamelodia ludoviciana.....	189
	Zenaidura macroura.....	116
	Zonotrichia albicollis.....	182
	leucophrys.....	181
	querula.....	181

..... 207
 208
 215
 208
 206
 209
 203
 215
 205
 207
 207
 213
 203
 214
 212
 209
 206
 213
 206
 203
 204
 210
 204
 209
 210
 202
 204
 215
 205
 212
 211

 230
 149

 67
 102
 214
 215
 214
 215
 95
 145
 145
 144

 144
 146
 147
 147